

# 首のしこりの検査について

## ●考えられる主な病気

- ① **リンパ節の腫れ：どこかに大元があるはずです。**
  - a. 歯や口のどに感染があると首のリンパ節が腫れます。
  - b. 同じくガンがあっても転移リンパ節が腫れます。
  - c. 血液のガン（悪性リンパ腫）でも腫れます。
- ② **唾液を作る腺の腫れ：**  
おたふく風邪で腫れる耳の前の耳下腺、顎の下顎下腺が感染や腫瘍で腫れます。
- ③ **生まれつきの嚢胞：**  
子宮の中で胎児が成長する時に、袋が残って徐々に大きくなります。


## ●医者診察

見たり触ったりして、痛いのか膿が出るのか確かめます。炎症やガンの大元が鼻のど口のどこかにいるので、細いファイバーを鼻の穴から入れて詳しく観察します。ガンを疑えば、採血して腫瘍マーカーを測定しますが、早期ガンだと分かりません。


## ●画像検査：翌日までに、専門医（放射線診断医）がレポートを書いてくれます。

- ① **CT単純もしくはCT造影：**まずは腫瘍の大きさを測定するためにCTですが、血管を染めて違いを際立たせるために造影剤を使いたい。腎臓や甲状腺が悪い人はできないので、採血して確かめてから予約します。糖尿病の薬を飲んでいる人も休止する必要があります。検査前の食事は抜きます。
- ② **MRI単純もしくはMRI造影：**腫瘍（固体）なのか膿（液体）なのかが分かる検査です。磁力を使うので医療用の金属（ペースメーカーや人工骨）が体にあるとできません。血管を染める造影剤を使いたいですが、腎臓の悪い人、喘息やアレルギー体質の人はできません。検査前の食事は抜きます。
- ③ **PET検査：**ガンに取り込まれるブドウ糖が光って全身の転移が分かる検査です。真木病院、日高病院、くすの木病院のPETセンターで撮影します。4時間前から糖분을控えるなど詳しい説明があります。
- ④ **超音波エコー：**針を刺す前に深さを見たり、頸動脈との距離を見極めます。経過観察にも使います。

単純CTでは血管が不明 造影CTで腫瘍と血管の違いが分かる



MRIの腫瘍がPETで2箇所光ってガンの転移と判明



## ●病理検査：専門医（病理診断医）がレポートを書いてくれますが7-14日かかります。

※ 心臓や脳疾患で、血液をサラサラにする薬、血が止まらなくなる薬を服用している人は、数日前から中止しなくてはならない場合もあります。

- ① **針生検（穿刺吸引細胞診）：**針を刺して中をほんの少しだけ抜いてスライドガラスに塗布します。細胞数個だけでの診断なので、ガンか良性かの判断だけです。
- ② **鉗子生検：**鼻や口の中は、小さな鉗子で米粒ほどの組織を採取します。
- ③ **パンチ生検：**皮膚を切って太い針を強力なバネで打ち出します。糸くず程度の組織が採取できます。
- ④ **メス切開による生検：**局所麻酔もしくは全身麻酔でリンパ節ごと摘出します。手術になり、入院が必要です。傷は7日後に抜糸します。最終診断が得られます。