

扁桃腺の手術後の出血について

手術後 1週間

2週間

3週間



手術後1週間を過ぎると、白いかさぶたが剥がれます。その時、出血することがあります。入院中はすぐ看護師に相談、退院後なら病院に連絡をください。

痰に血液の塊が混ざるのは、よくあることで心配ありません。
→ 次の日の朝9時に、病院に電話して相談してください。
痰が全体的に赤くなる時は、出血を疑ってください。

大丈夫 出血

出血した時の家での対応

- 1) 氷水を口に含んで、のどを冷やす。
- 2) 首まわりも、アイスノン氷枕で冷やす。
- 3) 口の中の血液は飲み込まずに洗面器に吐き出す。
- 4) 病院に電話する。




病院の電話番号
0273-22-5901

血液を飲み込むと、気持ち悪くなります。
嘔吐すると力が入って、さらに出血します。
血液の塊がのどに詰まると窒息します。
大量出血の時は、横向き寝で窒息を防いで救急車。

少しの出血:「もう止まりましたが、心配なので、当直の先生に診察してもらいたいです。」
中等の出血:「洗面器をかかえて、家族の運転で向かいます。耳鼻科の先生にも伝えてください。」
大量の出血:呼んだ救急隊員に病院連絡してもらってください。

手術後7-14日目に出血が多いです。



食べてはダメな食事: からあげ、とんかつ、炭酸、激辛の刺激物など

口の中もきれいにしてください。
鏡で傷の具合も自分で観察しましょう。



歯みがき
口ゆすぎ



高崎総合医療センター 耳鼻咽喉科