


メニエール病の治療

メニエール病はストレスが原因です。ストレスが加わると尿が出なくなり、内耳にリンパ液が溜まります。利尿剤（尿を多く出す薬）のイソソルビド（商品名イソバイド、メニレットなど）を内服して、リンパ液を内耳から排出する治療が一般的です。



膜迷路の腫脹(内リンパ水腫)により、めまい、耳鳴、難聴が引き起こされます。

利尿剤も有用ですが、長年飲み続ける訳にはゆきません。水の出入りを活発にすれば、薬に頼らない治療になります。水分を多く取りつつ、運動して汗をかくことを奨めます。軽い運動を長く続けるほうが、じっと汗をかいて水が出てゆきます。

- 1) **イソソルビド** 初回量 90 – 120 ml/日 良くなったら減量してゆきます
- 2) **水分摂取** 男性 2500 – 3000 ml/日
女性 1500 – 2500 ml/日

水分はカフェインを含まないものが望ましいですが、ただの水では飲みにくいようです。甘いジュースも多くは飲めません。薄いお茶のペットボトルはどうでしょう。目安として 500ml のペットボトルを 3 度の食事のときに 1 本、おやつの時間に 1 本飲みきると 2000ml を飲めます。

- 3) **有酸素運動** (十分に長い時間をかけて酸素を消費する運動) を 週 3 回各 1 時間程度 酸素を取り込む、汗をかくことが良いようです。年齢と体力に合わせて、散歩、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳、プールでの歩行運動などを組み合わせてください。

その他に、めまい止めの薬、ビタミン B12、血流改善剤、少量のステロイドなどが、症状によって処方されます。医師の指示に従ってください。