

急に聞こえない（難聴）めまいの病気

急に聞こえなくなる病気には3つあります。初めての難聴では、3つの病気の区別が付きません。難聴を反復すると、突発性難聴が否定されて、メニエール病など他の病気の診断になります。

1) 突発性難聴

若くて働き盛りの人が多い。片耳ほぼ聞こえない高度難聴、一生に一度きりで反復しない。


原因不明ですがストレスが関与します。芸能人がなってニュースになる病気です。必ず片耳の高度の難聴で、耳鳴りや耳閉感を伴います。めまいを伴うと重症で、聞こえも治りが悪いと言われています。数日以内にステロイド内服を開始しないと壊れた神経は戻りません。一生のうちに一度しか罹らず、繰り返し同じ耳が難聴になる場合は別の病気です。



2) メニエール病

ストレスある60歳位までに多い。難聴は悪化と改善を反復、めまいも反復する。

難聴は軽度から中等度で、めまい発作を反復します。ストレスが原因で内耳にリンパ液が溜まり、聞こえの神経を圧迫します（内リンパ水腫）。神経質な性格、頭を使う職業の人、親の介護と家庭や仕事を両立する忙しい人に多いです。生活習慣から変えないと、薬だけでは治らないことが多いです。



3) 聴神経腫瘍

年寄りに見つかることが多い良性腫瘍。顔の麻痺やめまいも伴う。

良性の脳腫瘍で稀な病気ですが、突発性難聴やメニエール病と似た症状で発症して間違われます。年に数人見つかります。誤診を防ぐために、難聴の人には脳MRI検査を勧めています。

4) その他

高齢者は血管が細くなって、脳に血液が回らなくてめまいや難聴を起こすことがあります。脳梗塞の前兆です。子供や若い女性は起立性低血圧が原因になります。