

「めまい」リハビリの手順

朝、布団で目が覚めたら、すぐに体を起こすのではなく、ちょっとした動作をしてから起きましょう。



- ① 目が覚めたら、すぐ起き上がらず、左右に一往復、寝返りを打つ。肩や腰が痛い場合は、首から上だけ横を向く。
- ② 最後にうつぶせになってから、起き上がる。

「起床時に立ちくらみがする」人は、布団の上であおむけになり、自転車をこぐように空中で足を動かし、足の血液を心臓に戻してから立ち上がります。



あおむけで自転車をこぐように空中で足を動かしてから、起き上がる。

「腕を左右に振る」

立っても座っても構いません。

【ここがポイント！】

- 右手を動かす範囲は「視線が外れないギリギリのところ」が目安。
- 頭は動かさずに、目だけをしっかり動かす。
- 右手はできるだけ広範囲に、ゆっくり動かす。

① 左手の人差し指をあごに当て、頭を固定する。右腕を肩の高さで前方に伸ばし、親指を上にする。



② 右手の親指を左右にゆっくりと動かし、それを目で追う。「いーち、にー、さーん」と声を出して数えながら、20回（10往復）行う。



「首を左右に振る」

首に痛みがある時は中止してください。立っても座っても構いません。

【ここがポイント！】

- 手を動かさないように注意する。
- 親指の爪から視線を外さず、首だけをしっかりと振る。
- ① 右手を体の正面に伸ばし、親指を上立てる。



② 親指の爪をじっと見つめたまま目を離さない。後ろを振り返るように、大きく頭を左右に回す。右手は動かさない。「いーち、にー、さーん」と声に出して数えながら、20回（10往復）行う。



「片足立ち」

【ここがポイント！】

- 必ず、イスの背やテーブルに手をついて体を支えて行う。
- ふらついたら無理をせず、床に足をつく。
- 30 数える間、らくに片方の足を上げられるようになったら、上げにくい方の足を多めに練習する。



- ❶ 壁やイスに手をつき、目を開けたまま、片方の足を床から 10cm ほど上げる。「いち、に、さん」と声に出し、 30 まで数える。
- ❷ 反対の足も同様に行う。

「足踏み」

【ここがポイント！】

- 腕は必ず水平に上げて下げない。
- 足をできるだけ上げる。かかとを上げるだけでは効果がない。
- 慣れてきたら、目を閉じて行う。
- 目を閉じて足踏みをするときは、必ず家族に付き添ってもらおう。心配な人は、軽く手を取ってもらってもよい。



- ① 両手を肩の高さまで上げ、目を開けたまま、**50回**足踏みをする。
「いち、に、さん」と声に出し**50**まで数える。
- ②① がスムーズにできるようになったら、今度は目を閉じて、同様に**50回**足踏みをする。

「足の裏の刺激」



イスに座って足の裏でゴルフボールを転がします。足の裏の感覚を取り戻すことで、ふらつきを改善させます。

ゴルフボール以外にも、足踏みマットや竹踏みでも良いです。

リハビリについての問い合わせは、以下までお願いします。

群馬県高崎市高松町 36 高崎総合医療センター 耳鼻咽喉科
部長 高橋克昌