

## 非薬物療法




毎日運動  
15分の散歩  
水泳がおすすめ



加圧式腹部バンド

## OD予防装具の使用



圧迫ソックス



- 水分を多く取りましょう(1日1.5~2L).
- 塩分の制限は必要ありません. むしろ多くとってください.いつもの食事に3g程. 余分にとるだけで効果がでます(1日塩分摂取量10~12g. p37参照).




## 非薬物療法




- 寝た状態や座った位置から, 急に立ち上がってはいけません. 30秒以上かけてゆっくりと.
- 朝起きるときには, 左のイラストのように, 頭を下げたまま歩き始めてください. 頭を上げて立ち上がると脳血流が低下して気分が悪くなります. 一度気分が悪くなると, なかなか治りません.

静脈周囲の骨格筋が収縮する際に  
静脈に外圧を与え、静脈還流を促進させる



Memmler's The Human Body in Health and Disease Tenth Edition,  
Lippincott Williams & Wilkins, 2005, p.319



【図3】 低血圧の病態生理

## ふくらはぎは第二の心臓


血液量の70%は下半身に集まっている

上半身  
30%

下半身  
70%



四つ足動物に「ふくらはぎ」はない  
二足歩行になって人間だけに発達



Q.「朝起きが悪いのですが、起こした方が良いでしょう？」

朝起きられない理由は3つ

- ① 朝に交感神経の活性化が悪く、血圧が上がらず、脳血流が維持できない
- ② 午後から交感神経が活性化して夜に最高潮、寝付きが悪くなる(入眠障害)
- ③ 寝られないので遅くまで起きてしまい、また朝起きられない

A.「大声で怒るのは良くありません」

- ・ 朝起こすとき、何回か声かけする、でも怒らない
- ・ カーテンを開けて朝日を入れ布団をはがす
- ・ 夜は眠れなくても布団に入るようすすめて消灯する



寝るときにも、  
加圧ソックスや腹帯バンド

