

ガマ腫へのOK-432(ピシバニール) 注入療法



ガマ腫は3つの唾液腺のうち、舌下腺から発生します。漏れた唾液の刺激で作られる嚢胞（のうほう）で、良性の病気です。簡単に嚢胞だけ摘出する手術は、再発率が高く、最近では行われません。舌下腺を全て摘出する手術は、完治しますが、舌のしびれと味覚低下の合併症が怖いです。手術以外の治療法に、治療効果90%のOK-432注入療法があります。数日、発熱したり痛みを伴いますが、数回繰り返すと、手術しないで治ります。

OK-432はリンパ管腫の治療に使われる薬でしたが、2011年、ガマ腫に対して「使用事例を審査上認める」と掲載され（保医発0928第1号）、保険診療になりました（厚生労働省「医薬品の適応外使用に関わる保険診療上の取り扱いについて」平成23年9月28日）。医科手技J017-2リンパ管腫局所注入(1020点)が算定されます。

	成功率	合併症と後遺症	手技	医師の推奨
開窓術や嚢胞摘出術	50%	軽度の痛み腫れ	局所麻酔か全身麻酔 30分	薦めない
舌下腺摘出術	99%	舌しびれ、味覚障害	全身麻酔 90分	最終手段
OK-432注入	90%	数日の発熱、痛み腫れ	数分	まず2-3回試す

当院では、まずOK-432を試して効果なければ、舌下腺摘出術の順で治療します。

ガマ腫の内容液は、濃縮したドロドロ唾液です。太い針でできるだけ吸い出します。

抜いた後に、生理食塩水で希釈したOK-432を、注入します。

次の日に激しい炎症が生じて、舌下腺から漏れる唾液を塞ぎます。

痛み止め、抗生剤が必要です。大きなガマ腫では首が圧迫されることもあります。

呼吸が苦しく、気管切開が必要になる場合があります、あらかじめ入院して準備します。

腫れは、数週間かけて自然に吸収され、ガマ腫が治ります。



確認事項

- ☐ ペニシリンアレルギーがない（OK-432はペニシリンを含むため）。
- ☐ 大きなガマ腫では、あらかじめ入院して痛みと腫れに備えて点滴します。
- ☐ 数日、発熱や局所の痛みが強い場合があります（初回は1泊入院がおすすめ）。
- ☐ 窒息する危険があるほど腫れたら、医師の判断で気管切開、緊急気道確保をします。

年 月 日

同意書サイン

説明者（医師）： _____ 同席者： _____

患者： _____ 家族（代諾者）： _____

施行予定 年 月 日