

定義 1. (点列コンパクト)

$K \subset \mathbb{R}$ の任意の点列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ が K の点に収束する部分列 $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ をもつとき, K は点列コンパクトであるという.

補題 2.

(X, d) を距離空間とし, $A \subset X$ とする.

- (1) $x \in \overline{A}$ であるための必要十分条件は, x に収束する A の点列が存在することである.
- (2) A が X の閉集合であるための必要十分条件は, A の任意の収束点列の極限が A に含まれることである.

(証明)

- (1) [点列の収束](#)の命題 5 を参照.
- (2) A を X の閉集合, つまり $A = \overline{A}$ とする. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を A の任意の収束点列で, $x_n \rightarrow x$ であるとする. (1) より $x \in \overline{A}$ であり, $A = \overline{A}$ より $x \in A$ となる. 逆に A の任意の収束点列の極限が A に含まれると仮定する. このとき $x \in \overline{A}$ を任意に与えると, (1) より x に収束する A の点列が存在し, 仮定より $x \in A$ となる. したがって $\overline{A} \subset A$ であり, 逆の包含は常に成り立つので $\overline{A} = A$, すなわち A は X の閉集合となる. □

定理 3. (点列コンパクト \iff 有界閉集合)

$K \subset \mathbb{R}^n$ が点列コンパクトであるためには, K が有界閉集合であることが必要十分である.

(証明)

・必要性: K が点列コンパクトであるとする. まず, K が有界でないとする. 各 $m \in \mathbb{N}$ に対し, $|x_m| > m$ となる $x_m \in K$ が存在する. このようにして K の点列 $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ を定めると, これの任意の部分列 $(x_{m(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ について, $x_{m(k)} \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$) となり, 点列コンパクト性に反する. ゆえに K は有界である. また, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を任意の収束する K の点列とし, 極限を x とすると, 点列コンパクト性より, K の点に収束する部分列が存在する. すると, 収束点列の任意の部

分列の極限は元の点列の極限と一致することから、 $x \in K$ が従う。よって補題 2 より、 K は閉集合である。□

・十分性： $K \subset \mathbb{R}^n$ が閉集合ならば、補題 2 より、 K の任意の収束点列の極限は K に含まれる。次に有界集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ の任意の点列が収束する部分列をもつことを帰納法で示す。 $n = 1$ の場合、 $K \subset \mathbb{R}$ の任意の点列 (実数列) は有界なのでボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理より、ある x に収束する部分列をもつ。次に $n > 1$ とし、 \mathbb{R}^{n-1} の有界集合の任意の点列が収束する部分列をもつと仮定する。このとき $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ を有界集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ の任意の点列とし、各 m に対し $x_m = (x_{m,1}, \dots, x_{m,n-1}, x_{m,n})$ と表す。すると $((x_{m,1}, \dots, x_{m,n-1}))_{m \in \mathbb{N}}$ は \mathbb{R}^{n-1} の有界集合の点列となるので、帰納法の仮定より、収束する部分列 $((x_{m(k),1}, \dots, x_{m(k),n-1}))_{k \in \mathbb{N}}$ が存在する。さらに、実数列 $(x_{m(k),n})_{k \in \mathbb{N}}$ は有界なので、ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理から、収束する部分列 $(x_{m(k(l)),n})_{l \in \mathbb{N}}$ をもつ。すると $(x_{m(k(l))})_{l \in \mathbb{N}}$ は、 $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ の収束する部分列になる。以上をまとめると、 $K \subset \mathbb{R}^n$ が有界閉集合ならば、 K は点列コンパクトである。□

参考文献

- [1] 杉浦光夫「解析入門 I」東京大学出版会