

加藤岳生著「一歩進んだ理解を目指す 物性物理学講義」 (サイエンス社) 正誤表

東京大学物性研究所 加藤岳生

1 概要

これは「一歩進んだ理解を目指す 物性物理学講義」の本に含まれる誤りをまとめたものです。もし間違いに気がついた場合は、kato@issp.u-tokyo.ac.jp までメールを送っていただくか、下記 Web page の Issues に書き込んでください。

<https://github.com/takeokato719/SolidStatePhysicsText/>

細かい間違いでも遠慮なく教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

2 正誤表

- p.14 式 (1.75) の最終行:

$$\begin{aligned} \text{[誤]} &= \frac{1}{2}V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle + \frac{1}{2}v(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle = V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle \\ \text{[正]} &= \frac{1}{2}V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle + \frac{1}{2}\mathbf{V}(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle = V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\rangle \end{aligned}$$

- p.15 式 (1.79) の最初の等式:

$$\begin{aligned} \text{[誤]} & \Psi^\dagger(\mathbf{x})\Psi^\dagger(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{x})|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\cdots\mathbf{r}_N\rangle \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta<\alpha}^N (-1)^{\alpha-1}(-1)^{\beta-1}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{r}_\beta)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\beta) \\ & \quad \times |\mathbf{r}_1\cdots(\mathbf{r}_\beta\text{抜け})\cdots(\mathbf{r}_\alpha\text{抜け})\cdots\mathbf{r}_N\rangle \\ &+ \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta>\alpha}^N (-1)^{\alpha-1}(-1)^{\beta-2}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{r}_\beta)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\beta) \\ & \quad \times |\mathbf{r}_1\cdots(\mathbf{r}_\beta\text{抜け})\cdots(\mathbf{r}_\alpha\text{抜け})\cdots\mathbf{r}_N\rangle \\ \text{[正]} & \Psi^\dagger(\mathbf{x})\Psi^\dagger(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{x})|\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\cdots\mathbf{r}_N\rangle \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta<\alpha}^N (-1)^{\alpha-1}(-1)^{\beta-1}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{r}_\beta)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\beta) \\ & \quad \times |\mathbf{r}_1\cdots(\mathbf{r}_\beta\text{抜け})\cdots(\mathbf{r}_\alpha\text{抜け})\cdots\mathbf{r}_N\rangle \\ &+ \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta>\alpha}^N (-1)^{\alpha-1}(-1)^{\beta-2}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{r}_\beta)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\alpha)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_\beta) \\ & \quad \times |\mathbf{r}_1\cdots(\mathbf{r}_\alpha\text{抜け})\cdots(\mathbf{r}_\beta\text{抜け})\cdots\mathbf{r}_N\rangle \end{aligned}$$

- p.20 式 (1.113) の 1 行目と 2 行目で生成演算子の添字に j が抜けています:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H &= \sum_{\sigma} \int d^3 \mathbf{r} \left[\sum_{j, \mathbf{k}} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) c_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} \right] \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right) \left[\sum_{j', \mathbf{k}'} \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) c_{j'\mathbf{k}'\sigma} \right] \\
&= \sum_{\sigma} \sum_{j, \mathbf{k}} \sum_{j', \mathbf{k}'} \int d^3 \mathbf{r} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) c_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right) \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) c_{j'\mathbf{k}'\sigma} \\
[\text{正}] \quad H &= \sum_{\sigma} \int d^3 \mathbf{r} \left[\sum_{j, \mathbf{k}} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) c_{j\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} \right] \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right) \left[\sum_{j', \mathbf{k}'} \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) c_{j'\mathbf{k}'\sigma} \right] \\
&= \sum_{\sigma} \sum_{j, \mathbf{k}} \sum_{j', \mathbf{k}'} \int d^3 \mathbf{r} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) c_{j\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right) \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) c_{j'\mathbf{k}'\sigma}
\end{aligned}$$

- p.21 式 (1.116):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & \int d^3 \mathbf{r} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}} \int_{\text{unit cell}} d^3 \mathbf{x} e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{R}} u_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{x} + \mathbf{R}) u_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{x} + \mathbf{R}) \\
&= \int_{\text{unit cell}} d^3 \mathbf{x} u_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{x}) u_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{x}) = \delta_{j,j'} \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \\
[\text{正}] \quad & \int d^3 \mathbf{r} \psi_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \psi_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}} \int_{\text{unit cell}} d^3 \mathbf{x} e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot (\mathbf{R} + \mathbf{x})} u_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{x} + \mathbf{R}) u_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{x} + \mathbf{R}) \\
&= \int_{\text{unit cell}} d^3 \mathbf{x} u_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{x}) u_{j'\mathbf{k}'}(\mathbf{x}) \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} = \delta_{j,j'} \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \\
&\Leftrightarrow \int_{\text{unit cell}} d^3 \mathbf{x} u_{j\mathbf{k}}^*(\mathbf{x}) u_{j'\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \delta_{j,j'}
\end{aligned}$$

- p.28 式 (2.17) の第二項の係数 $1/2$ が落ちています:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H &= \sum_{\sigma} \int d\mathbf{r} \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z}{r} \right) \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}) \\
&\quad + \sum_{\sigma, \sigma'} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \Psi_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Psi_{\sigma'}(\mathbf{r}') \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}) \\
[\text{正}] \quad H &= \sum_{\sigma} \int d\mathbf{r} \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z}{r} \right) \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}) \\
&\quad + \frac{1}{2} \sum_{\sigma, \sigma'} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \Psi_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Psi_{\sigma'}(\mathbf{r}') \Psi_{\sigma}(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

- p.33 式 (2.30) で生成演算子とすべきところが消滅演算子になっています。

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & |S\rangle = c_{1\uparrow} c_{1\downarrow} |\text{vac}\rangle, \quad |T\rangle = c_{1\uparrow} c_{2\uparrow} |\text{vac}\rangle, \\
[\text{正}] \quad & |S\rangle = c_{1\uparrow}^{\dagger} c_{1\downarrow}^{\dagger} |\text{vac}\rangle, \quad |T\rangle = c_{1\uparrow}^{\dagger} c_{2\uparrow}^{\dagger} |\text{vac}\rangle,
\end{aligned}$$

- p.34 式 (2.34) の直前

[誤] N 個の電子がエネルギーの低い原子軌道を占有したスレーター波動関数

[正] N 個の電子がエネルギーの低い分子軌道を占有したスレーター波動関数

- p.35 脚注 24. [誤] $1u_g$ 分子軌道 [正] $1\sigma_g$ 分子軌道
- p.41 式 (2.50):

$$[\text{誤}] |\Psi\rangle = a|\Psi_1\rangle + b|\Psi_2\rangle \quad [\text{正}] |\Psi\rangle = a|\Psi_1\rangle - b|\Psi_2\rangle$$

[補足説明] a, b は $a^2 + b^2 = 1$ を満たす実数であり、 $a > 0$ としても一般性は失いません。このとき上述の修正を行った上で、 $b > 0$ としたときに $R \rightarrow \infty$ で非物理的な状態の重みが抑えられてエネルギーが下がります。式 (2.51) の以下の説明では $a > 0, b > 0$ を前提として話が進みますので、上述の b の符号についての修正が必要となります。

- p.42 式 (2.55) の上: [誤] $2.09 \text{ \AA} = 3.704a_B$, [正] $2.09 \text{ \AA} = 3.95a_B$.
- p.42 式 (2.55):

$$[\text{誤}] -\frac{1}{3.704} \text{Hartree} = -27.211 \text{ eV} \times \frac{1}{3.704} = -7.35 \text{ eV},$$

$$[\text{正}] -\frac{1}{3.95} \text{Hartree} = -27.211 \text{ eV} \times \frac{1}{3.95} = -6.89 \text{ eV},$$

- p.42 式 (2.55) の下: [誤] 結合エネルギーは $(7.35 - 1.94) \text{ eV} = 5.41 \text{ eV}$ と見積もられる。
[正] 結合エネルギーは $(6.89 - 1.94) \text{ eV} = 4.95 \text{ eV}$ と見積もられる。
- p.49 式 (3.26) 中の生成演算子の添字が間違っています:

$$[\text{誤}] H_1 = \sum_{l\sigma} \sum_{l'} \int d\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 + v_{l'}(\mathbf{r}) \right) \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) c_{l'\sigma}^\dagger c_{l'\sigma},$$

$$[\text{正}] H_1 = \sum_{l\sigma} \sum_{l'} \int d^3\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 + v_{l'}(\mathbf{r}) \right) \varphi_{1s,l'}(\mathbf{r}) c_{l\sigma}^\dagger c_{l'\sigma},$$

またこの式を含み、この章に現れる積分の多くは体積積分であり、 $d\mathbf{r}$ は $d^3\mathbf{r}$ と書くべきでした。

- p.49 式 (3.26):

$$[\text{誤}] H_3 = \sum_{l\sigma} \sum_{l' \neq l} \sum_j \int d\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_j(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l'}(\mathbf{r}) c_{l\sigma}^\dagger c_{l'\sigma}$$

$$[\text{正}] H_3 = \sum_{l\sigma} \sum_{l' \neq l} \sum_{j \neq l'} \int d^3\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_j(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l'}(\mathbf{r}) c_{l\sigma}^\dagger c_{l'\sigma}$$

- p.49 最後の行: [誤] j についての和は、 l もしくは l' と一致する場合に、
[正] j についての和は、 l と一致する場合に、
- p.50 最初の行: [誤] j' についての和、 $j' = l, l'$ と一致する場合に、
[正] j についての和のうち、 $j = l$ と一致する場合に、
- p.50 式 (3.30):

$$[\text{誤}] \int d\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_l(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l+1}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_{l+1}(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l+1}(\mathbf{r}) = -t,$$

$$[\text{正}] \int d^3\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_l(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l+1}(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} \varphi_{1s,l}(\mathbf{r}) v_{l+1}(\mathbf{r}) \varphi_{1s,l+1}(\mathbf{r}) = -t,$$

- p.56 式 (3.75):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H_1 &= \sum_{\mathbf{r}} \sum_{\alpha} \frac{E_{\alpha}}{N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} e^{-i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r} + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} (c_{\mathbf{A}, \mathbf{k}', \alpha}^{\dagger} c_{\mathbf{A}, \mathbf{k}, \alpha} + c_{\mathbf{B}, \mathbf{k}', \alpha}^{\dagger} c_{\mathbf{B}, \mathbf{k}, \alpha}), \\
[\text{正}] \quad H_1 &= \sum_{\mathbf{r}} \sum_{\alpha} \frac{E_{\alpha}}{N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \left[e^{-i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r} + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} c_{\mathbf{A}, \mathbf{k}', \alpha}^{\dagger} c_{\mathbf{A}, \mathbf{k}, \alpha} \right. \\
&\quad \left. + e^{-i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{r} + \boldsymbol{\delta}) + i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \boldsymbol{\delta})} c_{\mathbf{B}, \mathbf{k}', \alpha}^{\dagger} c_{\mathbf{B}, \mathbf{k}, \alpha} \right].
\end{aligned}$$

- p.64 式 (3.102):

$$[\text{正}] \quad F(\mathbf{k}) = -t \sum_{j=1}^3 e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}_j}, \quad [\text{誤}] \quad F(\mathbf{k}) = -t \sum_{j=1}^3 e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}_j}.$$

- p.66 式 (4.2):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H_{\text{T}} &= \sum_{\sigma} \int d^3\mathbf{r} \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}), \\
[\text{正}] \quad H_{\text{T}} &= \sum_{\sigma} \int d^3\mathbf{r} \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}).
\end{aligned}$$

- p.68 式 (4.11) の積分変数が間違っています:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad \frac{1}{V} \int d^3\mathbf{k} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} &= \begin{cases} 1, & (\mathbf{q} = \mathbf{0}), \\ 0, & (\mathbf{q} \neq \mathbf{0}), \end{cases} \\
[\text{正}] \quad \frac{1}{V} \int d^3\mathbf{r} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} &= \begin{cases} 1, & (\mathbf{q} = \mathbf{0}), \\ 0, & (\mathbf{q} \neq \mathbf{0}), \end{cases}
\end{aligned}$$

- p.70 式 (4.19) でスピンについての和が抜けています:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H_{\text{C}} &= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \Psi_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Psi_{\sigma'}(\mathbf{r}') \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}) \\
&= \frac{1}{2V^3} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4, \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}_1 \sigma}^{\dagger} c_{\mathbf{k}_2 \sigma'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}_3 \sigma'} c_{\mathbf{k}_4 \sigma} \int d^3\mathbf{r} e^{i(\mathbf{k}_4 - \mathbf{k}_1 + \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r}} \\
&\quad \times \int d^3\mathbf{r}' e^{i(\mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r}'}, \\
[\text{正}] \quad H_{\text{C}} &= \frac{1}{2} \sum_{\sigma, \sigma'} \int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \Psi_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Psi_{\sigma'}(\mathbf{r}') \Psi_{\sigma}(\mathbf{r}) \\
&= \frac{1}{2V^3} \sum_{\sigma, \sigma'} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4, \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}_1 \sigma}^{\dagger} c_{\mathbf{k}_2 \sigma'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}_3 \sigma'} c_{\mathbf{k}_4 \sigma} \int d^3\mathbf{r} e^{i(\mathbf{k}_4 - \mathbf{k}_1 + \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r}} \\
&\quad \times \int d^3\mathbf{r}' e^{i(\mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r}'},
\end{aligned}$$

- p.70 式 (4.20) もスピンについての和が抜けています:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad H_{\text{C}} &= \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}', \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k} + \mathbf{q} \sigma}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' - \mathbf{q} \sigma'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' \sigma'} c_{\mathbf{k} \sigma}, \\
[\text{正}] \quad H_{\text{C}} &= \frac{1}{2V} \sum_{\sigma, \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}', \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k} + \mathbf{q} \sigma}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' - \mathbf{q} \sigma'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' \sigma'} c_{\mathbf{k} \sigma},
\end{aligned}$$

- p.84 式 (5.16):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & \langle [\rho_I(\mathbf{r}, t), \rho_I(\mathbf{r}', t')] \rangle_0 = \langle \Phi_0 | [\rho_I(\mathbf{r}, t - t'), \rho_I(\mathbf{r}', 0)] | \Phi_0 \rangle \\
& = \langle [\rho_I(\mathbf{r}, t - t'), \rho_I(\mathbf{r}', 0)] \rangle = \langle [\rho_I(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t'), \rho_I(\mathbf{0}, 0)] \rangle_0, \\
[\text{正}] \quad & \langle [\rho_I(\mathbf{r}, t), \rho_I(\mathbf{r}', t')] \rangle_0 = \langle \Phi_0 | [\rho_I(\mathbf{r}, t - t'), \rho_I(\mathbf{r}', 0)] | \Phi_0 \rangle \\
& = \langle [\rho_I(\mathbf{r}, t - t'), \rho_I(\mathbf{r}', 0)] \rangle_0 = \langle [\rho_I(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t'), \rho_I(\mathbf{0}, 0)] \rangle_0,
\end{aligned}$$

- p.85 式 (5.20) 直後: [誤] 時刻に関する積分の上限を ∞ に変更
[正] 時刻に関する積分の **下限** を $-\infty$ に変更
- p.86 式 (5.36) の第 1 式:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & \chi(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{V} \int d^3 \mathbf{r}' \int d^3 \mathbf{r}'' \int_0^\infty dt e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} + i\omega t} \\
& \quad \times \left\langle \left[\frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}'} \rho_{\mathbf{q}'}(t) e^{i\mathbf{q}' \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{r}')} , \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}''} \rho_{\mathbf{q}''} e^{i\mathbf{q}'' \cdot \mathbf{r}'} \right] \right\rangle_0 \\
[\text{正}] \quad & \chi(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{V} \int d^3 \mathbf{r} \int d^3 \mathbf{r}' \int_0^\infty dt e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} + i\omega t} \\
& \quad \times i \left\langle \left[\frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}'} \rho_{\mathbf{q}'}(t) e^{i\mathbf{q}' \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{r}')} , \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}''} \rho_{\mathbf{q}''} e^{i\mathbf{q}'' \cdot \mathbf{r}'} \right] \right\rangle_0
\end{aligned}$$

- p.89 下から五行目: [誤] $z = \epsilon e^{i\theta}$ とし, $dz = i\epsilon e^{i\theta} d\theta$ とする
[正] $z' = \epsilon e^{i\theta}$ とし, $dz' = i\epsilon e^{i\theta} d\theta$ とする
- p.92 図 5.4 中およびキャプション: [誤] 光の分散関係 $\omega = ck$ [正] 光の分散関係 $\omega = c\mathbf{q}$
- p.92 図 5.4 中, および, p.94 図 5.5 中: [誤] $\omega = v_F k$ [正] $\omega = v_F \mathbf{q}$
- p.93 式 (5.68):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & \chi(q, \omega) = 2 \int d\epsilon D(\epsilon) \left(-\frac{\partial n}{\partial \epsilon} \right), \\
[\text{正}] \quad & \lim_{q \rightarrow 0} \lim_{\omega \rightarrow 0} \chi(q, \omega) = 2 \int d\epsilon D(\epsilon) \left(-\frac{\partial n}{\partial \epsilon} \right),
\end{aligned}$$

- p.102 式 (5.96) 直後: [誤] $k = 2k_F$ に対数的な特異点 [正] $q = 2k_F$ に対数的な特異点
- p.138 式 (7.29) の第 2 式: [誤] $y = v_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}}}{E_{\mathbf{k}}}}$, [正] $y = -v_{\mathbf{k}} = -\sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}}}{E_{\mathbf{k}}}}$.
- p.138 脚注 22: [誤] $x = -v_{\mathbf{k}} = -\sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}}}{E_{\mathbf{k}}}}$, [正] $x = +v_{\mathbf{k}} = +\sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}}}{E_{\mathbf{k}}}}$.
- p.145 最終行の式:

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & N(E) = N_0 \int_0^\infty \frac{\epsilon d\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 - \Delta^2}} \delta(E - \epsilon) \\
[\text{正}] \quad & N(E) = N_0 \int_{\Delta}^\infty \frac{\epsilon d\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 - \Delta^2}} \delta(E - \epsilon)
\end{aligned}$$

- p.151 式 (7.94):

$$\begin{aligned}
[\text{誤}] \quad & - \int d^3 \mathbf{r} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} (c_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}\uparrow}) \begin{pmatrix} \frac{e\hbar \mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{q}}}{mV} & 0 \\ 0 & \frac{e\hbar \mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{q}}}{mV} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{\mathbf{k}\uparrow} \\ c_{-\mathbf{k}\uparrow}^\dagger \end{pmatrix}, \\
[\text{正}] \quad & - \int d^3 \mathbf{r} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} (c_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}\downarrow}) \begin{pmatrix} \frac{e\hbar \mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{q}}}{mV} & 0 \\ 0 & \frac{e\hbar \mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{q}}}{mV} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{\mathbf{k}\uparrow} \\ c_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

- p.159 3 行目: [誤] 式 (7.49) で [正] 式 (7.112) で
- p.161 式 (7.148) の三行上と三行下: [誤] $-a^2/b$ [正] $-a^2/2b$
- p.178 式 (8.17):

$$\begin{aligned} \text{[誤]} \quad E(z) &= \text{Re} [E_0 e^{i\omega N(\omega)z/c}] = \text{Re} [E_0 e^{i\omega z/\bar{c}-\alpha z}], \\ \text{[正]} \quad E(z) &= \text{Re} [E_0 e^{i\omega N(\omega)z/c}] = \text{Re} [E_0 e^{i\omega z/\bar{c}-\alpha z/2}]. \end{aligned}$$

- p.178 式 (8.19): [誤] $\alpha = \frac{\omega\kappa(\omega)}{c}$, [正] $\alpha = \frac{2\omega\kappa(\omega)}{c}$.
 [補足説明] 通常は電場ではなく、電場の持つエネルギー ($\propto E^2$) の減衰率によって吸収係数を決めるため、 E^2 が $e^{-\alpha z}$ に比例するとして吸収係数 α を定義します。そのため上述のように定義に因子 2 がつきます。
- 8.3 節中で ARPES の日本語訳が不適切でした。
 [誤] 角度依存光電子分光 → [正] 角度分解光電子分光

3 補足説明

- 式 (1.66) 直前で「式 (1.32) を用いて」と書きましたが、式 (1.29) を用いたほうがより直接的でわかりやすかったです。すみません。
- 図 8.28 は文献 [80] の表から作成しており、それに従ってユウロピウム (Eu) が高圧下で 2.7 K の超伝導を示すと記載しましたが、元となる論文 (M. Debessai, et al., Phys. Rev. Lett. **102**, 197002 (2009)) は 2021 年に撤回されています。