

ファイバー束

目次

1	ファイバー束と切断	3
1.1	ファイバー束と切断の定義	3
1.2	ファイバー束の変換関数	13
1.3	変換関数からファイバー束の位相的構成	16
1.4	滑らかな変換関数から滑らかなファイバー束の構成	27
2	ベクトル束	30
2.1	構造群	30
2.2	位相体と位相ベクトル空間	33
2.3	有限次元線形空間の多様体構造	37
2.4	テンソル積	38
2.5	ベクトル束	48
2.6	構造群統論	54
3	主ファイバー束	56
3.1	評価写像の連続性	56
3.2	標構束	58
3.3	主ファイバー束	62
3.4	商 Lie 群	66
3.5	主ファイバー束と構造群の同型	71
3.6	同伴したファイバー束	73
3.7	同相群の部分群としての位相群	76
3.8	主ファイバー束と構造群	79
4	作用と変換関数を構造に入れる	87

4.1	構造群付きファイバー束 (作用付き)	87
4.2	構造群付きファイバー束 (作用付き) と主ファイバー束	95
4.3	構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き)	99
5	等質ファイバー束	108
5.1	等質ファイバー束と G 同変	108
5.2	閉部分群とその作用の組	114
5.3	G 同変と圏同値	125
5.4	等質 G -多様体の分類定理	129
5.5	トートロジカル線束	133
6	等質ベクトル束	138
6.1	ベクトル束 (再掲含む)	138
6.2	等質ベクトル束と G 同変	144

1 ファイバー束と切断

1.1 ファイバー束と切断の定義

ああああああああ

定義 1.1. 位相空間 F 、 E 、 X と連続写像 $\pi: E \rightarrow X$ に対して、以下の条件 (1)(2) を満たすとき、 E は F をファイバーとする X 上のファイバー束であるという。

(1) π は全射である。

(2) X の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ と各 $\alpha \in \Lambda$ に対する同相写像 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ が存在して、 $pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ を満たす。ただし、 $pr_1: U_\alpha \times F \rightarrow U_\alpha$ は第一射影である。

ファイバー束を表す記号として $\pi: E \rightarrow X$ あるいは (E, X, π, F) を用いる。この時、 ψ_α を局所自明化といい、 E を全空間、 X を底空間、 π をファイバー束の射影と呼ぶ。また、各 $x \in X$ に対して、 $E_x = \pi^{-1}(x)$ を x 上のファイバーと呼ぶ。なお、上で具体的にとった局所自明化以外でも同じ条件を満たすものはすべて局所自明化と呼ぶことにする。

注意 1.2. π の連続性は定義に入れてなくても、局所自明化の存在から自動的に従う。

例 1.3 (2重被覆). S^1 を単位円とする。 $\pi: S^1 \rightarrow S^1$ を $\pi(z) = z^2$ で定める写像とする。 $F = \{0, 1\}$ とする。このとき、 π はファイバー束である。 S^1 の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \{1, 2\}}$ を、 $U_1 = S^1 \setminus \{1\}$ 、 $U_2 = S^1 \setminus \{-1\}$ とする。 $\psi_1: S^1 \setminus \{1, -1\} \rightarrow U_1 \times F$ を、

$$\psi_1(z) = \begin{cases} (z^2, 0) & (0 < \arg(z) < \pi) \\ (z^2, 1) & (\pi \leq \arg(z) < 2\pi) \end{cases}$$

で定める写像とする。 $\psi_2: S^1 \setminus \{1, -1\} \rightarrow U_2 \times F$ を、

$$\psi_2(z) = \begin{cases} (z^2, 0) & (\arg(z) \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)) \\ (z^2, 1) & (\arg(z) \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})) \end{cases}$$

で定める写像とする。このとき、 ψ_1 と ψ_2 は局所自明化である。

定義 1.4. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。 $x \in U_\alpha$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \psi_\alpha^x : E_x & \longrightarrow & F \\ \Psi & & \Psi \\ e & \longmapsto & pr_2(\psi_\alpha(e)) \end{array}$$

で定める。

命題 1.5 (各点のファイバーはファイバーと同相). $\psi_\alpha^x : E_x \rightarrow F$ は同相である。

証明 U_α を x を含む X の開集合とし、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。制限写像 $\psi_\alpha|_{E_x} : E_x \rightarrow \psi_\alpha(E_x)$ は同相である。ゆえに、 $\psi_\alpha(E_x) = \{x\} \times F$ を示せば、 $\{x\} \times F \cong F$ より、 E_x は F と同相であることがわかる。任意に、 $\psi_\alpha(E_x)$ の元 (x', f) をとる。この時、ある $e \in E_x$ が存在して $\psi_\alpha(e) = (x', f)$ を満たす。 $x' = pr_1(x', f) = pr_1(\psi_\alpha(e)) = \pi(e) = x$ である。ゆえに、 $\psi_\alpha(E_x) \subset \{x\} \times F$ が成り立つ。任意に、 $\{x\} \times F$ の元 (x, f) をとる。この時、ある $e \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ が存在して $\psi_\alpha(e) = (x, f)$ を満たす。 $x = pr_1(x, f) = pr_1(\psi_\alpha(e)) = \pi(e)$ である。ゆえに、 $\{x\} \times F \subset \psi_\alpha(E_x)$ が成り立つ。 $\square$

定義 1.6. F, E, X を C^∞ 級多様体とし、 $\pi : E \rightarrow X$ を写像とする。このとき、 E が F をファイバーとする X 上のファイバー束であり、局所自明化が微分同相であるものとして取れるとき π は C^∞ 級ファイバー束であるという。

注意 1.7. π は滑らかである。

定義 1.8. F, E, X を複素多様体とし、 $\pi : E \rightarrow X$ を正則写像とする。このとき、 E が F をファイバーとする X 上のファイバー束であり、局所自明化が正則で逆写像も正則なものとして取れるとき π は正則なファイバー束であるという。

定義 1.9. F, E, X を位相空間とし、 $\pi : E \rightarrow X$ を連続写像とする。このとき、 $E = X \times F$ とし、 π を第一射影とする。このとき、 π は自明なファイバー束であるという。

注意 1.10. 局所自明化として $X \times F$ の恒等写像をとる。

定義 1.11. M を滑らかな多様体とする。接束を $TM := \{(p, v) \mid p \in M, v \in T_p M\}$ と定める。

$\pi : TM \rightarrow M$ を、 $\pi((p, v)) = p$ で定める写像とする。これを、射影という。各 M のチャート (U, φ) に対して、 $\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ を、 $\Phi_\varphi(p, v) = (\varphi(p), (v^1, \dots, v^n))$ で定める写像とする。ただし、 $v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p + \dots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p$ であるとする。

補題 1.12 (チャートから多様体構造の構成). M を集合とする。 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ を M の被覆とする。各 $\alpha \in A$ に対して、 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ を写像とする。次の条件をすべて満たすとき各 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ が M のチャートであるような M の滑らかな構造が一意的に存在する。

- (1) 任意の $\alpha \in A$ に対して、 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$ は全単射である。
- (2) 任意の $\alpha \in A$ に対して、 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。
- (3) 任意の任意の $\alpha \in A$ に対して、 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ と、 $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。
- (4) 任意の $\alpha, \beta \in A$ に対して、 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ は滑らかな写像である。
- (5) M の異なる点 p, q に対して、ある $\alpha \in A$ が存在して、 $p, q \in U_\alpha$ である。またはある互いに素な $U_\alpha, U_\beta (\alpha, \beta \in A)$ が存在して、 $p \in U_\alpha, q \in U_\beta$ である。

証明 まず、存在を示す。 $\mathcal{B} := \{\varphi_\alpha^{-1}(V) \mid \alpha \in A, V \subset \mathbb{R}^n \text{ は開集合}\}$ とする。 $\mathcal{B}$ は M 上で開基の公理を満たすことを示す。まず、任意に、 $p \in M$ をとる、ある $\alpha \in A$ が存在して、 $p \in U_\alpha \subset \varphi_\alpha^{-1}(\varphi_\alpha(U_\alpha))$ である。(2) より、 $\mathcal{B}$ は M の被覆である。

次に、任意の $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ をとる。 $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ であることを示す。 $B_1 = \varphi_\alpha^{-1}(V_1)$ 、 $B_2 = \varphi_\beta^{-1}(V_2)$ とする。ただし、 $\alpha, \beta \in A, V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^n$ は開集合であるとする。(4) より、 $(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)$ は $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ の開集合であるから、(3) より、これは $\mathbb{R}^n$ の開集合である。よって、

$$\begin{aligned}
 B_1 \cap B_2 &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1) \cap \varphi_\beta^{-1}(V_2) \\
 &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1) \cap \varphi_\alpha^{-1}((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)) (\because \text{定義域を縮小したことに注意}) \\
 &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1 \cap (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)) \\
 &\in \mathcal{B}
 \end{aligned}$$

したがって、 $\mathcal{B}$ は M 上で開基の公理を満たす。 $\mathcal{O} := \{\cup_{i \in I} B_i \mid I \text{ は集合}, B_i \in \mathcal{B} (i \in I)\}$

とする。 $\mathcal{O}$ は M の位相である。(1) より、 $U_\alpha \in \mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ かつ、 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。また、 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ は M の被覆である。この時 φ_α は部分空間の間の写像として同相である。(各自確かめよ) $(M, \mathcal{O})$ が Hausdorff 空間であることを示す。任意の M の異なる点 p, q をとる。(5) より、ある $\alpha \in A$ が存在して、 $p, q \in U_\alpha$ である。またはある互いに素な $U_\alpha, U_\beta (\alpha, \beta \in A)$ が存在して、 $p \in U_\alpha, q \in U_\beta$ である。後者の場合、 U_α と U_β は互いに素であるから、 p, q を分離することができる。前者の場合、 $\varphi_\alpha(p)$ と $\varphi_\alpha(q)$ は $\mathbb{R}^n$ の異なる点であるから、 $\mathbb{R}^n$ の開集合 V_p, V_q が存在して、 $\varphi_\alpha(p) \in V_p, \varphi_\alpha(q) \in V_q, V_p \cap V_q = \emptyset$ である。 $\varphi_\alpha^{-1}(V_p)$ と $\varphi_\alpha^{-1}(V_q)$ は M の開集合であるから、これらは p, q を分離することができる。 $\mathcal{A}' := \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ とする。よって、 $\mathcal{A}'$ は M のアトラスである。これが M の滑らかなアトラスであることは (4) より明らかである。よって、これを含む極大アトラスを $\mathcal{A}$ とする。この時 $(M, \mathcal{O}, \mathcal{A})$ は滑らかな多様体である。また、任意の $\alpha \in A$ に対して、 $(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$ である。次に、一意性を示す。 $(M, \tilde{\mathcal{O}}, \tilde{\mathcal{A}})$ を、条件を満たすものとする。まず、 $\mathcal{O} = \tilde{\mathcal{O}}$ であることを示す。これはどちらも $\varphi_\alpha^{-1}(V)$ が開集合の間の同相になるから、基本近傍系として同じ集合を持てるからである。次に、 $\mathcal{A} = \tilde{\mathcal{A}}$ であることを示す。どちらも $\mathcal{A}'$ を含む極大アトラスであるから、 $\mathcal{A} = \tilde{\mathcal{A}}$ である。□

注意 1.13. 命題??と命題??より、 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ が M のチャートであるという条件は、 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$ が開部分空間の間の微分同相であるという条件に書き換えてもよい。

命題 1.14 (接束の多様体構造). M を n 次元の滑らかな多様体とする。 TM 上の Hausdorff 位相 $\mathcal{O}$ と $2n$ 次元の滑らかな極大アトラス $\mathcal{A}$ の組であって、

$$\forall (U, \varphi) \in \mathcal{A}, \Phi_\varphi \text{ は開部分空間の間の微分同相 かつ } \pi \text{ は滑らかである}$$

であるものが一意的に存在する。この多様体構造に対して、 $\pi : TM \rightarrow M$ は C^∞ 級ファイバー束である。ただし、局所自明化はチャート $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ に対して、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n, (p, v) \mapsto (p, (v^1, \dots, v^n))$ で定める。

証明 M のチャート (U, φ) に対して、 $\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ を、 $\Phi_\varphi(p, v) = (p, (v^1, \dots, v^n))$ で定める写像とする。ただし、 $v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p + \dots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p$ であるとする。この時、 $\{\pi^{-1}(U)\}$ は TM の被覆である。まずは $(\pi^{-1}(U), \Phi_\varphi)$ が前命題の条件を満たすことを示す。

- (1) $\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ は全単射であることは簡単に確かめられる。
- (2) $\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U)) = \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合である。
- (3) 任意のチャート (V, ψ) に対して、 $\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合であることを示す。 $\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は、 $\varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n$ である。ゆえに、 $\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合である。
- (4) 任意のチャート (V, ψ) に対して、 $\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)) \rightarrow \Phi_\psi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は滑らかな写像であることを示す。 $\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n$ である。この写像は、 $(\varphi(p), (a_1, \dots, a_n)) \mapsto (\psi(p), (b_1, \dots, b_n))$ である。ただし、命題 ?? より、 $b_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(\psi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p)) \cdot a_j$ である。 $\frac{\partial(\psi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$ は (U, φ) と (V, ψ) が compatible なので、滑らかな写像であるから、 $\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1}$ は滑らかな写像である。
- (5) M の Hausdorff 性と命題 ?? を用いる。

これで得られる多様体 $(TM, \mathcal{O}, A)$ について π が滑らかであることを示す。任意のチャート (U, φ) に対して、 $\pi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \varphi(U)$ は、 $(p, (v^1, \dots, v^n)) \mapsto p$ である。これは滑らかであるから、滑らかの局所性より、 π は滑らかである。 Ψ_φ と、 φ_α が微分同相なので ψ_α が微分同相になる。よって、 $\pi : TM \rightarrow M$ が C^∞ 級ファイバー束である。 $\square$

定義 1.15. $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とする。 $s : X \rightarrow E$ が π の切断であるとは、 $\pi \circ s = id_X$ を満たすことをいう。特に、 s が連続の時は連続切断という。連続切断全体のなす集合を $\Gamma(X, E)$ あるいは単に $\Gamma(E)$ と表す。また、 $\pi : E \rightarrow X$ が C^∞ 級ファイバー束のとき、 s が C^∞ 級切断であるとは、 s が C^∞ 級写像であることをいう。 C^∞ 級切断全体のなす集合を $\Gamma^\infty(X, E)$ あるいは $C^\infty(X, E)$ 、または単に $\Gamma(E)$ と表す。

命題 1.16. $\pi : X \times F \rightarrow X$ が自明なファイバー束のとき、 $\Gamma(X, X \times F)$ は $C(X, F)$ と 1 対 1 に対応する。具体的には、 $s \in \Gamma(X, X \times F)$ に対して、 $pr_2 \circ s : X \rightarrow F$ を対応させる。逆に、 $f \in C(X, F)$ に対して、 $(id_X, f) : X \rightarrow X \times F$ を対応させる。

定義 1.17. M を滑らかな多様体とする。 $\mathfrak{X} := \{X : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M) \mid X \text{ は線形で、任意の } \phi, \psi \text{ に対して、} X(\phi\psi) = X(\phi)\psi + \phi X(\psi)\}$ とする。 $s \in \Gamma^\infty(M, TM)$ に対して、 $X^s : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ を $X^s(\phi)(p) = s_p(\phi)$ で定める。逆に、 $X \in \mathfrak{X}$ に対して、 $s^X : M \rightarrow TM$ を $s^X(p) = (p, \phi \mapsto X(\phi)(p))$ で定める。これは次の命題より well-defined であることがわかる。

注意 1.18. 条件 $X(\phi\psi) = X(\phi)\psi + \phi X(\psi)$ を満たすことを X が $id_{C^\infty(M)}$ -derivation であるという。

次の命題によりベクトル場を $\mathfrak{X}$ の元とみなすことができる。

命題 1.19 (ベクトル場の別の定義). 上で定めた、 X^s, s^X は well-defined である。また、 $\Gamma^\infty(M, TM) \rightarrow \mathfrak{X}, s \mapsto X^s$ と $\mathfrak{X} \rightarrow \Gamma^\infty(M, TM), X \mapsto s^X$ は互いに逆写像である。これにより、 $\Gamma^\infty(M, TM)$ と $\mathfrak{X}$ は 1 対 1 に対応する。

証明 いくつかの step に分ける。

Step 1. X^s は well-defined である。

任意に、 $\phi \in C^\infty(M)$ をとる。 $X^s(\phi) : M \rightarrow \mathbb{R}$ が滑らかな関数であることを示す。任意に、 $p \in M$ をとる。あるチャート (U, φ) が存在して、 $p \in U$ である。命題??より、 $s^i : U \rightarrow \mathbb{R}$ を $s(x) = (x, \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x)$ として定めると、 s^i は滑らかな関数である。よって、

$$\begin{aligned} X^s(\phi)(x) &= s_x(\phi) \\ &= \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x (\phi) \\ &= \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial(\phi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(x)) \end{aligned}$$

であるから、 $X^s(\phi) : U \rightarrow \mathbb{R}$ は滑らかな関数である。

Step 2. s^X は well-defined である。

任意に、 $p \in M$ をとる。 $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}, \phi \mapsto X(\phi)(p)$ が、 $T_p M$ の元であることを示す。まず、 v が線形であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$v(a\phi + b\psi) = X(a\phi + b\psi)(p) = a \cdot X(\phi)(p) + b \cdot X(\psi)(p) = a \cdot v(\phi) + b \cdot v(\psi)$$

であるから、 v は線形である。次に、 v がライプニッツ則を満たすことを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ に対して、

$$v(\phi\psi) = X(\phi\psi)(p) = X(\phi)(p) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot X(\psi)(p) = v(\phi) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot v(\psi)$$

であるから、 v は $T_p M$ の元である。

Step 3. $X^s \in \mathfrak{X}$ である。

まず、 X^s が線形であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$X^s(a\phi + b\psi)(p) = s_p(a\phi + b\psi) = a \cdot s_p(\phi) + b \cdot s_p(\psi) = a \cdot X^s(\phi)(p) + b \cdot X^s(\psi)(p)$$

であるから、 X^s は線形である。次に X^s が $id_{C^\infty(M)}$ -derivation であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ に対して、

$$X^s(\phi\psi)(p) = s_p(\phi\psi) = s_p(\phi) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot s_p(\psi) = X^s(\phi)(p) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot X^s(\psi)(p)$$

であるから、 X^s は $id_{C^\infty(M)}$ -derivation である。

Step 4. $s^X \in \Gamma^\infty(M, TM)$ である。

s^X が滑らかな写像であることを示す。任意に、 $p \in M$ をとる。あるチャート (U, φ) が存在して、 $p \in U$ である。任意に、 $x \in U$ をとる。 x の開近傍 V と、 V 上で φ と一致する M 上の滑らかな写像 $\tilde{\varphi}: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ をとる。 $\Phi_\varphi \circ s^X|_V: V \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ が滑らかな写像であることを示せば十分である。

$$\begin{aligned} \Phi_\varphi \circ s^X(x) &= \Phi_\varphi(x, \phi \mapsto X(\phi)(x)) \\ &= (\varphi(x), (\phi \mapsto X(\phi)(x))(pr_1 \circ \tilde{\varphi}), \dots, \phi \mapsto X(\phi)(x)(pr_n \circ \tilde{\varphi})) (\because \text{命題??}) \\ &= (\varphi(x), X(pr_1 \circ \tilde{\varphi})(x), \dots, X(pr_n \circ \tilde{\varphi})(x)) \end{aligned}$$

$X(pr_i \circ \tilde{\varphi}): V \rightarrow \mathbb{R}$ は滑らかな関数であるから、 $\Phi_\varphi \circ s^X|_V$ は滑らかな写像である。

Step 5. $X^{s^X} = X$ である。

任意の $\phi \in C^\infty(M)$ と任意の $p \in M$ に対して、

$$X^{s^X}(\phi)(p) = s_p^X(\phi) = X(\phi)(p)$$

であるから、 $X^{s^X} = X$ である。

Step 6. $s^{X^s} = s$ である。

任意の $p \in M$ に対して、

$$s^{X^s}(p) = (p, \phi \mapsto X^s(\phi)(p)) = (p, \phi \mapsto s_p(\phi)) = s(p)$$

であるから、 $s^{X^s} = s$ である。 □

定義 1.20. $\pi_1 : E_1 \rightarrow X_1$ 、 $\pi_2 : E_2 \rightarrow X_2$ をファイバー束とする。連続写像 $f : E_1 \rightarrow E_2$ と $h : X_1 \rightarrow X_2$ に対して (f, h) がファイバー束の準同型であるとは、 $\pi_2 \circ f = h \circ \pi_1$ を満たすことをいう。さらに、 f, h が同相であるとき、 (f, h) がファイバー束の同型であるという。また、ファイバー束が C^∞ 級ファイバー束のとき、 (f, h) が C^∞ 級ファイバー束の準同型であるとは、 f と h がともに滑らかな写像であり、 $\pi_2 \circ f = h \circ \pi_1$ を満たすことをいう。さらに、 f, h が微分同相であるとき、 (f, h) が C^∞ 級ファイバー束の同型であるという。底空間が同じであるときは h として恒等写像をとるときだけを考えることもある。(真面目にいうとこれを E 上のファイバー束の準同型と呼んで、ただのファイバー束の準同型とは区別するべきであるが、同じ名前と呼ぶことにする。)

命題 1.21 (ファイバー束の準同型の制限). $\pi_1 : E_1 \rightarrow X_1$ 、 $\pi_2 : E_2 \rightarrow X_2$ をファイバー束とする。 (f, h) がファイバー束の準同型とする。任意の $x \in X_1$ に対して、 $(E_1)_x = \pi_1^{-1}(\{x\})$ と $(E_2)_{h(x)} = \pi_2^{-1}(\{h(x)\})$ とすると、 $f|_{(E_1)_x} : (E_1)_x \rightarrow (E_2)_{h(x)}$ は *well-defined* で連続である。

証明 任意に $y \in (E_1)_x$ をとる。 $\pi_2(f(y)) = h(\pi_1(y)) = h(x)$ であるから、 $f(y) \in \pi_2^{-1}(\{h(x)\}) = (E_2)_{h(x)}$ である。よって、 $f|_{(E_1)_x}$ は *well-defined* である。連続性は簡単にわかる。 □

例 1.22. $\pi : X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ 、 $\pi : X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ を自明なファイバー束とする。このとき、 $f : X \times \mathbb{R} \rightarrow X \times \mathbb{R}, (x, t) \mapsto (x, 0)$ とする。 (f, id_X) はファイバー束の準同型である。しかし、 $f|_{(E_1)_x} : (E_1)_x \rightarrow (E_2)_{h(x)}$ は全単射ではない。

命題 1.23. $\pi_1 : E_1 \rightarrow X_1$, $\pi_2 : E_2 \rightarrow X_2$ をファイバー束とする。 $f : E_1 \rightarrow E_2$ を連続写像とする。このとき、任意の $x \in X_1$ に対して、 $x' \in X_2$ が存在し、 $f((E_1)_x) \subset (E_2)_{x'}$ であることと、ある連続写像 $h : X_1 \rightarrow X_2$ が存在して、 (f, h) がファイバー束の準同型であることは同値である。

証明 まず、任意の $x \in X_1$ に対して、ある $x' \in X_2$ が存在し、 $f((E_1)_x) \subset (E_2)_{x'}$ であるとする。このとき、 $h : X_1 \rightarrow X_2$ を、 $h(x) = x'$ で定める。このとき、任意の $y \in E_1$ に対して、 $f(y) \in f((E_1)_{\pi_1(y)}) \subset (E_2)_{h(\pi_1(y))} = \pi_2^{-1}(\{h(\pi_1(y))\})$ であるから、 $\pi_2(f(y)) = h(\pi_1(y))$ である。 h は連続であることは $\pi_2 \circ f$ が連続であることと、 π_1 が商写像であることからわかる。よって、 (f, h) はファイバー束の準同型である。逆は命題 1.21 より明らかである。 $\square$

命題 1.24. $\pi_1 : E_1 \rightarrow X_1$, $\pi_2 : E_2 \rightarrow X_2$ をファイバー束とする。 (f, h_1) と (f, h_2) がファイバー束の準同型とする。このとき、 $h_1 = h_2$ である。

証明 任意の $x \in X_1$ をとる。 π_1 は全射であるから、ある $y \in E_1$ が存在して、 $\pi_1(y) = x$ である。このとき、 $h_1(x) = h_1(\pi_1(y)) = \pi_2(f(y)) = h_2(\pi_1(y)) = h_2(x)$ であるから、 $h_1 = h_2$ である。 $\square$

例 1.25. ファイバー束 $pr_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ と、 $pr_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ について、連続写像 $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $(id_{\mathbb{R}^2}, h)$ が pr_1 と pr_2 の間のファイバー束の準同型であることはない。

証明 そのような h が存在すると仮定する。 $1 = pr_2(id_{\mathbb{R}^2}(0, 1)) = h(pr_1((0, 1))) = h(pr_1((0, 0))) = pr_2(id_{\mathbb{R}^2}(0, 0)) = 0$ であるから、矛盾である。 $\square$

定義 1.26. M, N を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ を滑らかな写像とする。このとき、 f の微分とは、 $df : TM \rightarrow TN$ であって、 $df(p, v) = (f(p), df_p(v))$ で定義される写像をいう。

命題 1.27 (微分は滑らか). M, N を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ を滑らかな写像とする。このとき、 $df : TM \rightarrow TN$ は滑らかな写像である。

証明 任意のチャート (U, φ) と (V, ψ) に対して、 $\Phi_\psi \circ df \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(V) \times \mathbb{R}^m$ は、 $(\varphi(p), (v^1, \dots, v^n)) \mapsto (\psi(f(p)), (w^1, \dots, w^m))$ である。ただし、命題??(多様体の微分の表現行列はヤコビ行列) より、 $w^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial (pr_i \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p)) \cdot v^j$ である。 f は滑らかであるから $\frac{\partial (pr_i \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}$ は滑らかな写像であるから、 $\Phi_\psi \circ df \circ \Phi_\varphi^{-1}$ は滑らかな写像である。 Φ_ψ, Φ_φ は微分同相であり、滑らかさの局所性より、 df は滑らかな写像である。 $\square$

命題 1.28 (微分の関手性). M, N, Z を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ 、 $g : N \rightarrow Z$ を滑らかな写像とする。この時、次が成り立つ

$$(1) d(g \circ f) = dg \circ df \text{ である。}$$

$$(2) d(id_M) = id_{TM} \text{ である。}$$

証明 命題??(一点の微分の関手性) を用いる。 $\square$

系 1.29 (微分同相の微分も微分同相). M, N を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ を滑らかな写像とする。 f が微分同相であるとき、 $df : TM \rightarrow TN$ は微分同相である。

注意 1.30. この命題は逆も成り立つ、証明は逆写像定理を用いる。

証明 命題 1.27 と命題 1.28 より、 $df : TM \rightarrow TN$ は微分同相である。 $\square$

命題 1.31 (微分はファイバー束の準同型). M, N を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ を滑らかな写像とする。このとき、 (df, f) はファイバー束の準同型である。

証明 命題 1.27 より、 df は滑らかな写像である。あとは簡単に確かめられる。 $\square$

命題 1.32. M, N を滑らかな多様体とする。 $f : M \rightarrow N$ を微分同相写像とする。このとき、 (df, f) はファイバー束の同型である。

証明 命題 1.29 より、 df は微分同相である。 $\square$

1.2 ファイバー束の変換関数

定義 1.33. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta & \longrightarrow & \text{Homeo}(F) \\ \Psi & & \Psi \\ x & \longmapsto & \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \end{array}$$

このとき、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を (局所自明化 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ に対する) ファイバー束の変換関数という。

注意 1.34. $\varphi_{\alpha\beta}(x)$ が $\text{Homeo}(F)$ の元であることは、命題 1.5 で示される。

例 1.35. $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \theta \mapsto (\cos(2\pi\theta), \sin(2\pi\theta))$ を考える。 $F = \mathbb{Z}$ とする。このとき、 π はファイバー束である。 $\{U_1, U_2\}$ を S^1 の開被覆であって、 $U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$ 、 $U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ であるものとする。

$$\psi_1 : \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1) \rightarrow U_1 \times \mathbb{Z}$$

を $\psi_1(\theta) = ((\cos(2\pi(\theta - \lfloor \theta \rfloor)), \sin(2\pi(\theta - \lfloor \theta \rfloor))), \lfloor \theta \rfloor)$ で定める。

$$\psi_2 : \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}) \rightarrow U_2 \times \mathbb{Z}$$

を $\psi_2(\theta) = ((-\sin(2\pi(\theta - \lfloor \theta \rfloor)), -\cos(2\pi(\theta - \lfloor \theta \rfloor))), \lfloor \theta - \frac{1}{2} \rfloor)$ で定める。このとき、 ψ_1 と ψ_2 は局所自明化である。このとき、 $\varphi_{12} : S^1 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\} \rightarrow \text{Homeo}(\mathbb{Z})$ は、

$$\varphi_{12}(z)(n) = \begin{cases} n+1 & (\arg(z) \in (0, \pi)) \\ n & (\arg(z) \in (\pi, 2\pi)) \end{cases}$$

である。

命題 1.36. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。このとき、変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は次の 2 つの条件を満たす。

$$(1) \varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x) (x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$$

$$(2) (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \text{ から } F \text{ への写像 } (x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f) \text{ が連続である}$$

証明 まず、(1) を示す。 $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \circ \psi_\beta^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

である。次に、(2) を示す。

$$(x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1}(f) = pr_2(\psi_\alpha^x(\psi_\beta^{-1}(x, f)))$$

であるから、 ψ_α と ψ_β が連続であることから、 $(x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f)$ は連続である。 $\square$

定義 1.37. F, X を位相空間とする。 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とし、各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を写像とする。このとき、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ が変換関数の公理を満たすとは

$$(1) \varphi_{\alpha\beta}(z) \circ \varphi_{\beta\gamma}(z) = \varphi_{\alpha\gamma}(z) (z \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$$

$$(2) (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \text{ から } F \text{ への写像 } (z, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(z)(f) \text{ が連続である}$$

を満たすことである。

命題 1.38. $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とし、 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とし、 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を局所自明化の族とする。このとき、このファイバー束の変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は変換関数の公理を満たす。

証明 命題 1.36 で示される。 $\square$

命題 1.39. F, X を位相空間とする。 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ が変換関数の公理を満たすとする。このとき、

$$(1) \varphi_{\alpha\alpha}(z) = id_F(z \in U_\alpha)$$

$$(2) \varphi_{\alpha\beta}(z) = (\varphi_{\beta\alpha}(z))^{-1} (z \in U_\alpha \cap U_\beta)$$

が成り立つ。

この命題を多様体と滑らかな関数に対して考える。

定義 1.40. F, X を多様体とする。 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とし、各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Diffeo}(F)$ を写像とする。ただし、 $\text{Diffeo}(F)$ は F から F への微分同相写像全体のなす集合である。このとき、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ が滑らかな変換関数の公理を満たすとは

$$(1) \varphi_{\alpha\beta}(z) \circ \varphi_{\beta\gamma}(z) = \varphi_{\alpha\gamma}(z) (z \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$$

$$(2) (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \text{ から } F \text{ への写像 } (z, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(z)(f) \text{ が滑らかである}$$

を満たすことである。

命題 1.41. F, X を多様体とする。 $\pi : E \rightarrow X$ を滑らかなファイバー束とし、 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とし、 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を局所自明化の族とする。このとき、このファイバー束の変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす。

1.3 変換関数からファイバー束の位相的構成

ここからは逆に、ファイバー束の変換関数からファイバー束を構成する方法を説明する。そのための準備として直和位相と商写像について触れておく。

命題 1.42. X を集合とし、 $\{X_i \mid i \in I\}$ を位相空間の族とする。 $\{f_i\}_{i \in I}$ を写像 $f_i : X_i \rightarrow X$ の族とする。この時、

$$\mathcal{O} := \{U \in 2^X \mid \text{任意の } i \in I \text{ に対して、} f_i^{-1}(U) \text{ は } X_i \text{ の開集合}\}$$

は X の位相である。さらにこの位相の下で任意の位相空間 Y と写像 $g : X \rightarrow Y$ に対して、以下は同値である。

(1) g は連続である。

(2) 任意の $i \in I$ に対して、 $g \circ f_i : X_i \rightarrow Y$ は連続である。

証明 $\mathcal{O}$ が X の位相であることは

$$\bigcup_{j \in J} f_i^{-1}(U_j) = f_i^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} U_j\right)$$

などからわかる。次に、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。この X の位相について、任意の $i \in I$ に対して、 $f_i : X_i \rightarrow X$ は連続である。ゆえに g が連続であるとき、 $g \circ f_i : X_i \rightarrow Y$ は連続である。最後に、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。任意の $i \in I$ に対して、 $g \circ f_i : X_i \rightarrow Y$ は連続であるとする。任意の Y の開集合 V をとる。 $g^{-1}(V)$ が X の位相 $\mathcal{O}$ の元であることを示す。任意の $i \in I$ に対して、 $f_i^{-1}(g^{-1}(V)) = (g \circ f_i)^{-1}(V)$ は X_i の開集合であるから、 $g^{-1}(V)$ は $\mathcal{O}$ の元である。

□

定義 1.43. $\{X_i\}_{i \in I}$ を位相空間の族とする。このとき、 $\coprod_{i \in I} X_i := \{(i, x) \mid i \in I, x \in X_i\}$ と定める。さらに、 $\coprod_{i \in I} X_i$ の位相を、 $j_i : X_i \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i, x \mapsto (i, x)$ という写像の族を用いて、前命題の位相とする。これを直和位相という。なお i が明らかな場合は、 (i, x) を x と書くことにする。

次の命題はいらなかったなので、後で消すかもしれない。

命題 1.44. 各 j_i は位相的埋め込みである。したがって、 X_i は $\coprod_{i \in I} X_i$ の部分空間とみなすことができる。

証明 任意の $i \in I$ に対して、 $j_i : X_i \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ は単射であることは簡単に確かめられる。次に、 j_i が連続であることは前命題の位相の定義からわかる。最後に、任意の X_i の開集合 U をとる。 $j_i(U)$ が部分空間 $j_i(X_i)$ の開集合であることを示す。 $j_i(U)$ が $\coprod_{i \in I} X_i$ の開集合であることが分かれば充分である。任意に、 $k \in I$ をとる。 $k \neq i$ のとき、 $j_k^{-1}(j_i(U)) = \emptyset$ は X_k の開集合である。 $k = i$ のとき、 $j_k^{-1}(j_i(U)) = j_i^{-1}(j_i(U)) = U$ は X_i の開集合である。よって、 $j_i(U)$ は $\coprod_{i \in I} X_i$ の開集合である。□

命題 1.45 (直和空間の相対位相は部分空間の直和位相). X_i を位相空間の族とする。このとき、各、 i に対して、 Y_i を X_i の部分集合とする。このとき、 $\coprod_{i \in I} Y_i$ には、 $\coprod_{i \in I} X_i$ の部分空間の位相と、部分空間 Y_i の直和位相の両方が入る。この時、これら2つは同じである。

証明 $\coprod_{i \in I} Y_i$ に $\coprod_{i \in I} X_i$ の部分空間の位相を入れた空間を $\bar{Y}$ とする。 $\coprod_{i \in I} Y_i$ に部分空間 Y_i の直和位相を入れた空間を $\underline{Y}$ とする。この時、恒等写像 $id : \bar{Y} \rightarrow \underline{Y}$ は同相であることを示す。まず、 $id : \bar{Y} \rightarrow \underline{Y}$ が連続であることを示す。任意に $\underline{Y}$ の開集合 U をとる。直和位相の定義より、任意の $i \in I$ に対して、 $U \cap Y_i$ は Y_i の開集合である。 Y_i の位相は X_i の部分空間の位相であるから、ある X_i の開集合 V_i が存在して、 $U \cap Y_i = V_i \cap Y_i$ である。ここで、直和位相の定義から $\coprod_{i \in I} V_i$ は $\coprod_{i \in I} X_i$ の開集合である。さらに、

$$U = \coprod_{i \in I} (U \cap Y_i) = \coprod_{i \in I} (V_i \cap Y_i) = \coprod_{i \in I} V_i \cap \coprod_{i \in I} Y_i$$

であるから、 U は $\bar{Y}$ の開集合である。よって、 $id : \bar{Y} \rightarrow \underline{Y}$ は連続である。次に、 $id : \underline{Y} \rightarrow \bar{Y}$ が連続であることを示す。 $\bar{Y}$ から $\coprod_{i \in I} X_i$ への包含写像を j とする。相対位相の普遍性から、 $j \circ id : \underline{Y} \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ が連続であることを示せば充分である。さらに、 Y_i から $\coprod_{i \in I} Y_i$ への包含写像を j_i とする。直和位相の普遍性から、 $j \circ id \circ j_i : Y_i \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ が連続であることを示せば充分である。 $j \circ id \circ j_i : Y_i \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$ は、 Y_i から X_i への包含写像と、 X_i から $\coprod_{i \in I} X_i$ への包含写像の合成であるから、連続である。□

定義 1.46. X, Y を位相空間とし、 $q: X \rightarrow Y$ を全射連続写像とする。このとき、 q が商写像であるとは、任意の位相空間 Z と任意の写像 $f: Y \rightarrow Z$ に対して、以下は同値であることをいう。

- (1) f は連続である。
- (2) $f \circ q: X \rightarrow Z$ は連続である。

注意 1.47. 商空間への自然な射影は商写像である。

命題 1.48 (商写像の特徴づけ). X, Y を位相空間とし、 $q: X \rightarrow Y$ を全射連続写像とする。以下は同値である。

- (1) q は商写像である。
- (2) Y の位相は $\{U \subset Y \mid q^{-1}(U) \text{ は } X \text{ の開集合}\}$ である。

証明 あとで必要なのは $(1) \Rightarrow$ 「 $q^{-1}(U)$ が X の開集合ならば U は Y の開集合である」だけなので、そこだけ示す。任意の Y の部分集合 U をとる。 $q^{-1}(U)$ が X の開集合であるとする。 $\{0, 1\}$ に位相 $\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$ を入れる。 $f: Y \rightarrow \{0, 1\}$ を $y \in U$ のとき、 $f(y) = 1$ 、 $y \notin U$ のとき $f(y) = 0$ と定める。 $q^{-1}(U)$ が X の開集合であるから、 $f \circ q: X \rightarrow \{0, 1\}$ は連続である。 q が商写像であるから、 $f: Y \rightarrow \{0, 1\}$ は連続である。よって、 $U = f^{-1}(\{1\})$ は Y の開集合である。

□

補題 1.49 (商写像の良い制限も商写像). $q: X \rightarrow Y$ を商写像とし、 $A \subset X$ を開部分集合とし、 $q^{-1}(q(A)) = A$ であるとする。このとき、制限写像

$$q|_A: A \rightarrow q(A)$$

は、相対位相の下で商写像である。

証明 $q|_A$ が全射であることは簡単に確かめられる。 $q|_A$ が連続であることは、 A の位相が相対位相であることからわかる。任意の位相空間 Z と任意の写像 $f: q(A) \rightarrow Z$ に対して、以下は同値であることを示す。

(1) f は連続である。

(2) $f \circ q|_A : A \rightarrow Z$ は連続である。

(1) $\Rightarrow$ (2) は $q|_A$ が連続であることからわかる。(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。任意の位相空間 Z と任意の写像 $f : q(A) \rightarrow Z$ に対して、 $f \circ q|_A : A \rightarrow Z$ が連続であるとする。任意の Z の開集合 O をとる。 $(f \circ q|_A)^{-1}(O)$ は A の開集合であり、 A は X の開集合であるから、 $(f \circ q|_A)^{-1}(O)$ は X の開集合である。 $q^{-1}(q(A)) = A$ と簡単な集合の計算により、 $q^{-1}(f^{-1}(O)) = (f \circ q|_A)^{-1}(O)$ であるから、 $q^{-1}(f^{-1}(O))$ は X の開集合である。命題 1.48 より、 $f^{-1}(O)$ は Y の開集合である。よって $f^{-1}(O)$ は $q(A)$ の開集合である。 $\square$

定理 1.50 (ファイバー束の変換関数からファイバー束を構成). F, X を位相空間とする。 X が空でないとき F も空でないとする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、ある位相空間 E とファイバー束 $\pi : E \rightarrow X$ が (ファイバー束の同型を除いて) 一意的存在して、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ がファイバー束の変換関数となる。

証明 いくつかの step に分ける。

Step 1. E と $\pi : E \rightarrow X$ の構成

まず、位相空間 $\coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ を考える。 $\coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ 上の 2 項関係 $\sim$ を定義する。 $(\alpha, (z, f)) \sim ((\beta, (w, g)))$ を

$$z = w \text{ かつ } \varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$$

によって定める。

$\sim$ が同値関係であることを示す。まず、反射律を示す。任意の $(\alpha, (z, f)) \in \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。命題 1.39 より、 $\varphi_{\alpha\alpha}(z)(f) = id_F(f) = f$ であるから、

$$(\alpha, (z, f)) \sim (\alpha, (z, f))$$

である。次に、対称律を示す。任意の $(\alpha, (z, f)), (\beta, (w, g)) \in \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。 $(\alpha, (z, f)) \sim (\beta, (w, g))$ であるとする。まず、 $z = w$ である。 $\varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$ であるから、命題 1.39 より、 $\varphi_{\alpha\beta}(z)(g) = (\varphi_{\beta\alpha}(z))^{-1}(g) = f$ である。よって、

$$(\beta, (w, g)) \sim (\alpha, (z, f))$$

である。最後に、推移律を示す。任意の $(\alpha, (z, f)), (\beta, (w, g)), (\gamma, (u, h)) \in \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。 $(\alpha, (z, f)) \sim (\beta, (w, g))$ かつ $(\beta, (w, g)) \sim (\gamma, (u, h))$ であるとする。 $z = w = u$ である。 $\varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$ であり、 $\varphi_{\gamma\beta}(z)(g) = h$ であるから、変換関数の公理より、

$$h = \varphi_{\gamma\beta}(z)(g) = \varphi_{\gamma\beta}(z)(\varphi_{\beta\alpha}(z)(f)) = \varphi_{\gamma\alpha}(z)(f)$$

したがって、

$$(\alpha, (z, f)) \sim (\gamma, (u, h))$$

である。以上より、 $\sim$ は同値関係である。

$E := \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F / \sim$ により定める。 $\pi : E \rightarrow X$ を、 $\pi([(\alpha, (z, f))]) = z$ で定める。 $((\alpha, (z, f))) \sim ((\beta, (w, g)))$ であるとき、 $z = w$ であるから、 π は well-defined である。

Step 2. E の位相と π が連続全射であること

E の位相を位相空間 $\coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ の商位相とする。 π が全射であることを示す。 X が空であるときは明らかなので、 X が空でないとする。この時 F も空でない。任意の $x \in X$ をとる。ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、 $x \in U_\alpha$ である。このとき、 F の元 f をとると、

$$\pi([(\alpha, (x, f))]) = x$$

であるから、 π は全射である。 π が連続であることを示す。 q を $\coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ から E への射影とする。商位相の普遍性による特徴付けから $\pi \circ q : \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F \rightarrow X$ が連続であることを示せば十分である。包含写像 $j_\alpha : U_\alpha \times F \rightarrow \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F$ を考える。直和位相の普遍性による特徴付けから、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\pi \circ q \circ j_\alpha : U_\alpha \times F \rightarrow X$ が連続であることを示せば十分である。これは第一射影なので、連続である。よって、 π は連続である。

Step 3. 局所自明化の写像の定義

任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を、

$$\psi_\alpha([(\beta, (z, f))]) = (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$$

で定める。 ψ_α が well-defined であることを示す。まず、任意の $[(\beta, (z, f))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。

$$\pi([(\beta, (z, f))]) = z$$

であるから、 $z \in U_\alpha$ である。また、 $(\beta, (z, f))$ であるから、 $z \in U_\beta$ である。したがって、 $z \in U_\alpha \cap U_\beta$ であり、 $\varphi_{\alpha\beta}(z)$ が定義されるので、 $(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$ は意味を持つ。次に、任意に、 $[(\beta, (z, f))], [(\gamma, (w, g))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。 $[(\beta, (z, f))] \sim [(\gamma, (w, g))]$ であるとする。このとき、

$$(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = (w, \varphi_{\alpha\gamma}(w)(g))$$

であることを示す。まず、 $z = w$ である。また、 $g = \varphi_{\gamma\beta}(w)(f)$ であるから、変換関数の公理より、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(w)(g) = \varphi_{\alpha\gamma}(w)(\varphi_{\gamma\beta}(w)(f)) = \varphi_{\alpha\beta}(w)(f)$$

したがって、

$$(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = (w, \varphi_{\alpha\gamma}(w)(g))$$

であり、 ψ_α は well-defined である。

Step 4. π がファイバー束であることを示す

$\{\psi_\alpha\}$ が π の局所自明化であることを示す。まず、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 ψ_α の逆写像を構成する。 $\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ を、

$$\psi'_\alpha(z, f) = [(\alpha, (z, f))]$$

と定める。 ψ'_α が well-defined であることを示す。任意の $(z, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。 $\pi([(\alpha, (z, f))]) = z$ であるから、 $[(z, f)] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ である。ゆえに、

$$\psi'_\alpha(z, f) = [(\alpha, (z, f))]$$

は well-defined である。 ψ'_α が ψ_α の逆写像であることを示す。任意の $[(z, f)] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。

$$\psi'_\alpha \circ \psi_\alpha([(\beta, (z, f))]) = \psi'_\alpha(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = [(\alpha, (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)))] = [(\beta, (z, f))]$$

であるから、 $\psi'_\alpha \circ \psi_\alpha = id_{\pi^{-1}(U_\alpha)}$ である。任意の $(z, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\psi_\alpha \circ \psi'_\alpha(z, f) = \psi_\alpha([(\alpha, (z, f))]) = (z, \varphi_{\alpha\alpha}(z)(f)) = (z, f)$$

であるから、 $\psi_\alpha \circ \psi'_\alpha = id_{U_\alpha \times F}$ である。ゆえに、 ψ'_α は ψ_α の逆写像である。次に、 ψ_α が同相であることを示す。 ψ_α が連続であることを示す。 $q : \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F \rightarrow E$ を自然な射

影とする。これは商写像である。 $q(q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))) = \pi^{-1}(U_\alpha)$ であるから、 q の制限写像 $q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ を考えると、補題 1.49 より、この制限写像は商写像であるから、

$$\psi_\alpha \circ q|_{q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))} : q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) \rightarrow U_\alpha \times F$$

が連続であることを示せば十分である。まず、

$$q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) = \coprod_{\gamma \in \Lambda} (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$$

である。命題 1.45 より、 $\coprod_{\gamma \in \Lambda} (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$ の位相は直和位相の相対位相であるが、これは相対位相の直和位相に等しい。各 $\gamma \in \Lambda$ に対して、包含写像

$$j_\gamma : (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F \rightarrow q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))$$

を考える。

直和位相の普遍性より、各 γ について

$$\psi_\alpha \circ q \circ j_\gamma : (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F \rightarrow U_\alpha \times F$$

が連続であることを示せば十分である。

任意の $(z, f) \in (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$ に対して、

$$\psi_\alpha \circ q \circ j_\gamma(z, f) = \psi_\alpha([\gamma, (z, f)]) = (z, \varphi_{\alpha\gamma}(z)(f))$$

である。第一成分は包含写像なので連続であり、第二成分は変換関数の公理より連続である。よって、 ψ_α は連続である。

ψ'_α の連続性は、射影の連続性と制限写像の連続性から示せる。

最後に、 $pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ であることを示す。任意の $[(\alpha, (z, f))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。 $pr_1 \circ \psi_\alpha([\alpha, (z, f)]) = pr_1(z, f) = z = \pi([\alpha, (z, f)])$ であるから、 $pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ である。

Step 5. 変換関数が $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ であることを示す

任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $z \in U_\alpha \cap U_\beta$ と任意の $f \in F$ をとる。

$$(pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1})(z, f) = \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$$

であることを示す。 $\psi_\beta^{-1}(z, f) = [(\beta, (z, f))]$ であるから、

$$\begin{aligned} pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) &= pr_2 \circ \psi_\alpha([\beta, (z, f)]) \\ &= pr_2(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(z)(f) \end{aligned}$$

であるから、変換関数は $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ である。

Step 6. 一意性

ある位相空間 E' とファイバー束 $\pi' : E' \rightarrow X$ が存在して、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ をファイバー束の変換関数となるとする。このとき、 E と E' はファイバー束の同型であることを示す。

このとき、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $(z, f) \in (U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ に対して、

$$pr_2 \circ \psi'_\alpha \circ (\psi'_\beta)^{-1}(z, f) = \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$$

が成り立つ。

各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow (\pi')^{-1}(U_\alpha)$ を

$$\Phi_\alpha := (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow (\pi')^{-1}(U_\alpha)$$

と定める。まず、 $\{\Phi_\alpha\}$ が貼り合わさることを示す。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $p \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ をとる。

$$\Phi_\alpha(p) = \Phi_\beta(p)$$

を示せば十分である。 $\psi_\beta(p) = (z, f)$ とおく。このとき、 $p = \psi_\beta^{-1}(z, f)$ であるから、

$$\begin{aligned} \Phi_\alpha(p) &= (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) \\ &= (\psi'_\alpha)^{-1}(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) \\ &= (\psi'_\alpha)^{-1}(\psi'_\alpha((\psi'_\beta)^{-1}(z, f))) \\ &= (\psi'_\beta)^{-1}(z, f) \\ &= \Phi_\beta(p) \end{aligned}$$

である。したがって、貼り合わせの補題より、連続写像

$$\Phi : E \rightarrow E'$$

が存在して、

$$\Phi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = \Phi_\alpha$$

を満たす。同様に、

$$\Psi_\alpha := \psi_\alpha^{-1} \circ \psi'_\alpha : (\pi')^{-1}(U_\alpha) \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$$

を貼り合わせることで、連続写像

$$\Psi : E' \rightarrow E$$

を得る。

任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{aligned}\Psi \circ \Phi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} &= \Psi_\alpha \circ \Phi_\alpha \\ &= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi'_\alpha \circ (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha \\ &= id_{\pi^{-1}(U_\alpha)}\end{aligned}$$

である。 $\{\pi^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ は E の開被覆であるから、

$$\Psi \circ \Phi = id_E$$

である。

同様に、

$$\Phi \circ \Psi = id_{E'}$$

である。

したがって、 Φ は同相写像である。

最後に、 Φ がファイバー束の同型であることを示す。任意の $p \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。

$\psi_\alpha(p) = (z, f)$ とおくと、

$$\begin{aligned}\pi' \circ \Phi(p) &= \pi' \circ (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha(p) \\ &= \pi' \circ (\psi'_\alpha)^{-1}(z, f) \\ &= z \\ &= \pi(p)\end{aligned}$$

である。

ゆえに、 Φ はファイバー束の同型である。 □

最後に、変換関数の視点から切断を考える。

命題 1.51 (切断から局所切断への対応). $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を π の変換関数とする。 $s \in \Gamma(X, E)$ が切断であるとき、 $f_\alpha := pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow F$ と定めると、これは *well-defined* である。さらに、これは連続であり、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))$$

が成り立つ。

証明 まず、 f_α が *well-defined* であることを示す。 $s|_{U_\alpha}(U_\alpha) \subset \pi^{-1}(U_\alpha)$ であるから、 $\psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}$ は *well-defined* である。 f_α は、連続写像の合成であるから、連続である。最後に、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $f \in F$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$\begin{aligned} f_\alpha(x) &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}(x) \\ &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1} \circ \psi_\beta \circ s|_{U_\alpha \cap U_\beta}(x) \\ &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(x, f_\beta(x)) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x)) \end{aligned}$$

である。 □

定理 1.52 (切断の局所的な記述). F, X を位相空間とする。 X が空でないとき F も空でないとする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、定理 1.50 より構成されるファイバー束 $\pi : E \rightarrow X$ を考える。

$$S := \{\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \mid f_\alpha \in C(U_\alpha, F), \text{ 任意の } x \in U_\alpha \cap U_\beta \text{ に対して } f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))\}$$

とする。この時、任意の $\{f'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \in S$ に対して、ある切断 $s \in \Gamma(X, E)$ が一意的に存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 1.51 で定まる $\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ は $\{f'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ に等しい。

証明 Step 1. 連続切断の構成

任意に、 $\{f'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \in S$ をとる。任意に、 U_α をとる。 $s_\alpha : U_\alpha \rightarrow E$ を、 $s_\alpha(x) = \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x))$ で定める。 s_α は連続である。これを開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ に沿って張り合わせて連続写像

$s : X \rightarrow E$ を得たい。任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $\beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned}
s_\alpha(x) &= \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\
&= \psi_\alpha^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x)(f'_\beta(x))) \\
&= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(x, f'_\beta(x)) \\
&= \psi_\beta^{-1}(s_\beta(x)) \\
&= s_\beta(x)
\end{aligned}$$

である。したがって、 s_α は $U_\alpha \cap U_\beta$ 上で一致するから、張り合わせの補題より、連続写像 $s : X \rightarrow E$ が存在して、 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ を満たす。これが切断であることは簡単。

Step 2. $(f_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} = (f'_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$

任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha$ をとる。

$$\begin{aligned}
f_\alpha(x) &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}(x) \\
&= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\
&= f'_\alpha(x)
\end{aligned}$$

である。

Step 3. 一意性

ある切断 $\tilde{s} \in \Gamma(X, E)$ が存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 1.51 で定まる $(\tilde{f}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ は $(f'_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ に等しいとする。任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha$ をとる。

$$\begin{aligned}
s(x) &= \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\
&= \psi_\alpha^{-1}(x, \tilde{f}_\alpha(x)) \\
&= \psi_\alpha^{-1}(x, pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \tilde{s}(x)) \\
&= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \tilde{s}(x) \\
&= \tilde{s}(x)
\end{aligned}$$

である。したがって、 $s = \tilde{s}$ である。 □

1.4 滑らかな変換関数から滑らかなファイバー束の構成

先の話有位相空間の代わりに滑らかな多様体で行う。

補題 1.53 (全単射から多様体構造を入れる). X を位相空間、 M を n 次元滑らかな多様体とする。 $f: X \rightarrow M$ を同相写像とする。このとき、 X に n 次元滑らかな多様体構造が存在して、 f が微分同相写像になるようにできる。さらに、 S を X の開部分集合とする。このとき、 S に入る X の多様体構造の開部分多様体構造と、同相写像 $f|_S: S \rightarrow f(S)$ から入る多様体構造は等しいものである。

証明 略

□

補題 1.54 (局所的に多様体構造が入るとき全体に多様体構造を入れられる). X を Hausdorff 位相空間、 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とする。各、 U_α に n 次元滑らかな多様体構造が入っているとする。さらに、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の多様体構造の開部分多様体構造と U_β の多様体構造の開部分多様体構造が等しいものであるとする。このとき、 X にある n 次元滑らかな多様体構造が存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 U_α の多様体構造はこの多様体構造の開部分多様体構造になるようにできる。

注意 1.55. 第2加算公理を多様体の定義に入れている場合は、 Λ が高々加算であることを仮定すれば行けるはずである。そのため、後でこの命題を使うときにうまく工夫する必要がある。

証明 略

□

定理 1.56 (滑らかなファイバー束の変換関数から滑らかなファイバー束を構成). F, X を滑らかな多様体とする。 X が空でないとき F も空でないとする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、ある多様体 E と滑らかなファイバー束 $\pi: E \rightarrow X$ が (滑らかなファイバー束の同型を除いて) 一意的存在して、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ がファイバー束の変換関数となる。

証明 定理 1.50 より得られる。 $E, \pi, \{\psi_\alpha\}$ について考える。まず、 E が Hausdorff であることを示す。任意に異なる点 $x, y \in E$ をとる。 $\pi(x) = \pi(y)$ であるとする。このと

き、ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、 $x, y \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ である。 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ と、 $U_\alpha \times F$ は同相であり、 $U_\alpha \times F$ は Hausdorff であるから、 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ は Hausdorff である。したがって、 x と y は $\pi^{-1}(U_\alpha)$ の開集合で分離できる。 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ は E の開集合であるから、 x と y は E の開集合で分離できる。 $\pi(x) \neq \pi(y)$ であるとする。このとき、 X は Hausdorff であるから、 $\pi(x)$ を含む X の開集合 V_x と $\pi(y)$ を含む X の開集合 V_y が存在して、 $V_x \cap V_y = \emptyset$ である。 $\pi^{-1}(V_x)$ と $\pi^{-1}(V_y)$ は E の開集合であるから、 $\pi^{-1}(V_x)$ と $\pi^{-1}(V_y)$ は x と y を分離する。したがって、 E は Hausdorff である。 E に多様体構造を入れる。まず、同相である局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を用いて、補題 1.53 より、 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ に多様体構造を入れることができる。(ただし、 $U_\alpha \times F$ には、開部分多様体 U_α の多様体構造と F の多様体構造から入る直積多様体構造を入れる。) 次に、 $\{\pi^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ は E の開被覆である。補題 1.54 の仮定を満たすことを示す。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。同相写像 $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ を考える。 $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) = (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$ であるから、(4) より、 $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ は滑らかである。(ただし、 $(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ には、開部分多様体 $(U_\alpha \cap U_\beta)$ の多様体構造と F の多様体構造から入る直積多様体構造を入れる。) この逆写像も滑らかであるから、 $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ は微分同相写像である。補題 1.53 の多様体構造の入れ方から、 $\pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$ に入る 2 つの開部分多様体構造の間の恒等写像が微分同相写像である。ゆえに、 $\pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$ に入る 2 つの開部分多様体構造は等しいものである。補題 1.54 より、 E 全体に多様体構造を入れることができる。この時、局所自明化は開部分多様体からの微分同相である。 $\pi : E \rightarrow X$ が滑らかであることを示す。補題 1.54 により、各、 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow X$ が滑らかなファイバー束であることを示せば十分である。

$$\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = j_\alpha \circ pr_1 \circ \psi_\alpha$$

である。(ただし、 $j_\alpha : U_\alpha \rightarrow X$ は包含写像である。) 補題 1.54 から、 ψ_α は滑らかであるから、 $\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)}$ は滑らかである。これで、 $\pi : E \rightarrow X$ が滑らかであることがわかった。 ψ_α が微分同相であるから、 $\pi : E \rightarrow X$ は滑らかなファイバー束である。一意性については定理 1.50 の Step6 の議論を滑らかな写像に置き換えて行えばいい。□

命題 1.51 の滑らかなバージョンを示す。

命題 1.57 (滑らかな切断から局所切断への対応). $\pi : E \rightarrow X$ を滑らかなファイバー束とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を π の滑らかな変換関数とする。 $s \in \Gamma^\infty(X, E)$ について、 $f_\alpha := pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow F$ と定めると、これは *well-defined* である。さらに、これは滑らかであり、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))$$

が成り立つ。

証明 命題 1.51 の証明を、連続性の議論を滑らかさの議論に置き換えて行えばいい。□

定理 1.52 の滑らかなバージョンを示す。

定理 1.58 (滑らかな切断の局所的な記述). F, X を滑らかな多様体とする。 X が空でないとき F も空でないとする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、定理 1.56 より構成されるファイバー束 $\pi : E \rightarrow X$ を考える。

$$S := \{\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \mid f_\alpha \in C^\infty(U_\alpha, F), \text{ 任意の } x \in U_\alpha \cap U_\beta \text{ に対して } f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))\}$$

とする。この時、任意の $\{f'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \in S$ に対して、ある滑らかな切断 $s \in \Gamma^\infty(X, E)$ が一意的に存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 1.57 で定まる $\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ は $\{f'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ に等しい。

証明 定理 1.52 の証明を、連続性の議論を滑らかさの議論に置き換えて行えばいい。□

2 ベクトル束

2.1 構造群

定義 2.1. $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とし、 G を $\text{Homeo}(F)$ の部分群とする。開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ の上での局所自明化 $\{\psi_\alpha\}$ とその局所自明化に対する変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ について、変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ の値域が G に含まれるとき、この変換関数を G -変換関数という。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数が G -変換関数であるとき、この $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の G -Atlas という。

定義 2.2. $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の G -Atlas とする。このとき、 $\{\psi_\alpha\}$ が極大 G -Atlas であるとは、 $\{\psi_\alpha\}$ を含むファイバー束の G -Atlas が $\{\psi_\alpha\}$ だけであることをいう。

命題 2.3 (極大 G -Atlas の存在と一意性). $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の G -Atlas とする。このとき、 $\{\psi_\alpha\}$ を含むファイバー束の極大 G -Atlas がただ一つ存在する。

証明 $\mathcal{A}$ を任意の $\{\psi_\alpha\}$ の元と変換関数が G -変換関数であるようなファイバー束の局所自明化全体の集合とする。これが求めるものになる。 $\mathcal{A}$ が $\{\psi_\alpha\}$ を含むことは定義からわかる。 $\mathcal{A}$ がファイバー束の G -Atlas であることを示す。任意の $\bar{\theta}, \theta' \in \mathcal{A}$ をとる。任意に、 $x \in \bar{U}_{\bar{\alpha}} \cap U'_{\alpha'}$ をとる。 x を元に持つ U_{α} をとる。 $\varphi_{\alpha\bar{\alpha}}$ を ψ_{α} と $\bar{\theta}$ の変換関数とする。 $\varphi_{\alpha,\alpha'}$ を ψ_{α} と θ' の変換関数とする。 $\varphi_{\bar{\alpha},\alpha'}$ を $\bar{\theta}$ と θ' の変換関数とする。このとき、 $\varphi_{\bar{\alpha},\alpha'} = \varphi_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1} \circ \varphi_{\alpha,\alpha'} \in G$ である。ゆえに、 $\varphi_{\alpha,\alpha'}$ は G -変換関数である。よって、 $\mathcal{A}$ はファイバー束の G -Atlas である。 $\mathcal{A}$ が極大であることと一意であることは簡単。 $\square$

定義 2.4. $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とし、 G を $\text{Homeo}(F)$ の部分群とする。 $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の極大 G -Atlas とする。このとき、 $(E, X, \pi, F, G, \{\psi_\alpha\})$ を構造群付きファイバー束という。またこの時、 $\{\psi_\alpha\}$ の元を G -局所自明化という。

注意 2.5. 次の「」の文では構造群を定義したことにならないことに注意せよ。なぜなら、これでは θ が G -局所自明化であることが $\{\psi_\alpha\}$ の取り方によるからである。(そのような具体例は例 2.7 を参照。) 構造群で定義の時に、局所自明化の族も併せてとる必要があるのはこのためである。「 $\pi : E \rightarrow X$ をファイバー束とし、 G を $\text{Homeo}(F)$ の部分群とする。ある開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ の上での局所自明化 $\{\psi_\alpha\}$ とその局所自明化に対する変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ について、

変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ の値域が G に含まれるとき、この変換関数を G -変換関数という。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数が G -変換関数であるとき、 $\pi: E \rightarrow X$ は G を構造群に持つという。また、 π の局所自明化 θ が G -局所自明化であるとは、任意の ψ_α と θ の変換関数が G -変換関数であることをいう。」

注意 2.6. 構造群は、ファイバー束の変換関数の値域を制限することで、ファイバー束の構造を制限するものである。これ以降構造群 G が定まっているときは、局所自明化と変換関数は G -局所自明化と G -変換関数を指すことになる。

例 2.7 (構造群は局所自明化の取り方による例). X を空でない位相空間とする。 $E = X \times \mathbb{R}$ とする。 $\pi: E \rightarrow X$ を $\pi(x, t) = x$ で定める。これはファイバー束である。 $G = \text{GL}(\mathbb{R}) \subset \text{Homeo}(\mathbb{R})$ とする。 $\psi: E \rightarrow X \times \mathbb{R}$ を $\psi(x, t) = (x, t)$ で定める。 $\psi': E \rightarrow X \times \mathbb{R}$ を $\psi'(x, t) = (x, t^3)$ で定める。このとき、局所自明化の族 $\{\psi\}$ と、 $\{\psi'\}$ について、これらの任意の元との変換関数はそれぞれ、 G -変換関数である。しかし、 $\theta := \psi$ とすると、これは ψ との変換関数は G -変換関数であるが、 ψ' との変換関数は G -変換関数ではない。

例 2.8. $\pi: E \rightarrow X$ を C^∞ 級ファイバー束とする。このとき、命題??より、 $(E, X, \pi, F, \text{Diffeo}(F), \{\psi_\alpha\})$ は $\text{Diffeo}(F)$ を構造群とするファイバー束である。ただしここで $\{\psi_\alpha\}$ は命題 2.3 で構成される極大 G -Atlas である。

例 2.9 (自明なファイバー束). $E = X \times F$ とする。 $\pi: E \rightarrow X$ を $\pi(x, f) = x$ で定める。これはファイバー束である。 $G = \{id_F\}$ とする。 $\psi: E \rightarrow X \times F$ を $\psi(x, f) = (x, f)$ で定める。このとき、 $\{\psi\}$ は G -Atlas である。 $\{\psi\}$ を含む極大 G -Atlas $\mathcal{A}$ に対して、 $(E, X, \pi, F, G, \mathcal{A})$ は G を構造群とするファイバー束である。

命題 2.10. $(E, X, \pi, F, \{id_F\}, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ を $\{id_F\}$ を構造群とするファイバー束とする。この時、ある $\gamma \in \Lambda$ が存在して、 $U_\gamma = X$ である。とくに、これは先の例と同型である。

証明 各、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の元は変換関数の値域が $\{id_F\}$ に含まれるので、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_{\alpha\beta} = id_F$ である。よって、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と、任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta, f \in F$ に

対して、

$$\psi_\alpha(x, f) = (id_X, \varphi_{\alpha\beta}) \circ \psi_\beta(x, f) = \psi_\beta(x, f)$$

である。ゆえに、各、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の元を張り合わせて、同相写像 $\psi : E \rightarrow X \times F$ を定めることができる。これは $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の極大性から再びこの元である。このファイバー束が前の例と同型であることは ψ が同型写像であることからわかる。 $\square$

2.2 位相体と位相ベクトル空間

定義 2.11. $\mathbb{K}$ を体とし、位相空間でもあるとする。このとき、 $\mathbb{K}$ が位相体であるとは、加法写像と乗法写像と乗法逆元をとる操作が連続であることをいう。

注意 2.12. 位相体において、加法逆元をとる操作も連続である。

補題 2.13. $\mathbb{K}$ を位相体とし、 X を位相空間とする。 $f, g: X \rightarrow \mathbb{K}$ を連続な写像とする。このとき、写像の和 $f + g: X \rightarrow \mathbb{K}$ と、写像の積 $f \cdot g: X \rightarrow \mathbb{K}$ は連続な写像である。

証明 簡単

□

例 2.14. $\mathbb{R}$ と $\mathbb{C}$ は自然な構造に対して位相体である。

定義 2.15. $\mathbb{K}$ を位相体とし、 V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間であって、位相空間でもあるとする。このとき、 V が位相ベクトル空間であるとは、スカラー倍写像と加法写像が連続であることをいう。

注意 2.16. 位相ベクトル空間において逆元をとる操作は連続である。

定義 2.17. V, W を位相ベクトル空間とする。このとき、 $f: V \rightarrow W$ が位相ベクトル空間の準同型であるとは、 f が線形写像であって、連続であることをいう。さらに、 f が位相ベクトル空間の同型であるとは、 f が線形同型写像であって、同相であることをいう。

命題 2.18 (自然な位相ベクトル空間構造). $\mathbb{K}$ を位相体とし、 $\mathbb{K}^n$ に自然なベクトル空間と位相を入れる。このとき、 $\mathbb{K}^n$ は位相ベクトル空間になる。さらに $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ が線形写像であれば、 f は位相ベクトル空間の準同型である。

証明 $\mathbb{K}^n$ の加法写像を $+: \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ 、スカラー倍写像を $\cdot: \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ とする。 $(pr_i \circ +)(x, y) = (pr_i \circ pr_1)(x, y) + (pr_i \circ pr_2)(x, y)$ であり、写像の和は連続であるから、 $pr_i \circ +$ は連続である。 $(pr_i \circ \cdot)(a, x) = pr_1(a, x) \cdot (pr_i \circ pr_2)(a, x)$ であり、写像の積は連続であるから、 $pr_i \circ \cdot$ は連続である。したがって、 $\mathbb{K}^n$ は位相ベクトル空間

である。 $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ が線形写像であるとする。 f の表現行列を $A = (a_{ij})$ とする。 $pr_i \circ f = \sum_{j=1}^n a_{ij} pr_j$ であり、写像の和と積は連続なので、 $pr_i \circ f$ は連続である。 $\square$

例 2.19 (有限次元位相ベクトル空間の自然な位相ベクトル空間構造). $\mathbb{K}$ を位相体とする。 V を $\mathbb{K}$ 上の n 次元ベクトル空間とする。このとき、 V は自然な位相ベクトル空間構造を入れることができる。具体的には、 V の基底をとって、 $\mathbb{K}^n$ との自然な全単射 P を定める。この全単射を用いて、 V に $\mathbb{K}^n$ の位相を誘導する。この位相は基底の選択に依らない。さらにこの位相に対して、 V は位相ベクトル空間になる。また、この構造に対して、 P は位相ベクトル空間の同型である。

証明 基底の取り方によらないことは基底の変換写像は線形同型写像であるから、命題 2.18 より、位相ベクトル空間の同型であるからわかる。 V に入る位相に対して、スカラー倍写像と加法写像が連続であることは、全単射を用いて $\mathbb{K}^n$ のスカラー倍写像と加法写像の連続性からわかる。 P が同相であることは誘導される位相の定義からわかる。 $\square$

命題 2.20 (有限次元位相ベクトル空間の線形写像は準同型). V, W を有限次元位相ベクトル空間とする。このとき、 $f: V \rightarrow W$ が線形ならば、 f は位相ベクトル空間準同型である。

証明 V と W に自然な位相ベクトル空間構造を入れる。 V と W の基底をとって、全単射を定める。この全単射を用いて、 V と W に自然な位相を入れる。この全単射を用いて、 f を $\mathbb{K}^n$ から $\mathbb{K}^m$ への線形写像とみなす。この線形写像は、命題 2.18 より、位相ベクトル空間の準同型である。 $\square$

命題 2.21 (双線形写像は連続). V, W, U を有限次元ベクトル空間とする。 V と W と U に自然な位相ベクトル空間構造を入れる。このとき、 $f: V \times W \rightarrow U$ が双線形ならば、 f は連続である。

証明 V と W と U の基底をとって、全単射を定める。それぞれの次元を n, m, r とする。この全単射の下で、 f を $\mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^m$ から $\mathbb{K}^r$ への双線形写像とみなす。

$$pr_k \circ f(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m pr_k(f(e_i, e_j)) \cdot pr_i \circ pr_1(x, y) \cdot pr_j \circ pr_2(x, y)$$

であるから、 $pr_k \circ f$ は連続である。

□

命題 2.22 (線形写像空間の連続性). $\mathbb{K}$ を位相体とし、 V を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 U を位相空間とする。このとき、 $\varphi: U \rightarrow L(V, V)$ について以下は同値である。ただし、 $L(V, V)$ は V から V への線形写像全体の集合であって、これは有限次元なので、自然な位相ベクトル空間構造を入れておく。

(1) φ は連続である。

(2) $F: U \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto \varphi(u)(v)$ は連続である。

証明 まず、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。命題 2.21 より、評価写像 $L(V, V) \times V \rightarrow V, (f, v) \mapsto f(v)$ は連続である。 φ は連続であるから、 $\varphi \times id_V: U \times V \rightarrow L(V, V) \times V$ は連続である。この二つの写像の合成は、 F であるから、これは連続である。次に、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。 V の基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ をとる。この基底による自然な線形同型を $P: V \rightarrow \mathbb{K}^n$ と定める。また、この基底を用いて、 $L(V, V)$ の基底 $\{f_{i,j}\}$ を定める。 $f_{i,j}$ は、 $f_{i,j}(e_k) = \delta_{j,k} e_i$ であるような線形写像である。この基底による自然な線形同型を $Q: L(V, V) \rightarrow \mathbb{K}^{n^2}$ と定める。任意に、 $u \in U$ をとる。 $\varphi(u)$ を $f_{i,j}$ の線形結合で書く。 $\varphi(u) = \sum_{i,j} a_{i,j}(u) f_{i,j}$ であるとする。任意の $s, t \in \{1, \dots, n\}$ に対して、これで得られる $a_{s,t}: U \rightarrow \mathbb{K}^{n^2}$ が連続であること

をまずは示す。 $a_{s,t} = pr_s \circ P \circ F \circ (id_U \times e_t)$ である。実際、

$$\begin{aligned}
 pr_s(P(F((id_U \times e_t)(u)))) &= pr_s(P(F(u, e_t))) \\
 &= pr_s(P(\varphi(u)(e_t))) \\
 &= pr_s(P(\sum_{i,j} a_{i,j}(u) f_{i,j}(e_t))) \\
 &= pr_s(P(\sum_{i,j} a_{i,j}(u) \delta_{j,t} e_i)) \\
 &= pr_s(P(\sum_i a_{i,t}(u) e_i)) \\
 &= pr_s\left(\begin{pmatrix} a_{1,t}(u) \\ a_{2,t}(u) \\ \vdots \\ a_{n,t}(u) \end{pmatrix}\right) \\
 &= a_{s,t}(u)
 \end{aligned}$$

である。したがって、 $a_{s,t}$ は連続である。 $Q \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{K}^{n^2}$ は、 $a_{i,j}$ を成分とする写像であるから、連続である。 Q は同相なので、 φ は連続である。

□

2.3 有限次元線形空間の多様体構造

前の位相構造の内容を多様体に置き換える。ただし、位相体は $\mathbb{R}$ とする。

命題 2.23 (有限次元位相ベクトル空間の多様体構造). V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。このとき、 V は自然な多様体構造を入れることができる。この構造に対して、和とスカラー倍は滑らかな写像である。

証明 略

□

命題 2.24 (線形写像は滑らか). V, W を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 V と W に自然な多様体構造を入れる。このとき、 $f: V \rightarrow W$ が線形ならば、 f は滑らかな写像である。

証明 略

□

命題 2.25 (双線形写像は滑らか). V, W, U を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 V と W と U に自然な多様体構造を入れる。このとき、 $f: V \times W \rightarrow U$ が双線形ならば、 f は滑らかな写像である。

証明 略

□

命題 2.26 (線形写像空間の滑らかさ). U を多様体とする。 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。このとき、 $\varphi: U \rightarrow L(V, V)$ について以下は同値である。ただし、 $L(V, V)$ は V から V への線形写像全体の集合であって、これは有限次元なので、自然な多様体構造を入れておく。

(1) φ は滑らかな写像である。

(2) $F: U \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto \varphi(u)(v)$ は滑らかな写像である。

証明 略

□

2.4 テンソル積

命題 2.27 (自由ベクトル空間). $\mathbb{K}$ を体とし、 S を集合とする。

$$\mathcal{F}(S) := \{\alpha : S \rightarrow \mathbb{K} \mid \text{有限個の } s \text{ を除いて } \alpha(s) = 0\}$$

とする。 $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ と $a \in \mathbb{K}$ に対して、 $(\alpha + \beta)(s) = \alpha(s) + \beta(s)$ 、 $(a\alpha)(s) = a\alpha(s)$ で定める。このとき、 $\mathcal{F}(S)$ は $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間になる。

証明 簡単。例えば有限と有限の和は有限であることなどを用いる。 $\square$

定義 2.28. 前の命題のベクトル空間 $\mathcal{F}(S)$ を、 S 上の自由ベクトル空間という。 $\mathcal{F}(S)$ の元 δ_s を、 $\delta_s(s) = 1$ であり、 $\delta_s(s') = 0 (s' \neq s)$ であるような関数とする。この δ_s を単に s と書く。この意味で、 $S \subset \mathcal{F}(S)$ であるを考える。この表記の下で、任意の $\mathcal{F}(S)$ の元 α は、有限個の $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ と $s_1, \dots, s_n \in S$ を用いて、 $\alpha = a_1 s_1 + \dots + a_n s_n$ と書ける。

注意 2.29. この時の $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ は $\alpha(s_1), \dots, \alpha(s_n)$ である。

注意 2.30. $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ をそれぞれ、 $\alpha = a_1 s_1 + \dots + a_n s_n$ 、 $\beta = b_1 s_1 + \dots + b_n s_n$ と書く。(必要に応じて、 a_i や b_i が 0 であることもある。) このとき、 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1)s_1 + \dots + (a_n + b_n)s_n$ である。また、 $a \in \mathbb{K}$ に対して、 $a\alpha = (aa_1)s_1 + \dots + (aa_n)s_n$ である。次に、任意の $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ に対して、

命題 2.31 (自由ベクトル空間の普遍性). $\mathbb{K}$ を体とし、 S を集合とする。 V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とし、 $f : S \rightarrow V$ を写像とする。このとき、ある $\mathbb{K}$ 線形写像 $\bar{f} : \mathcal{F}(S) \rightarrow V$ がただ一つ存在して、任意の $s \in S$ に対して、 $\bar{f}(s) = f(s)$ である。

証明 $\bar{f} : \mathcal{F}(S) \rightarrow V$ を、任意の $\alpha \in \mathcal{F}(S)$ に対して、

$$\bar{f}(\alpha) = \sum_{s \in S} \alpha(s) f(s)$$

と定める。 $s \in S$ は有限個しか $\alpha(s) \neq 0$ でないから、この和は有限和である。 $\bar{f}$ が線形であることを示す。 $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ と $a \in \mathbb{K}$ をとる。 $\bar{f}(\alpha + \beta) = \sum_{s \in S} (\alpha(s) + \beta(s)) f(s) = \sum_{s \in S} \alpha(s) f(s) + \sum_{s \in S} \beta(s) f(s) = \bar{f}(\alpha) + \bar{f}(\beta)$ である。 $\bar{f}(a\alpha) = \sum_{s \in S} (a\alpha(s)) f(s) = a \sum_{s \in S} \alpha(s) f(s) = a\bar{f}(\alpha)$ である。よって、 $\bar{f}$ は線形である。 $\bar{f}$

が任意の $s \in S$ に対して、 $\bar{f}(s) = f(s)$ であることを示す。 $\bar{f}(s) = \bar{f}(\delta_s) = \sum_{s' \in S} \delta_s(s') f(s')$ である。 $\delta_s(s) = 1$ であり、 $s' \neq s$ のとき $\delta_s(s') = 0$ であるから、 $\bar{f}(s) = f(s)$ である。 $\bar{f}$ の一意性を示す。 $\bar{f}' : \mathcal{F}(S) \rightarrow V$ を、任意の $s \in S$ に対して、 $\bar{f}'(s) = f(s)$ であるような線形写像とする。 $\bar{f}'(\alpha) = f(\sum_{s \in S} \alpha(s)s) = \sum_{s \in S} \alpha(s)f(s) = \bar{f}(\alpha)$ であるから、 $\bar{f}'(\alpha) = \bar{f}(\alpha)$ である。 $\square$

定義 2.32. $\mathbb{K}$ を体とし、 $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。自由ベクトル空間 $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ を考える。(なお、 $V_1 \times \dots \times V_n$ は線形空間ではなく単なる集合である と考える。) この自由ベクトル空間の部分集合 R を、以下の元全体の集合とする。

- $(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)$
- $(v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - a(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)$

(ただし、 $v_i, v'_i \in V_i$ 、 $a \in \mathbb{K}$ であるとする。) R により生成される $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ の部分空間を $\mathcal{R}$ とする。このとき、商空間 $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)/\mathcal{R}$ を $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ と書く。これを $V_1, \dots, V_n$ のテンソル積という。さらに、 $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ を、商空間 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ における $(v_1, \dots, v_n)$ の同値類とする。

命題 2.33. $\mathbb{K}$ を体とし、 $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $\varphi : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ を、任意の $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $\varphi(v_1, \dots, v_n) = v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ で定める写像とする。このとき、 φ は多重線形写像である。

注意 2.34. これは、 $(x + x') \otimes y = x \otimes y + x' \otimes y$ や $(ax) \otimes y = a(x \otimes y)$ などの等式が成り立つことを意味する。とくに、 $0 \otimes y = 0$ や $x \otimes 0 = 0$ などの等式も成り立つ。

証明 任意に、 $1 \leq i \leq n$ 、 $v_i, v'_i \in V_i$ 、 $a, b \in \mathbb{K}$ をとる。 $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ から商空間 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ への標準射影を p と書く。

$$\begin{aligned}
& \varphi(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - \varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - \varphi(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) \\
&= (v_1 \otimes \dots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \dots \otimes v_n) - (v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n) - (v_1 \otimes \dots \otimes v'_i \otimes \dots \otimes v_n) \\
&= p(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - p(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - p(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) \\
&= p((v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \varphi(v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - a\varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) \\
&= (v_1 \otimes \dots \otimes (av_i) \otimes \dots \otimes v_n) - a(v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n) \\
&= p(v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - ap(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) \\
&= p((v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - a(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)) \\
&= 0
\end{aligned}$$

□

命題 2.35 (テンソル積の普遍性). $\mathbb{K}$ を体とし、 $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $\varphi : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ を、任意の $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $\varphi(v_1, \dots, v_n) = v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ で定める写像とする。このとき、任意の $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 W と任意の多重線形写像 $f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ に対して、線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes \dots \otimes V_n \rightarrow W$ がただ 1 つ存在して、任意の $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $\tilde{f}(\varphi(v_1, \dots, v_n)) = f(v_1, \dots, v_n)$ が成り立つ。

証明 命題 2.31 より、ある線形写像 $\bar{f} : \mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n) \rightarrow W$ がただ一つ存在して、任意の $(v_1, \dots, v_n) \in V_1 \times \dots \times V_n$ に対して、 $\bar{f}(v_1, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_n)$ である。 $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ から商空間 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ への標準射影を p と書く。この時、任意の $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ を取る。このとき、 $p(\alpha) = p(\beta)$ であるとき、 $\bar{f}(\alpha) = \bar{f}(\beta)$ であることを示す。 α と β は同値であるから、 $\alpha - \beta \in \mathcal{R}$ である。ゆえに、ある $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in \mathcal{R}$ と $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$ があって、 $\alpha - \beta = a_1\gamma_1 + \dots + a_m\gamma_m$ である。 $\bar{f}(\alpha) - \bar{f}(\beta) = \bar{f}(\alpha - \beta) = \bar{f}(a_1\gamma_1 + \dots + a_m\gamma_m) = a_1\bar{f}(\gamma_1) + \dots + a_m\bar{f}(\gamma_m)$ である。ここで、各、 γ_i について、 $\bar{f}(\gamma_i) = 0$ であることを示せば、 $\bar{f}(\alpha) = \bar{f}(\beta)$ であることがわかる。 γ_i は、 $(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)$ の形の元か、 $(v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - a(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)$ の形の元である。 γ_i が前者の形の元であるとする。

$$\begin{aligned}
\bar{f}(\gamma_i) &= \bar{f}((v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)) \\
&= f(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) - f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) - f(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) \\
&= 0
\end{aligned}$$

γ_i が後者の形の元であるとする。

$$\begin{aligned}\bar{f}(\gamma_i) &= \bar{f}((v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - a(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)) \\ &= f(v_1, \dots, av_i, \dots, v_n) - af(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) \\ &= 0\end{aligned}$$

したがって、 $\bar{f}(\alpha) = \bar{f}(\beta)$ である。よって、 $\bar{f}$ は $\mathcal{F}(V_1 \times \dots \times V_n)$ から商空間 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ への線形写像 $\tilde{f}$ を誘導する。 $\tilde{f} \circ p = \bar{f}$ である。 $p|_{(V_1 \times \dots \times V_n)} = \varphi$ であるから、 $\tilde{f} \circ \varphi = \tilde{f} \circ p|_{V_1 \times \dots \times V_n} = \bar{f}|_{V_1 \times \dots \times V_n} = f$ である。一意性は $V_1 \times \dots \times V_n$ の元が $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ の形の元の有限個の線形結合であることと、 $\tilde{f} \circ \varphi = f$ であることからわかる。□

補題 2.36 (線形同型写像のテンソル積は線形同型写像). V, V', W, W' を体 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $f: V \rightarrow W$ と $g: V' \rightarrow W'$ を線形写像とする。このとき、 $f \otimes g: V \otimes V' \rightarrow W \otimes W'$ であって、 $f \otimes g(v \otimes v') = f(v) \otimes g(v')$ を満たすような線形写像が一意的に定まる。さらに、 f と g が線形同型写像であるとき、 $f \otimes g$ も線形同型写像である。

証明 $h: V \oplus V' \rightarrow W \otimes W'$ を、 $h(v, v') = f(v) \otimes g(v')$ で定める。 h が双線形であることを示す。任意の $v_1, v_2 \in V$ と任意の $v'_1, v'_2 \in V'$ と任意の $a, b \in \mathbb{K}$ をとる。

$$\begin{aligned}h(av_1 + bv_2, v') &= f(av_1 + bv_2) \otimes g(v') \\ &= (af(v_1) + bf(v_2)) \otimes g(v') \\ &= af(v_1) \otimes g(v') + bf(v_2) \otimes g(v') \\ &= ah(v_1, v') + bh(v_2, v')\end{aligned}$$

である。第2成分についても同様。よって、テンソル積の普遍性より、 $f \otimes g: V \otimes V' \rightarrow W \otimes W'$ が線形写像として一意に定まる。 f と g が線形同型写像であるとする。 $f \otimes g$ の逆写像は $f^{-1} \otimes g^{-1}$ であるから、 $f \otimes g$ は線形同型写像である。□

命題 2.37 (テンソル積と直和). V, W_1, W_2 を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $f : V \times (W_1 \oplus W_2) \rightarrow (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ に対して、 $f(v, w_1, w_2) = (v \otimes w_1, v \otimes w_2)$ で定める写像とする。これは双線形であり、テンソル積の普遍性から得られる線形写像 $\tilde{f} : V \otimes (W_1 \oplus W_2) \rightarrow (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ は線形同型写像である。

証明 双線形であることは簡単。逆写像を定める。 $g_1 : V \times W_1 \rightarrow V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1$ に対して、 $g_1(v, w_1) = v \otimes (w_1, 0)$ で定める写像とする。 $g_2 : V \times W_2 \rightarrow V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ を、任意の $v \in V, w_2 \in W_2$ に対して、 $g_2(v, w_2) = v \otimes (0, w_2)$ で定める写像とする。 g_1 と g_2 は双線形であるから、 $\tilde{g}_1 : V \otimes W_1 \rightarrow V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ と $\tilde{g}_2 : V \otimes W_2 \rightarrow V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ が線形写像として一意的に定まる。ここから、 $\tilde{g} : (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2) \rightarrow V \otimes (W_1 \oplus W_2), \tilde{g}(x, y) = \tilde{g}_1(x) + \tilde{g}_2(y)$ が得られる。 $\tilde{g}$ が逆写像であることを示す。任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ をとる。

$$\begin{aligned} \tilde{g} \circ \tilde{f}(v \otimes (w_1, w_2)) &= \tilde{g}(v \otimes w_1, v \otimes w_2) \\ &= \tilde{g}_1(v \otimes w_1) + \tilde{g}_2(v \otimes w_2) \\ &= v \otimes (w_1, 0) + v \otimes (0, w_2) \\ &= v \otimes (w_1, w_2) \end{aligned}$$

一般の元は $v \otimes (w_1, w_2)$ の形の元の有限個の線形結合であるから、 $\tilde{g} \circ \tilde{f} = id$ である。

$$\tilde{f} \circ \tilde{g}(v \otimes w_1, 0) = \tilde{f}(v \otimes (w_1, 0)) = (v \otimes w_1, 0)$$

$$\tilde{f} \circ \tilde{g}(0, v \otimes w_2) = \tilde{f}(v \otimes (0, w_2)) = (0, v \otimes w_2)$$

一般の元は $(v \otimes w_1, 0)$ や $(0, v \otimes w_2)$ の形の元の有限個の線形結合であるから、 $\tilde{f} \circ \tilde{g} = id$ である。 □

系 2.38 (テンソル積と内部直和). V, W を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 W_1 と W_2 を W の部分空間とする。内部直和として $W = W_1 \oplus W_2$ であるとする。 $f : V \times W \rightarrow (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ に対して、 $f(v, w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2$ で定める写像とする。これは双線形であり、テンソル積の普遍性から得られる線形写像 $\tilde{f} : V \otimes W \rightarrow (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ は線形同型写像である。

証明 内部直和の定義から f が well-defined であることがわかる。内部直和と外部直和の自然な同型を用いて、命題 2.37 を適用すればよい。 $\square$

命題 2.39 (テンソル積の結合律). V_1, V_2, V_3 を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。この時、 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ であり、この間の同型は $(v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$ と $v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3)$ と $v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ をそれぞれ対応させるような同型である。

証明 $f : V_1 \times V_2 \times V_3 \rightarrow (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ を、任意の $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, v_3 \in V_3$ に対して、 $f(v_1, v_2, v_3) = (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$ で定める写像とする。 f は多重線形写像であるから、命題 2.35 より、ある線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \rightarrow (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ があって、 $\tilde{f}(v_1 \otimes v_2 \otimes v_3) = (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$ である。 f が全射であることを示す。任意に、 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ の元 $\sum_{n=1}^N (\sum_{j=1}^M v_{1,n,j} \otimes v_{2,n,j}) \otimes v_{3,n}$ をとる。このとき、

$$\tilde{f}(\sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^M v_{1,n,j} \otimes v_{2,n,j} \otimes v_{3,n}) = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^M ((v_{1,n,j} \otimes v_{2,n,j}) \otimes v_{3,n}) = \sum_{n=1}^N (\sum_{j=1}^M v_{1,n,j} \otimes v_{2,n,j}) \otimes v_{3,n}$$

であるから、 $\tilde{f}$ は全射である。命題 2.41 より、 f の定義域と値域の次元は同じであるから、 $\tilde{f}$ は同型である。同様にして、 $V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ と $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ の間の同型も構成できる。 $\square$

補題 2.40 (一次元とのテンソル積). V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 W を $\mathbb{K}$ 上の一次元ベクトル空間とする。 y を W の零でない元とする。このとき、 $f : V \rightarrow V \otimes W, v \mapsto v \otimes y$ は線形同型写像である。

証明 f が線形であることは簡単。 f の逆写像を定める。 y は W の基底であるから、任意の $w \in W$ は、ある $a_w \in \mathbb{K}$ が一意的に存在して、 $w = a_w y$ である。 $g : V \times W \rightarrow V$ を、

任意の $v \in V, w \in W$ に対して、 $g(v, w) = a_w v$ で定める写像とする。 g は双線形であるから、テンソル積の普遍性より、ある線形写像 $\tilde{g}: V \otimes W \rightarrow V$ があって、 $\tilde{g}(v \otimes w) = g(v, w)$ である。 $\tilde{g}$ が f の逆写像であることを示す。任意の $v \in V, w \in W$ をとる。

$$\tilde{g}(f(v)) = \tilde{g}(v \otimes y) = g(v, y) = v$$

$$f(\tilde{g}(v \otimes w)) = f(g(v, w)) = f(a_w v) = a_w(v \otimes y) = v \otimes (a_w y) = v \otimes w$$

$V \otimes W$ の元は $v \otimes w$ の形の元の有限個の線形結合であるから、 $\tilde{g} \circ f = id$ である。 $\square$

命題 2.41 (テンソル積の基底). $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。それぞれの次元を m_i とし、 V_i の基底を $\{e_{i1}, \dots, e_{im_i}\}$ とする。このとき、 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ の基底は $\{e_{1j_1} \otimes \dots \otimes e_{nj_n} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ である。

証明 $n = 2$ の場合だけ示す。その他の場合は命題 2.39 を使う事で $n = 2$ の場合に帰着できる。 $\alpha_i: V_1 \rightarrow V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,i}$ を、任意の $v_1 \in V_1$ に対して、 $\alpha_i(v_1) = v_1 \otimes e_{2,i}$ で定める写像とする。補題 2.40 より、 α_i は線形同型写像である。 $V_2 = \mathbb{K}e_{2,1} \oplus \dots \oplus \mathbb{K}e_{2,m_2}$ であるから、補題 2.38 より、線形同型 $\tilde{f}: V_1 \otimes V_2 \rightarrow (V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,1}) \oplus \dots \oplus (V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,m_2})$ を得る。このとき、 $\tilde{f}^{-1} \circ (\alpha_1 \oplus \dots \oplus \alpha_{m_2})$ は、 $V_1^{\oplus m_2}$ から $V_1 \otimes V_2$ への線形同型写像であって、 $V_1^{\oplus m_2}$ の基底 $\{(e_{1j}, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, e_{1j}) \mid 1 \leq j \leq m_1\}$ を $V_1 \otimes V_2$ の元の集合 $\{e_{1j} \otimes e_{2i} \mid 1 \leq j \leq m_1, 1 \leq i \leq m_2\}$ に写す。 $\square$

命題 2.42. $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ を、 $V_1 \times \dots \times V_n$ から $\mathbb{K}$ への多重線形写像全体の集合とする。これは自然な演算に対して、 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間になる。

証明 和は、 $f, g \in \text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ に対して、 $(f + g)(v_1, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_n) + g(v_1, \dots, v_n)$ で定める。スカラー倍は、 $a \in \mathbb{K}$ と $f \in \text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ に対して、 $(af)(v_1, \dots, v_n) = af(v_1, \dots, v_n)$ で定める。この演算が $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ をベクトル空間にすることを示す。和が well-defined であることだけ示す。 $f + g$ が多重線形写像であ

ことを示す。任意の $1 \leq i \leq n$ 、 $v_i, v'_i \in V_i$ 、 $a, b \in \mathbb{K}$ をとる。

$$\begin{aligned}
& (f+g)(v_1, \dots, av_i + bv'_i, \dots, v_n) \\
&= f(v_1, \dots, av_i + bv'_i, \dots, v_n) + g(v_1, \dots, av_i + bv'_i, \dots, v_n) \\
&= af(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + bf(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) + ag(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + bg(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) \\
&= a(f+g)(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + b(f+g)(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)
\end{aligned}$$

□

命題 2.43 (テンソル積と多重線形写像の同型). $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ と $\text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ は同型であり、この同型は、 $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ に対して、 $\omega_{v_1, \dots, v_n} : V_1^* \times \dots \times V_n^* \rightarrow \mathbb{K}$ を、任意の $\alpha_1 \in V_1^*, \dots, \alpha_n \in V_n^*$ に対して、 $\omega_{v_1, \dots, v_n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1(v_1) \dots \alpha_n(v_n)$ で定める写像に写すような同型である。

証明 任意に、 $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ をとる。 $\omega_{v_1, \dots, v_n} : V_1^* \times \dots \times V_n^* \rightarrow \mathbb{K}$ を、任意の $\alpha_1 \in V_1^*, \dots, \alpha_n \in V_n^*$ に対して、 $\omega_{v_1, \dots, v_n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1(v_1) \dots \alpha_n(v_n)$ で定める写像とする。 $f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow \text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ を、任意の $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $f(v_1, \dots, v_n) = \omega_{v_1, \dots, v_n}$ で定める写像とする。

f は多重線形写像であることを示す。任意の $1 \leq i \leq n$ 、 $v_i, v'_i \in V_i$ 、 $a, b \in \mathbb{K}$ をとる。

$$\begin{aligned}
& f(v_1, \dots, av_i + bv'_i, \dots, v_n)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\
&= \alpha_1(v_1) \dots \alpha_i(av_i + bv'_i) \dots \alpha_n(v_n) \\
&= a\alpha_1(v_1) \dots \alpha_i(v_i) \dots \alpha_n(v_n) + b\alpha_1(v_1) \dots \alpha_i(v'_i) \dots \alpha_n(v_n) \\
&= af(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + bf(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n)(\alpha_1, \dots, \alpha_n)
\end{aligned}$$

となり、 f は多重線形写像である。よって、命題 2.35 より、ある線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes \dots \otimes V_n \rightarrow \text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ があって、 $\tilde{f}(v_1 \otimes \dots \otimes v_n) = f(v_1, \dots, v_n) = \omega_{v_1, \dots, v_n}$ である。あとは、 $\tilde{f}$ が同型であることを示すだけである。

それぞれの次元を m_i とし、 V_i の基底を $\{e_{i1}, \dots, e_{im_i}\}$ とする。命題 2.41 より、 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ の基底は $\{e_{1j_1} \otimes \dots \otimes e_{nj_n} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ である。よって、 $\{\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \dots \otimes e_{nj_n}) \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ の基底であることを示せばよい。 $\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \dots \otimes e_{nj_n}) = \omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}}$ である。まず、 $\{\omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ を生成することを示す。任意に $\omega \in \text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ をとる。 $i = 1, \dots, n$ について、 V_i の基底 $\{e_{i1}, \dots, e_{im_i}\}$ に

対して、 V_i^* の双対基底を $\{\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{im_i}\}$ とすると、任意の $\alpha_i \in V_i^*$ は

$$\alpha_i = \sum_{j_i=1}^{m_i} \alpha_i(e_{ij_i}) \varepsilon_{ij_i}$$

と書ける。したがって、 ω の多重線形性より

$$\begin{aligned} \omega(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= \omega\left(\sum_{j_1=1}^{m_1} \alpha_1(e_{1j_1}) \varepsilon_{1j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^{m_n} \alpha_n(e_{nj_n}) \varepsilon_{nj_n}\right) \\ &= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} \alpha_1(e_{1j_1}) \cdots \alpha_n(e_{nj_n}) \omega(\varepsilon_{1j_1}, \dots, \varepsilon_{nj_n}) \\ &= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} \omega(\varepsilon_{1j_1}, \dots, \varepsilon_{nj_n}) \omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

である。ゆえに、 ω は $\{\omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ の線形結合として表される。

次に、 $\{\omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が線形独立であることを示す。

$$\sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \dots j_n} \omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$$

であるとする。任意に、 $k_i \in \{1, \dots, m_i\}$ をとる。 $a_{k_1 \dots k_n}$ が 0 であることを示す。

このとき、

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \dots j_n} \omega_{e_{1j_1}, \dots, e_{nj_n}}(\varepsilon_{1, k_1}, \dots, \varepsilon_{n, k_n}) \\ &= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \dots j_n} \varepsilon_{1, k_1}(e_{1j_1}) \cdots \varepsilon_{n, k_n}(e_{nj_n}) \\ &= a_{k_1 \dots k_n} \end{aligned}$$

である。したがって、 $a_{k_1 \dots k_n} = 0$ である。よって、 $\{\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n}) \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\text{Mult}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K})$ の基底である。 $\square$

系 2.44. $V_1, \dots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ は同型である。この同型は、 $\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_n$ に対して、 $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} : V_1 \times \cdots \times V_n \rightarrow \mathbb{K}$ を、任意の $v_1 \in V_1, \dots, v_n \in V_n$ に対して、 $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}(v_1, \dots, v_n) = \alpha_1(v_1) \cdots \alpha_n(v_n)$ で定める写像に写すような同型である。

証明 V_i から $((V_i^*)^*)$ への自然な同型写像を ι_{V_i} とする。これは、 $\iota_{V_i}(v)(\alpha) = \alpha(v)$ で定める写像である。命題 2.43 より、 $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\text{Mult}((V_1^*)^*, \dots, (V_n^*)^*; \mathbb{K})$ は同型である

から、 $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ は同型である。この同型写像は $\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_n$ に対して、まず、 $\text{Mult}((V_1^*)^*, \dots, (V_n^*)^*; \mathbb{K})$ の元 $\omega_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}$ に写し、次に $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; \mathbb{K})$ の元 $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}$ に写すような同型である。 $\square$

2.5 ベクトル束

ここでは位相体上の有限次元線形空間には自然な位相を入れているとする。

定義 2.45. $\mathbb{K}$ を位相体とし、 V を $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間とする。 $(E, X, \pi, V, \text{Aut}(V)\{\psi_\alpha\})$ を、 $\text{Aut}(V)$ を構造群とするファイバー束であるとき、これをベクトル束という。ただし、 $\text{Aut}(V)$ は位相ベクトル空間同型写像全体の集合である。ベクトル束を表すときは、 $(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\})$ のように、構造群を明示的に書かないことにする。また、ベクトル束の次元とは、ファイバーの次元のことをいう。

注意 2.46. V が有限次元の時、命題 2.20 より、 $\text{Aut}(V)$ は V の線形同型写像全体の集合である。

例 2.47. M を n 次元 C^∞ 級多様体とする。このとき、自然な射影 $\pi : TM \rightarrow M$ は自然な極大 $\text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ -Atlas に対して、ベクトル束である。

証明 まず、命題 1.14 より、 $\pi : TM \rightarrow M$ は C^∞ ファイバー束である。局所自明化はチャート $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ に対して、 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ を、 $\psi_\alpha(p, v) = (p, (v^1, \dots, v^n))$ で定める。ただし、 $v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p + \dots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p$ であるとする。このとき、変換関数の各元の行き先は標準基底に対する表現行列がチャートの変換行列になるような線形写像であるから、この全体は $\text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ -Atlas になる。このとき、命題 2.3 より、 π はこの極大 $\text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ -Atlas について $\text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ を構造群に持つ。□

命題 2.48 (各点のファイバーは位相ベクトル空間). $(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\})$ をベクトル束とする。任意の $x \in X$ に対して、 $E_x = \pi^{-1}(x)$ は以下の演算により、体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間である。

- 加法： $u, v \in E_x$ に対して、 $u + v := \psi_\alpha^{-1}(\psi_\alpha(u) + \psi_\alpha(v))$ と定める。
- スカラー倍： $a \in \mathbb{K}$ と $u \in E_x$ に対して、 $au := \psi_\alpha^{-1}(a\psi_\alpha(u))$ と定める。

この定義は α の選び方に依らない。さらにこれは E_x に相対位相を入れると V と自然な位相ベクトル空間同型である。

証明 命題 1.5 の証明より得られる同相 $\psi_\alpha^x : E_x \rightarrow V$ により誘導される位相ベクトル空間構造を E_x に入れることができる。この構造が上に挙げた定義と一致する。この構造が α の選び方に依らないことは、 π が構造群 $\text{Aut}(V)$ をもつので、 $\psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} : V \rightarrow V$ が位相ベクトル空間同型であることからわかる。 E_x と V の位相ベクトル空間同型写像は ψ_α^x である。 $\square$

続いて線形ファイバー束を導入する。これはベクトル束と同じものであるが、同じであると示すまでは区別して呼ぶことにする。

定義 2.49. E, X を位相空間とする。 $\pi : E \rightarrow X$ を連続写像とする。 V を $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間とする。 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\})$ が線形ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- π は全射である。
- 各、 $x \in X$ に対して $E_x := \pi^{-1}(x)$ は、 $+_x$ と $\cdot_x$ を加法とスカラー倍とする位相ベクトル空間である。
- X の開被複 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ と、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times V$ が存在して、 $pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ かつ、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、 $\psi_\alpha^y : E_y \rightarrow V$ は位相ベクトル空間同型である。

注意 2.50. 明らかに線形ファイバー束はファイバー束である。

注意 2.51. $\psi_\alpha^y : E_y \rightarrow V$ が位相ベクトル空間同型であるという条件があるが、大切なのは線形性である。実際、同相であることはその他から従う。

注意 2.52. V 有限次元の場合、 E_x には相対位相とベクトル空間構造から定まる位相が入るが両者は一致する。制限写像 $\psi_\alpha^x : E_x \rightarrow \{x\} \times V$ が E_x にどちらの位相を入れても同相だからである。

命題 2.53. ベクトル束は自然に線形ファイバー束の構造を持つ。

証明 命題 2.48 より、ベクトル束の各点のファイバーには自然な位相ベクトル空間構造が入る。この位相ベクトル空間族に対して線形ファイバー束になる。 $\square$

命題 2.54. 線形ファイバー束は自然にベクトル束の構造を持つ。

証明

$\mathcal{A} := \{(U_{\bar{\alpha}}, \psi_{\bar{\alpha}})_{\bar{\alpha} \in \bar{\Lambda}} : \text{ファイバー束の局所自明化} \mid \forall y \in U_{\bar{\alpha}}, \psi_{\bar{\alpha}}^y : E_y \rightarrow V \text{ は位相ベクトル空間同型}\}$

とする。これが極大 $\text{Aut}(V)$ -Atlas であることを示す。まず、Atlas であることは明らかである。次に、 $\text{Aut}(V)$ -Atlas であることを示す。任意の $\bar{\alpha}, \bar{\beta} \in \bar{\Lambda}$ と、 $y \in U_{\bar{\alpha}} \cap U_{\bar{\beta}}$ をとる。 $\psi_{\bar{\alpha}}^y \circ (\psi_{\bar{\beta}}^y)^{-1} : V \rightarrow V$ は位相ベクトル空間同型であるから、変換関数の y 値 $\varphi_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}(y)$ も線形同型写像である。ゆえに、 $\text{Aut}(V)$ -Atlas である。最後に、 $\mathcal{A}$ が極大 $\text{Aut}(V)$ -Atlas であることを示す。任意に $\mathcal{A}$ を含む $\text{Aut}(V)$ -Atlas $\mathcal{B}$ をとる。 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ であることを示す。任意の $(U_{\beta}, \psi_{\beta}) \in \mathcal{B}$ をとる。任意に、 $y \in U_{\beta}$ をとる。 $y \in U_{\bar{\alpha}}$ となる $\bar{\alpha} \in \bar{\Lambda}$ をとる。 $\mathcal{B}$ は $\text{Aut}(V)$ -Atlas であるから、変換関数の y 値 $\varphi_{\beta\bar{\alpha}}(y)$ は線形同型写像である。

$\psi_{\beta}^y = \varphi_{\beta\bar{\alpha}}(y) \circ \psi_{\bar{\alpha}}^y$ であるから、 ψ_{β}^y も線形同型写像である。したがって、 $(U_{\beta}, \psi_{\beta}) \in \mathcal{A}$ である。□

定理 2.55. 前の2つの命題は互いに逆である。

注意 2.56. この定理は、ベクトル束と線形ファイバー束が同じものであることを意味する。

証明 まず、ベクトル束から線形ファイバー束を入れて、これに対してベクトル束の構造を入れると、もとのベクトル束と同じ構造になることを示す。もともとの極大 $\text{Aut}(V)$ -Atlas を $\mathcal{B}$ とする。変換後の極大 $\text{Aut}(V)$ -Atlas を $\mathcal{A}$ とする。 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ であることは簡単にわかり、極大性から $\mathcal{B} = \mathcal{A}$ である。次に、線形ファイバー束からベクトル束を入れて、これに対して線形ファイバー束の構造を入れると、もとの線形ファイバー束と同じ構造になることを示す。もとの位相ベクトル空間構造を $\{(+_x, \cdot_x)\}$ とする。変換後の位相ベクトル空間構造を $\{(\oplus_x, \odot_x)\}$ とする。もとの条件を満たす局所自明化を $\{(U_{\alpha}, \psi_{\alpha})\}$ とする。任意の $x \in X$ をとる。 $x \in U_{\alpha}$ となる $\alpha \in \Lambda$ をとる。 $\psi_{\alpha}^x : E_x \rightarrow V$ はもとの位相ベクトル空間構造については位相ベクトル空間同型である。また、 $(U_{\alpha}, \psi_{\alpha})$ は線形ファイバー束から得られるベクトル束の極大アトラスの元である。したがって、 $\psi_{\alpha}^x : E_x \rightarrow V$ は変換後の位相ベクトル空間構造についても位相ベクトル空間同型である。よって、もとの位相ベクトル空間構造と変換後の位相ベクトル空間構造は同じである。□

続いて、複数のベクトル束から新しいベクトル束を構成する方法を紹介する。

補題 2.57 (線形同型写像の直和は線形同型写像). V, V', W, W' を体 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。 $f: V \rightarrow W$ と $g: V' \rightarrow W'$ を線形同型写像とする。このとき、 $f \oplus g: V \oplus V' \rightarrow W \oplus W'$ を、 $f \oplus g(v, v') = (f(v), g(v'))$ で定めると、これは線形同型写像である。また、 f, g が位相ベクトル空間の同型写像であるとき、 $f \oplus g$ も位相ベクトル空間の同型写像である。

証明 線形性だけ考える $pr_W \circ (f \oplus g) = f \circ pr_V$ および $pr_{W'} \circ (f \oplus g) = g \circ pr_{V'}$ であるから、直和空間の普遍性より、 $f \oplus g$ は線形写像である。 $\square$

命題 2.58 (ベクトル束の直和). $(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\}), (E', X, \pi', V', \{\psi'_\alpha\})$ をベクトル束とする。 X の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ と変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ と $\{\varphi'_{\alpha\beta}\}$ をとる。(2つのベクトル束で開被覆が違ふときは共通部分全体を新しく開被覆として取り直すことで2つのベクトル束で同じ開被覆を取ることができる。) このとき、各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_{\alpha\beta} \oplus \varphi'_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(V \oplus V')$, $(\varphi_{\alpha\beta} \oplus \varphi'_{\alpha\beta})(z) = \varphi_{\alpha\beta}(z) \oplus \varphi'_{\alpha\beta}(z)$ が定まる。 $F = V \oplus V'$ について、これは変換関数の公理を満たす。さらに、これで得られる局所自明化は $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(V \oplus V')$ -Atlas であるから、命題 2.3 により得られる極大 $\text{Aut}(V \oplus V')$ -Atlas に対して、このファイバー束はベクトル束である。

証明 ベクトル空間の定義から、 F は空でない。任意に $\alpha, \beta \in \Lambda$ と、 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。補題 2.57 より、 $\varphi_{\alpha\beta}(x) \oplus \varphi'_{\alpha\beta}(x)$ は同相写像である。あとは変換関数の公理を満たすことを示す。

$$(\varphi_{\gamma\beta}(x) \oplus \varphi'_{\gamma\beta}(x)) \circ (\varphi_{\beta\alpha}(x) \oplus \varphi'_{\beta\alpha}(x)) = (\varphi_{\gamma\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\alpha}(x)) \oplus (\varphi'_{\gamma\beta}(x) \circ \varphi'_{\beta\alpha}(x)) = \varphi_{\gamma\alpha}(x) \oplus \varphi'_{\gamma\alpha}(x)$$

であり、また、 $(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ から F への写像

$$(z, (v, v')) \mapsto (\varphi_{\alpha\beta}(z)(v), \varphi'_{\alpha\beta}(z)(v'))$$

が連続であることを言う。だがこの写像は

$$(z, (v, v')) \mapsto ((z, v), (z, v')) \mapsto (\varphi_{\alpha\beta}(z)(v), \varphi'_{\alpha\beta}(z)(v'))$$

の合成として表せる。第一の写像 $(z, (v, v')) \mapsto ((z, v), (z, v'))$ は積位相の性質から連続であり、各写像 $(z, v) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(z)(v)$ と $(z, v') \mapsto \varphi'_{\alpha\beta}(z)(v')$ はそれぞれ連続である。したがって合成も連続であり、変換関数の公理を満たす。したがって、定理 1.50 の条件を満たす。

す。このファイバー束は、 $\varphi_{\alpha\beta}(x) \oplus \varphi'_{\alpha\beta}(x)$ が線形同型写像であるから、命題 2.3 により得られる極大 $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(V \oplus V')$ -Atlas に対して、よって、このファイバー束はベクトル束である。 $\square$

約束 2.59. 前命題により構成されるファイバー束の全空間は $E \oplus E'$ と書くことにする。このお気持ちとしては命題 2.48 より、各 $x \in X$ に対して、 $(E \oplus E')_x \cong E_x \oplus E'_x$ であることだと思う。

命題 2.60. 命題 2.58 において $(E, X, \pi, V), (E', X, \pi', V')$ が滑らかなファイバー束でもあるとする。このとき、定理 1.50 のかわりに、定理 1.56 を使うことで、構成されるファイバー束は滑らかなファイバー束になる。

証明 同様である。 $\square$

命題 2.61 (ベクトル束のテンソル積). $(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\}), (E', X, \pi', V', \{\psi'_\alpha\})$ を有限次元ベクトル束とする。 X の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ と変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ と $\{\varphi'_{\alpha\beta}\}$ をとる。(2つのベクトル束で開被覆が違ふときは共通部分全体を新しく開被覆として取り直すことで2つのベクトル束で同じ開被覆を取ることができる。) このとき、各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_{\alpha\beta} \otimes \varphi'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(V \otimes V'), (\varphi_{\alpha\beta} \otimes \varphi'_{\alpha\beta})(z) = \varphi_{\alpha\beta}(z) \otimes \varphi'_{\alpha\beta}(z)$ が定まる。 $F = V \otimes V'$ について、これは変換関数の公理を満たす。さらに、これによって得られる局所自明化は $\text{Aut}(V \oplus V')$ -Atlas であるから、命題 2.3 により得られる極大 $\text{Aut}(V \oplus V')$ -Atlas に対して、このファイバー束はベクトル束である。

注意 2.62. 有限次元ベクトル空間のテンソル積は有限次元なのでこれには自然な位相を入れている。

証明 命題 2.58 の証明を参考にする。まず、 $\varphi_{\alpha\beta}(x) \otimes \varphi'_{\alpha\beta}(x)$ は位相ベクトル空間同型写像であることは、補題 2.36 から直ちにわかる。

$$(\varphi_{\gamma\beta}(x) \otimes \varphi'_{\gamma\beta}(x)) \circ (\varphi_{\beta\alpha}(x) \otimes \varphi'_{\beta\alpha}(x)) = (\varphi_{\gamma\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\alpha}(x)) \otimes (\varphi'_{\gamma\beta}(x) \circ \varphi'_{\beta\alpha}(x))$$

である。また、 $(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ から F への写像

$$(z, w) \mapsto (\varphi_{\alpha\beta}(z) \otimes \varphi'_{\alpha\beta}(z))(w)$$

が連続であることを示す。命題 2.22 より、 $\varphi_{\alpha\beta} \otimes \varphi'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow L(V \otimes V')$ が連続であることを示せば十分である。 $\Phi : L(V) \times L(V') \rightarrow L(V \otimes V'), \Phi(f, g) = f \otimes g$ とする。これは双線形写像であるから、特に、連続である。再度、命題 2.22 より、 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow L(V)$ と $\varphi'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow L(V')$ が連続であることから、 $\Phi \circ (\varphi_{\alpha\beta}, \varphi'_{\alpha\beta})$ も連続である。これは $\varphi_{\alpha\beta} \otimes \varphi'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow L(V \otimes V')$ である。よって、変換関数の公理を満たす。 $\square$

約束 2.63. 前命題により構成されるファイバー束の全空間は $E \otimes E'$ と書くことにする。このお気持ちとしては命題 2.48 より、各 $x \in X$ に対して、 $(E \otimes E')_x \cong E_x \otimes E'_x$ であることだと思う。

命題 2.64. V と V' は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であるとする。命題 2.61 において $(E, X, \pi, V), (E', X, \pi', V')$ が滑らかなファイバー束でもあるとする。このとき、定理 1.50 のかわりに、定理 1.56 を使うことで、構成されるファイバー束は滑らかなファイバー束になる。

証明 同様 $\square$

2.6 構造群続論

この節では、ベクトル束で行ったことを一般の構造群を持つファイバー束に対して行う。

定義 2.65. $(E, X, \pi, F, G, \{\psi_\alpha\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。 $x \in U_\alpha$ とする。 $\Phi_\alpha^x : \text{Homeo}(E_x) \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を $\Phi_\alpha^x(f) = \psi_\alpha^x \circ f \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$ で定める。これは次の命題より well-defined である。また、 $G_\alpha^x := \Phi_\alpha^{x,-1}(G)$ とする。

命題 2.66 (構造群の移動). 前の定義の Φ_α^x は well-defined である。また、 Φ_α^x は群の同型写像である。とくに、 G_α^x は G と同型な $\text{Homeo}(E_x)$ の部分群である。また、 G_α^x は α によらない。

証明 まず、 Φ_α^x が well-defined であることを示す。 ψ_α^x が同相であることを示せばよい。 $x \times F$ に相対位相を入れると ψ_α の E_x における制限は同相で、自然な同相写像 $x \times F \rightarrow F$ も同相であるから、 ψ_α^x は同相である。次に、 Φ_α^x が群の同型写像であることを示す。任意の $f, g \in \text{Homeo}(E_x)$ をとる。

$$\begin{aligned}\Phi_\alpha^x(f \circ g) &= \psi_\alpha^x \circ (f \circ g) \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \\ &= (\psi_\alpha^x \circ f \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) \circ (\psi_\alpha^x \circ g \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) \\ &= \Phi_\alpha^x(f) \circ \Phi_\alpha^x(g)\end{aligned}$$

である。 Φ_α^x は全単射であることも簡単に示せる。 Φ_α^x が群の同型写像であることから、 $G_\alpha^x = \Phi_\alpha^{x,-1}(G)$ は $\text{Homeo}(E_x)$ の部分群である。 $\Phi_\beta^x = \Phi_\alpha^x$ であることも示せる。最後に、 $G_\alpha^x = G_\beta^x$ を示す。任意に、 $f_\beta \in G_\beta^x$ をとる。このとき、 $\Phi_\beta^x(f_\beta) = \psi_\beta^x \circ f_\beta \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \in G$ である。よって、

$$\begin{aligned}\Phi_\alpha^x(f_\beta) &= \psi_\alpha^x \circ f_\beta \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \\ &= (\psi_\alpha^x \circ \psi_{\beta-1}^x) \circ (\psi_\beta^x \circ f_\beta \circ (\psi_\beta^x)^{-1}) \circ (\psi_\beta^x \circ \psi_{\alpha-1}^x) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \Phi_\beta^x(f_\beta) \circ \varphi_{\alpha\beta}(x)^{-1} \\ &\in G\end{aligned}$$

である。よって示された。 □

定義 2.67 (G -ファイバー束). E, X, F を位相空間とする。 $\pi : E \rightarrow X$ を連続全射とする。 G を $\text{Homeo}(F)$ の部分群とする。 このとき、 $(E, X, \pi, F, G, \{G_x\}_{x \in X})$ が G -ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- 任意の $x \in X$ に対して、 G_x は $\text{Homeo}(E_x)$ の部分群である。
- 任意の $x \in X$ に対して、ある局所自明化 (U_α, ψ_α) が存在して、 $x \in U_\alpha$ であり、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、 $\psi_\alpha^y : \pi^{-1}(y) \rightarrow F$ を $\psi_\alpha|_{\pi^{-1}(y)}$ と自然な同型 $y \times F \rightarrow F$ の合成とする。この時、 ψ_α^y が誘導する写像 $\Phi_\alpha^y : \text{Homeo}(E_y) \rightarrow \text{Homeo}(F)$ が G_y を G に写す。

命題 2.68. $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ を G を構造群に持つファイバー束とする。これは自然に G -ファイバー束である。

証明 命題 2.66 により定まる G_α^x は α によらない。これを使って、 $(E, X, \pi, F, G, \{G_\alpha^x\}_{x \in X})$ を考えると、これは G -ファイバー束である。実際、任意の $x \in X$ に対して、極大 G -Atlas の元である局所自明化 (U_β, ψ_β) が存在して、 $x \in U_\beta$ であり、任意の $y \in U_\beta$ に対して、 $\Phi_\beta^y : \text{Homeo}(E_y) \rightarrow \text{Homeo}(F)$ が G_β^y を G に写す。 $G_\beta^y = G_\alpha^y$ であることから、 Φ_β^y が G_α^y を G に写すことも示せる。 $\square$

例 2.69. G -ファイバー束は必ずしも G を構造群に持つファイバー束であるとは限らない。例 1.3 の 2 重被覆を考える。この例において、 $(S^1, S^1, \pi, \{0, 1\}, \{id_{S^1}\}, \{id_{E_x}\}_{x \in X})$ は $\{id_{S^1}\}$ -ファイバー束である。しかし、これは $\{id_{S^1}\}$ を構造群に持つファイバー束ではない。実際、 S^1 は連結であるが、 $S^1 \times \{0, 1\}$ は連結でないので、ファイバー束 $(S^1, S^1, \pi, \{0, 1\})$ は自明なファイバー束ではない。ゆえに、命題 2.10 により、これは $\{id_{S^1}\}$ を構造群に持つファイバー束ではない。

3 主ファイバー束

3.1 評価写像の連続性

定義 3.1. F を位相空間とする。 G を $C(F, F)$ の部分集合とする。 G には位相が入っているとするとする。この位相に関して、以下の条件を考える。任意の位相空間 U と任意の、 $\varphi : U \rightarrow G$ について

(イ) φ は連続である。

(ロ) $\text{ev} \circ (\varphi \times \text{id}_F) : U \times F \rightarrow F, (f, u) \mapsto \varphi(u)(f)$ は連続である。

G の位相で、(イ) $\Rightarrow$ (ロ) が成り立つものの全体を $T_{(\text{イ})\Rightarrow(\text{ロ})}(G)$ と書き、(イ) $\Leftarrow$ (ロ) が成り立つものの全体を $T_{(\text{イ})\Leftarrow(\text{ロ})}(G)$ と書く。(イ) $\Leftrightarrow$ (ロ) が成り立つものの全体を $T_{(\text{イ})\Leftrightarrow(\text{ロ})}(G)$ と書く。

例 3.2. V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 $\text{Aut}(V)$ は $\text{Homeo}(V)$ の部分群である。 $\text{Aut}(V)$ には自然な位相が入っている。この位相は命題 2.22 から $T_{(\text{イ})\Leftrightarrow(\text{ロ})}(\text{Aut}(V))$ の元である。

命題 3.3. F を位相空間とする。 G を $C(F, F)$ の部分集合とする。 G には位相が入っているとするとする。以下は同値である。

(1) G の位相は $T_{(\text{イ})\Rightarrow(\text{ロ})}(G)$ の元

(2) $\text{ev} : G \times F \rightarrow F$ は連続である。

証明 まず、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。 $\varphi : G \rightarrow G$ を恒等写像とする。 φ は連続である。(1) から、 $\text{ev} \circ (\varphi \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ は連続である。これは ev と同一であるから、(2) が成り立つ。次に、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。任意の位相空間 U と任意の、 $\varphi : U \rightarrow G$ について φ は連続であるとする。(2) から、 $\text{ev} \circ (\varphi \times \text{id}_F) : U \times F \rightarrow F$ は連続である。□

命題 3.4. F を位相空間とする。 G を $C(F, F)$ の部分集合とする。 $|T_{(\text{イ})\Leftrightarrow(\text{ロ})}(G)| \leq 1$ である。さらに、 $T_{(\text{イ})\Leftrightarrow(\text{ロ})}(G)$ の元は存在すれば、 $\text{ev} : G \times F \rightarrow F$ を連続にする最小の位相である。

証明 $T_{(\mathcal{I})\Leftrightarrow(\square)}(G)$ の元が $\text{ev} : G \times F \rightarrow F$ を連続にすることはすでに示した。次に、任意に、 $\mathcal{O} \in T_{(\mathcal{I})\Leftrightarrow(\square)}(G)$ をとる。これが $\text{ev} : G \times F \rightarrow F$ を連続にする最小の位相であることを示す。 $\mathcal{O}'$ を $\text{ev} : G \times F \rightarrow F$ を連続にする位相とする。 $\text{id}_G : (G, \mathcal{O}') \rightarrow (G, \mathcal{O})$ が連続であることを示す。 $\text{ev} : (G, \mathcal{O}') \times F \rightarrow F$ は連続である。これは $\text{ev} \circ (\text{id}_G \times \text{id}_F) : (G, \mathcal{O}') \times F \rightarrow F$ と同一である。 $\mathcal{O} \in T_{(\mathcal{I})\Rightarrow(\square)}(G)$ であるから、 $\text{id}_G : (G, \mathcal{O}') \rightarrow (G, \mathcal{O})$ は連続である。 $\square$

3.2 標構束

主ファイバー束の例である標構束まず考える。これはその補題である。

補題 3.5 (局所的に位相構造が入るとき全体に位相構造を入れられる). X を集合、 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の被覆とする。各、 U_α に位相構造が入っているとする。さらに、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $U_\alpha \cap U_\beta$ は U_α の開集合であり、 U_β の開集合であることを仮定する。 $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の相対位相と U_β の相対位相が等しいものであるとする。このとき、 X にある位相が一意的に存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 U_α の位相は X の開部分空間になるようにできる。

証明 X 上の位相 $\mathcal{O}$ として

$$\mathcal{O} = \{V \subset X \mid \forall \alpha \in \Lambda, V \cap U_\alpha \text{ は } U_\alpha \text{ の開集合}\}$$

と置く。これが位相であることは簡単に示せる。

さらに、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 U_α の位相は X の開部分空間になることを示す。任意の $\alpha \in \Lambda$ をとる。任意の $V \subset U_\alpha$ をとる。 V が U_α の開集合であるとする。任意の $\beta \in \Lambda$ をとる。 $V \cap U_\beta$ は U_β の開集合であることを示す。 $V \cap U_\beta = V \cap (U_\alpha \cap U_\beta)$ は $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の相対位相において開集合であり、ことから、 $V \cap U_\beta$ は $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_β の相対位相において開集合である。ゆえに、ある U_β の開集合 W が存在して、 $V \cap U_\beta = W \cap (U_\alpha \cap U_\beta)$ である。 $(U_\alpha \cap U_\beta)$ が U_β の開集合であるから $V \cap U_\beta$ は U_β の開集合である。したがって、 V は X の開集合である。よって、 V は U_α に X からの相対位相を入れたときの開集合である。

逆に、 V が U_α に X からの相対位相を入れたときの開集合であるとする。 $V = W \cap U_\alpha$ であるような X の開集合 W が存在する。 $\mathcal{O}$ の定義から、 $W \cap U_\alpha$ は U_α の開集合である。以上より、 U_α の位相は X の部分空間になる。

U_α が X の開集合であることを示す。任意の $\beta \in \Lambda$ をとる。 $V = U_\alpha \cap U_\beta$ は U_β の開集合であるから、 U_α は X の開集合である。

一意性は基本近傍系として同じものが取れることから従う。

□

補題 3.6. X を集合、 Y_α を位相空間とする。 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の被覆とする。各、 α に対して、 $f_\alpha : U_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ を全単射とする。また、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 $f_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ は Y_α の開集合であるとする。さらに、 $f_\beta \circ f_\alpha^{-1}$ は $f_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ から $f_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ への同相写像であるとする。このとき、 X にある位相が一意的に存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 U_α は開集合で、 f_α が部分空間からの同相写像になるようにできる。

標構束 (frame bundle) を定義する。これは、ベクトル束の各ファイバー E_x の基底の集合を集めたものである。しかし、そのまま基底を集めてくるとめんどくさいので工夫する。 V には基底が定まっていることにする。このとき、各点の E_x の基底は、 V の基底を E_x に移す線形同型写像と同一視できる。これを用いて、標構束を定義する。

命題 3.7 (標構束). $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ をベクトル束とする。

$x \in X$ とする。 P_x を V から E_x へ線形同型写像全体の集合とする。 $P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。 $\varpi : P \rightarrow X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、 $\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。ここで、 $\psi_\alpha^y : E_y \rightarrow V$ を $\psi_\alpha|_{E_y}$ と自然な同型 $\{y\} \times V \rightarrow V$ の合成とし、 $\tilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \text{Aut}(V)$ を

$$\tilde{\psi}_\alpha(y, p) = (y, \psi_\alpha^y \circ p)$$

で定める写像とする。このとき、 $\tilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、このとき、 $\varpi : P \rightarrow X$ が $\tilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相がただ1つ存在する。

証明 ϖ が全射であることは簡単。まず、 $\tilde{\psi}_\alpha$ が *well-defined* であることを示す。任意に、 $\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。任意に、 $(y, p) \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。このとき、 $p \in P_y$ であるから、 $p : V \rightarrow E_y$ は線形同型写像である。よって、 $\psi_\alpha^y \circ p$ は *well-defined* な線形同型写像である。 $\tilde{\psi}_\alpha$ が全単射であることを示す。逆写像を構成する。 $\bar{\psi}_\alpha : U_\alpha \times \text{Aut}(V) \rightarrow \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を

$$\bar{\psi}_\alpha(y, g) = (y, (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ g)$$

で定める写像とする。 $\bar{\psi}_\alpha$ は *well-defined* であることは ψ_α^y が線形同型写像であることから従う。 $\bar{\psi}_\alpha$ は $\tilde{\psi}_\alpha$ の逆写像であることは簡単。この全単射が補題 3.6 の条件を満たすこと

を示す。任意に、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。

$$\tilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)) = \tilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta \times \text{Aut}(V)$$

は $U_\alpha \times \text{Aut}(V)$ の開集合である。また、

$$\tilde{\psi}_\beta \circ \tilde{\psi}_\alpha^{-1} : U_\alpha \cap U_\beta \times \text{Aut}(V) \rightarrow U_\alpha \cap U_\beta \times \text{Aut}(V)$$

は、 $(y, g) \mapsto (y, \psi_\beta^y \circ (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ g)$ で定まる写像である。 α, β の変換関数について $\varphi_{\beta\alpha}(y) = \psi_\beta^y \circ (\psi_\alpha^y)^{-1}$ である。このとき、 $U_\alpha \cap U_\beta \times V \rightarrow V, (y, v) \mapsto \varphi_{\beta\alpha}(y)(v)$ は連続である。ゆえに、例 3.2 から $U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Aut}(V), y \mapsto \varphi_{\beta\alpha}(y)$ は連続である。ゆえに、

$$(U_\alpha \cap U_\beta) \times \text{Aut}(V) \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times \text{Aut}(V) \times \text{Aut}(V) \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times \text{Aut}(V)$$

を $(y, g) \mapsto (y, \varphi_{\beta\alpha}(y), g) \mapsto (y, \varphi_{\beta\alpha}(y) \circ g)$ と定めると、連続写像の合成である。よって、 $\tilde{\psi}_\beta \circ \tilde{\psi}_\alpha^{-1}$ は連続である。逆写像の連続性も同様に示せる。以上より、補題 3.6 の条件を満たす。よって、位相を定めることができる。 ϖ が連続であることを示す。補題 3.6 から $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda\}$ は P の開被覆である。また、各、 $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ 上で ϖ は同相写像と第一射影の合成であるから、 ϖ は局所的に連続である。したがって、 ϖ は連続である。よって、 $\varpi : P \rightarrow X$ が $\tilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相が存在する。一意性は補題 3.6 から従う。 $\square$

定義 3.8. 先の命題で得られるファイバー束 $(P, X, \varpi, \text{Aut}(V))$ をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の標構束という。

前のベクトル空間に対する標構束を一般化する。

命題 3.9 (一般の標構束). $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。 $x \in X$ とする。

$$P_x := \{f : F \rightarrow E_x \mid \forall \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in G\}$$

とする。 G には位相が入っていて位相群になるとする。さらに、 G の位相は $T_{(\mathcal{I}) \leftarrow (\square)}(G)$ の元であるとする。 $P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。 $\varpi : P \rightarrow X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、 $\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。ここで、 $\psi_\alpha^y : E_y \rightarrow F$ を $\psi_\alpha|_{E_y}$ と自然な同型 $\{y\} \times F \rightarrow F$ の合成とし、 $\tilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G$ を

$$\tilde{\psi}_\alpha(y, p) = (y, \psi_\alpha^y \circ p)$$

で定める写像とする。このとき、 $\tilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、このとき、 $\varpi : P \rightarrow X$ が $\tilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相がただ1つ存在する。

注意 3.10. 特にベクトル束の時、 P_x は F から E_x への線形同型写像全体の集合である。

証明 まず、

$$\begin{aligned} P_x &= \{f : F \rightarrow E_x \mid \exists \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in G\} \\ &= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ g \mid g \in G, \exists \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha\} \end{aligned}$$

であることは任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、 $\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \in G$ であることから従う。あとは前命題 3.7 と同様に示せる。

□

定義 3.11. 先の命題で得られるファイバー束 (P, X, ϖ, G) を $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の標構束という。

3.3 主ファイバー束

定義 3.12. G を位相群とする。 (P, X, ϖ, G) がファイバー束であるとする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ が G を構造群とする主ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- (1) $\cdot : P \times G \rightarrow P$ が連続で、 P に対して右からの作用である。すなわち、 $(p \cdot g_1) \cdot g_2 = p \cdot (g_1 g_2)$ かつ、 $p \cdot e = p$ が成り立つ。
- (2) $\varpi(p \cdot g) = \varpi(p)$ ($p \in P, g \in G$) が成り立つ。
- (3) X の開被覆 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ と、各、 $\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G$ が存在して、 $pr_1(\psi_\alpha(u)) = \varpi(u)$ かつ、 $\psi_\alpha(u \cdot g) = \psi_\alpha(u) \cdot g$ が成り立つ。(ただし、 $pr_1 : U_\alpha \times G \rightarrow U_\alpha$ は第一射影である。) ここで、 $\psi_\alpha(u) \cdot g$ は、 $(x, g') \cdot g := (x, g'g)$ で定める。

$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を単に、主 G -束ともいう。(3) の条件を満たす局所自明化を主ファイバー束構造に適合する局所自明化という。 P, X が滑らかな多様体で、 G が lie 群で、 ϖ が滑らかで、 $\cdot$ が滑らかで、主ファイバー束構造に適合する局所自明化が微分同相写像であるとき、 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を滑らかな主ファイバー束という。

定義 3.13. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束とする。 $(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta)$ を主ファイバー束構造に適合する局所自明化とする。ここで、 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ が (U_α, ψ_α) と (U_β, ψ_β) の主ファイバー束の変換関数であるとは

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(x, g) = (x, \varphi_{\beta\alpha}(x)g)$$

が成り立つことをいう。

命題 3.14. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束とする。 $(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta)$ を主ファイバー束構造に適合する局所自明化とする。このとき、主ファイバー束の変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ はただ1つ存在し、連続である。さらにこれは

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) := (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)$$

で定まる。ここで、 e は G の単位元である。

証明 Step 1. $\varphi_{\beta\alpha}$ の存在性

$\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ を

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) = (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)$$

と定める。これは、

$$\begin{aligned}\varphi_{\beta\alpha}(x)g &= (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)g \\ &= pr_2(\psi_\alpha((\psi_\alpha^{-1}(x, e))))g \\ &= pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x, e)g))) \\ &= pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x, g))))\end{aligned}$$

である。よって、 $(\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1})(x, g) = (x, \varphi_{\beta\alpha}(x)g)$ である。

Step 2. $\varphi_{\beta\alpha}$ の一意性

任意に、変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ をとる。 $\varphi_{\beta\alpha}(x) = pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x, e))))$ である。

Step 3. $\varphi_{\beta\alpha}$ の連続性

一意性のところの式の $\varphi_{\beta\alpha}(x) = pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x, e))))$ からわかる。

Step 4. 最後の等式

存在性の証明からわかる。 □

注意 3.15. ここでの構造群と、定義 2.4 での構造群の関係は後で述べる。

命題 3.16. $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ をベクトル束とする。この標構束 $(P, X, \varpi, \text{Aut}(V))$ は自然な作用に対して $\text{Aut}(V)$ を構造群とする主ファイバー束である。

証明 $\text{Aut}(V)$ による P への右からの作用は $(y, p) \in P$ と $g \in \text{Aut}(V)$ に対して、 $(y, p) \cdot g = (y, p \circ g)$ で定める。これが作用であることは明らか。この連続性を示す。 $P \times \text{Aut}(V)$ の開被覆 $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \text{Aut}(V) \mid \alpha \in \Lambda\}$ を考える。各、 $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \text{Aut}(V)$ 上で連続であることを示す。この部分集合の相対位相は $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の相対位相と $\text{Aut}(V)$ の位相の積位相である。この写像は

$$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \text{Aut}(V) \rightarrow U_\alpha \times \text{Aut}(V) \times \text{Aut}(V) \rightarrow U_\alpha \times \text{Aut}(V) \rightarrow \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow P$$

$((y, p), g) \mapsto (y, \psi_\alpha^y \circ p, g) \mapsto (y, \psi_\alpha^y \circ p \circ g) \mapsto (y, (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ \psi_\alpha^y \circ p \circ g) \mapsto (y, p \circ g)$ で定まる。各、写像は連続であることが示せる。よって、 $P \times \text{Aut}(V) \rightarrow P, ((y, p), g) \mapsto (y, p) \cdot g$ は連続である。また、各、 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\tilde{\psi}_\alpha$ に対して、任意に、 $(y, p) \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ と $g \in \text{Aut}(V)$ をとる。

$$\tilde{\psi}_\alpha((y, p) \cdot g) = \tilde{\psi}_\alpha(y, p \circ g) = (y, \psi_\alpha^y \circ p \circ g) = (y, \psi_\alpha^y \circ p) \cdot g = \tilde{\psi}_\alpha(y, p) \cdot g$$

である。 □

ここまでで、構造群という言葉が二つ出てきた。一つは、2章で定義した構造群であり、もう一つは、主ファイバー束での構造群である。ここでは2章で定義した構造群から主ファイバー束を構成することができることを示す。逆は後に回す。

命題 3.17. $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。 G には位相が入っていて位相群になるとする。また、評価写像 $\text{ev} : G \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。このとき、標構束 (P, X, ϖ, G) は自然な作用に対して G を構造群とする主ファイバー束である。

証明 同様である。一応、作用は $\cdot : P \times G \rightarrow P, (x, p) \cdot g = (x, p \circ g)$ で定める。 □

命題 3.18. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。 $P_x := \varpi^{-1}(x)$ について次が成り立つ。

- (1) $\cdot$ の制限 $P_x \times G \rightarrow P_x$ は *well-defined* である。つまり、 P_x は G の右からの作用を受ける。
- (2) $\varpi(p_1) = \varpi(p_2)$ ならば、 $p_1 = p_2 \cdot g$ なる $g \in G$ が一意に存在する。つまり、 P_x の作用は単純推移的である。

証明 (1) は $\varpi(p \cdot g) = \varpi(p)$ ($p \in P, g \in G$) から従う。次に、(2) を示す。任意に、 $p_1, p_2 \in P$ で $\varpi(p_1) = \varpi(p_2)$ を満たすものをとる。 $\alpha \in \Lambda$ を $p_1, p_2 \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を満たすようにとる。

$\psi_\alpha(p_1) = (\varpi(p_1), g_1)$ と $\psi_\alpha(p_2) = (\varpi(p_2), g_2)$ とする。よって、

$$\begin{aligned} p_1 &= \psi_\alpha^{-1}(\psi_\alpha(p_1)) = \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_1), g_1) = \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_2), g_2 \circ g_2^{-1} \circ g_1) \\ &= \psi_\alpha^{-1}((\varpi(p_2), g_2) \cdot (g_2^{-1} \circ g_1)) \\ &= \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_2), g_2) \cdot (g_2^{-1} \circ g_1) \\ &= p_2 \cdot (g_2^{-1} \circ g_1) \end{aligned}$$

である。 □

命題 3.19 (位相群同型による主ファイバー束の構造群の変換). $(P, X, \varpi, G_1, \cdot)$ を G_1 を構造群とする主ファイバー束とする。 G_2 を位相群とする。 $f : G_2 \rightarrow G_1$ を連続群同型とする。このとき、 $\cdot' : P \times G_2 \rightarrow P, (p, g) \mapsto p \cdot f(g)$ で定める作用に対して、 $(P, X, \varpi, G_2, \cdot')$ は G_2 を構造群とする主ファイバー束である。

証明 $\cdot'$ が作用であることは、 f が群同型であることから従う。 $\cdot'$ の連続性は、 $\cdot' = \cdot \circ (id_P \times f)$ であることから従う。主ファイバー束構造に適合する局所自明化は、 (U_α, ψ_α) をそのまま使える。 □

3.4 商 Lie 群

定義 3.20. G は滑らかな多様体かつ、群であるとする。 G が Lie 群であるとは、 G の積と逆元をとる操作が滑らかな写像であることをいう。ただし、積の定義域には積多様体構造を入れる。

例 3.21. V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 $\text{Aut}(V)$ は演算を合成とすると Lie 群である。(多様体構造は $\text{End}(V)$ からの開部分多様体空間を入れる。)

定義 3.22. G を Lie 群とする。 H を G の部分群とする。 H が正則部分 Lie 群であるとは、 H が G の正則部分多様体であることをいう。

命題 3.23. G を Lie 群とする。 H を G の正則部分 Lie 群とする。 H は自然に Lie 群になる。

証明 H と H の直積多様体が G と G の直積多様体の正則部分多様体であることと、正則部分多様体において制限写像が滑らかさを保つことと、終域の拡張が滑らかさを保つことを使う。 □

次の2つを認める。

定理 3.24. G を Lie 群とする。 H を G の閉部分群とする。この時、 H は正則部分 Lie 群である。

定理 3.25. G を Lie 群とする。 H を G の閉部分群とする。 G/H を G の右剰余類全体の集合とする。この時、商位相空間 G/H にはある滑らかな多様体構造が一意的に存在して、 $\varpi: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ が滑らかな沈めこみになる。

定理 3.26. G を Lie 群とする。 H を G の閉部分群とする。この時、 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ は H を構造群とする滑らかな主ファイバー束である。ただし、 $\cdot: G \times H \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$ は右からの作用である。

証明 Step 1. 局所切断の構成

G の次元を n 、 G/H の次元を m とする。任意に、 $x \in G/H$ をとる。 $x = \varpi(g)$ なる $g \in G$ が存在する。 ϖ は沈めこみであるので、 g の開近傍 U と x の開近傍 V が存在して、 $(U, \varphi_g), (V, \varphi_x)$ がチャートであり、 $\varpi(U) \subset V$ かつ、

$$\varphi_x \circ \varpi \circ \varphi_g^{-1}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_m)$$

である。このとき、十分小さい $\epsilon > 0$ が存在して、 $\varphi_g(g)$ 中心の半径 ϵ の開立方体 $C_\epsilon(\varphi_g(g))$ が $C_\epsilon(\varphi_g(g)) \subset \varphi_x(V)$ を満たす。このとき、 $V' := \varpi(\varphi_g^{-1}(C_\epsilon(\varphi_g(g))))$ は x の開近傍である。実際、 $\varphi_x(V')$ は開立方体より V' は G/H の開集合であるからである。 $i; \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ を定める。ここで、 $s_x: V' \rightarrow G$ を

$$s_x = \varphi_g^{-1} \circ i \circ \varphi_x|_{V'}$$

とすると、 s_x は滑らかで、 $\varpi \circ s_x = id_{V'}$ である。

Step 2. 局所自明化の構成

任意に、 $x \in G/H$ をとる。前のステップより、 x の開近傍 V' と滑らかな写像 $s_x: V' \rightarrow G$ が存在して、 $\varpi \circ s_x = id_{V'}$ である。 $\psi_x: \varpi^{-1}(V') \rightarrow V' \times H$ を

$$g' \mapsto (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1}g')$$

で定める。これが well-defined な微分同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、 $g' \in \varpi^{-1}(V')$ をとる。

$$g'H = \varpi(g') = \varpi(s_x(\varpi(g'))) = s_x(\varpi(g'))H$$

より、ある $h \in H$ が存在して、 $g' = s_x(\varpi(g'))h$ である。したがって、 $s_x(\varpi(g'))^{-1}g' = h \in H$ である。よって、 ψ_x は well-defined である。 G がリー群であることと、 ϖ, s_x が滑らかであることから、 ψ_x は滑らかである。 ψ_x の逆写像を構成する。 $\psi': V' \times H \rightarrow \varpi^{-1}(V'), (x', h) \mapsto s_x(x')h$ で定める。

$$\varpi(s_x(x')h) = \varpi(s_x(x')) = x'$$

であるので、 ψ' は well-defined である。また、 ψ' は滑らかである。 ψ_x と ψ' が互いに逆写像であることは簡単に分かる。

Step 3. $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ は主ファイバー束である

作用が滑らかであることは、 G が Lie 群であることから従う。前のステップにおける局所自明化 ψ_x が主ファイバー構造に適合することを示す。任意に、 $g' \in \varpi^{-1}(V'), h \in H$ をとる。

$$\begin{aligned}\psi_x(g' \cdot h) &= \psi_x(g'h) \\ &= (\varpi(g'h), s_x(\varpi(g'h))^{-1}g'h) \\ &= (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1}g'h) \\ &= (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1}g') \cdot h \\ &= \psi_x(g') \cdot h\end{aligned}$$

であるので、 ψ_x は主ファイバー構造に適合する。 □

例 3.27 (円周のファイバー束). Lie 群 $\mathbb{R}$ の閉部分群 $\mathbb{Z}$ を考える。このとき、 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \varpi, \mathbb{Z}, \cdot)$ は $\mathbb{Z}$ を構造群とする滑らかな主ファイバー束である。このとき、 $\cdot$ は $\mathbb{R}$ の加法の制限である。

命題 3.28. $\mathrm{SO}(\mathbb{R}^2) = \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{R}) \mid \det(A) = 1, A^\top A = I\}$ は $\mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) = \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{C}) \mid \det(A) = 1, A^\dagger A = I\}$ の閉部分集合である。

証明 $\mathrm{M}(2, \mathbb{R})$ が $\mathrm{M}(2, \mathbb{C})$ の閉部分集合であることから従う。 □

例 3.29. $G = \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) := \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{C}) \mid \det(A) = 1, A^\dagger A = I\}$ とする。 $H = \mathrm{SO}(\mathbb{R}^2) := \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{R}) \mid \det(A) = 1, A^\top A = I\}$ とする。このとき、主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ を Hopf ファイバー束と呼ぶ。

定義 3.30. X を位相空間とする。 X が局所弧状連結であるとはある開基 $\mathcal{B}$ が存在して、任意の $U \in \mathcal{B}$ が弧状連結であることをいう。

補題 3.31. 次が成り立つ。

- (1) $\mathbb{R}$ は局所弧状連結である。
- (2) $\mathbb{Q}$ は局所弧状連結でない。
- (3) X が局所弧状連結であるとき、任意の開部分集合 $U \subset X$ は局所弧状連結である。
- (4) X は空でない位相空間で、 Y を位相空間とする。 $X \times Y$ が局所弧状連結であるとき、 Y は局所弧状連結である。

証明 (1) は开区間が弧状連結であることから従う。(2) は $\mathbb{R}$ 上の空でない弧状連結な開集合は区間であることから従う。(3) を示す。任意に、 $u \in U$ をとる。 U が開集合で、 X が局所弧状連結であることから、ある X の弧状連結な開集合 V_u が存在して、 $u \in V_u \subset U$ である。 V_u は U の開集合でもあるので、 $\{V_u \mid u \in U\}$ は U の弧状連結な元からなる開基である。(4) を示す。任意に、 $y \in Y$ をとる。任意に、 y の開近傍 V をとる。 X が空でないことから、ある $x \in X$ がをとる。 $X \times Y$ が局所弧状連結であることから、 (x, y) の弧状連結な開近傍 $W \subset X \times V$ が存在する。このとき、射影 $pr_2: X \times Y \rightarrow Y$ は連続開写像であるので、 $pr_2(W)$ は y の弧状連結な開近傍である。 $pr_2(W) \subset V$ である。よって、 Y は局所弧状連結である。□

命題 3.32. $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Q}, \varpi, \mathbb{Q})$ はファイバー束でない。

証明 ファイバー束であると仮定する。この時、ある $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ の空でない開集合 U が存在して、 $\varpi^{-1}(U)$ と $U \times \mathbb{Q}$ が同相である。 $\varpi^{-1}(U)$ は $\mathbb{R}$ の開集合であるので、局所弧状連結であるから、 $U \times \mathbb{Q}$ は局所弧状連結である。このとき、 $\mathbb{Q}$ が局所弧状連結になり、矛盾である。□

補題 3.33. $X_i (i \in I)$ を位相群とする。 $Y_i (i \in I)$ をその部分位相群とする。この時、位相群同型

$$\left(\prod_{i \in I} X_i \right) / \left(\prod_{i \in I} Y_i \right) \cong \prod_{i \in I} (X_i / Y_i)$$

が存在して、 $[(x_i)_{i \in I}] \mapsto [(x_i)_{i \in I}]$ で与えられる。

証明 $q_i : X_i \rightarrow X_i/Y_i$ を標準射影とする。 $Q := \prod_{i \in I} q_i : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} (X_i/Y_i), (x_i)_{i \in I} \mapsto (q_i(x_i))_{i \in I}$ とする。 q_i が連続全射開写像であることから、 Q も連続全射開写像である。 Q の核は $\prod_{i \in I} Y_i$ である。よって、 Q は $(\prod_{i \in I} X_i)/(\prod_{i \in I} Y_i) \cong \prod_{i \in I} (X_i/Y_i)$ を誘導する。これは $[(x_i)_{i \in I}] \mapsto ([x_i]_{i \in I})$ で与えられる。□

命題 3.34. $G := (S^1)^\mathbb{N}$ に積位相と直積群を入れる。その部分集合 $H := \{-1, 1\}^\mathbb{N}$ は閉部分群である。しかし、 $(G, G/H, \varpi, H)$ はファイバー束でない。

証明 まず、 H が部分群であることは簡単。 H が閉集合であることは $\{-1, 1\}$ が S^1 の閉集合であることから従う。 $(G, G/H, \varpi, H)$ がファイバー束であると仮定する。この時、ある G/H の空でない開集合 U が存在して、 $\varpi^{-1}(U)$ と $U \times H$ が同相である。特に、 H は空でないので、ある連続写像 $s : U \rightarrow G$ が存在して、 $\varpi \circ s = id_U$ である。ここで、 G/H の位相は $S^1/\{-1, 1\}$ の積位相であり、 $(G/H$ と $S^1/\{-1, 1\}$ の直積を同一視した。) 開基として、

$$\left\{ \prod_{n \in \mathbb{N}} U_n \mid U_n \subset S^1/\{-1, 1\} \text{ は開集合で、} U_n \neq S^1/\{-1, 1\} \text{ なる } n \text{ が有限個しかない} \right\}$$

を持つので、必要ならば、 U を十分小さくすることにより

$$U = \prod_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

ただし、 $U_n \subset S^1/\{-1, 1\}$ は開集合で、 $U_n \neq S^1/\{-1, 1\}$ なる n が有限個しかないようにできる。ここで、 $i \in \mathbb{N}$ を $U_i = S^1/\{-1, 1\}$ となるものとしてとる。また、 U は空集合ではないので、各、 U_n から元 a_n をとる。ここで、 $j : S^1/\{-1, 1\} \rightarrow U, x \mapsto (a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots)$ と定める。これは $U_i = S^1/\{-1, 1\}$ であることから well-defined である。また、 $S^1/\{-1, 1\}$ の積位相の普遍性から j は連続である。ここで、 $p_i : (S^1)^\mathbb{N} \rightarrow S^1$ を i 番目の射影とする。 $pr_i : G/H \rightarrow S^1/\{-1, 1\}$ を i 番目の射影とする。 $(G/H$ と $S^1/\{-1, 1\}$ の直積を同一視した。) $q : S^1 \rightarrow S^1/\{-1, 1\}$ を標準射影とする。このとき、 p_i は連続で、 $q \circ p_i = pr_i \circ \varpi$ である。 $t := p_i \circ s \circ j : S^1/\{-1, 1\} \rightarrow S^1$ とすると、これは連続である。

$$q \circ t = q \circ p_i \circ s \circ j = pr_i \circ \varpi \circ s \circ j = pr_i \circ j = id_{S^1/\{-1, 1\}}$$

であり、 t は q の連続な右逆写像である。しかし、 q は連続な右逆写像を持たないので、矛盾である。□

3.5 主ファイバー束と構造群の同型

定義 3.35 (主ファイバー束の同型). $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ と $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ を主ファイバー束とする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ と $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ が同型であるとは、同相写像 $f: P \rightarrow P'$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。

- (1) $\varpi' \circ f = \varpi$ が成り立つ。
- (2) $f(p \cdot g) = f(p) \cdot' g (p \in P, g \in G)$ が成り立つ。

注意 3.36. 同型写像の逆写像も同型写像である。

例 3.37. *Hopf* ファイバー束 $(\mathrm{SU}(\mathbb{C}^2), \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2)/\mathrm{SO}(\mathbb{R}^2), \varpi, \mathrm{SO}(\mathbb{R}^2), \cdot)$ と $(S^3, \mathbb{C}P^1, \varpi', S^1, \cdot')$ は同型である。ただし、 $\varpi': S^3 \rightarrow \mathbb{C}P^1$ は、 S^3 の各点 $(z_1, z_2) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$ を、 $\mathbb{C}P^1$ の点 $[z_1 : z_2]$ に写す写像である。また、 $\cdot': S^3 \times S^1 \rightarrow S^3$ は、 $(z_1, z_2) \cdot' e^{i\theta} = (z_1 e^{i\theta}, z_2 e^{i\theta})$ で定める。同型写像 $f: \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) \rightarrow S^3$ は、 $A \in \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2)$ を、 A の第一列ベクトル $(z_1, z_2)^T$ に写す写像である。

定義 3.38 (構造群付きファイバー束の同型). $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ を構造群付きのファイバー束とする。 $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ が (構造群 G 付きの) 同型であるとは、ファイバー束の同型写像 $f: E \rightarrow E'$ が存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、ある $\alpha' \in \Lambda'$ が存在して、 $U_\alpha = U'_{\alpha'}$ を満たし、

$$\psi'_{\alpha'} \circ f \circ \psi_\alpha^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。

注意 3.39. 自明ではないが、構造群付きのファイバー束の同型写像の逆写像も構造群付きのファイバー束の同型写像である。これはアトラスの極大性からわかる。

注意 3.40. $\mathcal{A}$ を $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の部分集合で、 G -アトラスであるとする。このとき、任意に、 $\alpha \in \Lambda$ をとる代わりに、 $\mathcal{A}$ の任意の要素 (U, ψ) をとってもよい。

注意 3.41. ファイバー束としては同型であっても、構造群付きのファイバー束としては同型でない場合がある。例 3.42 を参照。

例 3.42. 例 2.7 の構造群付きのファイバー束 $(X \times \mathbb{R}, X, \pi, \mathbb{R}, \mathrm{GL}(\mathbb{R}), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(X \times \mathbb{R}, X, \pi, \mathbb{R}, \mathrm{GL}(\mathbb{R}), \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ について、 $X \times \mathbb{R}$ の恒等写像はファイバー束としては同型であるが、構造群付きのファイバー束としては同型ではない。

3.6 同伴したファイバー束

主ファイバー束から構造群付きのファイバー束を作る。

命題 3.43. $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を作用とする。 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ は連続写像とする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。 F が空集合であるとき、 X は空集合であるとする。 e を G の単位元とする。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。 $\tilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(G)$ を変換関数とする。 $P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p, f) \sim (p', f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。 $P \times_G F := (P \times F) / \sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \rightarrow X, [p, f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、 $(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(\text{pr}_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(F)$ は

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) = \sigma(\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))$$

である。特に、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ は $\sigma(G)$ -Atlas であり、これを極大化して得られる $\sigma(G)$ -Atlas を $\mathcal{A}$ とする。よって、 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ は構造群付きのファイバー束である。

注意 3.44. G の位相が評価写像が連続性を検出する位相であるとし、 σ が連続であるとする。と $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ は連続写像である。

証明 Step 1. $\sim$ が同値関係である

反射律を示す。任意に、 $(p, f) \in P \times F$ をとる。 $p = p \cdot e$ であり、 $f = \sigma(e^{-1})(f)$ であるので、 $(p, f) \sim (p, f)$ である。

対称律を示す。任意に、 $(p, f), (p', f') \in P \times F$ をとる。 $(p, f) \sim (p', f')$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p' = p \cdot g$ かつ $f' = \sigma(g^{-1})(f)$ である。したがって、 $p = p' \cdot g^{-1}$

かつ

$$f = \sigma(e)(f) = \sigma((g^{-1})^{-1}g^{-1})(f) = \sigma((g^{-1})^{-1})(\sigma(g^{-1})(f)) = \sigma((g^{-1})^{-1})(f')$$

である。よって、 $(p', f') \sim (p, f)$ である。

推移律を示す。任意に、 $(p, f), (p', f'), (p'', f'') \in P \times F$ をとる。 $(p, f) \sim (p', f')$ かつ $(p', f') \sim (p'', f'')$ とする。このとき、ある $g_1, g_2 \in G$ が存在して、 $p' = p \cdot g_1$, $f' = \sigma(g_1^{-1})(f)$, $p'' = p' \cdot g_2$, $f'' = \sigma(g_2^{-1})(f')$ である。したがって、 $p'' = p \cdot g_1 \cdot g_2$ かつ

$$f'' = \sigma(g_2^{-1})(\sigma(g_1^{-1})(f)) = (\sigma(g_2^{-1}) \circ \sigma(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_2^{-1})(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_1 g_2)^{-1})(f)$$

である。よって、 $(p, f) \sim (p'', f'')$ である。

Step 2. π が well-defined な全射連続写像である

任意に、 $(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。 $[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。したがって、命題 3.18 から、 $\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。よって、 π は well-defined である。 π が全射であることは、 ϖ が全射であることと、 F が空集合であるとき、 X は空集合であることから直ちにわかる。 π は連続写像 $\varpi \circ pr_1$ に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。

Step 3. $(P \times_G F, X, \pi, F)$ の具体的な局所自明化の設定

$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。これが well-defined な同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、 $(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。 $[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。 $\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。また、

$$\sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_2)))(f_2) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1 \cdot g)))(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1))g)(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1)))(f_1)$$

よって、 ψ_α は well-defined である。次に、 ψ_α が連続であることを示す。 ψ_α は

$$(\varpi \circ pr_1, \text{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ ((pr_2 \circ \tilde{\psi}_\alpha) \times id_F)) : \pi^{-1}(U_\alpha) \times F \rightarrow U_\alpha \times F$$

に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。 ψ_α の逆写像を構成する。

$\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha), (x, f) \mapsto [\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]$ で定める。これが well-defined な連続写像

であることを示す。任意に、 $(x, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\pi([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]) = \varpi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)) = x \in U_\alpha$$

であるから、 ψ'_α は well-defined である。 $P \times F$ から $P \times_G F$ への商写像を q とする。

$$\psi'_\alpha = q \circ (\tilde{\psi}_\alpha^{-1} \times id_F) \circ ((id_{U_\alpha}, cst_e) \times id_F)$$

であるから、連続である。 ψ_α と ψ'_α が互いに逆写像であることは簡単に分かる。よって、 ψ_α は局所自明化であり、 $(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束である。

Step 4. 変換関数の計算

任意に、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。前のステップで構成した局所自明化 ψ_α, ψ_β に対して変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を計算する。任意に、 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned} \varphi_{\beta\alpha}(x)(f) &= pr_2(\psi_\beta(\psi_\alpha^{-1}(x, f))) \\ &= pr_2(\psi_\beta([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\ &= pr_2(\varpi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\beta(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f)) \\ &= \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\beta(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f) \\ &= \sigma(\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))(f) \end{aligned}$$

である。よって、 $\varphi_{\beta\alpha}(x) = \sigma(\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))$ である。

□

定義 3.45. 前命題で得られるファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ を主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ に同伴したファイバー束という。

例 3.46. 3.27 で定まる主ファイバー束 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \varpi, \mathbb{Z}, \cdot)$ と、 $F = [-a, a]$ について作用 $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \text{Homeo}(F), n \mapsto (x \mapsto (-1)^n x)$ について、同伴したファイバー束 $(\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} F, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \pi, F, \mathcal{A})$ を考える。 $\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} F$ はメビウスの輪に同相である。

3.7 同相群の部分群としての位相群

命題 3.47. G を位相群とする。 $g \in G$ に対して、 $L_g : G \rightarrow G, f \mapsto gf$ を定める。
 $L : G \rightarrow \text{Homeo}(G), g \mapsto L_g$ は *well-defined* な単射な群準同型である。

証明 まず、 L が *well-defined* であることを示す。任意に、 $g \in G$ をとる。 L_g が同相写像であることを示す。 $m : G \times G \rightarrow G, (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ を積の写像とする。これは連続である。 $L_g = m \circ (cst_g, id_G)$ であるので、 L_g は連続である。 $L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$ であるので、 L_g は同相写像である。 L が群準同型であることを示す。任意に、 $g_1, g_2 \in G$ と $f \in G$ をとる。

$$L_{g_1 g_2}(f) = g_1 g_2 f = L_{g_1}(L_{g_2}(f))$$

であるので、 $L_{g_1 g_2} = L_{g_1} \circ L_{g_2}$ である。最後に、 L が単射であることを示す。 L_g が恒等写像であるとする。このとき、 $e = L_g(e) = ge = g$ であるので、 $g = e$ である。 $\square$

補題 3.48. G_1, G_2 を群とする。 G_1 は位相群とする。 $f : G_1 \rightarrow G_2$ が群同型かつ同相とする。このとき、 G_2 は位相群であり、 f は位相群同型である。

命題 3.49. G を位相群とする。 $L : G \rightarrow \text{Homeo}(G), g \mapsto L_g$ と $H := L(G)$ の位相について以下は同値である。また、いずれか1つ、すなわちすべてを満たす位相が一意的に存在する。

- (1) H は位相群であり、 $L : G \rightarrow H$ が位相群同型
- (2) H は位相群であり、 $ev_e : H \rightarrow G, h \mapsto h(e)$ が位相群同型
- (3) 任意の $g \in G$ に対して、 $ev_g : H \rightarrow G, h \mapsto h(g)$ が同相
- (4) H の位相は評価写像が連続性を検出する位相

証明 あああ

Step 1. ev_e が $L : G \rightarrow H$ の逆写像である

任意に、 $g \in G$ をとる。 $ev_e(L(g)) = L(g)(e) = ge = g$ であるので、 $ev_e \circ L = id_G$ である。次に、任意に、 $h \in H$ をとる。ある $g \in G$ が存在して、 $h = L(g)$ である。任意に、 $g' \in G$ をとる。 $L(ev_e(h))(g') = L(ev_e(L(g)))(g') = L(L(g)(e))(g') = L(g)(g') = h(g')$ であるので、 $L \circ ev_e = id_H$ である。よって、 ev_e は L の逆写像である。

Step 2. (1) $\iff$ (2) $\iff$ (3)

(1) $\iff$ (2) はステップ 1 から直ちに従う。(3) $\Rightarrow$ (2) を示す。 ev_e の同相性は、(3) の $g = e$ の場合である。群準同型であることは群同型 $L : G \rightarrow H$ の逆写像であることから従う。ゆえに、 H は位相群であり、 $\text{ev}_e : H \rightarrow G, h \mapsto h(e)$ が位相群同型 (2) $\Rightarrow$ (3) を示す。任意に、 $g \in G$ をとる。任意に、 $h \in H$ をとる。ある $g' \in G$ が存在して、 $h = L(g')$ である。 $R_g : G \rightarrow G, f \mapsto fg$ を右移動とする。

$$\text{ev}_g(h) = h(g) = L(g')(g) = g'g = R_g(g') = R_g(L(g')(e)) = R_g(h(e)) = (R_g \circ \text{ev}_e)(h)$$

である。 R_g は同相であるから ev_g は同相

Step 3. ((1) $\wedge$ (2)) $\Rightarrow$ (4)

任意に、位相空間 X と写像 $f : X \rightarrow H$ をとる。 $m : G \times G \rightarrow G, (g_1, g_2) \mapsto g_1g_2$ を積の写像とする。

$$\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G) = m \circ ((\text{ev}_e \circ f) \times \text{id}_G)$$

である。実際、 $x \in X$ と $g \in G$ をとる。また、ある $g' \in G$ が存在して、 $f(x) = L(g')$ であり、

$$\begin{aligned} \text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)(x, g) &= \text{ev}(f(x), g) = \text{ev}(L(g'), g) = L(g')(g) = g'g = m(g', g) \\ &= m(\text{ev}_e(L(g')), g) \\ &= m(\text{ev}_e(f(x)), g) \\ &= m \circ ((\text{ev}_e \circ f) \times \text{id}_G)(x, g) \end{aligned}$$

である。よって、 f が連続ならば、(2) より、 $\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)$ は連続である。逆に、 $\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)$ が連続であるとする。

$$f = L \circ (\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)) \circ (\text{id}_X, \text{cst}_e)$$

である。実際、 $x \in X$ をとる。また、ある $g' \in G$ が存在して、 $f(x) = L(g')$ である。

$$L \circ (\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)) \circ (\text{id}_X, \text{cst}_e)(x) = L(\text{ev} \circ (f \times \text{id}_G)(x, e)) = L(\text{ev}(f(x), e)) = L(\text{ev}(L(g'), e)) = L(g') = f(x)$$

である。(1) より、 f は連続である。

Step 4. (4) $\Rightarrow$ (2)

$id_H : H \rightarrow H$ は連続である。(4) より、 $ev = ev \circ (id_H \times id_G)$ は連続である。ゆえに、 $ev_e = ev \circ (id_H \times cst_e)$ は連続である。また、 G の積写像 m について、

$$ev \circ (L \times id_G) = m$$

は連続である。(4) より、 L は連続である。 ev_e は L の逆写像であるので、 ev_e は同相である。 ev_e が群同型であることは L が群同型であることから従う。

Step 5. 位相の存在と一意性

(1) から直ちにわかる。

□

3.8 主ファイバー束と構造群

ここで扱いたいのは、2章で定義した構造群付きのファイバー束 $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の同型類と主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ の同型類の間に 1 対 1 対応があることを示すことである。ただし、さらに少し一般化した状況で示す。この節は次の定理のための節である。証明は長いので、いくつかの命題に分けて行うことにする。

定理 3.50. X, F を位相空間とする。 F は空でないとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。 $\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。さらに、 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ が連続であるとする。このとき、次の集合？

$\{X \text{ を底空間, } F \text{ をファイバー, } \sigma(G) \text{ を構造群とするファイバー束}\} / \text{構造群付きの同型}$
と

$\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束}\} / \text{主ファイバー束の同型}$

の間に 1 対 1 対応がある。さらにこの対応は次の対応から誘導される。 $(E, X, \pi, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。この標構束から $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ に対して命題 3.19 を用いて、得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ である。また、逆の対応は同伴したファイバー束をとる操作である。

注意 3.51. $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ が連続という条件は $\sigma(G)$ の位相が評価写像に関する指数法則を満たすなら、 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : \sigma(G) \times F \rightarrow F$ が連続というのを代わりに課しておけばいい。

この定理の証明に移る前に、ここから直ちにわかることを述べる。

系 3.52. X, F を位相空間とする。 F は空でないとする。 G を $\text{Homeo}(F)$ の部分群とする。 G に位相が入っていて位相群になるとする。 評価写像 $G \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。 このとき、次の集合？

$\{X$ を底空間, F をファイバー, G を構造群とするファイバー束 $\}$ / 構造群付きの同型と

$\{X$ を底空間とする G を構造群とする主ファイバー束 $\}$ / 主ファイバー束の同型

の間に 1 対 1 対応がある。 さらにこの対応は命題 3.17 の対応から誘導される。 逆の対応は同伴したファイバー束をとる操作から誘導される。

証明 簡単

□

系 3.53. 任意の主ファイバー束は、ある構造群付きのファイバー束の標構束に命題 3.19 を適用することで得られる主ファイバー束と同型である。

証明 命題 3.49 からわかる。

□

では、定理の証明に移る。

構造群付きのファイバー束から主ファイバー束を作って、主ファイバー束から同伴したファイバー束を作ると、元の構造群付きのファイバー束と同伴したファイバー束は同型であることを示す。

命題 3.54. X, F を位相空間とする。 F は空でないとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。 $\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ は連続であるとする。 $(E, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。 このとき、命題 3.17 から得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ に対して、同型写像 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ を用いて命題 3.19 を適用することで得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ に対して、その同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ は、元のファイバー束 $(E, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}\})$ と構造群付きの同型である。

証明 $\Phi : P \times F \rightarrow E, ((x, p), f) \mapsto p(f)$ で定める写像を考える。この定義域を商空間 $P \times_G F$ にしたものを $\bar{\Phi} : P \times_G F \rightarrow E$ とする。これが同型写像であることを示す。

Step 1. $\bar{\Phi}$ が well-defined である

任意に、 $[(x, p_1), f_1] = [(x, p_2), f_2] \in P \times_G F$ をとる。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $(x, p_2) = (x, p_1) \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。このとき、 $(x, p_2) = (x, p_1 \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$p_2(f_2) = (p_1 \circ \sigma(g))(\sigma(g^{-1})(f_1)) = (p_1 \circ \sigma(g) \circ \sigma(g^{-1}))(f_1) = p_1(f_1)$$

である。よって、 $\bar{\Phi}$ は well-defined である。

Step 2. $\bar{\Phi}$ は全射である

任意に、 $e \in E$ をとる。 $\pi(e) \in X$ であり、 $\pi(e) \in U_\alpha$ となる $\alpha \in \Lambda$ が存在する。 $e \in E_{\pi(e)}$ であるので、 $f = (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}(e)$ はうまく定まる。このとき、 $[(\pi(e), (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}), f] \in P \times_G F$ であり、 $\bar{\Phi}([(\pi(e), (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}), f]) = e$ である。よって、 $\bar{\Phi}$ は全射である。

Step 3. $\bar{\Phi}$ は単射である

$\bar{\Phi}([(x, p_1), f_1]) = \bar{\Phi}([(y, p_2), f_2])$ とする。このとき、 $p_1(f_1) = p_2(f_2)$ である。

$$x = \pi(p_1(f_1)) = \pi(p_2(f_2)) = y$$

であり、 $\varpi((x, p_1)) = \varpi((y, p_2))$ より、命題 3.18 から、ある $g \in G$ が存在して、 $(y, p_2) = (x, p_1) \cdot g$ である。このとき、 $(y, p_2) = (x, p_1 \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$p_2(f_2) = p_1(f_1) = (p_2 \circ \sigma(g^{-1}))(f_1) = p_2(\sigma(g^{-1})(f_1))$$

であり、 p_2 は単射であるので、 $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。よって、 $[(x, p_1), f_1] = [(y, p_2), f_2]$ である。

Step 4. $\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ である

任意に、 $[(x, p), f] \in P \times_G F$ をとる。

$$\pi_2([(x, p), f]) = \varpi((x, p)) = x = \pi_1(p(f)) = \pi_1([(x, p), f])$$

であるので、 $\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ である。

Step 5. $\bar{\Phi}$ の局所的構造

任意に、 $x \in X$ をとる。このとき、ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、 $x \in U_\alpha$ である。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi_2^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ に対して、対応する標構束の局所自明化を $\tilde{\psi}_\alpha : \pi_1^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ とする。これは主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ に適合する局所自明化であり、また、主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ に適合する局所自明化でもある。さらにこれに対応する同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ の局所自明化を $\psi_{2,\alpha} : \pi_2^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ とする。 $\bar{\Phi}$ は全単射で、 $\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ なので、

$$\bar{\Phi}(\pi_2^{-1}(U_\alpha)) = \pi_2^{-1}(U_\alpha)$$

である。ゆえに、 $\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1} : U_\alpha \times F \rightarrow U_\alpha \times F$ は well-defined である。 $e \in G$ を単位元とする。

$$\begin{aligned} (\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1})(y, f) &= \psi_\alpha(\bar{\Phi}([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(y, e), f])) \\ &= \psi_\alpha(\bar{\Phi}([(y, (\psi_\alpha^y)^{-1}), f])) \\ &= \psi_\alpha((\psi_\alpha^y)^{-1}(f)) \\ &= \psi_\alpha(\psi_\alpha^{-1}(y, f)) \\ &= (y, f) \end{aligned}$$

であるので、 $\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$ である。

Step 6. $\bar{\Phi}$ は構造群付きの同型写像である

前のステップから、 $\bar{\Phi}$ は局所的に同相であることがわかる。ゆえに全単射 $\bar{\Phi}$ は同相である。これが構造群付きの同型写像であることは、前のステップからわかる。 $\square$

逆に、主ファイバー束から同伴したファイバー束を作って、同伴したファイバー束から主ファイバー束を作ると、元の主ファイバー束と同伴したファイバー束は同型であることを示す。

命題 3.55. X, F を位相空間とする。 F は空でないとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。 $\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ は連続であるとする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。このとき、同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ に対して、命題 3.17 から得られる主ファイバー束 $(P', X, \varpi', \sigma(G), \cdot)$ に対して、同型写像 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ を用いて命題 3.19 を適用することで得られる主ファイバー束 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ は、元の主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ と主ファイバー束の同型である。

証明 $\Psi : P \rightarrow P'$ を $p \in P, f \in F$ に対して、 $\Psi(p) : F \rightarrow \pi^{-1}(\varpi(p)), f \mapsto [p, f]$ で定める。これが同型写像であることを示す。

Step 1. Ψ が well-defined である

$\Psi(p) : F \rightarrow \pi^{-1}(\varpi(p))$ であることは、 $\pi([p, f]) = \varpi(p)$ であることから直ちにわかる。 $\Psi(p) \in P'_{\varpi(p)}$ であることを示す。 $p \in P$ をとる。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ に適合する局所自明化の組とする。

ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、 $\varpi(p) \in U_\alpha$ である。 $\Psi(p) = (\psi_\alpha^{\varpi(p)})^{-1} \circ (\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p))$ であるから、 $\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p) \in \sigma(G)$ であることを示せばよい。任意に、 $f \in F$ をとる。

$$(\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p))(f) = \psi_\alpha^{\varpi(p)}([p, f]) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f)$$

であるので、 $\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p) \in \sigma(G)$ である。よって、 Ψ が well-defined であることがわかる。

Step 2. Ψ の逆写像

局所的な写像の張り合わせとして逆写像を構成する。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を開被覆と主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ に適合する局所自明化の組とする。任意に、 $\alpha \in \Lambda$ をとる。 ψ_α を $\tilde{\psi}_\alpha$ に対応する同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ の局所自明化とする。また、 $\tilde{\psi}'_\alpha$ を ψ_α に対応する主ファイバー束 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ に適合する局所自明化の組とする。 $\text{inv} : G \rightarrow G, g \mapsto g^{-1}$ として、 $\Psi'_\alpha : (\varpi')^{-1}(U_\alpha) \rightarrow \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を、

$$\Psi'_\alpha = \tilde{\psi}_\alpha^{-1} \circ (id_{U_\alpha} \times \text{inv}) \circ \tilde{\psi}'_\alpha$$

で定める。これが連続であることは明らかである。これが張り合わさって、 $\Psi' : P' \rightarrow P$ が well-defined であることを示す。

□

命題 3.56. $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$ 、 $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。このとき、 $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$ と $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ が主ファイバー束の同型であるとする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を作用とする。 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ は連続写像とする。同伴したファイバー束 $(P_1 \times_G F, X, \pi_1, F, \sigma(G), \mathcal{A}_1)$ と $(P_2 \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A}_2)$ は構造群付きの同型である。

証明 $\Psi : P_1 \rightarrow P_2$ を主ファイバー束の同型とする。 $\Phi : P_1 \times_G F \rightarrow P_2 \times_G F$ を

$$\Phi([(x, p), f]) = [\Psi((x, p)), f]$$

で定める。これが構造群付きの同型であることを示す。

Step 1. Φ が well-defined である

任意に、 $[(x, p), f] = [(x, p'), f'] \in P_1 \times_G F$ をとる。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $(x, p') = (x, p) \cdot_1 g$ かつ $f' = \sigma(g^{-1})(f)$ である。このとき、 $(x, p') = (x, p \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$\begin{aligned} [\Psi((x, p')), f'] &= [\Psi((x, p) \cdot_1 g), f'] \\ &= [\Psi((x, p)) \cdot_2 g, \sigma(g^{-1})(f)] \\ &= [\Phi((x, p)), f] \end{aligned}$$

である。

Step 2. Φ は同相

まず、 Φ が連続であることは、 Ψ が連続であることから直ちにわかる。 Φ の逆写像は

$$\Phi^{-1}([(x, p), f]) = [\Psi^{-1}((x, p)), f]$$

で定まる写像であり、これも連続であることから、 Φ は同相である。

Step 3. Φ は構造群付きの同型である

$$\pi_2 \circ \Phi([(x, p), f]) = \pi_2([\Psi((x, p)), f]) = \varpi_2(\Psi((x, p))) = \varpi_1((x, p)) = \pi_1([(x, p), f])$$

であるので、 Φ はファイバー束の同型である。これが構造群付きの同型であることを示す。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を主ファイバー束 $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$ に適合する局所自明化の組とする。

Ψ は主ファイバー束の同型であるので、 $\{(\Psi(\varpi_1^{-1}(U_\alpha)), \tilde{\psi}_\alpha \circ \Psi|_{\varpi_1^{-1}(U_\alpha)})\}_{\alpha \in \Lambda}$ は主ファイバー束 $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ に適合する局所自明化の組である。ここで、 $\psi_{\alpha,1}$ を $\tilde{\psi}_\alpha$ に対応する同伴したファイバー束 $(P_1 \times_G F, X, \pi_1, F, \sigma(G), \mathcal{A}_1)$ の局所自明化、 $\psi_{\alpha,2}$ を $\tilde{\psi}_\alpha \circ \Psi|_{\varpi_1^{-1}(U_\alpha)}$ に対応する同伴したファイバー束 $(P_2 \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A}_2)$ の局所自明化とする。このとき、 $\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,1})\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}_1$ であり、 $\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,2})\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}_2$ である。また、 $\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,1})\}_{\alpha \in \Lambda}$ は極大性を仮定しない G -アトラスである。 $\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1} : U_\alpha \times F \rightarrow U_\alpha \times F$ は任意の $(x, f) \in U_\alpha \times F$ に対して、

$$\begin{aligned} (\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1})(x, f) &= \psi_{\alpha,2}(\Phi(\psi_{\alpha,1}^{-1}(x, f))) \\ &= \psi_{\alpha,2}(\Phi([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\ &= \psi_{\alpha,2}([\Psi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), f]) \\ &= (\varpi(\Psi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))), \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha \circ \Psi^{-1}(\Psi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))) (f)) \\ &= (x, f) \end{aligned}$$

であるので、 $\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$ である。よって、 Φ は構造群付きの同型である。 $\square$

命題 3.57. X, F を位相空間とする。 F は空でないとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を自由な作用とする。 $\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \rightarrow F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。 $(E_1, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ 、 $(E_2, X, \pi_2, F, \sigma(G), \{(U_{2,\alpha}, \psi_{2,\alpha})\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。このとき、 $(E_1, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ と $(E_2, X, \pi_2, F, \sigma(G), \{(U_{2,\alpha}, \psi_{2,\alpha})\})$ が構造群付きの同型であるならば、この標構束をそれぞれ $(P_1, X, \varpi_1, \sigma(G), \cdot_1)$ 、 $(P_2, X, \varpi_2, \sigma(G), \cdot_2)$ としたとき、これらは主ファイバー束の同型である。とくに、 $\sigma : G \rightarrow \sigma(G)$ が連続なら命題 3.19 を適用することで得られる主ファイバー束 $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot'_1)$ 、 $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot'_2)$ は主ファイバー束の同型である。

証明 $\Phi : E_1 \rightarrow E_2$ を構造群付きの同型とする。 $\Psi : P_1 \rightarrow P_2$ を

$$\Psi((x, p)) = (x, \Phi \circ p)$$

で定める。これが主ファイバー束の同型であることを示す。

Step 1. Ψ が well-defined な全単射

任意に、 $(x, p) \in P_1$ をとる。 $(x, \Phi \circ p) \in P_2$ であることを示す。 $p = (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ g$ となる $g \in G$ と $(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}_1$ が存在する。 Φ は構造群付きの同型なので、ある $(U_\alpha, \psi_{2,\alpha}) \in \mathcal{A}_2$ が存在して、

$$\psi_{2,\alpha} \circ \Phi \circ (\psi_\alpha)^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。このとき、

$$(\psi_{2,\alpha}^x)^{-1} = \Phi \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$$

であるから、 $\Phi \circ p = (\psi_{2,\alpha}^x)^{-1} \circ g$ である。 Ψ の逆写像は

$$\Psi^{-1}((x, p)) = (x, \Phi^{-1} \circ p)$$

で定まる。これが well-defined であることは同様である。

Step 2. Ψ は主ファイバー束の同型である

任意に、 $x \in X$ をとる。 $\Phi : E_1 \rightarrow E_2$ が構造群付きの同型なので、ある $(U_\alpha, \psi_{1,\alpha}) \in \mathcal{A}_1$ 、 $(U_\alpha, \psi_{2,\alpha}) \in \mathcal{A}_2$ が存在して、 $x \in U_\alpha$ であり、

$$\psi_{2,\alpha} \circ \Phi \circ \psi_{1,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。 $\psi_{1,\alpha}$ に対応する局所自明化を $\tilde{\psi}_{1,\alpha}$ 、 $\psi_{2,\alpha}$ に対応する局所自明化を $\tilde{\psi}_{2,\alpha}$ とする。このとき、

$$\tilde{\psi}_{2,\alpha} \circ \Psi \circ \tilde{\psi}_{1,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times G}$$

である。ここで、 $\tilde{\psi}_{1,\alpha}$ と $\tilde{\psi}_{2,\alpha}$ は同相なので、 Ψ は局所的に同相である。よって、 Ψ は同相である。

$$\varpi_2 \circ \Psi = \varpi_1$$

は明らかである。最後に、任意に、 $(x, p) \in P_1$ 、 $g \in G$ をとる。

$$\Psi((x, p) \cdot_1 g) = \Psi((x, p \circ g)) = (x, \Phi \circ p \circ g) = (x, \Phi \circ p) \cdot_2 g = \Psi((x, p)) \cdot_2 g$$

である。 □

4 作用と変換関数を構造に入れる

4.1 構造群付きファイバー束 (作用付き)

定義 4.1. $\sigma : G \rightarrow \mathfrak{S}_F$ を作用とする。これが連続であるとは、 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ が連続であることをいう。また、 σ が滑らかであるとは、 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ が滑らかであることをいう。

注意 4.2. 連続な作用 σ の像は $\text{Homeo}(F)$ の部分群であるから、 σ を $\text{Homeo}(F)$ への写像とみなす。滑らかな作用 σ の像は $\text{Diffeo}(F)$ の部分群であるから、 σ を $\text{Diffeo}(F)$ への写像とみなす。

定義 4.3. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 G を位相群、 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ と $\psi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \rightarrow U_\beta \times F$ をとる。連続写像 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ が σ 変換関数であるとは $(\sigma \circ \varphi_{\alpha\beta})(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1}(x \in U_\alpha \cap U_\beta)$ が成り立つことをいう。

開被覆と局所自明化の族 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ が σ アトラスであるとは、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 σ 変換関数が存在することをいう。

σ アトラスが極大であるとはそれを真に含む σ アトラスが存在しないことをいう。

$\mathcal{A}$ を極大 σ アトラスとする。 $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) という。

命題 4.4 (極大 σ アトラスの存在). $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を σ アトラスとする。このとき、ある極大 σ アトラス $\mathcal{A}$ が一意的に存在して、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}$ を満たす。

証明 $\mathcal{A}$ を任意の $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の局所自明化との間に、 σ 変換関数が存在する局所自明化の族とする。これが条件を満たすことを示す。 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}$ であることは、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ が σ アトラスであることから明らか。 $\mathcal{A}$ が σ アトラスであることは、任意の $(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ に対して、 σ 変換関数が存在することを示せばよい。任意に、 $y \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。 $y \in U_\gamma$ なる $\gamma \in \Lambda$ が存在する。このとき、 σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\gamma} : U_\alpha \cap U_\gamma \rightarrow G$ と $\varphi_{\beta\gamma} : U_\beta \cap U_\gamma \rightarrow G$ が存在する。ここで、 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ を

$$\varphi_{\alpha\beta}(y) = \varphi_{\alpha\gamma}(y) \cdot (\varphi_{\beta\gamma}(y))^{-1}$$

で定める。このとき、

$$(\sigma \circ \varphi_{\alpha\beta})(y) = (\sigma \circ \varphi_{\alpha\gamma})(y) \circ (\sigma \circ \varphi_{\beta\gamma})(y)^{-1} = \psi_\alpha^y \circ (\psi_\gamma^y)^{-1} \circ (\psi_\gamma^y) \circ (\psi_\beta^y)^{-1} = \psi_\alpha^y \circ (\psi_\beta^y)^{-1}$$

である。よって、 $\mathcal{A}$ が σ アトラスであることがわかる。極大であることと、一意であることは簡単。 $\square$

命題 4.5. $(E, X, \pi, F, G, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束とする。 G に位相が入っていて位相群になるとする。さらに、 G の位相は $T_{(\iota) \leftarrow (\rho)}(G)$ の元であるとする。(3.1 参照) このとき、 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を包含写像とすると、 $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 (作用付き) である。

証明 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : G \times F \rightarrow F$ が連続であることは、これが射影であることから明らか。 σ 変換関数は G 変換関数である。ただし、 σ 変換関数が連続であることを示すために、 G の位相が $T_{(\iota) \leftarrow (\rho)}(G)$ の元であることを使う。 $\square$

命題 4.6. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。 G は $\text{Homeo}(F)$ の部分群であり、 σ は包含写像であるとする。このとき、 $(E, X, \pi, F, G, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束である。

命題 4.7. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ は単射とする。 $x \in X$ とする。

$$\begin{aligned} P_x &:= \{f : F \rightarrow E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\} \\ &= \{f : F \rightarrow E_x \mid \exists (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \wedge \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\} \\ &= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\} \end{aligned}$$

とする。 $P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。 $\varpi : P \rightarrow X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、 $(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}$ と $x \in U_\alpha$ をとる。 $\tilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G$ を

$$\tilde{\psi}_\alpha(x, p) = (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p))$$

で定める写像とする。このとき、 $\tilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、 $\cdot : P \times G \rightarrow P, ((x, p), g) \mapsto p \cdot g := (x, p \circ \sigma(g))$ で定める右作用を入れると、 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束にするような位相が一意的に存在する。

証明 Step 1. P_x の定義の等式

$$\begin{aligned} &\{f : F \rightarrow E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\} \\ &\subset \{f : F \rightarrow E_x \mid \exists (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \wedge \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\} \\ &= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\} \end{aligned}$$

であることは $\mathcal{A}$ がアトラスであることから明らか。

$$\begin{aligned} &\{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\} \\ &\subset \{f : F \rightarrow E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\} \end{aligned}$$

であることを示す。任意に、 $(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G$ をとる。任意に、 $(U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ で $x \in U_\beta$ を満たすものをとる。 σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ が存在する。この時、

$$\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) = (\sigma \circ \varphi_{\beta\alpha})(x) \circ \sigma(g) = \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x)g) \in \sigma(G)$$

である。よって示された。

Step 2. $\tilde{\psi}_\alpha$ の well-defined 性と逆写像

$\tilde{\psi}_\alpha$ が well-defined であることは、 ϖ と P_x の定義から明らか。 $\tilde{\psi}_\alpha$ の逆写像は

$$\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, g) = (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(g))$$

で定まる well-defined な写像である。この逆写像が well-defined であることは、 P_x の3つの式からわかる。

Step 3. $(\tilde{\psi}_\beta \circ (\tilde{\psi}_\alpha)^{-1})(x, g) = (x, \varphi_{\alpha, \beta}(x)g)$

この式の $\varphi_{\alpha, \beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ は σ 変換関数である。

$$\begin{aligned} (\tilde{\psi}_\beta \circ (\tilde{\psi}_\alpha)^{-1})(x, g) &= \tilde{\psi}_\beta(x, (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g)) \\ &= (x, \sigma^{-1}(\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g))) \\ &= (x, \sigma^{-1}((\sigma \circ \varphi_{\beta\alpha})(x) \circ \sigma(g))) \\ &= (x, \sigma^{-1}(\sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x)g))) \\ &= (x, \varphi_{\beta\alpha}(x)g) \end{aligned}$$

Step 4. P の位相

3.6 の条件を満たすことを示す。任意に、 $(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ をとる。

$$\tilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)) = \tilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)) = (U_\alpha \cap U_\beta) \times G$$

であるからこれは $U_\alpha \times G$ の開集合である。また、

$$(\tilde{\psi}_\beta \circ (\tilde{\psi}_\alpha)^{-1}) : (U_\alpha \cap U_\beta) \times G \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times G$$

が同相であることを示す。前のステップの計算から、 $(\tilde{\psi}_\beta \circ (\tilde{\psi}_\alpha)^{-1})(y, g) = (y, \varphi_{\beta\alpha}(y)g)$ である。 $\varphi_{\beta\alpha}$ の連続性と G が位相群であることからこれは連続である。この逆写像の連続性も同様である。よって、3.6 の条件を満たす。したがって、 P の位相を定めることができ、この位相の下で、 $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ は P の開集合であり、 $\tilde{\psi}_\alpha$ は同相写像である。また、各 $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ 上で ϖ は同相写像と第一射影の合成であるから、 ϖ は局所的に連続である。したがって、 ϖ は連続である。位相の一意性は 3.6 から従う。

Step 5. $\cdot$ が右作用であることと連続性

$\cdot$ が右作用であることは、 σ が群準同型であることから明らか。 $\cdot$ の連続性を示す。 $P \times G$ の開被覆 $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}\}$ を考える。各、 $\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G$ 上で、 $\cdot$ が連続であることを示せばよい。この部分集合の相対位相は $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の相対位相と G の位相の積位相である。この写像は

$$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G \rightarrow U_\alpha \times G \times G \rightarrow U_\alpha \times G \rightarrow \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow P$$

であり、 $((x, p), g) \mapsto (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p), g) \mapsto (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g) \mapsto (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(\sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g)) \mapsto (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(\sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g)) = (x, p \circ \sigma(g))$ で定まる。これは連続写像の合成であるから、 $\cdot$ は連続である。□

命題 4.8. $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。 F が空集合であるとき、 X は空集合であるとする。 e を G の単位元とする。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。 $\tilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ を主ファイバー束の変換関数とする。 $P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p, f) \sim (p', f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。 $P \times_G F := (P \times F) / \sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \rightarrow X, [p, f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、 $(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(\text{pr}_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ として $\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)$ が得られる。とくに、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ は σ -Atlas であり、これを極大化して得られる σ -Atlas を $\mathcal{A}$ とする。よって、 $(P \times_G F, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 (作用付き) である。

証明 Step 1. $\sim$ が同値関係である

反射律を示す。任意に、 $(p, f) \in P \times F$ をとる。 $p = p \cdot e$ であり、 $f = \sigma(e^{-1})(f)$ であるの

で、 $(p, f) \sim (p, f)$ である。

対称律を示す。任意に、 $(p, f), (p', f') \in P \times F$ をとる。 $(p, f) \sim (p', f')$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p' = p \cdot g$ かつ $f' = \sigma(g^{-1})(f)$ である。したがって、 $p = p' \cdot g^{-1}$ かつ

$$f = \sigma(e)(f) = \sigma((g^{-1})^{-1}g^{-1})(f) = \sigma((g^{-1})^{-1})(\sigma(g^{-1})(f)) = \sigma((g^{-1})^{-1})(f')$$

である。よって、 $(p', f') \sim (p, f)$ である。

推移律を示す。任意に、 $(p, f), (p', f'), (p'', f'') \in P \times F$ をとる。 $(p, f) \sim (p', f')$ かつ $(p', f') \sim (p'', f'')$ とする。このとき、ある $g_1, g_2 \in G$ が存在して、 $p' = p \cdot g_1$, $f' = \sigma(g_1^{-1})(f)$, $p'' = p' \cdot g_2$, $f'' = \sigma(g_2^{-1})(f')$ である。したがって、 $p'' = p \cdot g_1 \cdot g_2$ かつ

$$f'' = \sigma(g_2^{-1})(\sigma(g_1^{-1})(f)) = (\sigma(g_2^{-1}) \circ \sigma(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_2^{-1})(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_1 g_2)^{-1})(f)$$

である。よって、 $(p, f) \sim (p'', f'')$ である。

Step 2. π が well-defined な全射連続写像である

任意に、 $(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。 $[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。したがって、命題 3.18 から、 $\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。よって、 π は well-defined である。 π が全射であることは、 ϖ が全射であることと、 F が空集合であるとき、 X は空集合であることから直ちにわかる。 π は連続写像 $\varpi \circ pr_1$ に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。

Step 3. $(P \times_G F, X, \pi, F)$ の具体的な局所自明化の設定

$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。これが well-defined な同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、 $(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。 $[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、 $p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。 $\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。また、

$$\sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_2)))(f_2) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1 \cdot g)))(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1))g)(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(p_1)))(f_1)$$

よって、 ψ_α は well-defined である。次に、 ψ_α が連続であることを示す。 ψ_α は

$$(\varpi \circ pr_1, \text{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ ((pr_2 \circ \tilde{\psi}_\alpha) \times id_F)) : \pi^{-1}(U_\alpha) \times F \rightarrow U_\alpha \times F$$

に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。 ψ_α の逆写像を構成する。 $\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha), (x, f) \mapsto [\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]$ で定める。これが well-defined な連続写像であることを示す。任意に、 $(x, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\pi([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]) = \varpi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)) = x \in U_\alpha$$

であるから、 ψ'_α は well-defined である。 $P \times F$ から $P \times_G F$ への商写像を q とする。

$$\psi'_\alpha = q \circ (\tilde{\psi}_\alpha^{-1} \times id_F) \circ ((id_{U_\alpha}, cst_e) \times id_F)$$

であるから、連続である。 ψ_α と ψ'_α が互いに逆写像であることは簡単に分かる。よって、 ψ_α は局所自明化であり、 $(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束である。

Step 4. 変換関数の計算

任意に、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。前のステップで構成した局所自明化 ψ_α, ψ_β に対して変換関数を計算する。任意に、 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned} (\psi_\beta^x \circ ((\psi_\alpha^x)^{-1}))(f) &= pr_2(\psi_\beta(\psi_\alpha^{-1}(x, f))) \\ &= pr_2(\psi_\beta([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\ &= pr_2(\varpi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\beta(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f)) \\ &= \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\beta(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f) \\ &= \sigma(\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x))(f) \end{aligned}$$

である。よって、 $(\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) = \sigma(\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x))$ である。

□

定義 4.9. $(X, E, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。
 $(X', E, \pi', F, G, \sigma, \mathcal{A}')$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。連続写像
 $\Phi : E \rightarrow E'$ が準同型であるとは以下の2つが成り立つことである。

(1) $\pi' \circ \Phi = \pi$ が成り立つ。

(2) 任意の $U_\alpha \in \mathcal{A}, U_{\alpha'} \in \mathcal{A}'$ に対して、ある $\eta_{\alpha, \alpha'}^\Phi : U_\alpha \cap U_{\alpha'} \rightarrow G$ が存在して、
 $(\sigma \circ \eta_{\alpha, \alpha'}^\Phi)(x) = \psi_{\alpha'}^x \circ \Phi \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$ が成り立つ。

さらに、 Φ が同相であるとき、 $(X, E, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ と $(X', E, \pi', F, G, \sigma', \mathcal{A}')$ は同型であるという。

命題 4.10. 構造群付きファイバー束 (作用付き) の準同型の合成写像は準同型であり、
同型の逆写像は同型である。また、恒等写像は同型である。

4.2 構造群付きファイバー束 (作用付き) と主ファイバー束

定理 4.11. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束とする。 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ を主ファイバー束とする。 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆とする。 $\{W_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}$ を X の開被覆とする。 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ に適合する局所自明化との組とする。 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ を $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ の変換関数とする。 $\{W_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}$ を主ファイバー束 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ に適合する局所自明化の組とする。 $\varphi'_{\beta'\alpha'} : W_{\alpha'} \cap W_{\beta'} \rightarrow G$ を $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ の変換関数とする。この時以下は同値である。

- (1) $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ と $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ は主ファイバー束の同型である。
- (2) 連続関数の族 $\{h_{\alpha', \alpha} : U_\alpha \cap W_{\alpha'} \rightarrow G\}_{(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda \times \Lambda'$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap W_{\alpha'} \cap W_{\beta'}$ に対して、

$$\varphi'_{\beta', \alpha'}(x) h_{\alpha', \alpha}(x) = h_{\beta', \beta}(x) \varphi_{\beta, \alpha}(x)$$

である。

証明 まず、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。 $\Phi : P \rightarrow P'$ を主ファイバー束の同型とする。

Step 1. (1) $\Rightarrow$ (2) の連続関数の族の構成

任意に、 $(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ をとる。 $h_{\alpha', \alpha} : U_\alpha \cap W_{\alpha'} \rightarrow G$ を $x \in U_\alpha \cap W_{\alpha'}$ に対して、

$$h_{\alpha', \alpha}(x) = (pr_2 \circ \psi'_{\alpha'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x, e)$$

で定める。これが連続であることは簡単。

Step 2. (1) $\Rightarrow$ (2) の $(\psi'_{\alpha'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x, g) = (x, h_{\alpha', \alpha}(x)g)$ であること

任意に、 $(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ と $x \in U_\alpha \cap W_{\alpha'}$ と $g \in G$ をとる。

$$\begin{aligned} (\psi'_{\alpha'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x, g) &= (\psi'_{\alpha'} \circ \Phi)(\psi_\alpha^{-1}(x, e) \cdot g) \\ &= (\psi'_{\alpha'}(\Phi(\psi_\alpha^{-1}(x, e))) \cdot' g) \\ &= (\psi'_{\alpha'} \circ \Phi)(\psi_\alpha^{-1}(x, e)) \cdot' g \\ &= (x, h_{\alpha', \alpha}(x)) \cdot' g \\ &= (x, h_{\alpha', \alpha}(x)g) \end{aligned}$$

である。

Step 3. (1) $\Rightarrow$ (2) の $\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x) = h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x)$ であること

$\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1}(x, e)$ を2通りで計算する。まず、

$$\begin{aligned} (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1})(x, e) &= (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1}(\psi_{\alpha}(\psi_{\beta'}^{-1}(x, e)))) \\ &= (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1}(x, \varphi_{\alpha,\beta'}(x))) \\ &= (x, h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\alpha,\beta'}(x)) \end{aligned}$$

である。一方、

$$\begin{aligned} (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1})(x, e) &= (\psi'_{\beta'} \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ \psi'_{\alpha'} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha}^{-1})(x, e) \\ &= (\psi'_{\beta'} \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1})(x, h_{\alpha',\alpha}(x)) \\ &= (x, \varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x)) \end{aligned}$$

である。よって、示された。つぎに、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。

Step 4. (2) $\Rightarrow$ (1) の局所同型

任意に、 $(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ をとる。 $H_{\alpha',\alpha} : (U_{\alpha} \cap W_{\alpha'}) \times G \rightarrow (U_{\alpha} \cap W_{\alpha'}) \times G, (x, g) \mapsto (x, h_{\alpha',\alpha}(x)g)$ と定める。これは連続写像である。これを用いて、連続写像 $\Phi_{\alpha',\alpha} : \varpi^{-1}(U_{\alpha} \cap W_{\alpha'}) \rightarrow (\varpi')^{-1}(U_{\alpha} \cap W_{\alpha'})$ を

$$\Phi_{\alpha',\alpha} = (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_{\alpha}$$

で定める。 $H_{\alpha',\alpha}$ の逆写像は $H_{\alpha',\alpha}^{-1}(x, g) = (x, h_{\alpha',\alpha}(x)^{-1}g)$ であるから、 $\Phi_{\alpha',\alpha}^{-1} = (\psi_{\alpha})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha}^{-1} \circ \psi'_{\alpha'}$ は連続である。ゆえに、 $\Phi_{\alpha',\alpha}$ は同相である。また、

$$\varpi' \circ \Phi_{\alpha',\alpha} = \varpi' \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_{\alpha} = pr_1 \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_{\alpha} = pr_1 \circ \psi_{\alpha} = \varpi$$

である。また、任意に、 $p \in \varpi^{-1}(U_{\alpha} \cap W_{\alpha'})$ と $g \in G$ をとる。

$$\begin{aligned} \Phi_{\alpha',\alpha}(p \cdot g) &= ((\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_{\alpha})(p \cdot g) \\ &= ((\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha})(\psi_{\alpha}(p) \cdot g) \\ &= (\psi'_{\alpha'})^{-1}(H_{\alpha',\alpha}(\psi_{\alpha}(p)) \cdot g) \\ &= \Phi_{\alpha',\alpha}(p) \cdot' g \end{aligned}$$

である。

Step 5. (2) $\Rightarrow$ (1) の局所同型の張り合わせ

任意に、 $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda \times \Lambda'$ と $p \in \varpi^{-1}(U_\alpha \cap W_{\alpha'} \cap U_\beta \cap W_{\beta'})$ をとる。 $(x, g) := \psi_\alpha(p)$ とする。このとき、 $\psi_\beta(p) = (x, \varphi_{\beta, \alpha}(x)g)$ である。まず、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\beta', \beta}(p)) = H(x, \varphi_{\beta, \alpha}(x)g) = (x, h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta, \alpha}(x)g)$$

である一方、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\alpha', \alpha}(p)) = (\psi'_{\beta'} \circ \psi'_{\alpha'})^{-1}(H(x, g)) = (x, \varphi'_{\beta', \alpha'}(x)h_{\alpha', \alpha}(x)g)$$

である。(2) の仮定より、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\beta', \beta}(p)) = \psi'_{\beta'}(\Phi_{\alpha', \alpha}(p))$$

である。よって、 $\Phi_{\beta', \beta}(p) = \Phi_{\alpha', \alpha}(p)$ である。よって、これらが張り合わさって、同型写像 $\Phi : P \rightarrow P'$ が得られる。 $\square$

次の証明は省略する。

定理 4.12. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, \{(W_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。 $\Lambda_0 \subset \Lambda$ と $\Lambda'_0 \subset \Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda_0}$ と $\{W_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。各、 $\alpha, \beta \in \Lambda_0$ と $\alpha', \beta' \in \Lambda'_0$ に対して、 σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ と $\varphi'_{\beta'\alpha'} : W_{\alpha'} \cap W_{\beta'} \rightarrow G$ をとる。この時、次の 2 条件は同値である。

(1) $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, \{(W_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ は構造群付きファイバー束 (作用付き) の同型である。

(2) 連続関数の族 $\{h_{\alpha', \alpha} : U_\alpha \cap W_{\alpha'} \rightarrow G\}_{(\alpha, \alpha') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap W_{\alpha'} \cap W_{\beta'}$ に対して、

$$\sigma(\varphi'_{\beta', \alpha'}(x)h_{\alpha', \alpha}(x)) = \sigma(h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta, \alpha}(x))$$

注意 4.13. σ が単射であるとき、

$$\sigma(\varphi'_{\beta', \alpha'}(x)h_{\alpha', \alpha}(x)) = \sigma(h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta, \alpha}(x))$$

は

$$\varphi'_{\beta', \alpha'}(x)h_{\alpha', \alpha}(x) = h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta, \alpha}(x)$$

に書き換えてよい。

定理 4.14. X, F を位相空間とする。 F は空であるとき、 X も空であるとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を単射な連続作用とする。このとき、次の集合

$$\frac{\{X \text{ を底空間, } F \text{ をファイバー, } G \text{ を構造群とする作用 } \sigma \text{ 付きのファイバー束}\}}{\text{構造群付きファイバー束 (作用付き) の同型}}$$

と

$$\frac{\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束}\}}{\text{主ファイバー束の同型}}$$

の間に 1 対 1 対応がある。ただしこの対応はフレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作から誘導される。

証明 フレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作は σ 変換関数と主ファイバー束の変換関数を変えない写像であり、 σ の単射性から定理 4.11 の (2) の条件と定理 4.12 の (2) の条件は同じなので、それぞれの対応が同型類から同型類への写像を与えることは示される。これらが互いに逆写像であることは $h_{\alpha', \alpha}$ として恒等的に、 G の単位元に送る連続写像をとることで示される。 $\square$

4.3 構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き)

定義 4.15. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 G を位相群、 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ と $\psi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \rightarrow U_\beta \times F$ をとる。連続写像 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ が σ 変換関数であるとは、任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、 $(\sigma \circ \varphi_{\alpha\beta})(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1}(x)$ が成り立つことをいう。開被覆と局所自明化の組 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ とその局所自明化に対する σ 変換関数の族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ との組が σ アトラス (変換関数付き) であるとは次の条件を満たすことをいう。

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x) \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda, x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$$

$(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda})$ を σ アトラス (変換関数付き) とする。これが極大であるとは、これを含む σ アトラス (変換関数付き) がこの σ アトラス (変換関数付き) だけであることをいう。 $\mathcal{A}$ を極大 σ アトラス (変換関数付き) とする。 $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) という。

命題 4.16. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。 σ が単射であるとき、一意的に変換関数の族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ が存在して、 $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ は構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) となる。

証明 σ の単射性から一意性は明らかである。作用付きファイバー束 (変換関数をつけない) の定義から、局所自明化 ψ_α と ψ_β に対して、 σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\beta}$ が存在することがわかる。これは任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$$

が成り立つことを示す。 $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ をとる。

$$\begin{aligned} \sigma(\varphi_{\alpha\gamma}(x)) &= \psi_\alpha^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} \\ &= \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \circ \psi_\beta^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} \\ &= \sigma(\varphi_{\alpha\beta}(x))\sigma(\varphi_{\beta\gamma}(x)) \\ &= \sigma(\varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)) \end{aligned}$$

σ が単射であることから、 $\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$ が成り立つ。この変換関数をつけない

σ アトラスから、変換関数付きの σ アトラスを構成する操作と、その逆の操作は包含を保つので、その操作で、極大性も保たれる。 $\square$

命題 4.17. $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda})$ を σ アトラス (変換関数付き) とする。このとき、ある極大 σ アトラス (変換関数付き) $\mathcal{A}$ が一意的に存在して、 $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda})$ を含む。

証明 まず、要点を述べる。局所自明化 $\psi_\theta : \pi^{-1}(U_\theta) \rightarrow U_\theta \times F$ ($\theta \in \Lambda$ というわけではない) であって、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 ψ_α と ψ_θ の σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\theta}$ が存在して、

$$\varphi_{\alpha\theta}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\theta}(x) \quad (\alpha, \beta \in \Lambda, x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\theta) \quad (1)$$

であるような ψ_θ をすべて集めて、(このとき、 $\varphi_{\alpha\theta}$ も固定して、)

$$(\{(U_\theta, \psi_\theta)\}_{\theta \in \Theta}, \{\varphi_{\alpha\theta}\}_{\theta \in \Theta})$$

を得る。ここで、 $\theta_1, \theta_2 \in \Theta$ に対して、 $\varphi_{\theta_1\theta_2} : U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2} \rightarrow G$ 定める。任意に、 $x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2}$ をとる。 x を元に持つ $\alpha \in \Lambda$ をとる。

$$\varphi_{\theta_1\theta_2}(x) = (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_2}(x)$$

で定める。これを用いて

$$\mathcal{A} := (\{(U_\theta, \psi_\theta)\}_{\theta \in \Theta}, \{\varphi_{\theta_1\theta_2}\}_{\theta_1, \theta_2 \in \Theta})$$

がただ 1 つの求める極大 σ アトラス (変換関数付き) であることを示す。

Step 1. $\varphi_{\theta_1\theta_2}$ は well-defined である

$\varphi_{\theta_1\theta_2}$ の定義において、 α の取り方によらないことを示す。 $x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2}$ をとる。 $\alpha_1, \alpha_2 \in \Lambda$ を x を元に持つようにとる。

$$\begin{aligned} (\varphi_{\alpha_1\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_1\theta_2}(x) &= (\varphi_{\alpha_1\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_1\alpha_2}(x)\varphi_{\alpha_2\theta_2}(x) \\ &= (\varphi_{\alpha_2\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_2\theta_2}(x) \end{aligned}$$

である。

Step 2. $\mathcal{A}$ は σ アトラス (変換関数付き) である

$\varphi_{\theta_1\theta_2}$ は連続である。また、任意の $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in \Theta$ と $x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2} \cap U_{\theta_3}$ に対して、

$$\begin{aligned}\varphi_{\theta_1\theta_3}(x) &= (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_3}(x) \\ &= (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_2}(x)\varphi_{\theta_2\theta_3}(x) \\ &= \varphi_{\theta_1\theta_2}(x)\varphi_{\theta_2\theta_3}(x)\end{aligned}$$

である。

Step 3. $\mathcal{A}$ が $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda})$ を含むことと極大性と一意性

簡単

□

命題 4.18. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) とする。

$$\begin{array}{ccc} L: G & \longrightarrow & \text{Homeo}(G) \\ \psi & & \psi \\ g & \longmapsto & (g' \mapsto gg') \end{array}$$

とする。(3.47 参照) $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は、変換関数の公理を満たす。これより得られるファイバー束 (P, X, ϖ, G) は、作用 $\cdot: P \times G \rightarrow P$ を各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \cdot_\alpha: U_\alpha \times G \times G & \longrightarrow & U_\alpha \times G \\ \psi & & \psi \\ (x, g_1, g_2) & \longmapsto & (x, g_1 g_2) \end{array}$$

を局所自明化により $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の作用が定まり、これの張り合わせで定めると $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は主ファイバー束となる。さらにこれは σ が単射の時、4.7 で定義した主ファイバー束と同型である。

証明 **Step 1.** $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は変換関数の公理を満たす

任意に、 $\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ をとる。

$$\begin{aligned}L(\varphi_{\alpha\gamma}(x)) &= L(\varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)) \\ &= L(\varphi_{\alpha\beta}(x)) \circ L(\varphi_{\beta\gamma}(x))\end{aligned}$$

である。また、 $\text{ev} \circ (L \circ \varphi_{\alpha\beta} \times \text{id}_G) : U_\alpha \cap U_\beta \times G \rightarrow G$ は

$$\text{ev} \circ (L \circ \varphi_{\alpha\beta} \times \text{id}_G)(x, g) = L(\varphi_{\alpha\beta}(x))(g) = \varphi_{\alpha\beta}(x)g$$

である。ゆえにこれは連続である。

Step 2. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は主ファイバー束である

まず、作用が張り合わさることを示す。任意に、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ と $p \in \varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)$ と $g \in G$ をとる。 $\tilde{\psi}_\beta(p) = (x, g_1)$ とする。この時、 $\tilde{\psi}_\alpha(p) = (x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1)$ である。

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}_\alpha^{-1} \circ \cdot_\alpha \circ (\tilde{\psi}_\alpha \times \text{id}_G)(p, g) &= \tilde{\psi}_\alpha^{-1}(\tilde{\psi}_\alpha(p) \cdot_\alpha g) \\ &= \tilde{\psi}_\alpha^{-1}((x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1) \cdot_\alpha g) \\ &= \tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1g) \\ &= \tilde{\psi}_\beta^{-1}(x, g_1g) \\ &= \tilde{\psi}_\beta^{-1}(\tilde{\psi}_\beta(p) \cdot_\beta g) \\ &= \tilde{\psi}_\beta^{-1} \circ \cdot_\beta \circ (\tilde{\psi}_\beta \times \text{id}_G)(p, g) \end{aligned}$$

であるから、作用が張り合わさる。この作用は局所的に連続なので、全体として連続である。この作用に対して、局所自明化 $\tilde{\psi}_\alpha$ が適合することを示す。任意に、 $p \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ と $g \in G$ をとる。 $\tilde{\psi}_\alpha(p) = (x, g_1)$ とする。

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}_\alpha(p \cdot g) &= \tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(\tilde{\psi}_\alpha(p) \cdot_\alpha g)) \\ &= \tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}((x, g_1) \cdot_\alpha g)) \\ &= \tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, g_1g)) \\ &= (x, g_1g) \end{aligned}$$

であるから、局所自明化 $\tilde{\psi}_\alpha$ が適合する。

Step 3. 4.7 と同型

前のステップにより局所自明化 $\tilde{\psi}_\alpha$ は主ファイバー束構造に適合する。4.7 の変換関数と $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ は一致するので、定理 4.11 より、 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は 4.7 で定義した主ファイバー束と同型である。 $\square$

命題 4.19. $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。 F が空集合であるとき、 X は空集合であるとする。 e を G の単位元とする。 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。 $\tilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ を主ファイバー束の変換関数とする。 $P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p, f) \sim (p', f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。 $P \times_G F := (P \times F) / \sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \rightarrow X, [p, f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、 $(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(\text{pr}_2(\tilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、 σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ として $\tilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)$ が得られる。とくに、 $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda})$ は σ -Atlas(変換関数付き) である。これを極大化して、 $\mathcal{A}$ を得る。よって、 $(P \times_G F, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) である。

証明 4.8 とほぼ同様。任意の $\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$$

であることだけ示せばいい。

$$\tilde{\varphi}_{\alpha\gamma}(x) = \tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\tilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)$$

であることを示す。任意に、 $g \in G$ をとる。

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}_\alpha \circ \tilde{\psi}_\gamma^{-1}(x, g) &= \tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\beta^{-1}(\tilde{\psi}_\beta \circ \tilde{\psi}_\gamma^{-1}(x, g))) \\ &= \tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\beta^{-1}(x, \tilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)g)) \\ &= (x, \tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\tilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)g) \end{aligned}$$

である。主ファイバー束の変換関数の一意性から $\tilde{\varphi}_{\alpha\gamma}(x) = \tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\tilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)$ が成り立つ。 □

定義 4.20. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha', \beta' \in \Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) とする。これらが (ファイバーと構造群と作用を固定する) 準同型であるとは、連続写像 $\Phi: E \rightarrow E'$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。

(1) $\pi' \circ \Phi = \pi$ が成り立つ。

(2) 連続関数の族 $\{\eta_{\alpha', \alpha}^\Phi: U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \rightarrow G\}_{\alpha \in \Lambda, \alpha' \in \Lambda'}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ と $x \in U_\alpha \cap U'_{\alpha'}$ に対して、 $(\sigma \circ \eta_{\alpha', \alpha}^\Phi)(x) = \psi_{\alpha'}^x \circ \Phi \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$ かつ、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x) \eta_{\beta', \beta}^\Phi(x) = \eta_{\alpha', \alpha}^\Phi(x) \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

が成り立つ。

また、これらが同型であるとは、準同型 Φ が同相であることをいう。

命題 4.21. 準同型と準同型の合成は準同型で、同型の逆写像は同型である。

命題 4.22. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha', \beta' \in \Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) とする。 $\Lambda_0 \subset \Lambda$ と $\Lambda'_0 \subset \Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda_0}$ と $\{U'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。 $\Phi: E \rightarrow E'$ をファイバー束の同型写像とする。このとき、以下の 2 つは同値である。

(1) Φ が同型である。

(2) 変換関数の族 $\{\eta_{\alpha', \alpha}^\Phi: U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \rightarrow G\}_{\alpha \in \Lambda_0, \alpha' \in \Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'}$ に対して、 $(\sigma \circ \eta_{\alpha', \alpha}^\Phi)(x) = \psi_{\alpha'}^x \circ \Phi \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$ かつ、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x) \eta_{\beta', \beta}^\Phi(x) = \eta_{\alpha', \alpha}^\Phi(x) \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

定理 4.23. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha', \beta' \in \Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) とする。 $\Lambda_0 \subset \Lambda$ と $\Lambda'_0 \subset \Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda_0}$ と $\{U'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。このとき、以下の 2 つは同値である。

- (1) $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'}\}_{\alpha' \in \Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha', \beta' \in \Lambda'}))$ が同型である。
- (2) 変換関数の族 $\{h_{\alpha'\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda_0, \alpha' \in \Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'}$ に対して、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)h_{\beta'\beta}(x) = h_{\alpha'\alpha}(x)\varphi_{\alpha\beta}(x)$$

が成り立つ。

証明 (1) $\Rightarrow$ (2) は、定義から明らかである。(2) $\Rightarrow$ (1) だけ示す。

Step 1. 局所同型の構成

各、 $\alpha \in \Lambda_0$ と $\alpha' \in \Lambda'_0$ に対して、 $H_{\alpha, \alpha'} : U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \times F \rightarrow U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \times F$ を

$$H_{\alpha, \alpha'} := (pr_1, \text{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ (h_{\alpha', \alpha} \times id_F))$$

とし、 $\Phi_{\alpha, \alpha'} : \pi^{-1}(U_\alpha \cap U'_{\alpha'}) \rightarrow (\pi')^{-1}(U_\alpha \cap U'_{\alpha'})$ を

$$\Phi_{\alpha, \alpha'} := (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha, \alpha'} \circ \psi_\alpha$$

で定める。これが well-defined であることは簡単。 σ が連続作用なので、 $H_{\alpha, \alpha'}$ は連続であるから、 $\Phi_{\alpha, \alpha'}$ も連続である。

$$H_{\alpha, \alpha'}^{-1} = (pr_1, \text{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ (h_{\alpha', \alpha}^{-1} \times id_F))$$

であるから $\Phi_{\alpha, \alpha'}^{-1} = (\psi_\alpha)^{-1} \circ H_{\alpha, \alpha'}^{-1} \circ \psi'_{\alpha'}$ である。これも連続であるから、 $\Phi_{\alpha, \alpha'}$ は同相である。

Step 2. 局所同型の張り合わせ

任意に、 $\alpha, \beta \in \Lambda_0$ と $\alpha', \beta' \in \Lambda'_0$ と $p \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'})$ をとる。 $\psi_\alpha(p) = (x, f)$ と

する。このとき、 $\psi_\beta(p) = (x, \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f))$ である。

$$\begin{aligned}\psi'_{\alpha'} \circ \Phi_{\alpha, \alpha'}(p) &= H_{\alpha, \alpha'} \circ \psi_\alpha(p) \\ &= H_{\alpha, \alpha'}(x, f) \\ &= (x, \sigma(h_{\alpha', \alpha}(x))(f))\end{aligned}$$

である。一方、

$$\begin{aligned}\psi'_{\alpha'} \circ \Phi_{\beta, \beta'}(p) &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1} \circ H_{\beta, \beta'} \circ \psi_\beta(p) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1} \circ H_{\beta, \beta'}(x, \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1}(x, \sigma(h_{\beta', \beta}(x))(\sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f))) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1}(x, \sigma(h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= (x, \sigma(\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)h_{\beta', \beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= (x, \sigma(h_{\alpha', \alpha}(x))(f))\end{aligned}$$

である。 $\psi'_{\alpha'}$ が同相であることから、 $\Phi_{\alpha, \alpha'}(p) = \Phi_{\beta, \beta'}(p)$ が成り立つ。これと同様に、 $\Phi_{\alpha, \alpha'}^{-1}(p) = \Phi_{\beta, \beta'}^{-1}(p)$ も成り立つ。よって、 $\Phi_{\alpha, \alpha'}$ は張り合わさって、同相写像

$$\Phi : E \rightarrow E'$$

が得られる。

Step 3. 同型であること

$\pi' \circ \Phi = \pi$ は、局所自明化の定義から明らかである。 $\{\eta_{\alpha, \alpha'}^\Phi\}_{\alpha \in \Lambda_0, \alpha' \in \Lambda'_0}$ は

$$\eta_{\alpha, \alpha'}^\Phi := h_{\alpha', \alpha}$$

で定める。これにより、 Φ は同型である。 □

定理 4.24. X, F を位相空間とする。 F は空であるとき、 X も空であるとする。 G を位相群とする。 $\sigma : G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を連続作用とする。このとき、次の集合

$\{X \text{ を底空間, } F \text{ をファイバー, } G \text{ を構造群とする, 作用 } \sigma \text{ 付きのファイバー束 (変換関数付き)}\}$
 $\text{構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) の同型}$

と

$\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束}\}$
 主ファイバー束の同型

の間に 1 対 1 対応がある。ただしこの対応はフレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作から誘導される。

証明 4.23 と 4.11 より。

□

ここまでの議論に対して、位相空間を多様体に、位相群をリー群に、連続を C^∞ に置き換えれば、滑らかな構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) と滑らかな主ファイバー束の間にも同様の 1 対 1 対応がある。ただし 1.56 を用いる必要がある。(同伴束をとる操作だけは少し考えることが必要である。)

5 等質ファイバー束

5.1 等質ファイバー束と G 同変

この章では構造群は G ではなく H で表す。

また、構造群付きファイバー束は作用と変換関数付きのものだけを考える。

定義 5.1. G を Lie 群とする。 H を G の閉部分群とする。 F を空でない多様体とする。
 $\sigma : H \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を滑らかな作用とする。このとき、主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ を考える。このとき、同伴したファイバー束 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ のことを等質 G ファイバー束という。

定義 5.2. (E, X, π, F) をファイバー束とする。 G を位相群とする。 $\tau : G \rightarrow \text{Homeo}(E)$ を連続な作用とする。 $\rho : G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ を連続な作用とする。 $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ が G 同変ファイバー束であるとは、任意の $g \in G$ に対して、

$$\pi \circ \tau(g) = \rho(g) \circ \pi$$

であることをいう。さらに、 G が Lie 群で、 (E, X, π, F) が滑らかなファイバー束で、 τ と ρ が滑らかであるとき、 $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を滑らかな G 同変ファイバー束という。さらにこれが推移的であるとは、 ρ が推移的であることをいう。すなわち、任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して、ある $g \in G$ が存在して、 $\rho(g)(x_1) = x_2$ であることをいう。

補題 5.3. 等質ファイバー束 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ について、次の写像

$$\begin{array}{ccc} q: & G \times F & \longrightarrow G \times_H F \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & (g, f) & \longmapsto [g, f] \end{array}$$

は滑らかな沈めこみである。

注意 5.4. これは等質ファイバー束に限らず、一般の同伴ファイバー束についても成り立つ。

証明 Step 1. q の局所表示 Q_α

主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ について、 $\{(U_\alpha, \tilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を G/H の開被覆と、この主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。 $\psi_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times H$ を $\tilde{\psi}_\alpha$ に対応す

る局所自明化とする。

$$\begin{array}{ccc} Q_\alpha: & U_\alpha \times H \times F & \longrightarrow & U_\alpha \times F \\ & \Psi & & \Psi \\ & (x, h, f) & \longmapsto & (x, \sigma(h)(f)) \end{array}$$

で定める。任意に、 $\alpha \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha$ と $f \in F$ と $h \in H$ をとる。

$$\begin{aligned} Q_\alpha((x, h, f)) &= (x, \sigma(h)(f)) \\ &= (\varpi(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h)), \sigma(\text{pr}_2(\tilde{\psi}_\alpha(\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h))))(f)) \\ &= \psi_\alpha([\tilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h), f]) \\ &= \psi_\alpha(q((\tilde{\psi}_\alpha \times \text{id}_F)^{-1}(x, h, f))) \end{aligned}$$

である。ゆえに、

$$Q_\alpha = \psi_\alpha \circ q \circ (\tilde{\psi}_\alpha \times \text{id}_F)^{-1}$$

である。

Step 2. q が滑らかである

$\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times F\}_{\alpha \in \Lambda}$ は $G \times F$ の開被覆であり、 $\tilde{\psi}_\alpha \times \text{id}_F$ と ψ_α は微分同相であるから、 Q_α が滑らかであることを示せばよい。これは、 σ が滑らかな作用であることから従う。

Step 3. q が沈めこみである

前のステップと同様にして、 Q_α が沈めこみであることを示せばよい。 $\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F) : H \times F \rightarrow F, (h, f) \mapsto \sigma(h)(f)$ が沈めこみであることを示せばよい。任意に、 $(h, f) \in H \times F$ をとる。 $d(\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F))_{(h, f)} : T_h H \oplus T_f F \rightarrow T_{\sigma(h)(f)} F$ が全射であることを示せばよい。任意に、 $v \in T_{\sigma(h)(f)} F$ をとる。 $d\sigma(h)_f : T_f F \rightarrow T_{\sigma(h)(f)} F$ は同型であるから、ある $w \in T_f F$ が存在して、 $d\sigma(h)_f(w) = v$ である。 $i_h : F \rightarrow H \times F, f' \mapsto (h, f')$ とする。 $d(i_h)_f(w) = (0, w)$ である。

$$\begin{aligned} d(\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F))_{(h, f)}(0, w) &= (d(\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F))_{(h, f)} \circ d(i_h)_f)(w) \\ &= d\sigma(h)_f(w) \\ &= v \end{aligned}$$

である。ゆえに、 $d(\text{ev} \circ (\sigma \times \text{id}_F))_{(h, f)}$ は全射である。よって、 q は沈めこみである。 $\square$

命題 5.5. 等質 G ファイバー束 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \tau: G & \longrightarrow & \text{Homeo}(G \times_H F) \\ \Psi & & \Psi \\ g & \longmapsto & ([g', f] \mapsto [gg', f]) \end{array}$$

で定め、

$$\begin{array}{ccc} \rho: G & \longrightarrow & \text{Homeo}(G/H) \\ \Psi & & \Psi \\ g & \longmapsto & (g'H \mapsto gg'H) \end{array}$$

で定めると、 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, G, \rho, \tau)$ は推移的な滑らかな G 同変ファイバー束である。

証明 Step 1. τ が well-defined である

任意に、 $g \in G$ と $[g', f], [g'', f'] \in G \times_H F$ をとる。 $[g', f] = [g'', f']$ であるとする。ゆえに、ある $h \in H$ が存在して、 $g'' = g'h$ かつ $f' = \sigma(h^{-1})(f)$ である。このとき、

$$[gg'', f'] = [gg'h, \sigma(h^{-1})(f)] = [gg', f]$$

である。

Step 2. ρ が well-defined である

任意に、 $g \in G$ と $g'H, g''H \in G/H$ をとる。 $g'H = g''H$ であるとする。ある $h \in H$ が存在して、 $g'' = g'h$ である。ゆえに、

$$gg''H = gg'hH = gg'H$$

である。

Step 3. τ と ρ が作用である

まず、任意に $g_1, g_2 \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\begin{aligned} \tau(g_1 g_2)([g', f]) &= [g_1 g_2 g', f] \\ &= \tau(g_1)([g_2 g', f]) \\ &= \tau(g_1)(\tau(g_2)([g', f])) \end{aligned}$$

である。つぎに、任意に $g_1, g_2 \in G$ と $g'H \in G/H$ をとる。

$$\begin{aligned}\rho(g_1 g_2)(g'H) &= g_1 g_2 g'H \\ &= \rho(g_1)(g_2 g'H) \\ &= \rho(g_1)(\rho(g_2)(g'H))\end{aligned}$$

である。それぞれ G の単位元を e とすると、 $\tau(e)([g', f]) = [eg', f] = [g', f]$ であり、 $\rho(e)(g'H) = eg'H = g'H$ である。

Step 4. $\pi \circ \tau(g) = \rho(g) \circ \pi$

任意に、 $g \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\pi(\tau(g)([g', f])) = \pi([gg', f]) = \varpi(gg') = gg'H = \rho(g'H) = \rho(\varpi([g', f]))$$

である。

Step 5. τ と ρ が滑らかである

まず、 ρ が滑らかであることを示す。3.25 より、 $p: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ は滑らかな沈めこみである。ゆえに、 $id_G \times p: G \times G \rightarrow G \times G/H$ も滑らかな沈めこみである。その普遍性から、

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \longrightarrow & G/H \\ \downarrow & & \downarrow \\ (g, g') & \longmapsto & gg'H \end{array}$$

が滑らかであることを示せばよい。これは、 $G \times G \rightarrow G, (g, g') \mapsto gg'$ が滑らかであることと、 p が滑らかであることから従う。 τ が滑らかであることを示す。補題 5.3 より、 $q: G \times F \rightarrow G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ は滑らかな沈めこみであるので同様に示される。

Step 6. ρ は推移的である

任意に $g_1 H, g_2 H \in G/H$ をとる。このとき、 $g = g_2 g_1^{-1}$ とすると、 $\rho(g)(g_1 H) = gg_1 H = g_2 g_1^{-1} g_1 H = g_2 H$ である。 $\square$

定義 5.6. $(E_1, X_1, \pi_1, F_1, H_1, \sigma_1, (\{(U_{\alpha_1}, \psi_{\alpha_1})\}_{\alpha_1 \in \Lambda_1}, \{\varphi_{\alpha_1, \beta_1}\}_{\alpha_1, \beta_1 \in \Lambda_1}))$ と $(E_2, X_2, \pi_2, F_2, H_2, \sigma_2, (\{(U_{\alpha_2}, \psi_{\alpha_2})\}_{\alpha_2 \in \Lambda_2}, \{\varphi_{\alpha_2, \beta_2}\}_{\alpha_2, \beta_2 \in \Lambda_2}))$ を滑らかな構造群付きファイバー束とする。 $\Phi_E : E_1 \rightarrow E_2$ と $\Phi_X : X_1 \rightarrow X_2$ を滑らかな写像とする。 $\Phi_H : H_1 \rightarrow H_2$ を Lie 群準同型とする。 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) が滑らかな構造群付きファイバー束の準同型であるとは、次の条件を満たすことをいう。

(1) $\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$ である。

(2) $\sigma_2 \circ \Phi_H = \sigma_1$ である。

(3) 滑らかな関数の族 $\{\eta_{\alpha_2, \alpha_1} : U_{\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2}) \rightarrow H_2\}_{(\alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2}$ が存在して、任意の $(\alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2$ と $x \in U_{\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2})$ に対して、 $(\sigma_2 \circ \eta_{\alpha_2, \alpha_1})(x) = \psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1}^x)^{-1}$ かつ、任意の $(\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2$ と $x \in U_{\alpha_1} \cap U_{\beta_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2}) \cap \Phi_X^{-1}(W_{\beta_2})$ に対して、

$$\varphi_{\alpha_2, \beta_2}(\Phi_X(x)) \eta_{\beta_2, \beta_1}(x) = \eta_{\alpha_2, \alpha_1}(x) \Phi_H(\varphi_{\alpha_1, \beta_1}(x))$$

さらに、 Φ_E, Φ_X が微分同相で、 Φ_H が Lie 群同型であるとき、 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) を滑らかな構造群付きファイバー束の同型という。

命題 5.7. 滑らかな構造群付きファイバー束の準同型と同型について、準同型 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) と準同型 $(\Phi'_E, \Phi'_X, \Phi'_H)$ の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X, \Phi'_H \circ \Phi_H)$ も準同型であり、同型 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) の逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1}, \Phi_H^{-1})$ も同型である。

定義 5.8. $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1), (E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ を滑らかな G 同変ファイバー束とする。 $\Phi_E : E_1 \rightarrow E_2$ と $\Phi_X : X_1 \rightarrow X_2$ を滑らかな写像とする。 (Φ_E, Φ_X) が滑らかな G 同変ファイバー束の準同型であるとは、次の条件を満たすことをいう。

(1) $\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$ である。

(2) 任意の $g \in G$ に対して、 $\Phi_E \circ \tau_1(g) = \tau_2(g) \circ \Phi_E$ かつ $\Phi_X \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \Phi_X$ である。

さらに、 Φ_E, Φ_X が微分同相のとき、 (Φ_E, Φ_X) を滑らかな G 同変ファイバー束の同型という。

命題 5.9. 滑らかな G 同変ファイバー束の準同型と同型について、準同型 (Φ_E, Φ_X) と準同型 (Φ'_E, Φ'_X) の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ も準同型であり、同型 (Φ_E, Φ_X) の逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1})$ も同型である。

定義 5.10. G をリー群、 F を空でない多様体とする。

この時、対象を等質 G ファイバー束、射をファイバーだけを固定する滑らかな作用付きファイバー束の準同型とすると、圏が得られる。これを $\text{AFib}_G(F)$ と表す。(5.7 参照)

また、対象を推移的な滑らかな G 同変ファイバー束、射を滑らかな G 同変ファイバー束の準同型とすると、圏が得られる。これを $\text{EqFib}_G(F)$ と表す。(5.9 参照)

注意 5.11. これらはすべて小さい圏である。

命題 5.12. $\text{AFib}_G(F)$ の対象を 6.16 で定義した $\text{EqFib}_G(F)$ の対象に対応させ、 $\text{AFib}_G(F)$ の射 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) を (Φ_E, Φ_X) に対応させることで、圏 $\text{AFib}_G(F)$ から圏 $\text{EqFib}_G(F)$ への関手 $\mathcal{E}$ が一般に得られない

証明 G を加法群 $\mathbb{R}$ とする。 $F = \{e\}$ とする。 $H_1 = H_2 = \{e'\}$ とする。このとき、等質 $\mathbb{R}$ ファイバー束 $(\mathbb{R} \times_{H_1} F, \mathbb{R}/H_1, \pi_1, F, H_1, \sigma_1, \mathcal{A}_1)$ と $(\mathbb{R} \times_{H_2} F, \mathbb{R}/H_2, \pi_2, F, H_2, \sigma_2, \mathcal{A}_2)$ を考える。 $\Phi_E: \mathbb{R} \times_{H_1} F \rightarrow \mathbb{R} \times_{H_2} F$ を $\Phi_E([g, e]) = [2g, e]$ で定める。 $\Phi_X: \mathbb{R}/H_1 \rightarrow \mathbb{R}/H_2$ を $\Phi_X(\{g\}) = \{2g\}$ で定める。 $\Phi_H: H_1 \rightarrow H_2$ を恒等写像で定める。このとき、 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) はファイバーだけを固定する滑らかな作用付きファイバー束の準同型である。実際、 $H_1 = H_2 = \{e'\}$ であるので、条件 (3) は自動的に満たされる。条件 (1)、(2) は簡単に確認できる。これらの等質 $\mathbb{R}$ ファイバー束に対応する推移的な滑らかな $\mathbb{R}$ 同変ファイバー束 $(\mathbb{R} \times_{H_1} F, \mathbb{R}/H_1, \pi_1, F, \mathbb{R}, \tau_1, \rho_1)$ と $(\mathbb{R} \times_{H_2} F, \mathbb{R}/H_2, \pi_2, F, \mathbb{R}, \tau_2, \rho_2)$ について、 $\tau_1(g)([g', e]) = \tau_2(g)([g', e]) = [g + g', e]$ である。ゆえに、

$$\Phi_E \circ \tau_1(g) \neq \Phi_E \circ \tau_2(g)$$

であるので、 (Φ_E, Φ_X) は滑らかな $\mathbb{R}$ 同変ファイバー束の準同型ではない。 $\square$

5.2 閉部分群とその作用の組

定義 5.13. G をリー群、 F を空でない多様体とする。このとき、 G の閉部分群 H と滑らかな作用 $\sigma : H \rightarrow \text{Homeo}(F)$ の組 (H, σ) を (G, F) -作用データという。(めちゃくちゃ独自の言い方)

補題 5.14. (E, X, π, F) を滑らかなファイバー束とする。 $x \in X$ をとる。このとき、 $\pi^{-1}(x)$ は E の正則部分多様体である。

証明 局所自明化は π の滑らかな局所切断を与えるので、 π は滑らかな沈めこみであり、正則値定理から、 $\pi^{-1}(x)$ は E の正則部分多様体である。 $\square$

命題 5.15. X を空でない多様体とする。 $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を推移的な滑らかな G 同変ファイバー束とする。 $x_0 \in X$ と微分同相写像 $\theta : F \rightarrow E_{x_0}$ をとる。 $(F$ と E_{x_0} は常に微分同相であるから微分同相写像は存在する。) このとき、

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$$

とし、

$$\begin{array}{ccc} \sigma : H & \longrightarrow & \text{Homeo}(F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ h & \longmapsto & \theta^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_0}} \circ \theta \end{array}$$

で定めると、 (H, σ) は (G, F) -作用データである。

証明 まず、 H が閉部分群であることを示す。 $\text{ev} \circ (\rho \times \text{id}_X) \circ (\text{id}_G, \text{cst}_{x_0}) : G \rightarrow X, (g, x) \mapsto \rho(g)(x_0)$ は連続であり、 H この写像の $\{x_0\}$ の逆像であるので、閉集合である。次に、 σ が well-defined であることを示す。 $\tau(h)(E_{x_0}) \subset E_{x_0}$ であることを示す。任意に、 $y \in E_{x_0}$ と $h \in H$ をとる。

$$\pi(\tau(h)(y)) = \rho(h)(\pi(y)) = \rho(h)(x_0) = x_0$$

であるので、 $\tau(h)(y) \in E_{x_0}$ である。よって、 σ は well-defined である。 σ は τ の E_{x_0} への制限をして得られる滑らかな H 作用を微分同相 θ で移すことで得られるので、 σ は滑らかな作用である。 $\square$

定義 5.16. (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, F) -作用データとする。このとき、 (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, F) -共役であるとは、ある $g \in G$ と微分同相写像 $\phi: F \rightarrow F$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。(独自の言い方)

(1) $H_2 = gH_1g^{-1}$ である。

(2) 任意の $h \in H_1$ に対して、 $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ である。

注意 5.17. (G, F) -共役は同値関係である。

命題 5.18. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を推移的な滑らかな G 同変ファイバー束とする。 $x_1, x_2 \in X$ と微分同相写像 $\theta_1: F \rightarrow E_{x_1}$ と $\theta_2: F \rightarrow E_{x_2}$ をとる。命題 5.15 で得られる (G, F) -作用データをそれぞれ $(H_1, \sigma_1), (H_2, \sigma_2)$ とすると、これらは (G, F) -共役である。

証明 まず、 ρ が推移的であるので、ある $g \in G$ が存在して、 $\rho(g)(x_1) = x_2$ である。これを用いて、 $\phi: F \rightarrow F$ を

$$\phi = \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1$$

で定める。

Step 1. ϕ が well-defined な微分同相である

$\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ であることを示す。

$$\pi(\tau(g)(E_{x_1})) = \rho(g)(\pi(E_{x_1})) = \rho(g)(x_1) = x_2$$

ゆえに、 $\tau(g)(E_{x_1}) \subset E_{x_2}$ である。逆に、任意に、 $y_2 \in E_{x_2}$ をとる。 $y_1 = \tau(g^{-1})(y_2)$ とおく。

$$\tau(g)(y_1) = \tau(g)(\tau(g^{-1})(y_2)) = y_2$$

$$\pi(y_1) = \pi_1(\tau(g^{-1})(y_2)) = \rho(g^{-1})(\pi(y_2)) = \rho(g^{-1})(x_2) = x_1$$

であるので、 $\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ である。よって、 ϕ は well-defined である。この逆写像は

$$\phi^{-1} = \theta_1^{-1} \circ \tau(g)^{-1} \circ \theta_2$$

である。これが well-defined であることは、 $\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ であることから従う。また、 ϕ は微分同相写像の合成であるので、微分同相写像である。

Step 2. $H_2 = gH_1g^{-1}$ であること

任意に、 $h_1 \in H_1$ をとる。

$$\rho(gh_1g^{-1})(x_2) = \rho(gh_1g^{-1})(\rho(g)(x_1)) = \rho(g)(\rho(h_1)(x_1)) = \rho(g)(x_1) = x_2$$

であるから、 $gh_1g^{-1} \in H_2$ である。逆に、任意に、 $h_2 \in H_2$ をとる。

$$\rho(g^{-1}h_2g)(x_1) = \rho(g^{-1}h_2g)(\rho(g^{-1})(x_2)) = \rho(h_2)(\rho(g)(\rho_1(x_1))) = \rho(h_2)(x_2) = x_2$$

であるから、 $g^{-1}h_2g \in H_1$ である。

Step 3. $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ であること

任意に、 $h \in H_1$ をとる。

$$\begin{aligned} \phi \circ \sigma_1(h) &= \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \circ \theta_1^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \tau(h)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau(gh)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau(ghg^{-1})|_{E_{x_2}} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau(ghg^{-1})|_{E_{x_2}} \circ \theta_2 \circ \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \\ &= \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi \end{aligned}$$

である。 □

命題 5.19. $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1), (E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ を推移的な滑らかな G 同変ファイバー束とする。これらは同型であるとする。 $x_1 \in X_1$ と $x_2 \in X_2$ と、微分同相写像 $\theta_1 : F \rightarrow E_{1,x_1}$ と $\theta_2 : F \rightarrow E_{2,x_2}$ をとる。命題 5.18 で得られる (G, F) -作用データをそれぞれ $(H_1, \sigma_1), (H_2, \sigma_2)$ とすると、これらは (G, F) -共役である。

証明 $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1)$ と $(E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ が同型であるので、 G -同変ファイバー束の同型 (Φ_E, Φ_X) をとる。命題 5.18 より、 $\Phi_X(x_1) = x_2$ としてよい。 ϕ は $\theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1$ で定める。

Step 1. ϕ が well-defined な微分同相である

$\Phi_E(E_{1,x_1}) = E_{2,x_2}$ であることは簡単に示せる。ゆえに、 ϕ は well-defined である。また、

ϕ の逆写像は $\theta_1^{-1} \circ \Phi_E^{-1}|_{E_2, x_2} \circ \theta_2$ で定められるので、 ϕ は微分同相である。

Step 2. $H_2 = H_1$ であること

任意に、 $h_1 \in H_1$ をとる。

$$\rho_2(h_1)(x_2) = \rho_2(h_1)(\Phi_X(x_1)) = \Phi_X(\rho_1(h_1)(x_1)) = \Phi_X(x_1) = x_2$$

であるから、 $h_1 \in H_2$ である。逆に、任意に、 $h_2 \in H_2$ をとる。

$$\rho_1(h_2)(x_1) = \rho_1(h_2)(\Phi_X^{-1}(x_2)) = \Phi_X^{-1}(\rho_2(h_2)(x_2)) = \Phi_X^{-1}(x_2) = x_1$$

である。

Step 3. $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(h) \circ \phi$ であること

$$\begin{aligned} \phi \circ \sigma_1(h) &= \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_1, x_1} \circ \theta_1 \circ \theta_1^{-1} \circ \tau_1(h)|_{E_1, x_1} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_1, x_1} \circ \tau_1(h)|_{E_1, x_1} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau_2(h)|_{E_2, x_2} \circ \Phi_E|_{E_1, x_1} \circ \theta_1 \\ &= \theta_2^{-1} \circ \tau_2(h)|_{E_2, x_2} \circ \theta_2 \circ \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_1, x_1} \circ \theta_1 \\ &= \sigma_2(h) \circ \phi \end{aligned}$$

である。 □

命題 5.20. G をリー群、 F を空でない多様体とする。 (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, F) -作用データとする。これらは (G, F) -共役であるとする。このとき、 G -同変ファイバー束 $(G \times_{H_1} F, G/H_1, \pi_1, F, G, \rho_1, \tau_1)$ と $(G \times_{H_2} F, G/H_2, \pi_2, F, G, \rho_2, \tau_2)$ は同型である。

証明 (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, F) -共役なので、条件を満たす $g \in G$ と微分同相写像 $\phi: F \rightarrow F$ をとる。

$$\begin{array}{ccc} \Phi_E: G \times_{H_1} F & \longrightarrow & G \times_{H_2} F \\ \Psi & & \Psi \\ [g', f] & \longmapsto & [g'g^{-1}, \phi(f)] \end{array}$$

で定め、

$$\begin{array}{ccc} \Phi_X: G/H_1 & \longrightarrow & G/H_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ g'H_1 & \longmapsto & g'g^{-1}H_2 \end{array}$$

で定める。 (Φ_E, Φ_X) が G -同変ファイバー束の同型であることを示す。

Step 1. Φ_E, Φ_X が well-defined である

任意に、 $(g', f) = (g'h, \sigma_1(h^{-1})(f)) \in G \times F$ をとる。このとき、

$$[g'hg^{-1}, \phi(\sigma_1(h^{-1})(f))] = [g'g^{-1}, \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi(f)] = [g'g^{-1}, \phi(f)]$$

である。また、任意に、 $g'H_1 = g''H_1 \in G/H_1$ をとる。このとき、ある $h \in H_1$ が存在して、 $g'' = g'h$ である。また、 $ghg^{-1} \in H_2$ であるので、

$$g'g^{-1}H_2 = g'g^{-1}(ghg^{-1})H_2 = g''g^{-1}H_2$$

である。

Step 2. Φ_E, Φ_X が微分同相写像である

それぞれ逆写像は

$$\Phi_E^{-1}([g', f]) = [g'g, \phi^{-1}(f)], \quad \Phi_X^{-1}(g'H_2) = g'gH_1$$

である。これらが滑らかであることは、 $p: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ と $q: G \times F \rightarrow G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 3. Φ_E, Φ_X が G -同変ファイバー束の同型である

前のステップから Φ_E, Φ_X が G -同変ファイバー束の準同型であることを示せばよい。

$$\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$$

であることは簡単。任意に、 $g \in G$ と $[g', f] \in G \times_{H_1} F$ と $g'H_1 \in G/H_1$ をとる。

$$\Phi_E(\tau_1(g)([g', f])) = \Phi_E([gg', f]) = [gg'g^{-1}, \phi(f)] = \tau_2(g)([g'g^{-1}, \phi(f)]) = \tau_2(g)(\Phi_E([g', f]))$$

$$\Phi_X(\rho_1(g)(g'H_1)) = \Phi_X(gg'H_1) = gg'g^{-1}H_2 = \rho_2(g)(g'g^{-1}H_2) = \rho_2(g)(\Phi_X(g'H_1))$$

であり、 (Φ_E, Φ_X) が G -同変ファイバー束の同型であることが従う。 □

次を認める。

定理 5.21. M, N をなめらかな多様体、 $f : M \rightarrow N$ をランクが一定な滑らかな写像とする。このとき、 f が全単射であるならば、 f は微分同相写像である。

注意 5.22. 多様体に第 2 可算性を課す必要がある。

定理 5.23. M, N をなめらかな多様体、 G をリー群、 $\theta_1 : G \rightarrow \text{Diffeo}(M), \theta_2 : G \rightarrow \text{Diffeo}(N)$ を滑らかな作用とする。 θ_1 は推移的であるとする。 $f : M \rightarrow N$ を滑らかな写像とする。任意の $g \in G$ に対して、 $\theta_2(g) \circ f = f \circ \theta_1(g)$ が成り立つとする。このとき、 f のランクは一定である。

証明 任意に、 $x, y \in M$ をとる。 θ_1 が推移的であるので、ある $g \in G$ が存在して、 $\theta_1(g)(x) = y$ である。この時、

$$d(\theta_2(g))_{f(x)} \circ df_x = df_y \circ d\theta_1(g)_x$$

である。 $d\theta_1(g)_x, d(\theta_2(g))_{f(x)}$ は同型であるので、 df_x のランクと df_y のランクは等しい。 □

命題 5.24. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を推移的な滑らかな G 同変ファイバー束とする。 $x_0 \in X$ と微分同相写像 $\theta : F \rightarrow E_{x_0}$ をとる。[5.15](#) で得られる (G, F) -作用データを (H, σ) とする。このとき、 G -同変ファイバー束 $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ と $(G \times_H F, G/H, \pi', F, G, \tau', \rho')$ は同型である。

証明

$$\begin{array}{ccc} \Phi_E : G \times_H F & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ [g, f] & \longmapsto & \tau(g)(\theta(f)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \Phi_X : G/H & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ gH & \longmapsto & \rho(g)(x_0) \end{array}$$

とする。

Step 1. Φ_E, Φ_X が well-defined で滑らかである

任意に、 $(g, f) = (gh, \sigma(h^{-1})(f)) \in G \times F$ をとる。このとき、

$$\tau(gh)(\theta(\sigma(h^{-1})(f))) = \tau(g)(\tau(h)(\theta(\sigma(h^{-1})(f)))) = \tau(g)(\theta(f))$$

であるので、 Φ_E は well-defined である。任意に、 $gH = g'H \in G/H$ をとる。このとき、ある $h \in H$ が存在して、 $g' = gh$ である。

$$\rho(g')x_0 = \rho(gh)x_0 = \rho(g)(\rho(h)x_0) = \rho(g)x_0$$

であるので、 Φ_X は well-defined である。 Φ_X が滑らかであることは、 $p: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ が滑らかな沈めこみであることから従う。 Φ_E が滑らかであることは、 $q: G \times F \rightarrow G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 2. Φ_E, Φ_X の逆写像

Φ_E の逆写像は

$$\Phi_E^{-1}(y) = [g, \theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y))]$$

ここで、 $g \in G$ は $\rho(g)(x_0) = \pi(y)$ を満たすものである。また、 Φ_X の逆写像は

$$\Phi_X^{-1}(x') = gH$$

ここで、 $g \in G$ は $\rho(g)(x_0) = x'$ を満たすものである。これらが g の取り方によらないことを示す。まず、 Φ_E^{-1} が well-defined であることを示す。任意に、 $g, g' \in G$ で $\rho(g)(x_0) = \rho(g')(x_0) = \pi(y)$ を満たすものをとる。 $h = g^{-1}g'$ とおく。 $\rho(h)(x_0) = \rho(g^{-1}g')(x_0) = \rho(g^{-1})(\rho(g')(x_0)) = \rho(g^{-1})(\pi(y)) = x_0$ であるので、 $h \in H$ である。ゆえに、

$$\theta^{-1}(\tau(g'^{-1})(y)) = \theta^{-1}(\tau(h^{-1})\tau(g^{-1})(y)) = \sigma(h^{-1})(\theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y)))$$

である。ゆえに、

$$[g', \theta^{-1}(\tau(g'^{-1})(y))] = [gh, \sigma(h^{-1})(\theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y)))] = [g, \theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y))]$$

である。また、 Φ_X^{-1} が well-defined であることを示す。任意に、 $g, g' \in G$ で $\rho(g)(x_0) = \rho(g')(x_0) = x'$ を満たすものをとる。 $h = g^{-1}g'$ とおく。 $h \in H$ であるので、

$$g'H = ghH = gH$$

である。これらが実際に、逆写像であることを示す。 Φ_X のほうは簡単である。 Φ_E のほうは、任意に、 $[g, f] \in G \times_H F$ をとる。 $\rho(g)(x_0) = \pi(\tau(g)(\theta(f)))$ であることを用いる。

Step 3. Φ_E, Φ_X が G -同変ファイバー束の準同型である

任意に、 $[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\Phi_X(\pi'([g', f])) = \Phi_X(g'H) = \rho(g')(x_0) = \rho(g')(\pi(\theta(f))) = \pi(\tau(g')(\theta(f))) = \pi(\Phi_E([g', f]))$$

である。また、任意に、 $g \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ と $g''H \in G/H$ をとる。

$$\Phi_E(\tau'(g)([g', f])) = \Phi_E([gg', f]) = \tau(gg')(\theta(f)) = \tau(g)(\tau(g')(\theta(f))) = \tau(g)(\Phi_E([g', f]))$$

$$\Phi_X(\rho'(g)(g''H)) = \Phi_X(gg''H) = \rho(gg'')(x_0) = \rho(g)(\rho(g'')(x_0)) = \rho(g)(\Phi_X(g''H))$$

である。

Step 4. Φ_X が微分同相である

前のステップより、定理 5.23 を用いて、 Φ_X のランクは一定である。また、 Φ_X は全単射であることはすでに示したので、定理 5.21 より、 Φ_X は微分同相である。

Step 5. Φ_E は微分同相である

任意に、 $gH \in G/H$ をとる。 $p: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ は滑らかな沈めこみであるので、3.26 のステップ 1 より、ある開近傍 $gH \in V \subset G/H$ と滑らかな写像 $s: V \rightarrow G$ が存在して、

$$p \circ s = id_V$$

である。

$$\begin{array}{ccc} \xi: \pi^{-1}(\Phi_X(V)) & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ u & \longmapsto & s(\Phi_X^{-1}(\pi(u))) \end{array}$$

とする。 ξ は well-defined かつ滑らかである。これを用いて、写像

$$\begin{array}{ccc} \Xi: \pi^{-1}(\Phi_X(V)) & \longrightarrow & G \times_H F \\ \downarrow & & \downarrow \\ u & \longmapsto & [\xi(u), \theta^{-1}(\tau(\xi(u)^{-1})(u))] \end{array}$$

とすると、これが $\Phi_E|_{\pi'^{-1}(V)}: \pi'^{-1}(V) \rightarrow \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ の逆写像であることを示せば、 $gH \in G/H$ の任意性から、 Φ_E は微分同相である。まず、 Ξ が $(\pi')^{-1}(V)$ への写像とし

て well-defined であることを示す。示すことは、任意に、 $u \in \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ をとると、 $\tau(\xi(u)^{-1})(u) \in E_x$ であること、 $\pi'(\Xi(u)) \in V$ であることである。後者は簡単なので、前者を示す。

$$\begin{aligned}\pi(\tau(\xi(u)^{-1})(u)) &= \rho(\xi(u)^{-1})(\pi(u)) \\ &= \rho(\xi(u)^{-1})(\Phi_X(p(\xi(u)))) \\ &= \rho(\xi(u)^{-1})(\rho(\xi(u))(x_0)) \\ &= x_0\end{aligned}$$

であるから Ξ が $(\pi')^{-1}(V)$ への写像として well-defined である。

また、 Ξ が $\Phi_E|_{\pi'^{-1}(V)} : \pi'^{-1}(V) \rightarrow \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ の右逆写像であることは簡単である。左逆写像であることを示す。任意に、 $[g', f] \in \pi'^{-1}(V)$ をとる。

$$\begin{aligned}\Xi(\Phi_E([g', f])) &= \Xi(\tau(g')(\theta(f))) \\ &= [\xi(\tau(g')(\theta(f))), \theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f))))^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))] \\ &= [s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f))))) , \theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f))))^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))]\end{aligned}$$

である。さらに、

$$s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f))))) = s(\Phi_X^{-1}(\rho(g')(\pi(\theta(f))))) = s(\Phi_X^{-1}(\rho(g')(x_0))) = s(g'H)$$

であり、 $p(s(g'H)) = g'H = p(g)$ であるので、ある $h \in H$ が存在して、 $s(g'H) = g'h$ である。また、この h を用いて、

$$\begin{aligned}\theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f))))^{-1})(\tau(g')(\theta(f))) &= \theta^{-1}(\tau(s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f)))))^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(s(g'H)^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))) \\ &= \theta^{-1}(\tau((g'h)^{-1}g')(\theta(f))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(h^{-1})(\theta(f))) \\ &= \sigma(h^{-1})(f)\end{aligned}$$

である。よって、

$$\Xi(\Phi_E([g', f])) = [s(g'H), \sigma(h^{-1})(f)] = [g'h, \sigma(h^{-1})(f)] = [g, f]$$

である。

□

命題 5.25. G をリー群、 F を空でない多様体とする。 (H, σ) を (G, F) -作用データとする。このとき、 G -同変ファイバー束 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, G, \tau, \rho)$ について、 e を G の単位元とし、 $x_0 = eH \in G/H$ と微分同相写像 $\theta : F \rightarrow (G \times_H F)_{x_0}, f \mapsto [e, f]$ とする。命題 5.15 で得られる (G, F) -作用データ (H', σ') は (H, σ) 自身である。

証明 **Step 1.** θ が微分同相写像であること

まず、 θ が well-defined であることを示す。任意の、 $f \in F$ をとると、

$$\pi([e, f]) = eH = x_0$$

であるので、 θ は well-defined である。 θ の逆写像は

$$\theta^{-1}([g, f]) = \sigma(g)(f)$$

である。これが well-defined であることは、任意に、 $[g, f] = [gh, \sigma(h^{-1})(f)] \in (G \times_H F)_{x_0}$ をとると、

$$\sigma(gh)(\sigma(h^{-1})(f)) = \sigma(ghh^{-1})(f) = \sigma(g)(f)$$

であるから従う。これが実際に逆写像であることを示す。任意に、 $f \in F$ をとる。

$$\sigma(e)(f) = f$$

であり、任意に、 $[g, f] \in (G \times_H F)_{x_0}$ をとる。 $gH = \pi([g, f]) = x_0 = eH$ であるので、 $g \in H$ である。ゆえに、

$$[e, \sigma(g)(f)] = [g, f]$$

である。よって、この写像は well-defined であり、 θ の逆写像である。これらが滑らかであることは、命題 6.16 のように、 $q : G \times F \rightarrow G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 2. $H' = H$ と、 $\sigma' = \sigma$ であること

$$H' = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\} = \{g \in G \mid gH = H\} = H$$

である。また、任意に、 $h \in H$ と $f \in F$ をとる。

$$\begin{aligned}\sigma'(h)(f) &= \theta^{-1}(\tau(h)|_{(G \times_H F)_{x_0}}(\theta(f))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(h)([e, f])) \\ &= \theta^{-1}([h, f]) \\ &= \sigma(h)(f)\end{aligned}$$

である。

□

定理 5.26 (推移的 G 同変ファイバー束の分類定理). G をリー群、 F を空でない多様体とする。

$$\frac{\{ \text{底空間が空でない推移的な } F \text{ をファイバーとする } G \text{ 同変ファイバー束} \}}{G \text{ 同変の同型}}$$

と

$$\frac{\{(G, F)\text{-作用データ}\}}{(G, F)\text{-共役}}$$

との間に自然な一対一対応が存在する。これは命題 6.16 と、命題 5.15 から得られる。

証明 命題 5.18 と命題 5.19 と命題 5.20 と命題 5.24 と命題 5.25 から従う。

□

5.3 G 同変と圏同値

定義 5.27. $(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho)$ を G -同変ファイバー束とする。これと基点 $x_0 \in X$ と微分同相 $\theta: F \rightarrow E_{x_0}$ の組 $(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta)$ を基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束という。 $(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta)$ と $(E', \pi', X', F, G, \tau', \rho'; x'_0, \theta')$ を基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束とする。 (Φ_E, Φ_X) が基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束の準同型であるとは、 (Φ_E, Φ_X) が G -同変ファイバー束の準同型であり、かつ $\Phi_X(x_0) = x'_0$ であり、 $\Phi_E \circ \theta = \theta'$ であることをいう。

定義 5.28. 多様体 F と Lie 群 G を固定する。基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束の圏 $\text{EqFib}_*(G, F)$ を、対象を基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束とし、射を基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束の準同型とする圏とする。合成は $(\Phi'_E, \Phi'_X) \circ (\Phi_E, \Phi_X) := (\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ で定める。

注意 5.29. 命題 5.9 により、この圏はうまく定まっていて、射 (Φ_E, Φ_X) がこの圏において同型であることと、 Φ_E, Φ_X が微分同相写像であることは同値である。

定義 5.30. 多様体 F と Lie 群 G を固定する。 (G, F) -作用データの圏 $\text{Act}(G, F)$ を、対象を (G, F) -作用データとし、対象 (H, σ) と (H', σ') の間の射は $H \subset H'$ かつ $\sigma'|_H = \sigma$ であるときただ 1 つ存在するとする。

命題 5.31. 圏手 $\mathcal{A}: \text{EqFib}_*(G, F) \rightarrow \text{Act}(G, F)$ が次で定まる。対象の変換は 5.15 で与えられる。射の変換は、基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束の準同型 $(\Phi_E, \Phi_X): (E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta) \rightarrow (E', \pi', X', F, G, \tau', \rho'; x'_0, \theta')$ に対して、ただ 1 つ存在する射 $(H, \sigma) \rightarrow (H', \sigma')$ を対応させる。

証明 射の変換が定まることを示す。示すことは以下の 2 つである。

- (1) $H \subset H'$ である。
- (2) $\sigma'|_H = \sigma$ である。

まず、 $H \subset H'$ であることを示す。任意の $h \in H$ をとる。 $H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$ で

あるから、 $\rho(h)(x_0) = x_0$ である。また、 $\Phi_X(x_0) = x'_0$ であるから、

$$\rho'(h)(x'_0) = \rho'(h)(\Phi_X(x_0)) = \Phi_X(\rho(h)(x_0)) = \Phi_X(x_0) = x'_0$$

である。よって、 $h \in H'$ である。次に、 $\sigma'|_H = \sigma$ であることを示す。任意の $h \in H$ と $f \in F$ をとる。

$$\sigma'(h)(f) = \theta'^{-1}(\tau'(h)(\theta'(f))) = \theta'^{-1}(\Phi_E(\tau(h)(\theta(f)))) = \theta'^{-1}(\Phi_E(\theta(\sigma(h)(f)))) = \sigma(h)(f)$$

よって、 $\sigma'|_H = \sigma$ である。射の変換が定まったことを示した。射の変換が恒等射を恒等射に写すことと、射の合成を保つことは簡単に示せる。 $\square$

命題 5.32. 圏手 $\mathcal{B} : \text{Act}(G, F) \rightarrow \text{EqFib}_*(G, F)$ が次で定まる。対象の変換は $(H, \sigma) \mapsto (G \times_H F, G/H, \pi, F, G, \tau, \rho; eH, \theta)$ で定まる。ただし、 $\theta : F \rightarrow (G \times_H F)_{eH}$ は $\theta(f) = [e, f]$ で定まる。射の変換は、 $(H, \sigma) \rightarrow (H', \sigma')$ に対して、 $\Phi_E : G \times_H F \rightarrow G \times_{H'} F, [g, f] \mapsto [g, f]$ と $\Phi_X : G/H \rightarrow G/H', gH \mapsto gH'$ で定まる。

証明 **Step 1.** θ が微分同相であること

aaa

Step 2. Φ_E は well-defined

aaa

Step 3. Φ_X は well-defined

aaa

Step 4. (Φ_E, Φ_X) は基点付き G -同変ファイバー束の準同型

aaa

Step 5. 恒等射と射の合成を保つ

aaaa

$\square$

命題 5.33. 圏手 $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ は圏同値である。

証明 $\text{EqFib}_*(G, F)$ の対象 $(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta)$ に対して、 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta)) = (G \times_H F, G/H, \pi', F, G, \tau', \rho'; eH, \theta')$ である。

$$\begin{array}{ccc} \Phi_E: G \times_H F & \longrightarrow & E \\ \Psi & & \Psi \\ [g, f] & \longmapsto & \tau(g)(\theta(f)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \Phi_X: G/H & \longrightarrow & X \\ \Psi & & \Psi \\ gH & \longmapsto & \rho(g)(x) \end{array}$$

とする。

Step 1. $\mathcal{A} \circ \mathcal{B} \cong id_{\text{Act}(G, F)}$

aaa

Step 2. (Φ_E, Φ_X) は welldefined で、基点付き G -同変ファイバー束の同型

aaa

Step 3. $\{(\Phi_E, \Phi_X)\}_{(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta)}$ が圏手 $\mathcal{B}\mathcal{A}$ と $id_{\text{EqFib}_*(G, F)}$ の間の自然同型を与える

aaa

□

定義 5.34. G をリー群、 F を空でない多様体とする。

この時、対象を等質 G ファイバー束、射をファイバーだけを固定する滑らかな作用付きファイバー束の準同型とすると、圏が得られる。これを $\text{AFib}(G, F)$ と表す。(5.7 参照)

命題 5.35. 関手 $\text{EqFib}_*(G, F) \rightarrow \text{AFib}(G, F)$ を次で定める。対象は (G, F) -作用データ (H, σ) を経由して $(E, \pi, X, F, G, \tau, \rho; x_0, \theta) \rightarrow (G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ である。射は、基点とファイバーの変換付き G -同変ファイバー束の準同型 (Φ_E, Φ_X) を $(\widetilde{\Phi_E}, \widetilde{\Phi_X}, \widetilde{\Phi_H})$ に対応させる。ただし、 (Φ_E, Φ_X) の定義域は $(E_1, \pi_1, X_1, F, G, \tau_1, \rho_1; x_1, \theta_1)$ で、終域は $(E_2, \pi_2, X_2, F, G, \tau_2, \rho_2; x_2, \theta_2)$ とするとき、

$$\begin{array}{ccc}
\widetilde{\Phi_E}: G \times_{H_1} F & \longrightarrow & G \times_{H_2} F \\
\downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\
[g, f]_{H_1} & \longmapsto & [g, (\theta_2^{-1} \circ (\Phi_E)|_{(E_1)_{x_1}} \circ \theta_1) f]_{H_2} \\
\\
\widetilde{\Phi_X}: G/H_1 & \longrightarrow & G/H_2 \\
\downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\
gH_1 & \longmapsto & gH_2 \\
\\
\widetilde{\Phi_H}: H_1 & \longrightarrow & H_2 \\
\downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\
h & \longmapsto & h
\end{array}$$

である。

5.4 等質 G -多様体の分類定理

補題 5.36. $SU(2)$ は $GL(2, \mathbb{C})$ の閉部分群である。特に、 $SU(2)$ は正則部分 Lie 群である。また、 $SO(2)$ は $GL(2, \mathbb{R})$ の閉部分群である。特に、 $SO(2)$ は正則部分 Lie 群である。

定義 5.37. X を滑らかな多様体とする。 G を Lie 群とする。 $\rho: G \rightarrow \text{Diffeo}(X)$ を滑らかな作用とする。 (X, ρ) が等質 G -多様体であるとは、 ρ が推移的であることをいう。

例 5.38. (S^{n-1}, ρ) は等質 $SO(n)$ -多様体である。ただし、 $\rho: SO(n) \rightarrow \text{Diffeo}(S^{n-1}), A \rightarrow (v \rightarrow Av)$ である。

証明 まず、 S^{n-1} は $\mathbb{R}^n$ の正則部分多様体で、 $SO(n)$ は $n \times n$ 実行列全体の正則部分多様体なので、 ρ は滑らかな作用である。 ρ が推移的であることを示す。任意に、 $v, w \in S^{n-1}$ をとる。ここで、 $v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_n$ をとり、 $v, v_1, v_2, \dots, v_n$ 及び、 $w, w_1, w_2, \dots, w_n$ が正規直交基底をなすようにする。したがって、 $A \in SO(n)$ を $Av = w, Av_1 = w_1, \dots, Av_n = w_n$ となるようにとる。ただしここで、必要なら w_n を -1 倍する。 □

例 5.39. 複素正方行列 A に対して、 $A^\dagger$ は共役転置とする。

$$\mathcal{S} = \left\{ A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A^\dagger = A, \text{trace} A = 0, A^2 = I_2 \right\}$$

とし、

$$\begin{array}{ccc} \iota: & S^2 & \longrightarrow & \mathcal{S} \\ & \Downarrow & & \Downarrow \\ & (x, y, z) & \longmapsto & \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix} \end{array}$$

とする。これは全単射である。これを用いて作用

$$\begin{array}{ccc} \rho': & SU(2) & \longrightarrow & \text{Diffeo}(S^2) \\ & \Downarrow & & \Downarrow \\ & A & \longmapsto & (v \rightarrow \iota^{-1}(A\iota(v)A^\dagger)) \end{array}$$

がうまく定まる。この時、 (S^2, ρ') は等質 $SU(2)$ -多様体である。

証明 ι は well-defined であることは簡単である。 ι^{-1} は $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ に対して、 $(\Re c, \Im c, a) \in S^2$ とすることで得られる。次に、 ρ' が well-defined であることを示す。任意に、 $A \in \mathrm{SU}(2), v \in S^2$ をとる。 $A\iota(v)A^\dagger \in \mathcal{S}$ を示す。簡単なので略。 S^2 は $\mathbb{R}^3$ の正則部分多様体で、 $\mathrm{SU}(2)$ は 2×2 複素行列全体の正則部分多様体なので、 ρ' は滑らかな作用である。最後に、 ρ' が推移的であることを示す。任意に、 $v_1, v_2 \in S^2$ をとる。 $j \in 1, 2$ をとる。 $\iota(v_j)$ の固有値を考える。 $\iota(v_j)^2 = I_2$ であるから固有値は ± 1 に限り、 $\mathrm{trace}(\iota(v_j)) = 0$ であるから、固有値は $1, -1$ である。ここで、エルミート行列 $\iota(v_j)$ を対角化して、ある $U_j \in \mathrm{U}(2)$ を取って、 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とすると、

$$\iota(v_j) = U_j \Lambda U_j^\dagger$$

である。さらにここで、必要なら -1 倍することで、 $U_j \in \mathrm{SU}(2)$ とできる。 $A := U_2 U_1^\dagger \in \mathrm{SU}(2)$ と置くと、

$$A\iota(v_1)A^\dagger = A(U_1 \Lambda U_1^\dagger)A^\dagger = U_2 \Lambda U_2^\dagger = \iota(v_2)$$

であるから、

$$\rho'(A)(v_1) = \iota^{-1}(A\iota(v_1)A^\dagger) = \iota^{-1}(\iota(v_2)) = v_2$$

である。 □

命題 5.40. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を推移的な G -同変ファイバー束とする。この時、 (X, ρ) は等質 G -多様体であり、逆に、一点空間 $\{*\}$ を固定したときに、任意の等質 G -多様体 (X, ρ) に対して、ある推移的な G -同変ファイバー束 $(E, X, \pi, \{*\}, G, \tau, \rho)$ が同型を除いて一意に存在する。

証明 存在は $E = X, \pi = id_X, \tau = \rho$ とすればよい。一意性は底空間の同型を id_X とし、全空間の同型を π を経由して底空間の同型から引き上げることで得られる。 □

定義 5.41. (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) を等質 G -多様体とする。 $f : X_1 \rightarrow X_2$ を滑らかな写像とする。 f が G -同変であるとは、任意の $g \in G$ に対して、

$$f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$$

であることをいう。 f が微分同相写像であり、かつ f が G -同変であるとき、 f を G -同変微分同相写像という。 また、 (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) が G -同変同型であるとは、ある G -同変微分同相写像 $f : X_1 \rightarrow X_2$ が存在することをいう。

命題 5.42. (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) を等質 G -多様体とする。 このとき、 (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) が G -同変同型であることと、命題 5.40 により得られる推移的な G -同変ファイバー束 $(E_1, X_1, \pi_1, \{*\}, G, \tau_1, \rho_1)$ と $(E_2, X_2, \pi_2, \{*\}, G, \tau_2, \rho_2)$ が G -同変ファイバー束の同型であることは同値である。

命題 5.43. G を *Lie* 群とする。 $F = \{*\}$ を一点空間とする。 この時、 (G, F) -作用データ (H, σ) は、 G の閉部分群 H と、 H の自明な作用 $\sigma : H \rightarrow \text{Diffeo}(F)$ により決定される。 また、 (G, F) -作用データ (H, σ) と (G, F) -作用データ (H', σ') が同型であることと、 H と H' が共役であることは同値である。

定理 5.44 (等質 G -多様体の分類定理). G を *Lie* 群とする。

$$\frac{\{\text{空でない等質 } G \text{ 多様体}\}}{G \text{ 同変同型}}$$

と

$$\frac{\{G \text{ の閉部分群}\}}{\text{共役}}$$

の間には自然な一対一対応が存在する。 この対応は定理 5.26 と命題 5.40 と命題 5.43 により与えられる。 さらにこれはイソトロピー部分群をとる操作と、 G の閉部分群 H から等質 G -多様体 G/H を構成する操作から誘導される。

証明 定理 5.26 と命題 5.40 と命題 5.42 と命題 5.43

□

例 5.45. 等質 $\mathrm{SO}(n)$ -多様体 (S^{n-1}, ρ) について、 $e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in S^{n-1}$ とする。このとき、 $\mathrm{SO}(n)$ の e_1 におけるイソトロピー部分群は

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(n) \mid A \in \mathrm{SO}(n-1) \right\}$$

である。よって、定理 5.44 により、

$$S^{n-1} \cong \mathrm{SO}(n)/H$$

である。

例 5.46. 等質 $\mathrm{SU}(2)$ -多様体 (S^2, ρ') について、 $e_3 = (0, 0, 1) \in S^2$ とする。このとき、 $\mathrm{SU}(2)$ の e_3 におけるイソトロピー部分群は

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2) \mid w \in S^1 \right\}$$

である。よって、定理 5.44 により、

$$S^2 \cong \mathrm{SU}(2)/H$$

である。

5.5 トートロジカル線束

例 5.47. $\mathbb{C}P^1 := \{l \subset \mathbb{C}^2 \mid l \text{ は複素 } 1 \text{ 次元線形部分空間} \}$ は全射 $\pi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}P^1, (z_0 : z_1) \mapsto [z_0 : z_1]$ により商位相を入れる。 $U_0 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_0 \neq 0\}$ と $U_1 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_1 \neq 0\}$ の 2 つの開集合で被覆され、

$$\begin{cases} \varphi_0 : U_0 \rightarrow \mathbb{C}, [z_0 : z_1] \mapsto z_1/z_0 \\ \varphi_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{C}, [z_0 : z_1] \mapsto z_0/z_1 \end{cases}$$

により、 C^∞ 級多様体構造が入る。これは作用を

$$\begin{array}{ccc} \rho : \mathrm{SU}(2) & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(\mathbb{C}P^1) \\ \Psi & & \Psi \\ A & \longmapsto & (l \mapsto Al) \end{array}$$

により定めると、 $(\mathbb{C}P^1, \rho)$ は等質 $\mathrm{SU}(2)$ -多様体である。これを複素射影直線と呼ぶ。

証明 Step 1. 多様体であること

ハウスドルフ性は略する。第 2 加算公理は π が開写像であることから従う。 φ_0 の逆写像は $\varphi_0^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow U_0, z \mapsto [1 : z]$ であり、 φ_1 の逆写像は $\varphi_1^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow U_1, z \mapsto [z : 1]$ である。 φ_0 と φ_1 は同相である。また、 $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto 1/z$ と $\varphi_0 \circ \varphi_1^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto 1/z$ は滑らかである。

Step 2. π が滑らかな沈めこみであること

π は滑らかな写像であることは $(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, (z_0, z_1) \mapsto z_1/z_0$ と $\mathbb{C} \times (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{C}, (z_0, z_1) \mapsto z_0/z_1$ が滑らかであることから従う。前者の写像は $z_0 = x_0 + iy_0, z_1 = x_1 + iy_1$ とおき、 $r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ とおくと、 $(x_0 + iy_0, x_1 + iy_1) \mapsto (x_1x_0 + y_1y_0)/r^2 + i(x_1y_0 - y_1x_0)/r^2$ であり、この写像の微分は

$$\begin{pmatrix} \frac{y_1^2 - y_0^2}{r^4} & \frac{2x_0y_0}{r^4} & \frac{x_0}{r^2} & \frac{y_0}{r^2} \\ \frac{2x_0y_0}{r^4} & \frac{x_0^2 - y_0^2}{r^4} & \frac{y_0}{r^2} & -\frac{x_0}{r^2} \end{pmatrix}$$

であり、 $z_0 \neq 0$ のとき、ランクは 2 である。また同様に、後者の写像の微分も $z_1 \neq 0$ のとき、ランク 2 である。よって、 π は滑らかな沈めこみである。

Step 3. 作用が滑らかであること

まえのステップで、 π が全射滑らかな沈めこみであることを示した。その普遍性から作用は滑らかである。

Step 4. 推移的であること

任意に、 $l_1, l_2 \in \mathbb{C}P^1$ をとる。ここで、 $l_1 = \mathbb{C}v_1, l_2 = \mathbb{C}v_2$ で、 $|v_1| = |v_2| = 1$ となるように、 v_1, v_2 をとる。ここで、 $v'_1, v'_2 \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ をとり、 v_1, v'_1 と v_2, v'_2 がそれぞれ $\mathbb{C}^2$ の正規直交基底をなすようにとる。 $A \in \mathrm{SU}(2, \mathbb{C})$ を、 $Av_1 = v_2, Av'_1 = v'_2$ を満たすようにとる。ただしここで、 $\det(A) = 1$ となるように、必要なら v'_2 を -1 倍する。このとき、 $\rho(A)(l_1) = Al_1 = \mathbb{C}Av_1 = \mathbb{C}v_2 = l_2$ である。 $\square$

例 5.48. $T_{2,1} := \{(l, v) \in \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}^2 \mid v \in l\}$ について、 $E_0 := T_{2,1} \cap (U_0 \times \mathbb{C}^2)$ と $E_1 := T_{2,1} \cap (U_1 \times \mathbb{C}^2)$ の 2 つの開集合で被覆され、

$$\begin{cases} \psi_0 : E_0 \rightarrow \mathbb{C}^2, ([1 : z], (w, wz)) \mapsto (z, w) \\ \psi_1 : E_1 \rightarrow \mathbb{C}^2, ([z : 1], (wz, w)) \mapsto (z, w) \end{cases}$$

により、 C^∞ 級多様体構造が入る。これは作用を

$$\begin{array}{ccc} \tau : \mathrm{SU}(2) & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(T_{2,1}) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ A & \longmapsto & ((l, v) \mapsto (Al, Av)) \end{array}$$

により定めると、これは滑らかな作用である。

証明 **Step 1.** 多様体であること

ハウスドルフ性と第 2 加算公理は有限直積と部分空間に遺伝する。 ψ_0 の逆写像は $\psi_0^{-1} : \mathbb{C}^2 \rightarrow E_0, (z, w) \mapsto ([1 : z], (w, wz))$ であり、 ψ_1 の逆写像は $\psi_1^{-1} : \mathbb{C}^2 \rightarrow E_1, (z, w) \mapsto ([z : 1], (wz, w))$ である。 ψ_0 と ψ_1 は同相である。 $\psi_1 \circ \psi_0^{-1} : (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \rightarrow (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C}, (z, w) \mapsto (1/z, wz)$ と $\psi_0 \circ \psi_1^{-1} : (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \rightarrow (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C}, (z, w) \mapsto (1/z, w/z)$ は滑らかである。

Step 2. 作用が滑らかであること

チャートを使って、作用

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SU}(2) \times T_{2,1} & \longrightarrow & T_{2,1} \\ \Psi & & \Psi \\ (A, (l, v)) & \longmapsto & (Al, Av) \end{array}$$

を局所表示した表が下である。ただし $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とした。

始点	終点	局所表示
$\mathrm{SU}(2) \times E_0$	$E_0 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([1 : z], (w, wz))) \rightarrow \left(\frac{c + dz}{a + bz}, w(a + bz) \right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_0$	$E_1 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([1 : z], (w, wz))) \rightarrow \left(\frac{a + bz}{c + dz}, w(c + dz) \right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_1$	$E_1 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([z : 1], (wz, w))) \rightarrow \left(\frac{az + b}{cz + d}, w(cz + d) \right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_1$	$E_0 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([z : 1], (wz, w))) \rightarrow \left(\frac{cz + d}{az + b}, w(az + b) \right)$

これは滑らかであるから示された。

□

例 5.49. $\pi : T_{2,1} \rightarrow \mathbb{CP}^1, (l, v) \mapsto l$ とする。このとき、 $(T_{2,1}, \pi, \mathbb{CP}^1, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ は推移的な $\mathrm{SU}(2)$ -同変ファイバー束である。

証明 局所自明化は $(\varphi_0^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_0$ と $(\varphi_1^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_1$ である。任意に、 $A \in \mathrm{SU}(2)$ と $(l, v) \in T_{2,1}$ をとる。

$$\pi(\tau(A)(l, v)) = \pi(Al, Av) = Al = \rho(A)(l) = \rho(A)(\pi(l, v))$$

である。

□

定義 5.50 (トートロジカル線束). $(T_{2,1}, \pi, \mathbb{CP}^1, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ をトートロジカル線束と呼ぶ。

補題 5.51.

$$\begin{array}{ccc} i: S^1 & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ \Psi & & \Psi \\ w & \longmapsto & \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \end{array}$$

は *Lie* 群の埋め込みである。

証明 任意の $w \in S^1$ に対して、

$$\begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2)$$

である。また、 $\tilde{i}: \mathbb{C} \rightarrow M(2, \mathbb{C}), z \mapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix}$ は滑らかである。 S^1 は $\mathbb{C}$ の正則部分多様体で、 $\mathrm{SU}(2)$ は $M(2, \mathbb{C})$ の正則部分多様体なので、 i は滑らかである。また、 i は単射である。また、簡単に、 i が群準同型であることがわかる。また、 i の逆写像は $\mathrm{SU}(2) \rightarrow S^1, \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \mapsto w$ であり、連続である。最後に、 i は各点での微分が単射であることを示す。 $\tilde{i}$ は実線形写像であるので、 $\tilde{i}$ の微分は $\tilde{i}$ 自身と同一視できる。これは単射である。ゆえに、 i も各点での微分が単射である。 $\square$

例 5.52. 定理 5.26 により、トートロジカル線束 $(T_{2,1}, \pi, \mathbb{C}P^1, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ は *Hopf* ファイバー束 $(\mathrm{SU}(2), \mathrm{SU}(2)/S^1, \varpi, S^1, \cdot)$ と作用

$$\begin{array}{ccc} \sigma: S^1 & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(\mathbb{C}) \\ \Psi & & \Psi \\ w & \longmapsto & (z \rightarrow wz) \end{array}$$

に対する同伴束 $(\mathrm{SU}(2) \times_{S^1} \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2)/S^1, \pi', \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau', \rho')$ と同型である。

注意 5.53.

$$\begin{array}{ccc} i: S^1 & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ \Psi & & \Psi \\ w & \longmapsto & \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \end{array}$$

この i は Lie 群の埋め込みである。これを用いて、 S^1 を $SU(2)$ の閉部分群とみなしている。

証明 $[1 : 0] \in \mathbb{C}P^1$ をとる。 $E_{[1:0]} := \pi^{-1}([1 : 0])$ をとる。

$$\begin{array}{ccc} \theta: \mathbb{C} & \longrightarrow & E_{[1:0]} \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & \Psi \\ w & \longmapsto & ([1 : 0], (w, 0)) \end{array}$$

とする。 θ は微分同相である。この時、命題 5.15 により、 $(SU(2), \mathbb{C})$ -作用データ (H, σ) が得られる。

$$\begin{aligned} H &= \{A \in SU(2) \mid A[1 : 0] = [1 : 0]\} \\ &= \{A \in SU(2) \mid A(1, 0)^T = w(1, 0)^T, w \in S^1\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \mid w \in S^1 \right\} \\ &\cong S^1 \end{aligned}$$

である。また、 $\sigma : H \rightarrow \text{Homeo}(\mathbb{C})$ は任意の $A = \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \bar{w} \end{pmatrix} \in H (w \in S^1)$ と $z \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned} \sigma(A)(z) &= \theta^{-1}(\tau(A)(\theta(z))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(A)([1 : 0], (z, 0))) \\ &= \theta^{-1}([1 : 0], (wz, 0)) \\ &= wz \end{aligned}$$

である。 □

6 等質ベクトル束

6.1 ベクトル束 (再掲含む)

定義 6.1. (E, X, π, V) をファイバー束とし、 V は位相体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間であるとする。 $\text{Aut}(V)$ を V の位相ベクトル空間としての自己同型全体の集合とする。この時、開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ とその上の局所自明化 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ について、各 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数の値域が $\text{Aut}(V)$ に含まれるとき、 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を G -Atlas と呼ぶ。 $\mathcal{A}$ を極大 G -Atlas とする。 $(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ をベクトル束 (その 1) と呼ぶ。また、ベクトル束 (その 1) の次元とは、 V の次元をいう。

さらに、 (E, X, π, V) が滑らかなファイバー束で、 V が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、 V の多様体構造は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間の多様体構造であり、極大 G -Atlas の各局所自明化が微分同相写像であるとき、 $(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ を滑らかなベクトル束と呼ぶ。

定義 6.2. (E, X, π, V) をファイバー束とし、 V は位相体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間であるとする。 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x \in X})$ がベクトル束 (その 2) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- 各、 $x \in X$ に対して $E_x := \pi^{-1}(x)$ は、 $+_x$ と $\cdot_x$ を加法とスカラー倍とする位相ベクトル空間である。
- X の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ と、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times V$ が存在して、 $pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ かつ、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、 $\psi_\alpha^y : E_y \rightarrow V$ はベクトル空間同型である。

また、ベクトル束 (その 2) の次元とは、 V の次元をいう。

さらに、 (E, X, π, V) が滑らかなファイバー束で、 V が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、 V の多様体構造は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間の多様体構造であり、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times V$ が微分同相写像である場合、 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x \in X})$ を滑らかなベクトル束 (その 2) と呼ぶ。(この時自動的に、 $+_x$ と $\cdot_x$ は滑らかである。)

定理 6.3. ベクトル束 (その 1) $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ の各点 $x \in X$ に対して、 $x \in U_\alpha$ なる $\alpha \in \Lambda$ をとる。この時、同相写像 $\psi_\alpha^x : E_x \rightarrow V$ を用いて、 E_x に V の位相ベクトル空間構造を引き戻すことにより、 E_x は位相ベクトル空間となる。これは α の取り方に依らない。またこれにより、 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x \in X})$ はベクトル束 (その 2) となる。逆に、ベクトル束 (その 2) $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x \in X})$ に対して、

$$\mathcal{A} := \{(U_{\bar{\alpha}}, \psi_{\bar{\alpha}})_{\bar{\alpha} \in \bar{\Lambda}} : \text{局所自明化} \mid \forall y \in U_{\bar{\alpha}}, \psi_{\bar{\alpha}}^y : E_y \rightarrow V \text{ はベクトル空間同型} \}$$

と定めると、 $(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ はベクトル束 (その 1) となる。これらは互いに逆の対応である。滑らかなベクトル束の場合も同様である。

証明 命題 2.48 から、定理 2.55 までから成り立つ。 □

これによりこれ以降、ベクトル束 (その 1) とベクトル束 (その 2) は単にベクトル束と呼ぶことにし、同一視する。

例 6.4. 例 5.50 は、 $T_{2,1} := \{(l, v) \in \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}^2 \mid v \in l\}$ について、 $E_0 := T_{2,1} \cap (U_0 \times \mathbb{C}^2)$ と $E_1 := T_{2,1} \cap (U_1 \times \mathbb{C}^2)$ の 2 つの開集合で被覆され、 $(U_0 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_0 \neq 0\}, U_1 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_1 \neq 0\})$ 局所自明化

$$\begin{cases} \psi'_0 : E_0 \rightarrow U_0 \times \mathbb{C}, ([1 : z], (w, wz)) \mapsto ([1 : z], w) \\ \psi'_1 : E_1 \rightarrow U_1 \times \mathbb{C}, ([z : 1], (wz, w)) \mapsto ([z : 1], w) \end{cases}$$

である。(これは以前の $(\varphi_0^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_0$ と $(\varphi_1^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_1$ と同じである。) この時、変換関数は

$$\varphi'_{1,0} : U_0 \cap U_1 \rightarrow \text{Homeo}(\mathbb{C}), [1 : z] \mapsto (w \mapsto wz)$$

である。この時、任意の $[1 : z] \in U_0 \cap U_1$ に対して、 $\varphi'_{1,0}([1 : z]) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ は実線形写像である。よって、 $\{\psi'_0, \psi'_1\}$ は $\text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ -Atlas であり、それを含む極大 G -Atlas を $\mathcal{A}$ とすると、 $(T_{2,1}, \mathbb{C}P^1, \pi, \mathbb{C}, \mathcal{A})$ は滑らかなベクトル束である。さらに、この時の、各点 $[1 : z] \in U_0$ に対して、 $E_{[1:z]} := \pi^{-1}([1 : z])$ 上の加法 $+_{[1:z]}$ とスカラー倍 $\cdot_{[1:z]}$ は、

$$\begin{array}{ccc} +_{[1:z]} & E_{[1:z]} \times E_{[1:z]} & \longrightarrow E_{[1:z]} \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & (([1 : z], (w_1, w_1z)), ([1 : z], (w_2, w_2z))) & \longmapsto ([1 : z], (w_1 + w_2, (w_1 + w_2)z)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \cdot_{[1:z]} & \mathbb{R} \times E_{[1:z]} & \longrightarrow E_{[1:z]} \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & (\lambda, ([1 : z], (w, wz))) & \longmapsto ([1 : z], (\lambda w, (\lambda w)z)) \end{array}$$

である。また、各点 $[z : 1] \in U_1$ に対して、 $E_{[z:1]} := \pi^{-1}([z : 1])$ 上の加法 $+_{[z:1]}$ とスカラー倍 $\cdot_{[z:1]}$ は、

$$\begin{array}{ccc} +_{[z:1]} & E_{[z:1]} \times E_{[z:1]} & \longrightarrow E_{[z:1]} \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & ([z : 1], (w_1z, w_1)), ([z : 1], (w_2z, w_2)) & \longmapsto ([z : 1], ((w_1 + w_2)z, w_1 + w_2)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \cdot_{[z:1]} & \mathbb{R} \times E_{[z:1]} & \longrightarrow E_{[z:1]} \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & (\lambda, ([z : 1], (wz, w))) & \longmapsto ([z : 1], ((\lambda w)z, \lambda w)) \end{array}$$

である。

命題 6.5. $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ を有限次元ベクトル束とする。このとき、 $\sigma : \text{Aut}(V) \rightarrow \text{Homeo}(V)$ を包含写像とする。命題 4.5 と、命題 4.16 より定まる変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$ を用いて、 $(E, X, \pi, V, \text{Aut}(V), \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ は構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) となる。また逆に、構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) $(E, X, \pi, V, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ に対して、 V が位相体 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間であり、 $\sigma(G) \subset \text{Aut}(V)$ であるとき、 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ はベクトル束となる。滑らかな場合も同様である。

証明 命題 3.2 から従う。また、滑らかな場合は命題 2.26 から従う。逆に関しては簡単である。 $\square$

定義 6.6. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_{1,\alpha_1}, \psi_{1,\alpha_1})\}_{\alpha_1 \in \Lambda_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(U_{2,\alpha_2}, \psi_{2,\alpha_2})\}_{\alpha_2 \in \Lambda_2})$ を有限次元ベクトル束とする。 $\text{End}(V)$ を V の位相ベクトル空間としての自己準同型全体の集合とする。これは行列全体の集合と同一視され、位相空間である。このとき、連続写像 $\Phi_E : E_1 \rightarrow E_2$ と $\Phi_X : X_1 \rightarrow X_2$ について、 (Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 (その 1) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- $\Phi_X \circ \pi_1 = \pi_2 \circ \Phi_E$ が成り立つ。

•

$$\begin{array}{ccc} \eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi U_{1, \alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2, \alpha_2}) & \longrightarrow & \text{End}(V) \\ \Psi & & \Psi \\ x & \longmapsto & \psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1}^x)^{-1} \end{array}$$

が well-defined である。

また、 (Φ_E, Φ_X) が同型 (その 1) であるとは、上の条件に加えて、 Φ_E と Φ_X が同相写像であることをいう。滑らかなベクトル束の場合は、 Φ_E, Φ_X の滑らかさを要求する。

定義 6.7. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(+_{x_1}, \cdot_{x_1})\}_{x_1 \in X_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(+_{x_2}, \cdot_{x_2})\}_{x_2 \in X_2})$ をベクトル束とする。このとき、連続写像 $\Phi_E : E_1 \rightarrow E_2$ と $\Phi_X : X_1 \rightarrow X_2$ について、 (Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 (その 2) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- $\Phi_X \circ \pi_1 = \pi_2 \circ \Phi_E$ が成り立つ。
- 任意の $x_1 \in X_1$ に対して、 $\Phi_E|_{\pi_1^{-1}(x_1)} : \pi_1^{-1}(x_1) \rightarrow \pi_2^{-1}(\Phi_X(x_1))$ はベクトル空間準同型である。(well-defined は 1.21 からわかっている。)

また、 (Φ_E, Φ_X) が同型 (その 2) であるとは、上の条件に加えて、 Φ_E と Φ_X が同相写像であることをいう。滑らかなベクトル束の場合は、 Φ_E, Φ_X の滑らかさを要求する。

定理 6.8. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_{1,\alpha_1}, \psi_{1,\alpha_1})\}_{\alpha_1 \in \Lambda_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(U_{2,\alpha_2}, \psi_{2,\alpha_2})\}_{\alpha_2 \in \Lambda_2})$ を有限次元ベクトル束とする。 (Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 (その 1) であることと、ベクトル束の準同型 (その 2) であることは同値である。これは滑らかなベクトル束の場合も同様である。

証明 滑らかなベクトル束の場合はそうとは限らない場合から自動的に従う。

Step 1. ベクトル束の準同型 (その 1) $\Rightarrow$ ベクトル束の準同型 (その 2)

各 $x \in X_1$ に対して、 $\alpha_1 \in \Lambda_1$ と $\alpha_2 \in \Lambda_2$ をとって、 $x \in U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2})$ とする。 $\eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi(x)$ は線形であり、 $\psi_{\alpha_1}^x$ と $\psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)}$ は位相ベクトル空間同型であるので、 $\Phi_E|_{E_{1,x}} : E_{1,x} \rightarrow E_{2,\Phi_X(x)}$ は位相ベクトル空間準同型である。

Step 2. ベクトル束の準同型 (その 2) $\Rightarrow$ ベクトル束の準同型 (その 1)

任意に、 $\alpha_1 \in \Lambda_1$ と $\alpha_2 \in \Lambda_2$ と、 $x \in U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2})$ をとる。

$$\psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1}^x)^{-1}$$

が線形であることは、 $\Phi_E|_{E_{1,x}} : E_{1,x} \rightarrow E_{2,\Phi_X(x)}$ が位相ベクトル空間準同型で、 $\psi_{\alpha_1}^x : E_{1,x} \rightarrow V$ と $\psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)} : E_{2,\Phi_X(x)} \rightarrow V$ が位相ベクトル空間同型であることからわかる。ゆえに、 $\eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi$ は well-defined である。 $\square$

これより、これ以降、ベクトル束の準同型 (その 1) とベクトル束の準同型 (その 2) は単にベクトル束の準同型と呼ぶことにし、同一視する。

命題 6.9. 有限次元ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) について、 $\eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi$ は連続である。また、滑らかなベクトル束の準同型の場合は滑らかである。

証明 $\eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi$ が連続であることを示す。

$$\begin{array}{ccc} U_{1, \alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2, \alpha_2}) \times V & \longrightarrow & V \\ \Psi & & \Psi \\ (x, v) & \longmapsto & (\psi_{\alpha_2}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1})^{-1})(x, v) \end{array}$$

が連続であるので、命題 3.2 から、 $\eta_{\alpha_2, \alpha_1}^\Phi$ は連続である。滑らかな場合は、命題 2.26 から従う。 $\square$

命題 6.10. ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) と (Φ'_E, Φ'_X) の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ はベクトル束の準同型である。また、ベクトル束の同型 (Φ_E, Φ_X) に対して、その逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1})$ はベクトル束の同型である。

あああああ

6.2 等質ベクトル束と G 同変

定義 6.11. H を Lie 群とする。 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。(ゆえに、 V は C^∞ 級多様体である。) $\sigma : H \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ が lie 群 H の V 上の表現であるとは、 σ が滑らかな群準同型であることをいう。

注意 6.12. 命題 2.26 と $\mathrm{GL}(V)$ の多様体構造は $\mathrm{End}(V)$ の多様体構造の正則部分多様体であることを用いて、 $\sigma : H \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ の滑らかさは $H \times V \rightarrow V, (h, v) \mapsto \sigma(h)(v)$ が滑らかであることと同値である。

定義 6.13. G を Lie 群とする。 H を G の閉部分群とする。 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。 $\sigma : H \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ が lie 群 H の V 上の表現とする。この時、 $(G \times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, \mathcal{A})$ のことを等質ベクトル束と呼ぶ。

命題 6.14. 等質ベクトル束 $(G \times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ について、 $(G \times_H V, G/H, \pi, V, \{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda})$ は滑らかなベクトル束である。

さらに、各、 $gH \in G/H$ に対して、 $(G \times_H V)_{gH}$ の和とスカラー倍 $+_{gH}$ と $\cdot_{gH}$ は次のように書ける。 $((G \times_H V)_{gH}$ の元は $[g, v]$ の形で書けることに注意する。)

$$[g, v_1] +_{gH} [g, v_2] = [g, v_1 + v_2], \quad \lambda \cdot_{gH} [g, v] = [g, \lambda v]$$

証明 **Step 1.** 滑らかなベクトル束であること

命題 6.5 から従う。滑らかであることは ψ_α が微分同相写像であることから従う。

Step 2. $(G \times_H V)_{gH}$ の元は $[g, v]$ の形で書けること

任意に、 $[g', v'] \in (G \times_H V)_{gH}$ をとる。 $\pi([g', v']) = g'H$ なので、ある $h \in H$ が存在して、 $g' = gh$ となる。ゆえに、 $v = \sigma(h)(v')$ とおくと、 $[g', v'] = [gh, v'] = [g, \sigma(h)(v')] = [g, v]$ である。

Step 3. $(G \times_H V)_{gH}$ の和とスカラー倍の具体的な書き方

局所自明化 ψ_α に対応する主ファイバー束の局所自明化を $\tilde{\psi}_\alpha$ とする。任意に、

$[g, v_1], [g, v_2] \in (G \times_H V)_{gH}$ と $\lambda \in \mathbb{R}$ をとる。 σ の終域は線形写像のなす集合なので

$$\begin{aligned} [g, v_1] +_{gH} [g, v_2] &= (\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\psi_\alpha^{gH}([g, v_1]) + \psi_\alpha^{gH}([g, v_2])) \\ &= (\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(g)))(v_1) + \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(g)))(v_2)) \\ &= (\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(g)))(v_1 + v_2)) (\because \sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(g)))) \text{ は線形} \\ &= [g, v_1 + v_2] \end{aligned}$$

であり、

$$\lambda \cdot_{gH} [g, v] = (\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\lambda \psi_\alpha^{gH}([g, v])) = (\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\tilde{\psi}_\alpha(g)))(\lambda v)) = [g, \lambda v]$$

である。 □

定義 6.15. G 同変ファイバー束 $(E, X, \pi, V, G, \tau, \rho)$ と局所自明化 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ について $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ がベクトル束であり、各、 $g \in G$ に対して、 $(\tau(g), \rho(g))$ がベクトル束の同型であるとき、 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ を G 同変ベクトル束と呼ぶ。

また、 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ が滑らかな G 同変ファイバー束で、 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ が滑らかなベクトル束であり、各、 $g \in G$ に対して、 $(\tau(g), \rho(g))$ が滑らかなベクトル束の同型であるとき、 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ を滑らかな G 同変ベクトル束と呼ぶ。さらに、 G 同変ベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ が推移的であるとは、 ρ が推移的であることをいう。当然 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ の代わりに、 $\{(+_x, \cdot_x)\}_{x \in X}$ を用いてもよい。

命題 6.16. 等質ベクトル束 $(G \times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, (\{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}))$ について、ここから得られる G 同変ファイバー束の作用、つまり

$$\begin{aligned} \tau: G &\longrightarrow \text{Homeo}(G \times_H F) \\ \Psi &\qquad \qquad \Psi \\ g &\longmapsto ([g', f] \mapsto [gg', f]) \\ \\ \rho: G &\longrightarrow \text{Homeo}(G/H) \\ \Psi &\qquad \qquad \Psi \\ g &\longmapsto (g'H \mapsto gg'H) \end{aligned}$$

を用いて、 $(G \times_H V, G/H, \pi, V, \{U_\alpha, \psi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ は滑らかな G 同変ベクトル束となる。

証明 命題 6.16 と命題 6.14 から、後は、各 $g \in G$ に対して、 $(\tau(g), \rho(g))$ が滑らかなベクトル束の同型であることを示せばよい。特に、任意の $g'H \in G/H$ に対して、 $\tau(g)|_{(G \times_H V)_{g'H}} : (G \times_H V)_{g'H} \rightarrow (G \times_H V)_{\rho(g)(g'H)}$ はベクトル空間準同型であることを示せばよい。任意に、 $[g', v_1], [g', v_2] \in (G \times_H V)_{g'H}$ と $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ をとる。

$$\begin{aligned} &\tau(g)(\lambda_1 \cdot_{g'H} [g', v_1] +_{g'H} \lambda_2 \cdot_{g'H} [g', v_2]) \\ &= \tau(g)([g', \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2]) \\ &= [gg', \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2] \\ &= \lambda_1 \cdot_{\rho(g)(g'H)} [gg', v_1] +_{\rho(g)(g'H)} \lambda_2 \cdot_{\rho(g)(g'H)} [gg', v_2] \\ &= \lambda_1 \cdot_{\rho(g)(g'H)} \tau(g)([g', v_1]) +_{\rho(g)(g'H)} \lambda_2 \cdot_{\rho(g)(g'H)} \tau(g)([g', v_2]) \end{aligned}$$

である。 □

定義 6.17. G を Lie 群とする。 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。この時、 G の閉部分群 H と、表現 $\sigma: H \rightarrow \text{GL}(V)$ の組 (H, σ) を (G, V) -表現データと呼ぶ。(めっちゃくちゃ独自の言い方)

命題 6.18. X を空でない多様体とする。 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, G, \tau, \rho)$ を推移的な滑らかな G 同変ベクトル束とする。 $x_0 \in X$ と滑らかな線形同型写像 $\theta: V \rightarrow E_{x_0}$ をとる。 $(\psi_\alpha^{x_0})$ を使えば、このような θ は存在する。) この時、

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$$

とし、

$$\begin{array}{ccc} \sigma: H & \longrightarrow & \text{Aut}(V) \\ \Psi & & \Psi \\ h & \longmapsto & \theta^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_0}} \circ \theta \end{array}$$

で定めると、 (H, σ) は (G, V) -表現データである。

定義 6.19. (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, V) -表現データとする。 この時、 (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, V) -共役であるとは、ある $g \in G$ と線形微分同相写像 $\phi: V \rightarrow V$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。 (独自の言い方)

(1) $H_2 = gH_1g^{-1}$ である。

(2) 任意の $h \in H_1$ に対して、 $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ である。

定理 6.20. G をリー群、 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。

$$\frac{\{ \text{底空間が空でない推移的な } V \text{ をファイバーとする } G \text{ 同変ベクトル束} \}}{G \text{ 同変ベクトル束の同型}}$$

と

$$\frac{\{(G, V)\text{-表現データ}\}}{(G, V)\text{-共役}}$$

との間に自然な一対一対応が存在する。これは定理 5.26 から誘導される。あるいは、命題 6.16 と命題 6.18 から誘導される。

証明 大体定理 5.26 の証明と同じ、線形性だけ確認すればいい

□

例 6.21. 例 6.4 は例 5.52 と同様にすると、 $\mathbb{C}$ を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とみなして、Hopf ファイバー束 $(\mathrm{SU}(2), \mathrm{SU}(2)/S^1, \varpi, S^1, \cdot)$ と表現

$$\begin{array}{ccc} \sigma: S^1 & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathbb{C}) \\ \Psi & & \Psi \\ w & \longmapsto & (z \rightarrow wz) \end{array}$$

に対する同伴束 $(\mathrm{SU}(2) \times_{S^1} \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2)/S^1, \pi', \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau', \rho')$ と同型である。

あああああ