

B --- Kleene Inversion

長さ N $A = [A_0, \dots, A_{N-1}]$

$K \times N : B$
 $\sim A$

K は 10^9 まで、 N は 2000 まで。
 B は作らずに数える

$A = 1, 3, 2, K = 2$

$B = 1, 3, 2, 1, 3, 2$


B の転倒数 + $70 (10^9 + 7)$

同じコピー内: $K \cdot x$ 個 ($x = A$ 中の $i < j, A_i > A_j$)
 コピー間: 位置に関係なく $A_i > A_j$ の組 $\times \frac{K(K-1)}{2}$

$+$: $\text{count}((i, j) \mid (0 \leq i < j \leq K \times N - 1) \wedge B_i > B_j)$

サンプル 1: コピー内 2 + コピー間 1 = 3

2 2 判読不能: 21
 2 1 21
 3 5 7
 1 1 1 1 -- 1



(判読不能: 点の値)

合計の式はメモに無く、コードで直接書いた
 $x \frac{K(K+1)}{2} + y \frac{K(K-1)}{2} \rightarrow 1$ 回目で AC

同じ値どうしは転倒にならない (等号は数えない) $\rightarrow 0$

図: サンプル 1 の転倒ペア (コピー内とコピー間)

$B = 2, 1 \mid 2, 1$ ($A = 2, 1, K = 2$)。黒はコピー内、赤はコピーをまたぐ転倒。

