

検定結果: 福岡

Mann-Kendall検定、Sen's slopeを行った。

- 春はフラットだが有意では無い（0.0日／10年、p>0.05）
- 夏は強い増加傾向（8.6日／10年、p<0.01）
- 秋は弱い減少傾向だが有意ではない（-2.0日／10年、p>0.05）
- 冬は強い減少傾向（-7.3日／10年、p<0.01）

※Kendall τ の目安
0.1弱い 0.2中程度 0.4強い

各都市の四季の長さ

	春	夏	秋	冬
仙台	-4.0日／10年 p<0.05	+10.8日／10年 p<0.01	-2.1日／10年 p>0.05	-4.8日／10年 p<0.01
東京	-2.8日／10年 p>0.05	+5.6日／10年 p<0.05	-1.7日／10年 p>0.05	-2.0日／10年 p>0.05
大阪	+2.0日／10年 p>0.05	+3.3日／10年 p<0.01	0.0日／10年 p>0.05	-5.0日／10年 p<0.01
福岡	0.0日／10年 p>0.05	+8.6日／10年 p<0.01	-2.0日／10年 p>0.05	-7.3日／10年 p<0.01

4都市の結果を評価すると、

- 夏が長くなっているのはほぼ確実（4都市で長くなっている、$p<0.05$）
- 冬が短くなっているのもかなり確度が高い
- 春、秋は傾向が一定しない上に$p>0.05$で有意でない