長期トレンドを除いた生物季節観測データの相互相関解析

日本気象予報士会 東北支部　2026年3月例会

No.3682 岩渕　巧

2026-03-14

長期トレンドの除去

2月例会話題提供では、「仙台」のデータを使って、さくら開花などの生物季節観測同士、あるいは気温との相関関係を算出した。
生物季節観測データ、気温には地球温暖化による長期トレンドが影響を及ぼしていると考えられることから、この長期トレンドを除去した相関関係を算出し、再検討してみることとした。

長期トレンド除去の方法

長期トレンドの除去方法として、以下の3つを行った。

1. **線形トレンドの除去**各系列に対して　$Y_i = a + bt + \epsilon_t$　の線形回帰を行い、残差を用いて相関を算出する
2. **Sen's slopeの除去** 外れ値に強いロバストな線形回帰であるSen's slopeを用いて、各系列のトレンドを除去し、残差を用いて相関を算出する
3. **多変量回帰**相関ではなく　$sakura = \beta_0 + \beta_1 temp_{spring} + \beta_2 year + \epsilon$　のような多変量回帰を行い、年の影響をコントロールした上で、春の気温の影響を評価する

さくら開花と春の気温について

相関係数

方法	さくら開花と春の気温の相関
基本相関	-0.794
線形トレンド除去後の相関	-0.762
Sen's slope除去後の相関	-0.741

基本相関は-0.794で、さくらの開花と春の気温には強い負の相関があることを示している。
線形トレンド除去後の相関は-0.762、Sen's slope除去後の相関は-0.741で、いずれも基本相関と比較してやや弱くなっているが、依然として強い負の相関が存在することを示している。
したがって、**さくらの開花は春気温の変動に強く反応している**と推定できる。

多変量回帰

多変量回帰による結果は以下の通り。

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	143.556	42.063	3.413	0.001
春	-4.962	0.445	-11.153	0.000
年	0.004	0.022	0.165	0.869

春の係数-4.962は、春の気温が1度上昇すると、さくらの開花が約5日早まること、$p=0.001$ は非常に有意な結果であることを示している。年の係数0.004は、さくらの開花が年々約0.004日遅くなっていることを示すが、$p=0.869$ であり有意ではない。
したがって、**さくらの開花には春気温が強く影響しており、年の影響はほとんどない**と推測できる。

すすき開花と夏の気温について

相関係数

方法	すすき開花と夏の気温の相関
基本相関	-0.339
線形トレンド除去後の相関	0.121
Sen's slope除去後の相関	0.101

基本相関は-0.339で、すすきの開花と夏の気温には弱い負の相関があることを示している。しかし、線形トレンド除去後の相関は0.121、Sen's slope除去後の相関は0.101で、いずれも基本相関と正負が逆転している上に相関が弱くなっている。
したがって、**すすきの開花に対する夏の気温の影響はほとんど無い**と推測できる。
これを図化すると次ページの通りとなる。

すすき開花と夏の気温について(長期トレンド除去後、仙台)



多変量回帰

多変量回帰による結果は以下の通り。

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	1436.457	117.941	12.179	0.000
夏	1.442	1.047	1.377	0.173
年	-0.623	0.064	-9.714	0.000

夏の係数1.442は、夏の気温が1度上昇すると、すすきの開花が約1.442日遅れることを示すが、 p=0.173であり、有意で無いことを示している。年の係数-0.623は、すすきの開花が年々約0.623日遅くなっていることを示しており、 p=0.000 で非常に有意である。したがって、**すすきの開花には夏気温の影響はなく、長期トレンド（温暖化）の影響が大きい**と推定できる。

すすき開花と夏の気温について（山形のケース）

仙台のすすき開花と年の相関は− 0.623と比較的強い負の相関で、長期トレンド（温暖化）の影響が考えられる。そこで、仙台に近い場所で、仙台より都市化が進んでおらず、日本の気象の代表13地点にも入っている山形のケースを検証してみる。

相関係数

方法	すすき開花と夏の気温の相関（山形）
基本相関	0.052
線形トレンド除去後の相関	0.048
Sen’s slope除去後の相関	0.050

基本相関は0.052と非常に小さく、**山形に於いては、すすきの開花と夏の気温にはほぼ無関係である**ことが示された。

多変量回帰

多変量回帰による結果は以下の通り。

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	373.907	93.170	4.013	0.000
夏	0.473	0.864	0.547	0.586
年	-0.079	0.051	-1.555	0.125

夏の係数0.473は、山形においては夏の気温が1度上昇すると、すすきの開花が約0.473日遅れることを示すが、p=0.586 は有意ではない。
年の係数-0.079は、すすきの開花が年々約0.079日遅くなっていることを示しているが、p=0.125 で有意ではない。
したがって、**山形に於いては、すすきの開花には夏気温も長期トレンド（温暖化）の影響も無い**という結論が得られる。

すすき開花に関する考察

すすき開花の経年変化を仙台と山形で比較すると次のとおりである。



仙台と山形で、すすき開花の経年変化傾向は大きく異なっていることが分かる。

仙台と山形のケースと考え合わせると、**すすきの開花には夏の気温の影響はなく、仙台に於いて長期トレンド（温暖化）の影響が大きいのは、仙台の都市化が進んでいる影響**といえるかもしれない。

夏の気温と冬の気温について

次に、夏の気温と冬の気温について、長期トレンドを除去した上で相関関係をみてみる。

相関係数

方法	夏の気温と冬の気温の相関
基本相関	0.302
線形トレンド除去後の相関	0.146
Sen's slope除去後の相関	0.135

基本相関は0.302で、夏の気温と冬の気温には弱い正の相関があることを示している。線形トレンド除去後の相関は0.146、Sen's slope除去後の相関は0.135で、いずれも基本相関と比較して半減しており、基本相関の弱い相関は長期トレンドの影響によるものと考えられる。
したがって、**長期トレンド（温暖化）除去を除去すると、夏と冬の気温はほぼ独立**という結論が得られる。

多変量回帰

多変量回帰による結果は以下の通り。

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	-30.581	13.317	-2.296	0.025
冬	0.139	0.156	0.890	0.376
年	0.026	0.007	3.858	0.000

冬の係数0.139は、冬の気温が1度上昇すると、夏の気温が約0.139度上昇することを示すが、 p=0.376 は有意ではない。
年の係数0.026は、夏の気温が年々約0.026度上昇していることを示しており、 p=0.000 で非常に有意である。これは温暖化のトレンドと考えられる。
したがって、**夏の気温には冬の気温の影響はなく、長期トレンド（温暖化）の影響が大きい**という結論が得られる。

まとめと次への課題

長期トレンドを除去した検定結果

- さくら開花は春気温の変動に強く反応しており、経年変化の影響は小さい
- すすき開花に対する夏の気温の影響はほとんど無い
- すすき開花に対し、仙台のデータは長期トレンド（温暖化）の影響が大きいと見られるのに対し、山形のデータは長期トレンドの影響はほとんど見られない
- 夏の気温に対して冬の気温の影響は無く、長期トレンドの影響が大きい

次回以降の課題

- 夏の気温と冬の気温について、エルニーニョ／ラニーニャの発生時期に限定して解析してみる
- 「二季化」の提唱者である、三重大学 立花教授の論文を読み解いてみる