


股関節の手術に携わられる方へ

＼THAなど/ 股関節手術後の 腫れ対策 サポーター

男女
兼用

手術前から
手術後のリハビリのお助けまで、
いつでも使えるサポート機能付き
スパッツです。



＼ご利用者の声／

※個人の感想です。

このサポーターをつけると圧迫され、
支えられてる感じがして、
術後も安心して出かけられました。

●70代女性 THA術後



術直後の移動や歩行練習の場面で、“安心感がある”
という声をよく聞きます。しっかりフィットしつつも
窮屈さがないので、術後すぐに使えて便利です。

●急性期病院 整形外科医師

患者さんの評判はいいです。余計な
部分は圧迫せず、圧迫してほしいところを
圧迫してくれて使い勝手が良いです。

●THA執刀医



履きやすく術後快適に過ごせました。
退院してからずっと愛用しています。
傷が治った後も包まれている感じがして
安心です。 ●60代女性 THA術後



サポーターについて、患者さんから質問を
受けることはありますが、みなさん自分で簡単に
着脱されます。薄手で伸びやすくケアの邪魔に
ならないのも助かります。 ●看護師

ご注文・お問い合わせ

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221 (代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東 京 支 店 ☎03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
札幌営業所 ☎011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
埼玉営業所 ☎048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎050-2018-1030 (代) FAX076-239-2005
名古屋営業所 ☎052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
近畿営業所 ☎050-2018-3372 (代) FAX0725-53-5643
北大阪営業所 ☎06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006
米子営業所 ☎0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800 (代) FAX082-233-8818
福岡営業所 ☎092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

《 男女兼用 》トータルHipサポーターが 患者様のHip(股関節)、全面的にお助けします！

おたすけのポイント 1

腫れ軽減サポート

ウエストから患部にかけて編地を変えた3段階(強・中・弱)の圧力を設定。
術後の患部に強めの圧力を加えることで圧迫し、さらに股関節を動きやすくしリハビリをサポートします。

おたすけのポイント 2

カテーテル用開口部付き

股の位置に尿道カテーテル用の開口部があるので、リハビリの邪魔にもなりません。



■サイズ表

男女兼用	サイズ	M	L	LL	3L	4L
	ウエスト	68～78 cm	78～88 cm	88～100 cm	100～112 cm	112～124 cm

※男女兼用サイズですので、ウエストサイズをご参考の上お選びください。
※サイズに迷われる場合は1サイズ大きめのものをお選びください。

中国製

品質：ナイロン87%・ポリウレタン13%

よくあるご質問

Q1. 医療機器ではないのか？

A1 医療機器ではございません。

Q2. 冷やす方法とどちらが効果あるのか？

A2 冷やすことも効果的でございます。こちらは薄手のサポーターなので、サポーターの上から冷却材の併用も可能ですし、凍傷の恐れのない温度素材(PCMパックなど)をサポーターと皮膚の間にすることも可能です。

Q3. ドレーンを使う場合はどうなるのか？

A3 関節内ドレーンを留置している場合の使用は想定しておらず、ドレーン抜去後の使用をお勧めしております。

Q4. おむつの上から履けるのか？

A4 術後用のおむつ等含め、基本的に着用は可能ですが、厚みのある市販品等の場合、難しい場合がございます。その場合も翌朝おむつが取れてからの着用は可能です。

Q5. いつから使用して、いつまで着けるのか？

A5 尿カテーテルを通す穴を設けているため、手術直後に手術室で履かせられる設計になっております。少なくとも術後1週間程度は洗濯しながら利用することをお勧めしておりますが、患者様の判断にまかせても大丈夫です。動きやすい、歩きやすいという評価もあり、術後半年後も履き続けている方も多くおられます。

