Netter: três questões de teste

Exemplos autorais no estilo TEOT/TARO. Abra os comentários depois de responder.

Questão 1

Na vista posterior da cintura escapular, o músculo apontado pela seta amarela é o




Figura adaptada do recorte do Netter fornecido, 2ª edição.

A. infraespinal.

B. redondo maior.

C. redondo menor.

D. latíssimo do dorso.

Resposta: B

Como orientar a figura. A imagem apresenta a cintura escapular em vista posterior. A coluna vertebral aparece no centro e as escápulas ficam lateralmente. O lado esquerdo da figura conserva músculos superficiais; no lado direito, a exposição permite reconhecer os músculos que ocupam a região posterior da escápula e sua continuação para o braço. A comparação entre os dois lados ajuda a perceber que a imagem reúne planos de exposição diferentes. A seta amarela está no lado mais exposto, sobre um ventre muscular inferior à região ocupada pelo infraespinal e pelo redondo menor, e superior à massa mais ampla do latíssimo do dorso.

O que a seta indica. No original identificado do recorte, a linha do nome "músculo redondo maior" termina no ventre que foi escolhido para a seta. A questão exige reconhecer esse músculo pela posição e pelas relações com os vizinhos, sem depender da leitura do rótulo. O redondo maior participa do conjunto de músculos que se originam na face posterior da escápula. Sua identificação fica mais segura quando o candidato observa a região inferior da escápula e o trajeto do ventre em direção ao úmero, em vez de usar apenas a cor ou a espessura das fibras do desenho.

Por que maior e menor não podem ser confundidos. Os dois nomes descrevem músculos distintos. No recorte, o redondo menor aparece acima do redondo maior, mais próximo do infraespinal. A tabela de inserções coloca o redondo menor no tubérculo maior do úmero. O redondo maior integra outro grupo de inserções proximais no úmero: o material apresenta peitoral maior, latíssimo do dorso e redondo maior na sequência de lateral para medial. Essa comparação mostra que a semelhança do nome não significa identidade de inserção. Para o candidato, nome, posição, inserção e inervação devem formar um conjunto coerente.

A inervação confirma a distinção. A seção de nervos descreve o nervo axilar como responsável pela inervação do deltoide e do redondo menor. O nervo subescapular inferior inerva a parte inferior do subescapular e o redondo maior. Já o nervo toracodorsal inerva o latíssimo do dorso. O nervo supraescapular atende supraespinal e infraespinal. Todos esses músculos estão próximos na cintura escapular, mas suas relações nervosas não são

intercambiáveis. Uma figura que hoje pergunta apenas o nome pode, em outra questão, exigir a inervação da mesma estrutura.

Músculo das alternativas	Referência para distinguir no recorte	Inervação descrita
Infraespinal	Região da escápula abaixo da espinha; acima dos redondos na vista apresentada	Nervo supraescapular
Redondo maior	Ventre indicado, inferior ao redondo menor e próximo à região inferior da escápula	Nervo subescapular inferior
Redondo menor	Faixa acima do redondo maior, vizinha ao infraespinal; inserção no tubérculo maior	Nervo axilar
Latíssimo do dorso	Massa ampla inferior do dorso, reconhecível também no lado menos dissecado	Nervo toracodorsal

Como resolver uma variação. Primeiro, identifique a vista e o plano exposto. Depois, localize a espinha e a região inferior da escápula. Por último, siga a ponta da seta até o ventre, sem confundir a estrutura atravessada pelo corpo da seta com aquela em que a ponta termina. Nesta imagem, a ponta recai no redondo maior. Não é necessário inventar um caso clínico ou memorizar a posição da alternativa B: a relação topográfica é o dado que continua válido quando a ordem das opções muda.

Na prova: redondo maior e redondo menor são músculos vizinhos, mas têm inserções e inervações diferentes. Nesta figura, a seta aponta o redondo maior.

A) infraespinal.

O infraespinal é um músculo presente na mesma vista e constitui um distrator plausível porque sua massa ocupa grande parte da região posterior da escápula. No desenho, entretanto, ele está acima do local em que termina a

seta. A identificação depende de seguir a ponta da seta até o ventre inferior escolhido, em vez de responder pelo músculo mais volumoso da área. O recorte também o associa ao nervo supraescapular, enquanto o redondo maior recebe o subescapular inferior. A alternativa seria correta se a marcação estivesse no ventre do infraespinal.

B) redondo maior.

O redondo maior é a estrutura indicada. A posição da ponta coincide com o ventre identificado por esse nome na figura original do Netter: abaixo do redondo menor e acima da massa mais ampla do latíssimo do dorso. A resposta reúne orientação espacial e reconhecimento do plano exposto. Como complemento, o recorte atribui sua inervação ao nervo subescapular inferior e diferencia sua inserção da inserção do redondo menor no tubérculo maior. Esses dados permitem resolver uma segunda pergunta sobre o mesmo músculo, sem transformar esta questão de identificação em uma pergunta de função não apresentada no trecho.

C) redondo menor.

O redondo menor é o vizinho superior que mais facilmente pode ser confundido com o alvo. O nome semelhante e a proximidade anatômica tornam a alternativa convincente, mas a faixa correspondente ao redondo menor fica acima da ponta da seta. No material, ele aparece ligado ao tubérculo maior do úmero e à inervação pelo nervo axilar. O redondo maior, indicado aqui, tem outra relação de inserção e recebe o nervo subescapular inferior. A troca entre maior e menor não é uma variação de nomenclatura: mudaria o músculo e as relações anatômicas exigidas.

D) latíssimo do dorso.

O latíssimo do dorso também aparece no recorte e está relacionado à região inferior da cintura escapular. Sua massa é mais ampla e se estende pelo dorso, abaixo do ventre apontado. A proximidade com o redondo maior e a apresentação das inserções de ambos na parte proximal do úmero explicam a utilidade deste distrator. A seta, porém, termina no redondo maior, não no

latíssimo. A seção de nervos ajuda a separar os dois: o toracodorsal inerva o latíssimo, enquanto o subescapular inferior inerva o redondo maior.

Netter, Atlas de Anatomia Ortopédica, 2ª edição, recorte fornecido: seções Músculos: origens e inserções, Nervos e Estruturas neurovasculares; figura dos músculos em vista posterior.

Questão 2

Na anatomia posterior do ombro, as estruturas que atravessam o espaço quadrangular são

A. nervo radial e artéria braquial profunda.

B. nervo axilar e artéria braquial profunda.

C. nervo radial e artéria circunflexa posterior do úmero.

D. nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero.

Resposta: D

O que a pergunta chama de espaço quadrangular. Na face posterior do ombro, músculos e osso delimitam passagens para estruturas neurovasculares. O recorte distingue o espaço triangular, o espaço quadrangular e o intervalo triangular. A questão não pergunta apenas quais estruturas existem na região: exige identificar o par que atravessa uma passagem específica. É por isso que reconhecer um nervo ou uma artéria isoladamente não basta para resolver as alternativas.

Conteúdo do espaço quadrangular. A tabela e a figura identificada associam esse espaço ao nervo axilar e à artéria circunflexa posterior do úmero. Na descrição do nervo axilar, o texto retoma a mesma relação: ele cursa posteriormente com a artéria circunflexa posterior do úmero através do espaço quadrangular. A concordância entre a tabela, a figura e a seção de nervos sustenta a resposta. A alternativa correta precisa conservar os dois componentes do par.

Relação com os músculos do ombro. A tabela descreve o redondo menor, o redondo maior, a cabeça longa do tríceps e o úmero entre as referências que delimitam o espaço quadrangular. Essas relações permitem reconhecer onde a passagem fica na figura posterior. Redondo menor e maior não são apenas nomes parecidos entre si: participam da orientação regional, e confundi-los atrapalha localizar o espaço. Nesta questão, a pergunta foi limitada ao

conteúdo, sem exigir reproduzir a terminologia problemática de outra linha da tabela sobre as cabeças do tríceps.

Qual é o par do nervo radial. O recorte coloca o nervo radial e a artéria braquial profunda no intervalo triangular. Esse é o principal contraste com o espaço quadrangular. A alternativa A, portanto, não reúne duas estruturas inventadas: ela apresenta um par anatômico verdadeiro no material, mas pertencente a outra passagem. Essa forma de elaborar o distrator reproduz uma estratégia frequente das provas: deslocar uma relação correta para o local errado.

Espaço triangular e intervalo triangular são distintos. A semelhança dos nomes pode induzir a tratar os dois como sinônimos. O material, porém, lista a artéria circunflexa da escápula no espaço triangular e o par radial/braquial profunda no intervalo triangular. A escolha de uma estrutura para cada passagem precisa acompanhar a descrição específica da fonte. Não substituir "circunflexa posterior do úmero" por "circunflexa da escápula" só porque ambos os vasos aparecem na mesma região posterior.

Passagem no recorte	Conteúdo listado
Espaço triangular	Artéria circunflexa da escápula
Espaço quadrangular	Nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero
Intervalo triangular	Nervo radial e artéria braquial profunda

Por que a relação tem importância clínica. A seção de nervos descreve o axilar imediatamente inferior à cápsula articular e informa que ele pode ser lesionado nas luxações glenoumerais e nos acessos laterais. O mesmo texto atribui a ele a inervação do deltoide e do redondo menor, além da sensibilidade na parte lateral da extremidade proximal do braço por seu ramo cutâneo. Assim, a anatomia regional conecta passagem, músculo e área sensitiva. Esses dados contextualizam o conteúdo cobrado, sem transformar a pergunta em uma estimativa de risco de lesão que não foi fornecida no recorte.

Como ler as quatro combinações. As alternativas cruzam dois nervos com duas artérias. A pode parecer correta porque mantém um par verdadeiro, mas

troca o espaço. B conserva o nervo do espaço quadrangular e troca a artéria. C conserva a artéria e troca o nervo. Apenas D mantém a associação inteira pedida. O raciocínio deve verificar cada componente antes de aceitar o conjunto.

Na prova: espaço quadrangular corresponde a nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero; intervalo triangular corresponde a nervo radial e artéria braquial profunda.

A) nervo radial e artéria braquial profunda.

O nervo radial e a artéria braquial profunda formam um par descrito no recorte, mas atravessam o intervalo triangular. A alternativa é plausível justamente porque preserva uma relação anatômica verdadeira. Seu erro é transportar esse par para o espaço quadrangular. Para diferenciá-los, organize a leitura pelo nome da passagem e só depois recupere o conteúdo. A seria a resposta para uma pergunta sobre o intervalo triangular, enquanto aqui a referência é a passagem do nervo axilar com a circunflexa posterior do úmero.

B) nervo axilar e artéria braquial profunda.

O nervo axilar pertence ao espaço quadrangular, mas a artéria braquial profunda foi retirada do conteúdo do intervalo triangular. A opção mistura uma informação correta com outra que corresponde ao espaço vizinho. Esse cruzamento exige atenção porque o candidato pode identificar o axilar e encerrar a leitura antes de conferir o vaso. O recorte repete em sua seção de nervos que o axilar acompanha a circunflexa posterior do úmero. Portanto, acertar o nome do nervo não torna correta a associação oferecida nesta alternativa.

C) nervo radial e artéria circunflexa posterior do úmero.

A artéria circunflexa posterior do úmero é o vaso listado no espaço quadrangular, mas o nervo radial não é o nervo associado a ela nessa passagem. No material, o radial aparece com a artéria braquial profunda no intervalo triangular. A alternativa mantém o componente vascular correto e substitui apenas o componente nervoso, de modo simétrico ao erro da opção

B. A diferenciação deve ser feita pela relação descrita entre nervo, vaso e espaço, sem supor que todos os nervos da face posterior do braço compartilham a mesma passagem.

D) nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero.

O nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero são as duas estruturas descritas no espaço quadrangular. A associação é mostrada na figura posterior, registrada na tabela dos espaços e retomada no trajeto do nervo axilar. A consistência entre essas partes do recorte evita depender de um único rótulo. Como contexto anatômico, o axilar inerva deltoide e redondo menor e tem uma área sensitiva lateral proximal no braço. Esses atributos pertencem ao mesmo nervo, mas a resposta desta questão decorre especificamente do seu trajeto com o vaso pelo espaço indicado.

Netter, Atlas de Anatomia Ortopédica, 2ª edição, recorte fornecido: seções Músculos: origens e inserções, Nervos e Estruturas neurovasculares; figura dos músculos em vista posterior.

Questão 3

O nervo que passa sob o ligamento transverso superior da escápula e inerva supraespinal e infraespinal é o

A. axilar.

B. toracodorsal.

C. supraescapular.

D. subescapular inferior.

Resposta: C

Do plexo ao músculo. O plexo braquial reúne estruturas nervosas que dão origem aos nervos do ombro e do membro superior. O recorte organiza seus ramos conforme o ponto de origem: raízes, tronco superior e fascículos. Essa organização é útil porque nervos com nomes parecidos podem sair de níveis diferentes do plexo e chegar a músculos diferentes. O nervo supraescapular está listado entre os ramos do tronco superior, com contribuição C5-C6.

Trajeto que identifica o supraescapular. O texto descreve sua passagem por baixo do ligamento na incisura da escápula, seguida da inervação do supraespinal. Depois, ele passa pela incisura espinoglenoidal para alcançar a fossa infraespinal e inervar o infraespinal. O enunciado utiliza duas informações desse trajeto: a passagem sob o ligamento transverso superior e o par de músculos. As duas apontam para o mesmo nervo. O candidato pode, portanto, conferir a coerência da resposta pelo caminho e pelo destino motor.

Relação entre nervo e artéria. A figura anterior identifica artéria e nervo supraescapulares junto à região da incisura. A seção de artérias informa que a artéria supraescapular passa sobre o ligamento transverso superior da escápula. A seção de nervos informa a passagem do nervo por baixo do ligamento. A proximidade dos nomes não significa que as duas estruturas tenham a mesma relação com essa referência. O detalhe “sob” funciona como uma pista anatômica precisa, e não como uma palavra decorativa.

Supraespinal e infraespinal como destinos. Os nomes dos músculos remetem às regiões mostradas na vista posterior da escápula. O nervo alcança primeiro o supraespinal e continua em direção ao infraespinal. Essa sequência ajuda a entender por que o material cita duas incisuras no trajeto. O recorte menciona a possibilidade de compressão na incisura espinoglenoidal, mas esta pergunta não exige escolher o local mais frequente de compressão. Ela cobra a identificação do nervo por sua relação com o ligamento e por sua distribuição motora, sem extrapolar frequência ou prognóstico.

Separar supraescapular de subescapular. O termo “escapular” aparece em vários nomes da região e pode induzir uma resposta pelo som da palavra. O subescapular inferior, entretanto, está descrito no fascículo posterior e inerva a parte inferior do subescapular e o redondo maior. Não é o ramo listado para supraespinal e infraespinal. Da mesma maneira, o toracodorsal atende o latíssimo do dorso, e o axilar atende deltoide e redondo menor. Todos são distratores regionais plausíveis porque compartilham a cintura escapular, mas a origem e o destino descritos são diferentes.

Nervo das alternativas	Origem descrita no recorte	Destinos motores descritos
Axilar	Fascículo posterior	Deltoide e redondo menor
Toracodorsal	Fascículo posterior	Latíssimo do dorso
Supraescapular	Tronco superior	Supraespinal e infraespinal
Subescapular inferior	Fascículo posterior	Parte inferior do subescapular e redondo maior

Como transformar reconhecimento em raciocínio. Se a questão apresentar a incisura e o ligamento, identifique qual estrutura passa abaixo dele. Se mostrar um dos músculos, associe-o ao nervo que o recorte atribui à sua inervação. Se perguntar a origem no plexo, recupere o tronco superior para o supraescapular, em vez de escolher automaticamente o fascículo posterior por estar estudando músculos posteriores. São atributos diferentes do mesmo caminho anatômico. A leitura conjunta reduz a dependência de memorizar listas sem relação espacial.

Na prova: o supraescapular passa sob o ligamento transverso superior da escápula e inerva supraespinal e infraespinal; a artéria supraescapular passa sobre o ligamento no trajeto descrito pelo recorte.

A) axilar.

O nervo axilar é um ramo regional importante, mas seu trajeto característico no recorte é o espaço quadrangular com a artéria circunflexa posterior do úmero. Seus destinos motores descritos são o deltoide e o redondo menor, não supraespinal e infraespinal. A alternativa pode atrair quem associa genericamente todo músculo posterior do ombro ao axilar. Para descartá-la, compare as duas pistas oferecidas: a relação com o ligamento na incisura e o par de músculos. Nenhuma delas corresponde ao trajeto e à distribuição apresentados para o axilar.

B) toracodorsal.

O nervo toracodorsal está listado no fascículo posterior e inerva o músculo latíssimo do dorso. O texto o descreve acompanhado da artéria toracodorsal, abaixo desse músculo. Sua localização na cintura escapular o torna um distrator plausível, mas ele não é o nervo atribuído à inervação dos dois músculos citados. Se o enunciado perguntasse pelo nervo do latíssimo, esta alternativa atenderia ao dado do recorte. Aqui, porém, o trajeto sob o ligamento e os destinos supraespinal e infraespinal exigem outro ramo do plexo.

C) supraescapular.

O nervo supraescapular satisfaz as duas condições do enunciado. A seção de nervos o apresenta no tronco superior, descreve a passagem por baixo do ligamento na incisura da escápula e informa a inervação do supraespinal. Em seguida, o trajeto continua pela incisura espinoglenoidal até o infraespinal. A seção vascular oferece uma comparação útil: a artéria supraescapular passa sobre o ligamento, enquanto o nervo passa sob ele. Assim, a resposta não depende apenas do prefixo “supra”: é sustentada pelo percurso e pela distribuição motora descritos no material.

D) subescapular inferior.

O nervo subescapular inferior tem nome semelhante ao supraescapular e também participa da inervação dos músculos da cintura escapular. Entretanto, o recorte o situa no fascículo posterior e atribui a ele a parte inferior do subescapular e o redondo maior. Isso o diferencia do supraescapular tanto pelo ponto de origem no plexo quanto pelo destino motor. Confundir os dois nomes faria trocar músculos relacionados à face anterior/inferior da escápula pelo par supraespinal/infraespinal solicitado. A alternativa não atende à relação com o ligamento descrita no enunciado.

Netter, Atlas de Anatomia Ortopédica, 2ª edição, recorte fornecido: seções Músculos: origens e inserções, Nervos e Estruturas neurovasculares; figura dos músculos em vista posterior.