

# PRML Problems

Xi Tan (tan19@purdue.edu)

January 29, 2015

## Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Probability Distributions</b>	<b>2</b>

## 1 Introduction

## 2 Probability Distributions

**Problem 2.1** Prove that

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{M} & -\mathbf{M}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1} \\ -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{M} & \mathbf{D}^{-1} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1} \end{pmatrix} \quad (1)$$

where  $\mathbf{M} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1}$ .

**Solution 2.1** We apply Gaussian Elimination in the following way:

$$\left[ \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{-1} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \quad (2)$$

and we have

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{-1} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$= \begin{pmatrix} (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & -(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1} \\ -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1} & \mathbf{D}^{-1} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1} \end{pmatrix} \quad (4)$$

**Problem 2.2** Show that the inverse of a symmetric matrix is itself symmetric.

**Solution 2.2** Suppose  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$  is a symmetric matrix, and invertible. We have

$$(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^T \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \quad (5)$$