

WORKSHOP 8 SOLUTIONS

$$1. \quad (i) \quad \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{array} \right] R_2 = 2R_2 + R_1 \sim \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{array} \right]$$

$r(A) = 2 = n \Rightarrow$ Unique/Trivial solution:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0$$

$$(ii) \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 0 \\ 6 & 9 & 0 \end{array} \right] R_2 = R_2 - 3R_1 \sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r(A) = 1 < n = 2 \Rightarrow$ Infinitely many solutions

Need $n - r = 2 - 1 = 1$ parameter

Let $x_2 = t, \quad t \in \mathbb{R}$

$$\text{Row 1: } 2x_1 + 3x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 + 3t = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{3t}{2}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2}t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$(iii) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ -3 & -2 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & -8 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 = R_2 + R_1 \\ R_3 = R_3 - 2R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 = R_3 + 3R_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} r(A) = 2 < n = 3 \Rightarrow \text{Infinitely many solutions} \\ \text{Need } n - r = 3 - 2 = 1 \text{ parameter} \end{array}$$

Let $x_3 = t, \quad t \in \mathbb{R}$

$$\text{Row 2: } 3x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$\text{Row 1: } 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \Rightarrow 3x_1 - 4t = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{4t}{3}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2. \quad (i) \quad \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 13 \\ 4 & 2 & -2 \end{array} \right] R_2 = R_2 + 2R_1 \sim \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 13 \\ 0 & 8 & 24 \end{array} \right] R_2 = R_2 \div 8$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 13 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right] R_1 = R_1 - 3R_2 \sim \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right] R_1 = R_1 \div (-2) \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\therefore x_1 = -2, \quad x_2 = 3$$

$$(ii) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -3 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 = R_2 - 2R_1 \\ R_3 = R_3 - 3R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{array} \right] R_3 = 7R_3 - 5R_2$$

$$\begin{aligned}
& \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -50 & -150 \end{array} \right] \quad R_3 = R_3 \div (-50) \quad \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_1 = R_1 - 3R_3 \\ R_2 = R_2 + 4R_3 \end{array} \\
& \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -7 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad R_2 = R_2 \div (-7) \quad \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad R_1 = R_1 - 2R_2 \\
& \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad \therefore x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 3
\end{aligned}$$

3. (i) $[A|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 6 & -9 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array} \right]$
i.e. Due to the row of zeros, the matrix A is not invertible.

(ii) $[B|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 5 & 1 & 0 \\ -3 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow 2R_2 + 3R_1$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 - 5R_2$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -14 & -10 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 \div (2)$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -7 & -5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] = [I|B^{-1}]$

i.e. $B^{-1} = \left[\begin{array}{cc} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{array} \right]$

(iii) $[C|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} -4 & -8 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow -2R_2 + R_1$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} -4 & -8 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 - 4R_2$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} -4 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \div (-4) \\ R_2 \rightarrow R_1 \div (-2) \end{array}$
 $\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{4} & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] = [I|C^{-1}]$

i.e. $C^{-1} = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{4} & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$

(iv) $[D|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow 5R_2 - R_1$
 $\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & -9 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_3 \rightarrow 3R_3 + R_2$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & -9 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 5 & 3 \end{array} \right]$$

i.e. Due to the row of zeros, the matrix D is not invertible.

$$\begin{aligned} \text{(v) } [E|I] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_3 \rightarrow 3R_3 - R_2 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow R_2 \div (-6) \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 - 5R_2 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right] = [I|E^{-1}] \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{(i) } [A|I] &= \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\ &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 \div (2) \\ &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] = [I|A^{-1}] \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Thus,

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{15}{2} - \frac{9}{2} \\ -10 + 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{(ii) } [A|I] &= \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 \rightarrow 3R_2 - R_1 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 - 5R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & 6 & -15 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 \div (3) \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] = [I|A^{-1}]
\end{aligned}$$

$$\text{i.e. } A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Thus,

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0 \\ 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{(iii) } [A|I] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -8 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right] \quad R_1 \rightarrow R_1 + R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right] = [I|A^{-1}]
\end{aligned}$$

$$\text{i.e. } A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -32 + 22 + 11 \\ 32 - 11 - 22 \\ 24 - 11 - 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$