BU TEZ ŞABLONU,
AFYON KOCATEPEÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZUNA
GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

BU ŞABLON TEZ YAZIM KLAVUZUNDA
BELİRTİLEN TÜM KURALLARA UYGUN
OLDUĞUNDAN, YL-DR TEZLERİ
YAZILIRKEN KULLANILMASI KOLAYLIK
SAĞLAYACAKTIR.

DİKKAT:
Bu Tez Şablonu
Sadece Tez Yazım Kuralları
Açısından Dikkate Alınmalıdır.

Dikkat:
Çıktı almadan önce bu ve bunun gibi diğer tüm uyarı kutucuklarını silmeyi unutmayınız.

TEZ BAŞLIĞI
TEZ BAŞLIĞI (Devam)
YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ
Öğrencinin Adı SOYADI
Danışman
Ünvanı Adı SOYADI
İkinci Danışman
Ünvanı Adı SOYADI
ANABİLİM DALI

Varsa, yazılacak

…….. numaralı proje ile …… tarafından desteklenmiştir.

Tez çalışması destek aldığı zaman bu satır eklenmelidir. (Punto: 12)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ

TEZ BAŞLIĞI

Yukarıdaki destek yazısı hariç sadece bu sayfada 14 punto kullanılmalıdır.

TEZ BAŞLIĞI (Devam)

Öğrencinin Adı SOYADI

Danışman
Ünvanı Adı SOYADI

İkinci Danışman
Ünvanı Adı SOYADI

Varsa, yazılacak

DALI

Ay Yıl

Savunmanın yapıldığı tarih

Bu sayfadakitümdüzenlemeler bilgisayar ortamında

TEZ ONAY SAYFASI

Adı SOYADI tarafından hazırlanan "Tez Onay Sayfası" adlı tez çalışması lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca GG / AA / YYYY tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Adı Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman : Ünvanı Adı SOYADI
İkinci Danışman : Ünvanı Adı SOYADI

Varsa, yazılacak

Başkan : Ünvanı Adı SOYADI
Üniversite adı, Fakültesi …… İmza
Üye : Ünvanı Adı SOYADI
Üniversite adı, Fakültesi …… İmza ……
Üye : Ünvanı Adı SOYADI
Üniversite adı, Fakültesi …… İmza ……
Üye : Ünvanı Adı SOYADI
Üniversite adı, Fakültesi …… İmza ……
Üye : Ünvanı Adı SOYADI
Üniversite adı, Fakültesi …… İmza ……

Savunma tamamlandıktan sonra, **sadece bir tanesi yer almalı** ve bu sayfa jüri üyeleri tarafından imzalanmalı.

Doktora savunmasında; eğer ikinci danışman varsa, toplam 7 jüri üyesi bulunmalıdır.

atepe Üniversitesi
leri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
..... tarih ve
…… sayılı kararıyla onaylanmıştır.

……
Prof. Dr. Bekir YALÇIN
Enstitü Müdürü

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;
- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

GG / AA / YYYY

İmza

Öğrencinin Adı SOYADI

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi
(Bir boşluk)
TEZİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ BAŞLIĞI
TEZ BAŞLIĞI (Devam)
(Bir boşluk)
Öğrencinin Adı SOYADI
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
…… Anabilim Dalı
…man: Ünvanı Adı SOYADI
…man: Ünvanı Adı SOYADI
(Bir boşluk)
Bu araştırmada, …
(Bir boşluk)
2019, ix + 16(*) sayfa
(Bir boşluk)
Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3, Anahtar kelime 4, Anahtar kelime 5, Anahtar kelime 6.


Varsa, yazılacak

(*) Giriş bölümünden sonraki sayfaları (ekler dahil) kapsar ((*)bilgi notudur, silinmelidir)

II. satır üst satıra hizalanmış olmalı

Anahtar kelimelerin sayısı 4 - 6 arasında olmalıdır

Boşluklarda aşağıdaki ayarlar uygulanmalı.



Times New Roman
10 Punto

ABSTRACT

M.Sc. Thesis / Ph.D. Thesis
(Bir boşluk)
TITLE OF THESIS
TITLE OF THESIS (Devam)
(Bir boşluk)
Student Name SURNAME
Afyon Kocatepe University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of ……
Supervisor: Title Name SURNAME
Co-Supervisor: Title Name SURNAME
(Bir boşluk)
In this research, …

İngilizce Karşılıkları:
Prof. Dr.➔Prof.
Doç. Dr.➔ Assoc. Prof.
Dr. Öğr. Üyesi ➔Asst. Prof.

(Bir boşluk)
2019, ix + 16(*) pages
(Bir boşluk)
Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5, Keyword 6.

BAPK dan destek alındıysa, proje numarası ile birlikte teşekkür bölümünde yer almalıdır. BAPK dan destek alındıysa, proje numarası ile birlikte teşekkür bölümünde yer almalıdır. TEŞEKKÜR

(Bir boşluk)
Bu araştırmanın konusu, deneysel çalışmaların yönlendirilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve yazımı aşamasında yapmış olduğu büyük katkılarından dolayı tez danışmanım Sayın Ünvanı Adı SOYADI, araştırma ve yazım süresince yardımlarını esirgemeyen Sayın Ünvanı Adı SOYADI'na her konuda öneri ve eleştirileriyle yardımlarını gördüğüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.
(Bir boşluk)
Bu araştırma boyunca maddi ve manevi desteklerinden dolayı aileme teşekkür ederim.
(Bir boşluk)
(Bir boşluk)

Öğrencinin Adı SOYADI
Afyonkarahisar 2020

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa
ÖZET i
ABSTRACT ii
TEŞEKKÜR iii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vi
ŞEKİLLER DİZİNİ vii
ÇİZELGELER DİZİNİ viii
RESİMLER DİZİNİ ix
1. GİRİŞ 1
2. LİTERATÜR BİLGİLERİ 2
2.1 İkinci Dereceden Başlık 2
2.2 İkinci Dereceden Başlık 2
2.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık 3
2.3 İkinci Dereceden Başlık 4
2.3.1 Üçüncü Dereceden Başlık 5
2.3.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık 6
2.3.1.2 Dördüncü Dereceden Başlık 6
3. MATERYAL ve METOT 7
3.1 İkinci Dereceden Başlık 7
3.2 İkinci Dereceden Başlık 7
3.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık 7
3.2.2 Üçüncü Dereceden Başlık 7
3.2.3 Üçüncü Dereceden Başlık 7
3.2.4 Üçüncü Dereceden Başlık 8
3.2.4.1 Dördüncü Dereceden Başlık 8
3.2.4.2 Dördüncü Dereceden Başlık 8
3.2.4.3 Dördüncü Dereceden Başlık 8
3.2.5 Üçüncü Dereceden Başlık 8
3.2.5.1 Dördüncü Dereceden Başlık 8
3.2.5.2 Dördüncü Dereceden Başlık 9
3.3 İkinci Dereceden Başlık 9
4. BULGULAR 10
4.1 İkinci Dereceden Başlık 10
4.1.1 Üçüncü Dereceden Başlık 10
4.1.2 Üçüncü Dereceden Başlık 11
4.1.3 Üçüncü Dereceden Başlık 11
4.1.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık 11
5. TARTIŞMA ve SONUÇ 13
6. KAYNAKLAR 14
ÖZGEÇMİŞ 17
EKLER 18

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

(Bir boşluk)

İçindekiler Dizininde; eğer açıklamalar II. satıra taşıyorsa, II. satır üst satıra hizalanmalı.

Simgeler	
dH2O	Distile su
Cr(VI)	Hekzavalent krom
H2O2	Hidrojen peroksit
HCl	Hidroklorik asit
$OH^{\cdot}$	Hidroksil radikali
Ma	Miliamper
µM	Mikromolar
mM	Milimolar
µg	Mikrogram
µL	Mikrolitre
O2·□	Süperoksit radikali
Kısaltmalar	
ALAD	□-Aminolevülinik asit dehidrataz
GSH	Glutatyon
GSSG	Okside glutatyon
GR	Glutatyon redüktaz
MDA	Malondialdehit
NADPH	Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat
NBT	Nitro blue tetrazolium
PAJE	Poliakrilamid jel elektroforez
POD	Guaiakol peroksidaz
ROT	Reaktif oksijen türleri
SOD	Süperoksit dismutaz
TBA	Tiyobarbütirik asit
TCA	Trikloroasetik asit


Kısaltmalar bölümü alfabetik sırada olmalıdır.

ŞEKİ

Sayfa
Şekil 2.1 Bitkilerde krom alınımı ve taşınımı ile ilgili hipotetik model…….……15
Şekil 2.2 Moleküler oksijenden (O2) reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonu 26
Şekil 3.1 Ağır metal bağımlı reakt… …en türlerinin (ROT) üretim yolları 36

Şekiller, Çizelgeler ve Resimler Dizininde; eğer açıklamalar II. satıra taşıyorsa, II. satır üst satıra hizalanmalı.

Şekiller, Çizelgeler ve Resimler Dizininde aşağıdaki ayarlar uygulanmalı



ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa
Çizelge 2.1 Çevredeki krom konsantrasyonları 12
Çizelge 2.2 Bitkilerde reaktif oksijen türlerinin (ROT) üretim, savunma ve sakınım mekanizmaları 21
Çizelge 3.1 İzoelektrik fokuslama jel çözeltisi (İEFJÇ) için gerekli kimyasallar ve miktarları 35

RESİMLER DİZİNİ

Sayfa
Resim 2.1 İlk denenen örneklerde izolasyon sonuçları 20
Resim 2.1 G6PDHG: Glukoz-6-fosfatdehidrojenaz kontrol 23
Resim 2.1 İkinci grup DNA izolasyonu sonuçları 45

1. GİRİŞ

(Bir boşluk)
Arpa (Hordeum vulgare L.) verim bakımından dünyada buğday, mısır ve çeltikten sonra dördüncü sırada, serin iklim tahılları arasında buğdaydan sonra yer almaktadır (FAO 2007). Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılmakla birlikte, kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt sanayidir. Arpa, Türkiye'de 120 milyon dekar tahıl ekiliş alanının 30.1 milyon dekarını ve 33.5 milyon ton tahıl üretiminin 7.3 milyon tonu ile bitkisel üretimde yer alan önemli bir kültür bitkisidir (TÜİK 2009).

2. LİTERATÜR BİLGİLERİ

(Bir boşluk)

2.1 İkinci Dereceden Başlık

(Bir boşluk)
Arpa, buğdaygiller (Poaceae) familyasından buğdayla beraber dünyanın en eski kültür bitkisidir. Buğdaygiller (Graminae=Poaceae) familyasının Triticeae oymağı, arpa (Hordeum), buğday (Triticum), yabani buğday (Aegilops), çavdar (Secale), brom (Bromus), ayrık otu (Agropyron) gibi cinsleri kapsar. Kültür ve yabani türleri kapsayan arpanın temel kromozom sayısı n=7'dir. Bütün kültür arpaları diploid (2n=14) iken yabani arpaların ise diploid (2n=14), tetraploid (2n=28) ve hekzaploid (2n=42) olanları vardır (Tatar 2001, Karaoğlu vd. 2019, Sağlam ve Atar 2017, Fridy 1985, Dixit vd. 2002, Beer ve Kasprzak 2002).
(Bir boşluk)
Arpa serin iklim tahılları içerisinde buğdaydan sonra en çok ekimi yapılan bitkidir (TÜİK 2008). Tek yıllık, uzun gün bitkisi olan arpanın tür ya da çeşitleri farklı fotoperiyodik davranışlar gösterebilir. Diğer tahıllara göre daha fazla sayıda kardeşlenme gösteren arpa genellikle 5-8 kardeş oluşturur. Bitki boyu ortalama 35-100 cm kadardır. Başakları ortalama 8-15 cm boyunda olup; 2, 4 ve 6 sıralıdırlar. Çiçeği kavuz ve kapçık sarar, kavuzlu arpalarda bunlar taneye yapışıktır ve harmanda ayrılmazlar. Tane yapısında %9-13 protein, %67 kadar karbonhidrat bulunur. Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yemlik arpalarda protein oranının fazla olması istenir. Kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt sanayidir. Bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı beyaz arpalardan elde edilmektir. Biralık arpalarda protein oranının düşük olması gereklidir (Kün 1988).
(Bir boşluk)

2.2 İkinci Dereceden Başlık

(Bir boşluk)
Baykal vd. (2015), çevre kirliliği yaratan kirleticiler arasında en tehlikeli olanı ağır metal kirliliği olduğunu göstermişlerdir. Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzoz gazları, maden yatakları ve işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda gübreleme ve ilaçlama gibi birçok faktör ağır metal kirliliğinin nedenleri arasında yer alır. Yoğunluğu 5 g/cm3'ün üzerinde olan çinko, krom, kadmiyum, nikel, bakır, kurşun, civa gibi metaller ağır metal olarak tanımlanır. Bununla beraber, 2.75 g/cm3 yoğunluğa sahip hafif metal olan alüminyum da diğer ağır metallere benzer zararlı etkileri gösterir (Petrucci ve Harwood 1993). Ağır metaller arasında yer alan Mn, Fe, Cu, Zn ve Ni gibi elementler bitki büyümesi için gerekli elementlerdir (Nedelkoska ve Doran 2000) ve metabolik öneme sahip birçok enzimin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır (Dixit vd. 2002). Pb, Cd, Se ve Al gibi diğer metaller ise biyolojik olarak gerekli değildir ve belirli bir konsantrasyonun üzerinde toksiktir. Mikrobesin elementi olsun veya olmasın ağır metallerin bitkide aşırı birikimi fizyolojik strese, büyüme ve gelişmede azalmaya sebep olur (Phalsson 1989).

2.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Black ve Kerry (2008), dünyada Cr üretimi yılda yaklaşık 107 ton civarında olduğunu yaptıkları çalışmada belirtmişlerdir. Metal sanayi ve kimya endüstrisi gibi alanlarında yaygın kullanımından dolayı kromun farklı bileşikleri hızla çevreye yayılmaktadır. Krom bileşikleri deri işleme, paslanmaz çelik üretiminde, boya pigmenti ve kromik asit üretiminde büyük ölçüde kullanılmaktadır (McGrath 1995, Shanker vd. 2005).

Fridy (2005), kromun periyodik cetvelin VI B grubunda yer alan bir geçiş metali olduğunu göstermiştir. Bitki metabolizmasında herhangi bir rol oynamayan krom (7.2 g/cm3), bitkiler için toksik bir element (Cervantes vd. 2001, Dixit vd. 2002) olup; toprak, su ve havada bulunmaktadır. Doğal olarak oluşan topraklarda krom konsantrasyonu ana kayaya bağlı olarak 10-50 mg kg-1 aralığında değişmektedir (Çizelge 2.1) (Zayed ve Terry 2003).

Farklı oksidasyon durumları gösteren kromun, trivalent [Cr(III)] ve hekzavalent [Cr(VI)] türleri tamamen farklı kimyasal özellik gösteren en kararlı formlardır (Barnhart 1997). Kromun hem trivalent hem de hekzavalent formları fitotoksiktir (Tatar 2001, Karaoğlu vd. 2019, Sağlam ve Atar 2017, Fridy 1985, Dixit vd. 2002, Balteer ve Kasprzak 2002).

1 Şekiller, Çizelgeler ve Resimlerin açıklamaları II. satıra taşıyorsa, II. satır üst satıra hizalanmalı. Şekiller, Çizelgeler ve Resimlerin açıklamaları II. satıra taşıyorsa, II. satır üst satıra hizalanmalı. Çizelge 2.1 Çizelge başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir .

Örnek tipi	Konsantrasyon
Doğal topraklar	5-1000 mg kg□1 5-3000 mg kg□1 5-1500 mg kg□1 30-300 mg kg□1
Serpentin topraklar	634-125.000 mg kg□1
Dünya toprakları	200 mg kg□1
Sediment	0-31.000 mg kg□1
Tatlı sular	0-117 µg L□1
Deniz suyu	0-0.5 µg L□1
Hava	1-545.000 ng m□3
Bitkiler	0.006-18 mg kg□1
Hayvanlar	0.3-1.6 mg kg□1

Şekiller, Çizelgeler ve Resimler sayfaya ortalanmalıdır. Ayrıca kenar boşluklarına taşmamalıdırlar.


* Çizelge altındaki açıklamalar 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

(Bir boşluk)

2.3 İkinci Dereceden Başlık

Metal alınımı ve taşınımı bitki türü ve metal çeşidine göre farklılıklar göstermektedir. Bitkiler, havada gaz halinde bulunan ağır metalleri stomaları aracılığıyla (Marschner 1995), kolloidlere tutunmuş, organik maddelere bağlı ve toprak çözeltisi içinde iyon halinde bulunan metalleri ise kökleri aracılığıyla almaktadır. Toprak sıcaklığı, organik madde miktarı ve diğer metallerin varlığı gibi toprak çözeltisindeki metal konsantrasyonunu değiştiren çevresel faktörler metal alınımını etkilemektedir (Greger 1999). Bununla birlikte, metal alınımı bitki türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Köklerden alınan metaller ksilem aracılığı ile gövde ve yapraklara taşınmakta ve bu taşınım bitki türü ve metal çeşi göre farklılıklar göstermektedir.

Şekiller, Çizelgeler ve Resimler sayfaya ortalanmalıdır. Ayrıca kenar boşluklarına taşmamalıdırlar.



Şekiller, Çizelgeler ve Resimlerin açıklamaları II. satıra taşıyorsa, II. satır üst satıra hizalanmalı.

Şekil 2.1 Şekil başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.
(Bir boşluk)

2.3.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Ağır metaller, bitkilerde stres cevabı olarak reaktif oksijen türlerinin (ROT'lar) oluşumunu teşvik etmektedir (Dietz vd. 1999). ROT'lar, serbest radikallerin en yaygın formu olan "serbest oksijen radikalleri"dir. Moleküler oksijen, aşırı enerjiyle eşleşmemiş elektronlarından birinin ters dönmesiyle aktive olabilmekte ve singlet oksijen ($^1O_2$) oluşmaktadır (Şekil 2.2). Bununla birlikte, moleküler oksijene bir, iki veya üç elektronun transferi sonrasında sırasıyla süperoksit ($O_2^{\cdot}$), hidrojen peroksit (H_2O_2) veya hidroksil radikali ($OH^{\cdot}$) meydana gelmektedir. Son aşamada $OH^{\cdot}$ radikaline bir elektronun transferiyle birlikte su (H_2O) oluşmaktadır. Hidroperoksil radikali ($HO_2^{\cdot}$), $O_2^{\cdot}$'in konjuge asidi olarak reaksiyonda yerini almaktadır (Vranová vd. 2002). Bununla birlikte, hücrelerde yükseltgenmiş formda bulunan metal iyonları (Fe^{+3}, Cu^{+2}), $O_2^{\cdot}$ varlığında indirgenmekte ve böylece Fenton ya da Haber-Weiss reaksiyonları aracılığıyla H_2O_2'in $OH^{\cdot}$ radikaline dönüşümü katalizlenmektedir (Şekil 2.2) (Vranová vd. 2002).



Şekil 2.2 Şekil başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

1 2.3.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Bitkilerde krom stresi, oksidatif strese ve lipit peroksidasyonuna neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşumuna neden olarak metabolik değişikliklere yol açmaktadır (Shanker vd. 2005). Hücre zarı lipitlerinin peroksidasyonu, membranların fonksiyonu ve bütünlüğünü olumsuz etkilemekte ve hücre fonksiyonunda geri dönüşümsüz zarara neden olabilmektedir (Dixit vd. 2002).

2 2.3.1.2 Dördüncü Dereceden Başlık

Metallotiyoneinler mRNA translasyon ürünleri olup; sisteince zengin düşük moleküler ağırlıklı metal bağlayıcı proteinlerdir (Yapıcı ve Durmaz 2017). Metallotiyoneinlerin bir sınıfı olan fitoşelatinler (PC'ler) ise gen ürünü olmayıp, yüksek oranda metal derişimlerine maruz kalan bitkilerde fitoşelatin sentetaz enzimi ile glutatyondan sentezlenen polipeptitlerdir (Cobbett 2000). MT'lerin antioksidantlar gibi fonksiyon görerek metal metabolizmasında veya plazma membranlarının onarım mekanizmalarında rol oynadıkları düşünülmektedir (Labra vd. 2006, Tiryakioğlu vd. 2018).

3. MATERYAL ve METOT

3.1 İkinci Dereceden Başlık

Bu araştırmada, Sigma, Merck, Fluka ve Riedel de-Haën'in analitik grade ürünleri kullanılmıştır. Besin çözeltisi monodistile su ve diğer çözeltiler ise bidistile su ile hazırlanmıştır.

3.2 İkinci Dereceden Başlık

Bu araştırmada, gövde ve kök kuru ağırlıklarındaki % azalma temelinde Cr(VI) stresine karşı en toleranslı…….

3.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Kontrol ve farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan toleranslı Zeynelağa ve hassas ……..

3.2.2 Üçüncü Dereceden Başlık

Krom(VI) stresine karşı toleranslı Zeynelağa ve hassas Orza-96 arpa çeşitlerinin yaprak dokusunda prolin içeriği üzerine farklı Cr(VI) konsantrasyonlarının etkisi incelenmiştir. Prolin analizleri, Bates vd. (1973) nin bildirdiği metoda göre gerçekleştirilmiştir.

3.2.3 Üçüncü Dereceden Başlık

Krom(VI) stresine karşı toleranslı Zeynelağa ve hassas Orza-96 arpa çeşitlerinin yaprak dokularındaki lipit peroksidasyonunun bir göstergesi olan malondialdehit (MDA) miktarının belirlenmesi Kosugi ve Kikugawa (1985) nın bildirdiği metoda göre yapılmıştır.

3.2.4 Üçüncü Dereceden Başlık

1 3.2.4 .1 Dördüncü Dereceden Başlık

Kontrol ve farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa çeşitlerinin yaprak dokusu (500 mg) 1 mM EDTA, %1 (w/v) polivinilpirrolidon (PVP) ve 5 mM askorbik asit (yalnızca APX için) içeren 5 mL 50 mM potasyum fosfat tamponunda (pH 7.0) homojenize edilmiştir. Ekstrakt +4oC ve 14.000 rpm'de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Süpernatantlar süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), guaiakol peroksidaz (POD) ve katalaz (CAT) gibi antioksidant enzimlerin aktivitesinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Süpernatantlardaki protein miktarı Bradford (1976) a göre belirlenmiştir.

2 3.2.4 .2 Dördüncü Dereceden Başlık

Süperoksit dismutaz (SOD; EC 1.15.1.1) aktivitesi, nitroblue tetrazolium (NBT) metoduna göre (Beauchamp ve Fridovich 1971) NBT'nin fotoindirgenmesinin 560 nm'de ölçülmesi ile belirlenmiştir.

3 3.2.4 .3 Dördüncü Dereceden Başlık

Askorbat peroksidaz (APX; EC 1.11.1.11) aktivitesi Nakano ve Asada (1987) ya göre belirlenmiştir.

3.2.5 Üçüncü Dereceden Başlık

1 3.2.5 .1 Dördüncü Dereceden Başlık

Sıvı azotta dondurulan yaprak dokularından protein ekstraksiyonu Damerval vd. (1986) ne göre yapılmıştır: Dokular, soğutulmuş porselen havan içerisinde sıvı azot kullanılarak toz haline getirilmiştir.

2 3.2.5 . 2 Dördüncü Dereceden Başlık

İzoelektrik fokuslama jel çözeltisi (İEFJÇ) Hochstrasser vd. (1988) ne göre hazırlanmıştır (Çizelge 3.1).
(Bir boşluk)

1 Çizelge 3.1 Çizelge başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir .

Kimyasal	Miktarı
Urea	10.0 g
dH2O	7.4 mL
Akrilamid/bis akrilamid stok çözeltisi	3.0 mL
CHAPS	0.3 g
NP-40	100.0 □L
Amfolin (pH:5-8)	200.0 □L
Amfolin (pH:3-10)	800.0 □L

* Çizelge altındaki açıklamalar 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
(Bir boşluk)

3.3 İkinci Dereceden Başlık

Denemeler rasgele deneme deseninde 3 tekrarlı olacak şekilde düzenlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel varyans analizleri SPSS (versiyon 15.0) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilere ait ortalamalar arasındaki önemli düzeydeki farklılıklar Duncan Çoklu Karşılaştırma testi

kullanılarak belirlenmiştir (P<0.05).

4. BULGULAR

Denklemler ve formüller; denklem editörü kullanılarak, sayfaya ortalı ve numaraları sağa yaslı yazılmalı Denklemler ve formüller; denklem editörü kullanılarak, sayfaya ortalı ve numaraları sağa yaslı yazılmalı

4.1 İkinci Dereceden Başlık

Einstein'ın İzafiyet Teorisi;
(Bir boşluk)

$$E = m \cdot c^2 \quad (4.1)$$

(Bir Boşluk)
olarak sunulmuştur.

4.1.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Aarpa çeşitlerinin gövde dokusunda krom birikimi, Cr(VI) konsantrasyonundaki (75, 150 ve 225 µM) artışa bağlı olarak önemli düzeyde (P<0.05) artmıştır (Çizelge 4.5).

1 Çizelge 4.1 Şekil başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir .

Arpa çeşidi	Cr(VI) konsantrasyonu (µM)	Gövde Cr birikimi (□g g□1 KA)	Kök Cr birikimi (□g g□1 KA)
75			
150			
Zeynelağa	0		
	75		
	150		
Ana etkiler ortalaması			
Orza-96			
	0		

Orza-96	0		

	75		
P değerleri			
Çeşit (Ç)		<0.001	<0.001
Krom (K)		<0.001	<0.001
Ç □ K		<0.001	<0.001

a-g; Bir kritere ait kolondaki farklı harfler, istatistiksel olarak ortalamalar arasındaki önemli farklılıkları göstermektedir (P<0.05).

2 Çizelge bir sayfayı aşıy orsa aşağıdaki şekilde düzenlen eli. Örnek olarak… Çizelge bir sayfayı aşıy orsa aşağıdaki şekilde düzenlen eli. Örnek olarak… Çizelge 4.1 (Devam) Şekil başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir .

P değerleri			
Nikel (Ni)		<0.005	<0.005
Bakır (Cu)		<0.003	<0.003
Kalay (Sn)		<0.011	<0.011

* Çizelge altındaki açıklamalar 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

4.1.2 Üçüncü Dereceden Başlık

…… arasındaki ilişki Resim 4.1'de gösterilmiştir.



Resim 4.1 Resim başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

4.1.3 Üçüncü Dereceden Başlık

1 4.1.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Arpa çeşitlerinin ilk yaprak dokusunda Cr(VI) stresine bağlı olarak süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinde önemli düzeyde (P<0.05) bir artış saptanmıştır (Resim 4.2). …… ……..



Resim 4.2 Resim başlıklarının yazımında 1 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bitki büyüme ve gelişimi için gerekli bir element olmayan krom (Cr), yaygın endüstriyel kullanımından dolayı önemli bir çevresel kirleticidir (Shanker vd. 2005). Çevrede her fazda bulunabilen Cr, doğal olarak oluşan topraklarda 10 ila 50 mg kg-1 konsantrasyonlarda bulunabilmektedir (Zayed ve Terry 2003). Mikromolar aralıktaki Cr(VI) stresi, şiddetli fitotoksik semptomlara neden olabilmektedir (Panda ve Choudhury 2005).

6 . KAYNAKLAR

Abrahart R J, See L, 1998, Modelling of Constructing, GeoComputation Conference, 17–19 April 1998, Bristol, United Kingdom, CD-ROM.

Anonim, 2009, İstatistiklerle Türkiye 2009, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Yayın no: 3352, Ankara.

Anonim, 1985, On birinci Kalkınma Planı (2019-2023), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara.

Anonim, 1991, The State of Food and Agriculture 1990, FAO, Rome.

ASTM 907, 1982, Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia.

Banville S, 2010, Improved Convergence for GNSS Precise Point Positioning, The University Of New Brunswick, Ph.D. Thesis, 271p, Fredericton.

Başaran C, Gökgöz A, 2017, Heybeli Jeotermal Sahasında (Afyonkarahisar, Türkiye) Potansiyel Kabuklaşma Problemlerinin Jeokimyasal İrdelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Basımda.

Baykal O, 2003, Mühendislik Ölçmeleri I - Kara ve Demir Yollarında Geçki Geometrisi Tasarımı ve Aplikasyonu - Cilt 1: Metinler, Birsen Yayınevi, 393s, İstanbul.

Bayarı C S, Kurttaş T, Tezcan L, 1998, Üç Boyutlu Yerinde Yoğunluk Ölçümleri, Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2–6 Kasım, Ankara, 104–106.

Benjamin W, 1995, Pasajlar, Çev.: Cemal A, Yapı Kredi Yayınları, 52s, İstanbul.

Bezcioğlu M, Yiğit C Ö, Bodur M N, 2019, Kinematik PPP-AR ve Geleneksel PPP Yöntemlerin Performanslarının Değerlendirilmesi: Antarktika Yarımadası Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 162–169.

Brachtendorf L, 1997, Detection of Protons and Carbon Ions with Depth using Al2O3:C,Mg-based Fluorescent Nuclear Track Detectors, The Ruprecht-Karls-University Heidelberg, M.Sc. Thesis, 77p, Heidelberg.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY), 2018, Resmi Gazete, 26 Haziran 2018, 30460.

Choorackal E, Riviera P P, Santagata E, 2019, Mix Design and Mechanical Characterization of Self-Compacting Cement-Bound Mixtures For Paving Applications, Construction and Building Materials, 229, Article number 116894.

Choorackal E, Riviera P P, Santagata E, 2019, Mix Design and Mechanical Characterization of Self-Compacting Cement-Bound Mixtures For Paving Applications, Construction and Building Materials, In Press.

Elmacı C, 2015, Sözlü görüşme, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 11.11.2019, e-posta: elmaci_c@uludag.edu.tr.

Groves P D, 2013, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, Artech House, 759p, Boston.

Goldstein W M, Hogarth R (Ed.), 1997, Research on Judgement and Decision Making, Longman Press, 245p, Cambridge.

Karancı A N (Ed.), 1997, Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 124s, Ankara.

Kraige L G, Meriam J L, 2013, Mühendislik Mekaniği Statik, Çev.: Apalak C, Nobel Akademik Yayıncılık, 544s, İstanbul.

Meşhur M, Yoldemir O, 1983, Köyceğiz, Datça Arasında Kalan Alanın Jeolojisi, TPAO Rapor No:1732,

185s.
Mozafari N, Tikhomirov D, Sumer Ö, Özkaymak Ç, Uzel B, Yeşilyurt S, vd., 2019, Dating of Active Normal Fault Scarps In The Büyük Menderes Graben (Western Anatolia) and Its Implications For Seismic History, Quaternary Science Reviews, 220, 111–123.
Özkaymak Ç, Sözbilir H, Geçievi O M, Tiryakioğlu I, Palaeoseismology on the Bolvadin Fault: Evidence for Tectonic Creep in Afyon-Akşehir Graben, Western Anatolia, International Conference on Geology and Earth Science Geoscience 2018, May 2–4, Rome.
Pinker S, 1998, Language Acquisition, In Posner M I (Ed.), Foundations of Cognitive Science (359–400), MIT Press, 142p, Massachusetts.
Sözbilir H, Tiryakioğlu İ, Özkaymak Ç, Solak H İ, Yavaşoğlu H H, Batı Anadolu'daki Güncel Blok Hareketlerinin Jeodezik, Jeofizik ve Jeolojik Veriler Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2018 Sismojeodezik Çalışmalar, 1–2 Kasım 2018, İzmir.
Sucuoğlu B, 1997, Özürlü Çocukların Aileleriyle Yapılan Çalışmalar, Karancı A N (Ed.), Farklılıkla Yaşama Gereksinimleri (35–86), Ekrem Yayınları, 245s, Ankara.
Tiryakioğlu İ, Yiğit C O, Özkaymak Ç, Baybura T, Yılmaz M, Uğur M A, vd., 2019, Active Surface Deformations Detected By Precise Levelling Surveys In The Afyon-Akşehir Graben Western Anatolia, Turkey, Geofizika, 36, 33–52.
TSE 2478, 1976, Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, TSE I. Baskı, Ankara.
Yiğit C Ö, 2010, Yüksek Yapıların Farklı Sensörler ile Tam Ölçekli İzlenmesi ve Dinamik Parametrelerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 148s, Konya.

İnternet Kaynakları

1. http://fenbil.aku.edu.tr/, 11.11.2019
2. http://fenbildergi.aku.edu.tr/1602/021201(212-221).pdf, 11.11.2019

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Yabancı Dili :
İletişim (Telefon / e-posta) :

Başlama ve Bitiş yılı yazılmalı

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)
Lise : ……. Lisesi (…… – ……)
…ans : …….. Üniversitesi, …….. Böl., (……– ……)
…sek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., …..
ABD, (…… – ……)
…tora : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., …..
ABD, (…… – ……)

Yüksek lisans veya Doktora yı tamamlayanlar yazmalı

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl
: ……. (…… – ……)
: ……. (…… – Devam Ediyor)

Yayınları (SCI ve diğer) :

Diğer konular

NOT: Yayınların yazımı, kaynaklar dizininin oluşturulmasında uygulanan kurallara göre yapılmalıdır.

EKLER
EK 1. Karayolları Haritası

EK 2. Zaman serileri (2017-2019)

EK 2. (Devam) Zaman serileri (2017-2019)

