

Résolution de Problèmes Combinatoires

Lesech Erwann, Le Riboter Aymeric, Ducrocq Tanguy

November 24, 2025

1 Données du problème

1.1 Entrée du problème

Première ligne

Trois entiers L, W, H représentant les dimensions (longueur \times largeur \times hauteur) des véhicules en cm.

- L : longueur des véhicules ($20 \leq L \leq 400$)
- W : largeur des véhicules ($20 \leq W \leq 210$)
- H : hauteur des véhicules ($20 \leq H \leq 220$)

Deuxième ligne

Un entier M représentant le nombre d'objets à charger.

M : nombre d'objets ($1 \leq M \leq 1000$)

M lignes suivantes

Quatre entiers $L2$ $W2$ $H2$ $D2$ représentant les dimensions (longueur \times largeur \times hauteur) et l'ordre de livraison du i ème objet. Les dimensions sont en cm. Les plus petites valeurs de livraison doivent être livrées en priorité et $D2 = -1$ indique qu'il n'y a pas d'ordre de livraison pour cet objet.

Ainsi pour chaque objet o :

- $L2_o$: longueur de l'objet o ($10 \leq L2_o \leq 500$)
- $W2_o$: largeur de l'objet o ($10 \leq W2_o \leq 500$)
- $H2_o$: hauteur de l'objet o ($10 \leq H2_o \leq 500$)
- $D2_o$: ordre de livraison de l'objet o ($-1 \leq D2_o \leq M$)

1.2 Sortie du problème

Première ligne

SAT s'il existe une solution, UNSAT sinon.

Par exemple si un des articles est trop grand, la sortie sera UNSAT.

1.2.1 M lignes suivantes

$v \ x_0 \ y_0 \ z_0 \ x_1 \ y_1 \ z_1$ où v est l'identifiant du véhicule (de 0 à N). Les triplets (x_0, y_0, z_0) sont les coordonnées du point le plus proche de $(0, 0, 0)$ et (x_1, y_1, z_1) sont les coordonnées du point le plus éloigné de $(0, 0, 0)$. L'ordre de sortie des articles doit correspondre à l'ordre d'entrée.

2 Variables et domaines de définitions

Nous allons définir les variables suivantes :

- n : nombre de véhicules utilisés (entier entre 1 et M)
- Pour chaque objet o , les variables suivantes :
 - v_o : véhicule auquel l'objet o est assigné (entier entre 0 et $n - 1$)
 - x_{0o} : coordonnée x du point le plus proche de $(0, 0, 0)$ de l'objet o (entier entre 0 et L)
 - y_{0o} : coordonnée y du point le plus proche de $(0, 0, 0)$ de l'objet o (entier entre 0 et W)
 - z_{0o} : coordonnée z du point le plus proche de $(0, 0, 0)$ de l'objet o (entier entre 0 et H)
 - L_{2o} : longueur de l'objet o (entier entre 10 et 500)
 - W_{2o} : largeur de l'objet o (entier entre 10 et 500)
 - H_{2o} : hauteur de l'objet o (entier entre 10 et 500)
 - D_{2o} : ordre de livraison de l'objet o (entier entre -1 et M)

3 Contraintes

Nous avons les contraintes suivantes :

3.1 Satisfiable — S'assurer que tous les objets ne dépassent pas les dimensions des camions

Pour chaque objet o , notons ses dimensions $(L2_o, W2_o, H2_o)$ et celles du camion (L, W, H) . L'objet peut être placé dans le camion sous l'une des 6 orientations possibles. Ainsi, il doit exister une permutation $(d_{o,1}, d_{o,2}, d_{o,3})$ de $(L2_o, W2_o, H2_o)$ telle que :

$$\begin{aligned} d_{o,1} &\leq L, \\ d_{o,2} &\leq W, \\ d_{o,3} &\leq H. \end{aligned}$$

Autrement dit :

$$\exists(d_{o,1}, d_{o,2}, d_{o,3}) \in \text{Perm}(L2_o, W2_o, H2_o) \quad \text{tel que} \quad (d_{o,1} \leq L) \wedge (d_{o,2} \leq W) \wedge (d_{o,3} \leq H).$$

3.2 Aucun objet ne doit chevaucher un autre objet (condition de non-chevauchement)

Pour tout paire d'objets (i, j) , si les deux objets sont assignés au même véhicule, alors leurs positions doivent être telles qu'ils ne se chevauchent pas. Cela peut être formulé par les contraintes suivantes :

3.3 S'assurer que les objets d'un camion ne dépasse pas les dimensions du camion

Soit un véhicule v utilisé, pour chaque article i assigné à ce véhicule, les coordonnées $(x0_i, y0_i, z0_i)$ et $(x1_i, y1_i, z1_i)$ doivent respecter les contraintes suivantes :

$$0 \leq x0_i < x1_i \leq L$$

3.4 Objectif à minimiser

La nature de ce projet est un problème d'optimisation sous contraintes. L'objectif est de minimiser le nombre de véhicules utilisés pour transporter tous les objets

tout en respectant les contraintes précédemment définies.

Formellement parlant :

$$\min n$$