

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Estructuras Discretas
Tarea 2

Rubí Rojas Tania Michelle
taniarubi@ciencias.unam.mx
cuenta: 315121719

2 de octubre de 2017

1. Sean $f^{(1)}, g^{(2)}$ símbolos de función, $P^{(1)}$ símbolo de predicado. Clasifica las siguientes fórmulas como términos, fórmulas atómicas, fórmulas cuantificadas (con cuantificadores pero con presencias de variables libres) o enunciados (fórmulas con cuantificadores sin variables libres); según el caso, justifica tu respuesta.

a) $f(g(a, b))$

SOLUCIÓN: Es un término. Como las constantes a y b son términos, entonces $g(a, b)$ también es un término ya que es un símbolo de función aplicado a términos.

b) $\neg \forall x \forall y (P(f(x)) \wedge Q(x, y))$

SOLUCIÓN: Es un enunciado, ya que es una fórmula cuantificada sin variables libres.

c) $P(g(f(x), y))$

SOLUCIÓN: Es una fórmula atómica, ya que es un símbolo de predicado aplicado a un término.

d) $\exists x \forall y \exists z (R(x, y, z) \wedge Q(x, f(y)) \rightarrow P(g(x, y)))$

SOLUCIÓN: Es un enunciado, ya que es una fórmula cuantificada sin variables libres.

e) $\forall x \forall y \forall z (P(x, y) \wedge R(y, z)) \vee \exists z (Q(x, y, z))$

SOLUCIÓN: Es una fórmula cuantificada, ya que las variables x y y aparecen como variables libres en la fórmula $\exists z (Q(x, y, z))$.

2. Traduce los siguientes enunciados a lógica de predicados. Indica de manera clara la traducción de los predicados que utilizarás y el Universo de discurso.

- a) Todos los voluntarios ayudan a alguien.
- b) Armando puede ayudar únicamente a un mexicano.
- c) Ningún militar puede ayudar a todas las personas.
- d) Hay un mexicano al que todos los militares y japoneses lo ayudan.
- e) Algún mexicano ayuda a todos o a nadie.
- f) Hay algún mexicano que no puede ser ayudado por algún japonés.
- g) Algunos alemanes sólo ayudan a mexicanos.
- h) Exactamente una persona ayuda a todos menos a sí misma.

- i) Exactamente una persona sólo se ayuda a sí misma.
- j) Algunos militares no ayudan a los mexicanos.
- k) Todos los voluntarios japoneses ayudan a algún mexicano.
- l) Armando ayuda a los mexicanos, por lo tanto los voluntarios Ayudarán a los mexicanos.

3. Considera los siguientes predicados

- $P(x) : x$ es un número par.
- $M(x, y) : x$ es menor que y .
- $G(x, y) : la división de x entre y está dentro del conjunto.$

Y los siguientes enunciados

- $\forall x \forall y (M(x, y) \rightarrow \exists z (M(x, z) \wedge M(z, y)))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow M(0, x))$
- $\forall x \forall y (x \neq 0 \wedge y \neq 0 \rightarrow (G(x, y) \wedge G(y, x)))$
- La negación del inciso c)

Evalúa su valor de verdad con respecto a los siguientes Universos del discurso. Para aquellos enunciados que sean falsos, exhibe un contraejemplo.

- a) Los números naturales (el 0 también es natural).
- b) Los números reales.
- c) Los números enteros.

4. El micromundo de figuras tiene los enunciados siguientes:

- $T(x), C(x)$ y $S(x)$ tales que x es triángulo, cuadrado o círculo, respectivamente.
- $P(x), M(x)$ y $G(x)$ tales que x es pequeño, mediano o grande, respectivamente.
- $Su(x, y), N(x, y), E(x, y)$ y $O(x, y)$ para indicar que x está al sur, norte, este u oeste de y , respectivamente.
- $Co(x, y)$ y $R(x, y)$ para indicar que x está en la misma columna o renglón que y , respectivamente.

Para cada una de las siguientes fórmulas, escribe su traducción al español, da un micromundo no vacío donde la fórmula sea verdad y uno donde sea falsa.

- a) $\exists x \exists y \exists z (T(x) \wedge C(y) \wedge S(z) \wedge N(x, y) \wedge N(y, z))$
- b) $\forall x (S(x) \rightarrow \neg G(x)) \wedge \forall x (C(x) \rightarrow \exists y (Co(x, y) \wedge T(x) \wedge P(x)))$
- c) $\forall x \exists y (R(x, y) \rightarrow (M(x) \vee G(y)))$
- d) $\exists x (C(x) \wedge \forall y (N(y, x) \rightarrow P(y) \vee S(y))) \wedge \forall w (C(w) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge E(y, w)))$