Facultad de Ciencias, UNAM Lenguajes de Programación Tarea 2

Hernández Salinas Oscar Rubí Rojas Tania Michelle

19 de octubre de 2020

- 1. Define las siguientes funciones sobre expresiones del lenguaje WAE:
 - a) La función libres: WAE → (listof symbol) que dada una expresión de tipo WAE devuelve una lista con los identificadores libres (sin repeticiones) contenidos en ésta.
 SOLUCIÓN:

b) La función ligadas: WAE → (listof symbol) que dada una expresión de tipo WAE devuelve una lista con identificadores ligados (sin repeticiones) contenidos en ésta. Solución:

c) La función de-ligado: WAE → (listof symbol) que dada una expresión de tipo WAE devuelve una lista con identificadores de ligado (sin repeticiones) contenidos en ésta. Solución:

```
(define (de-ligado expr)
(type-case WAE expr
    [id (i) '()]
    [num (n) '()]
    [add (lhs rhs) (union (de-ligado lhs) (de-ligado rhs))]
    [sub (lhs rhs) (union (de-ligado lhs) (de-ligado rhs))]
```

```
[with (id value body)
(union (list id) (de-ligado value) (de-ligado body))]))
```

2. Sea e una expresión del lenguaje WAE. Suponiéndo que (libres e) = '(), demostrar o dar un contraejemplo de la siguiente desigualdad.

```
(length (ligada e)) ≤ (length (de-ligado e))
```

Demostración. Sea e la siguiente expresión del lenguaje WAE

```
{with {a 17} {+ a {+ a {+ a a}}}}}
```

donde el símbolo de color azul es una variable de **de-ligado** y los símbolos de color **rojo** son variables **ligadas**. Notemos, además, que no tenemos variables **libres**.

Así,

```
(length (ligada e)) = 5 \le 1 (length (de-ligado e))
```

Por lo tanto, la desigualdad (length (ligada e)) \le (length (de-ligado e)) es falsa.

3. Realiza las siguientes sustituciones cuidando el alcance de las variables correspondientes. Indica para cada expresión los identificadores libres, de ligado y ligados.

```
a) {with {w {- u 8}} {with {v 5} {+ w {+ y x}}}} [x := {+ u v}] SOLUCIÓN:
```

- b) {with {y {+ x v}} {with {z x} {- x {- y z}}}} [x := {- y z}] SOLUCIÓN:
- c) {with {y {- z 3}} {+ x {+ y 11}}} [x := {- y {z 23}}] SOLUCIÓN:
- 4. Convierte las siguientes expresiones a su respectiva versión usando índices de De Brujin.

Solución:

5. Dadas las siguientes expresiones representadas mediante índices de *De Brujín*, ontén su respectiva versión usando identificadores de variables.

Solución:

Solución:

6. Determina el valor de la siguiente expresión y responde las siguientes preguntas: ¿puede haber otro resultado correcto? ¿por qué? ¿cuál es el correcto?

```
{with {a 2}
  {with {b 3}
      {with {c {+ a b}}}
      {with {a -2}
          {with {b -3}}
          {+ c c}}}}
```

Solución: