

Universität Würzburg Übungsblätter  
Bachelor Mathematische Physik

Jun Wei Tan

January 16, 2024



---

# Contents

---

<b>1</b>	<b>Lineare Algebra 1</b>	<b>5</b>
1.1	Blatt 1 . . . . .	5
1.2	Blatt 2 . . . . .	10
1.3	Blatt 3 . . . . .	13
1.4	Blatt 4 . . . . .	19
1.5	Blatt 5 . . . . .	25
1.6	Blatt 6 . . . . .	30
1.7	Blatt 7 . . . . .	36
1.8	Blatt 8 . . . . .	41
1.9	Blatt 10 . . . . .	47
<b>2</b>	<b>Lineare Algebra 2</b>	<b>57</b>
2.1	Blatt 1 (30/33) . . . . .	57
2.2	Blatt 2 . . . . .	61
2.3	Blatt 3 . . . . .	67
2.4	Blatt 4 . . . . .	72
2.5	Blatt 6 . . . . .	80
2.6	Blatt 7 . . . . .	85
2.7	Blatt 10 . . . . .	91
2.8	Blatt 11 . . . . .	98
<b>3</b>	<b>Analysis 2</b>	<b>105</b>
3.1	Blatt 1 (17.5/21) . . . . .	105
3.2	Blatt 2 . . . . .	110
3.3	Blatt 3 . . . . .	116
3.4	Blatt 4 . . . . .	122
3.5	Blatt 5 . . . . .	128
3.6	Blatt 6 . . . . .	134
3.7	Blatt 8 . . . . .	141
3.8	Blatt 9 . . . . .	146
3.9	Blatt 10 . . . . .	147
<b>4</b>	<b>Vertiefung Analysis</b>	<b>153</b>
4.1	Blatt 1 . . . . .	153
4.2	Blatt 2 . . . . .	157

4.3	Blatt 3 . . . . .	161
4.4	Blatt 4 . . . . .	163
4.5	Blatt 5 . . . . .	168
4.6	Blatt 6 . . . . .	170
4.7	Blatt 7 . . . . .	175
4.8	Blatt 8 . . . . .	179
4.9	Blatt 9 . . . . .	182
4.10	Blatt 10 . . . . .	187
4.11	Blatt 11 . . . . .	193
<b>5</b>	<b>Einführung in die Algebra</b>	<b>197</b>
5.1	Blatt 1 . . . . .	197
5.2	Blatt 2 . . . . .	200
5.3	Blatt 3 . . . . .	204
5.4	Blatt 4 . . . . .	206
5.5	Blatt 5 . . . . .	210
5.6	Blatt 6 . . . . .	214
5.7	Blatt 7 . . . . .	218
5.8	Blatt 8 . . . . .	223
5.9	Blatt 9 . . . . .	226
5.10	Blatt 10 . . . . .	229
<b>6</b>	<b>Theoretische Mechanik</b>	<b>231</b>
6.1	Blatt 1 . . . . .	231
6.2	Blatt 2 . . . . .	237
6.3	Blatt 3 . . . . .	242

# CHAPTER ONE

---

## Lineare Algebra 1

---

### 1.1 Blatt 1

**Definition 1.1.** Sind  $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$  mit  $(a_1, a_2) \neq (0, 0)$ , so bezeichnet man die Menge  $g := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 = b\}$  als Gerade.

**Satz 1.2.** Zu jeder Geraden gibt es  $c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{R}$ , sodass die Gerade in der Form

$$\{(c_1, c_2) + t(d_1, d_2) : t \in \mathbb{R}\}$$

geschrieben werden kann. Weiterhin ist obige Menge im Fall  $(d_1, d_2) \neq (0, 0)$  immer eine Gerade

**Bemerkung 1.3.** Der Parameterform für Geraden und Ebenen ist in der Vorlesung bewiesen.

**Aufgabe 1.** Beweisen Sie folgende Aussage: Gegeben seien zwei Punkte  $p, q \in \mathbb{R}^2$  mit  $p \neq q$ . Dann gibt es genau eine Gerade  $g \subseteq \mathbb{R}^2$  mit  $p \in g$  und  $q \in g$ . Diese ist gegeben durch  $g_{p,q} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1(q_2 - p_2) - x_2(q_1 - p_1) = p_1 q_2 - p_2 q_1\}$ .

*Beweis.* Wir nutzen Def. 1.1. Weil  $p$  und  $q$  in der Gerade sind, können wir zwei Gleichungen schreiben...

$$a_1 p_1 + a_2 p_2 = b$$

$$a_1 q_1 + a_2 q_2 = b$$

Dann gilt

$$a_1 p_1 + a_2 p_2 = a_1 q_1 + a_2 q_2$$

$$a_1(p_1 - q_1) = a_2(q_2 - p_2)$$

Daraus folgt die Lösungsmenge

$$a_1 = t$$

$$a_2 = t \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2}$$

$$b = p_1 t + p_2 \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2} t$$

Es ist klar, dass die gegebene Gerade eine Lösung zu die Gleichung ist, mit  $t = q_2 - p_2$ . Was passiert mit andere  $t$ ? Sei  $t = q_2 - p_2$  und  $t' \in \mathbb{R}$ . Vergleich dann die Gleichungen

$$\begin{aligned} x_1 t + x_2 t \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2} &= p_1 t + p_2 \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2} t \\ x_1 t' + x_2 t' \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2} &= p_1 t' + p_2 \frac{p_1 - q_1}{q_2 - p_2} t' \end{aligned}$$

Es ist klar, dass die zweite Gleichung nur die erste Gleichung durch  $t'/t$  multipliziert ist. Deshalb habe die zwei Gleichungen die gleiche Lösungsmengen, dann sind die Gerade, die durch die Gleichungen definiert werden, auch gleich.

Wenn  $q_1 = q_2$  dürfen wir die Lösungsmenge nicht so schreiben. Aber wir können den Beweis wiederholen, aber mit  $a_2$  als das freie Parameter. Es darf nicht, dass  $(q_1 - p_1, q_2 - p_2) = (0, 0)$ , weil  $\vec{q} \neq \vec{0}$   $\square$

**Aufgabe 2.** In Beispiel 1.2.8 wurde der Schnitt von zwei Ebenen bestimmt. Er hatte eine ganz bestimmte Form, die wir für den Kontext dieser Aufgabe als Gerade bezeichnen wollen, formal:

Ist  $(v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$  und  $(p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3$  beliebig, dann ist die Menge

$$\{(p_1 + t \cdot v_1, p_2 + t \cdot v_2, p_3 + t \cdot v_3) | t \in \mathbb{R}\}$$

eine Gerade.

- Finden Sie zwei Ebenen, deren Schnitt die Gerade  $g = \{(1 + 3t, 2 + t, 3 + 2t) | t \in \mathbb{R}\}$  ist. Erläutern Sie, wie Sie die Ebenen bestimmt haben und beweisen Sie anschließend, dass Ihr Ergebnis korrekt ist.
- Ist der Schnitt von zwei Ebenen immer eine Gerade? Wenn ja, begründen Sie das, wenn nein, geben Sie ein Gegenbeispiel an.
- Zeigen Sie: Für den Schnitt einer Geraden  $g$  mit einer Ebene  $E$  gilt genau einer der folgenden drei Fälle:

- $g \cap E = \emptyset$
- $|g \cap E| = 1$
- $g \cap E = g$

Geben Sie für jeden der Fälle auch ein Geraden-Ebenen-Paar an, dessen Schnitt genau die angegebene Form hat.

*Beweis.* (a) Wir suchen zwei Ebenen, also 6 Vektoren  $\vec{p}_1, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{p}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ , die zwei Ebenen durch

$$E_1 = \{\vec{p}_1 + t_1 \vec{u}_1 + t_2 \vec{u}_2 | t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

$$E_2 = \{\vec{p}_2 + t'_1 \vec{v}_1 + t'_2 \vec{v}_2 | t'_1, t'_2 \in \mathbb{R}\}$$

definieren. Einfachste wäre, wenn  $p_1 = p_2 \in g$ . Sei dann  $p_1 = p_2 = (1, 2, 3)^T$ . Wenn  $\vec{u}_1 = \vec{v}_1 = (3, 1, 2)^T$ , ist es auch klar, dass der Schnitt  $g$  entschließt ( $t_2 = t'_2 = 0$ ). Dann müssen wir  $\vec{u}_2, \vec{v}_2$  finden, für die gelten,

$$(t, t'_2) \neq (0, 0) \implies t_1 \vec{u}_1 + t_2 \vec{u}_2 \neq t'_1 \underbrace{\vec{u}_1}_{\vec{u}_1 = \vec{v}_1} + t'_2 \vec{v}_2 \forall t_1, t'_1 \in \mathbb{R},$$

also

$$\xi_1 \vec{u}_1 \neq t'_2 \vec{v}_2 - t_2 \vec{u}_2 \quad (t_2, t'_2) \neq (0, 0), \forall \xi_1 \in \mathbb{R}.$$

Das bedeutet

$$\xi_1 = 0 : \vec{v}_2 \neq k \vec{u}_2 \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\xi_1 \neq 0 : \vec{u}_1 \notin \text{span}(\vec{v}_2, \vec{u}_2)$$

**Bemerkung 1.4.** Wir können uns einfach für solchen  $\vec{v}_2, \vec{u}_2$  entscheiden. Wir brauchen nur

$$\langle \vec{u}_2, \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0.$$

Aber weil das innere Produkt nicht in der Vorlesung nicht diskutiert worden ist, müssen wir es nicht systematisch finden.

**Bemerkung 1.5.** Eigentlich braucht man keine spezielle Gründe, um  $\vec{u}_2$  und  $\vec{v}_2$  zu finden. Wenn man irgendeine normalisierte Vektoren aus einer Gleichverteilung auf  $\mathbb{R}^3$  nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Lösung sind, 1.

Daher entscheide ich mich ganz zufällig für zwei Vektoren...

$$\vec{v}_2 = (1, 0, 0)^T$$

$$\vec{u}_2 = (0, 1, 0)^T$$

Der Schnitt von der Ebenen kann berechnet werden...

$$\vec{p} + t_1 \vec{u}_1 + t_2 \vec{u}_2 = \vec{p} + t'_1 \vec{v}_1 + t'_2 \vec{v}_2,$$

$$\xi_1 \vec{u}_1 + t_2 \vec{u}_2 = t'_2 \vec{v}_2.$$

Also

$$\xi_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = t'_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

oder

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ t_2 \\ t'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Bemerkung 1.6.** Hier ist es noch einmal klar, dass die einzige Lösung  $\xi_1 = t_2 = t'_2 = 0$  ist, weil  $\det(\dots) \neq 0$ . Aber wir müssen noch eine längere Beweis schreiben...

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

also die einzige Lösung ist  $\xi_1 = t_2 = t'_2 = 0 \implies t_2 = t'_2 = 0, t_1 = t_2 \implies E_1 \cap E_2 = g$

(b) Nein.

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_1, u_2 \in \mathbb{R},$$

$$E_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_1, u_2 \in \mathbb{R}.$$

Dann ist  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$

(c)

**Satz 1.7.** Sei  $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$ . Dann gibt es genau eine Gerade  $g$ , wofür gilt  $\vec{a} \in g, \vec{b} \in g$ . Es kann als

$$\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}), t \in \mathbb{R}$$

geschrieben werden.

*Beweis.* Es ist klar, dass

$$\vec{a} \in g \quad (t = 0)$$

$$\vec{b} \in g \quad (t = 1)$$

Sei dann eine andere Gerade  $g'$ , wofür gilt  $\vec{a} \in g'$  und  $\vec{b} \in g'$ .  $g'$  kann als

$$\vec{u} + t\vec{v}, t \in \mathbb{R}$$

geschrieben werden, wobei  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ . Es existiert  $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ , sodass

$$\vec{u} + t_1\vec{v} = \vec{a}$$

$$\vec{u} + t_2\vec{v} = \vec{b}$$



Es gilt dann

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \vec{a} - t_1 \vec{v} \\ \vec{a} - t_1 \vec{v} + t_2 \vec{v} &= \vec{b} \\ \vec{v} &= \frac{1}{t_2 - t_1} (\vec{b} - \vec{a}) \quad t_1 \neq t_2 \text{ weil } \vec{a} \neq \vec{b}\end{aligned}$$

Es gilt dann für  $g'$ :

$$\begin{aligned}g' &= \{\vec{u} + t\vec{v} | t \in \mathbb{R}\} \\ &= \left\{ \vec{a} - \frac{t_1}{t_2 - t_1} (\vec{b} - \vec{a}) + \frac{t}{t_2 - t_1} (\vec{b} - \vec{a}) \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \vec{a} + \left( \frac{t}{t_2 - t_1} - \frac{t_1}{t_2 - t_1} \right) (\vec{b} - \vec{a}) \mid t \in \mathbb{R} \right\}\end{aligned}$$

Wenn man  $t' = \frac{t}{t_2 - t_1} - \frac{t_1}{t_2 - t_1}$  definiert, ist es dann klar, dass  $g' = g$   $\square$

Es ist klar, dass maximal eines der Fälle gelten kann. Wir nehmen an, dass die erste zwei Fälle nicht gelten. Dann gilt

$$|g \cap E| \geq 2.$$

Es gibt dann mindestens zwei Punkte in  $g \cap E$ . Es ist auch klar, dass die Verbindungsgerade zwischen die beide Punkte  $g$  ist (Pr. 1)

**Satz 1.8.** Sei  $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in E$ . Dann ist die Verbindungsgerade zwischen  $\vec{v}_1$  und  $\vec{v}_2$  auch in  $E$ .

*Beweis.* Sei

$$E = \{\vec{p}_1 + t_1 \vec{u} + t_2 \vec{v} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Es wird angenommen, dass  $a_1, a_2, b_1, b_2$  existiert, sodass

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= \vec{p} + a_1 \vec{u} + a_2 \vec{v} \\ \vec{v}_2 &= \vec{p} + b_1 \vec{u} + b_2 \vec{v}\end{aligned}$$

Dann ist

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (b_1 - a_1) \vec{u} + (b_2 - a_2) \vec{v},$$

also

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 + t(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) &= \vec{p} + a_1 \vec{u} + a_2 \vec{v} + t[(b_1 - a_1) \vec{u} + (b_2 - a_2) \vec{v}] \\ &= \vec{p} + [a_1 + t(b_1 - a_1)] \vec{u} + [a_2 + t(b_2 - a_2)] \vec{v} \in E\end{aligned}$$

$\square$

Deshalb ist  $g \subseteq g \cap E$ . Weil  $g \cap E \subseteq g$ , ist  $g = g \cap E$

$\square$

## 1.2 Blatt 2

**Aufgabe 3.** Gegeben sei die Relation  $\sim \subseteq (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$  mit  $x \sim y$  genau dann, wenn es eine Gerade  $L \subseteq \mathbb{R}^2$  gibt, die  $0, x$  und  $y$  enthält.


- Bestimmen Sie alle  $y \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  mit  $(0, 1) \sim y$  bzw.  $(1, 0) \sim y$  und skizzieren Sie die beiden Mengen in einem geeigneten Koordinatensystem.
- Begründen Sie, dass  $\sim$  eine Äquivalenzrelation ist.
- Bleibt  $\sim$  auch dann eine Äquivalenzrelation, wenn man sie als Relation in  $\mathbb{R}^2$  betrachtet?

*Beweis.* (a) Eine Gerade hat den Form

$$\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 = b\}.$$

Weil  $(0, 0)$  in der Gerade ist, gilt  $b = 0$ . Für die zwei Fälle:

- $(0, 1)$  ist in der Gerade. Es gilt dann  $a_2 = 0, a_1 \in \mathbb{R}$ . Die Gleichung der Gerade ist dann  $x_1 = 0$ , oder alle Punkte des Forms  $(0, y), y \in \mathbb{R}$ .
- $(1, 0)$  ist in der Gerade. Es gilt dann  $a_1 = 0, a_2 \in \mathbb{R}$ . Die Gerade enthält ähnlich alle Punkte des Forms  $(x, 0), x \in \mathbb{R}$ .



- $x \sim x$  (Reflexivität)

Es gibt immer eine Gerade zwischen  $0$  und  $x$ . Eine solche Gerade enthält  $x$  per Definition.

- $x \sim y \iff y \sim x$  (Symmetrie)

Es gibt eine Gerade, die  $0, x$  und  $y$  enthält. Deswegen gilt die beide Richtung der Implikationen.

(iii)  $x \sim y$  und  $y \sim z \implies x \sim z$  (Transitivität)

Es gibt eine Gerade zwischen  $0, x$  und  $y$ , und eine Gerade zwischen  $0, y$  und  $z$ . Weil die beide Geraden zwischen  $y$  geht, sind die Geraden gleich, und enthält  $x$  und  $z$ , daher  $x \sim z$ .

(c) Nein.  $(1, 0) \sim (0, 0), (0, 1) \sim (0, 0)$ , aber  $(1, 0) \not\sim (0, 1)$  stimmt nicht.  $\square$

**Aufgabe 4.** Es sei  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  mit  $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_1, x_2)$ ,  $s$  die Spiegelung in  $\mathbb{R}^2$ ,  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  die Translation um  $(1, 0)$  und  $em : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  die Einbettung.

- (a) Bilden Sie die Verkettungen  $f \circ em, em \circ f, s \circ f, T \circ s, s \circ T$  und  $em \circ s$ . Geben Sie dabei jeweils Argumentmenge, Zielmenge und Zuordnungsvorschrift an.
- (b) Untersuchen Sie die Funktionen aus der vorherigen Teilaufgabe auf Surjektivität, Injektivität bzw. Bijektivität.
- (c) Sei  $F = em \circ T \circ s \circ f$ . Bestimmen und skizzieren Sie das Bild bzw. Urbild von  $[0, 1] \times [-1, 1] \times [0, 2]$  unter  $F$ .

*Beweis.* (a) (i)  $f \circ em$

Argumentmenge:  $\mathbb{R}^3$

Zielmenge:  $\mathbb{R}^2$

Zuordnungsvorschrift:  $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2) = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$

(ii)  $em \cdot f$

Argumentmenge + Zielmenge:  $\mathbb{R}^3$

Zuordnungsvorschrift:  $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_1, x_2, 0)$

(iii)  $s \cdot f$

Argumentmenge:  $\mathbb{R}^3$

Zielmenge:  $\mathbb{R}^2$

Zuordnungsvorschrift:  $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_2, x_1)$

(iv)  $em \circ s$

Argumentmenge:  $\mathbb{R}^2$

Zielmenge:  $\mathbb{R}^3$

Zuordnungsvorschrift:  $(x_1, x_2) \rightarrow (x_2, x_1, 0)$

(b) (i)  $f \circ em$

Surjektive, injektiv und auch bijektiv

(ii)  $em \circ f$

Injektiv, aber nicht surjektiv (und deswegen nicht Bijektiv)



(iii)  $s \circ f$

Surjektive, aber nicht injektiv

(iv)  $em \circ s$ 

Injektiv, aber nicht surjektiv

(c)

Bild:  $[0, 2] \times [0, 1] \times \{0\}$ Urbild:  $[0, 1] \times [-2, 0] \times \mathbb{R}$ 

□

**Aufgabe 5.** Es sei  $M$  eine beliebige, nichtleere Menge und  $f : M \rightarrow M$  eine Abbildung. Wir definieren induktiv  $f^0 := id$  und für  $k \in \mathbb{N}$   $f^k := f \circ f^{k-1}$ .

- (a) Zeigen Sie:  $f^{k+l} = f^k \circ f^l$  für alle  $k, l \in \mathbb{N}_0$
- (b) Zeigen Sie: Gibt es  $k_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  und  $l \in \mathbb{N}$  mit  $f^{k_0+l} = f^{k_0}$ , dann gilt  $f^{k+l} = f^k$  für alle  $k \in \mathbb{N}_0$  mit  $k \geq k_0$ .
- (c) Geben Sie eine Funktion  $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$  an, für die  $f^1 \neq f^3$ , aber  $f^{k+2} = f^k$  für alle  $k \geq 2$  gilt. Begründen Sie, dass Ihre Funktion diese Eigenschaft hat.

*Beweis.* (a) Wir beweisen es per Induktion auf  $k$ . Für  $k = 1$  gilt es per Definition (es wird in der Frage gegeben). Jetzt nehme an, dass es für ein beliebige  $k \in \mathbb{N}$  gilt.

Es gilt dann:

$$\begin{aligned}
 f^{(k+1)+l} &= f \circ f^{k+l} \\
 &= f \circ f^k \circ f^l \\
 &= (f \circ f^k) \circ f^l \\
 &= f^{k+1} \circ f^l
 \end{aligned}$$

Deswegen gilt es auch für  $k + 1$ , und daher für alle  $k \in \mathbb{N}$ .

(b) Sei  $k = k_0 + k'$ . Es gilt

$$f^{k+l} = f^{k_0+k'+l} = f^{k_0} = f^{k_0+k'} = f^k.$$

(c) Sei  $f$  definiert durch

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \\ f(2) &= 1 \\ f(3) &= 2 \\ f(4) &= 1 \\ f(5) &= 4 \end{aligned}$$

Es gilt dann

x	$f^1(x)$	$f^2(x)$	$f^3(x)$	$f^4(x)$	$f^5(x)$
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	2	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	4	1	1	1	1

$f^1 \neq f^3$ , weil  $f^1(3) \neq f^3(3)$ . Aber  $f^k(x) = 1 \forall k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, k \geq 2$ . Daher ist  $f^{k+2} = f^k, k \geq 2$ .  $\square$

**Aufgabe 6.** Es seien  $M, N$  Mengen,  $m, n$  natürliche Zahlen und die Abbildungen  $f : M \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, m\}, g : N \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$  bijektiv. Finden Sie eine natürliche Zahl  $k$  und eine bijektive Abbildung  $F : M \times N \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, k\}$ .

*Beweis.*  $k = nm$ , und

$$F(a, b) = a + (b - 1)m.$$

Das ist bijektiv. Sei  $x \in \{1, 2, \dots, nm\}$ . Es existiert eindeutige Zahlen  $p, q \in \mathbb{N}$ , so dass

$$x = pm + q, q < m.$$

Falls  $q = 0$ , sei  $b = p, a = m$ . Sonst definiert man  $b = p + 1, a = m$ . Per Definition ist  $a \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ . Außerdem ist  $1 \leq b \leq n$ , weil  $p \leq k/m = n$  ( $n$  teilt  $k = mn$ ).  $\square$

## 1.3 Blatt 3

**Aufgabe 7.** Entscheiden Sie zu jedem der folgenden Objekte, welche der Bezeichnungen aus Definition 2.3.3 darauf zutreffen

- (a)  $(\mathbb{R}, *, -2)$ , wobei  $*$  :  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $a * b := a + b + 2$  definiert ist.
- (b)  $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$

(c)  $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, -, 0)$ , wobei  $\bar{a} - \bar{b} := \bar{a} + (-\bar{b})$

(d)  $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, *, 4)$  mit  $*$  :  $\mathbb{Z} \setminus \{0\} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}, (a, b) \rightarrow ab^{-1}$

*Beweis.* (a) Eine abelsche Gruppe. Es ist assoziativ:

$$\begin{aligned} a * (b * c) &= a + (b + c + 2) + 2 \\ &= (a + b + 2) + c + 2 \\ &= (a * b) * c \end{aligned}$$

Es gilt auch  $(-2) * x = (-2) + x + 2 = x$  und auch  $x * (-2) = x$  für alle  $x$ , also  $e = -2$  ist ein neutrales Element. Für jeder  $x$  gibt es auch  $y = -(x + 4) \in \mathbb{R}$ , damit

$$y * x = -(x + 4) + x + 2 = -2 = e.$$

(b) Kommutatives Monoid. Per Definition ist 1 das neutrale Element, und für jeder  $0 \neq x \in \mathbb{R}$  gibt es  $1/x \in \mathbb{R}$ , und  $x(1/x) = 1$ . Aber es existiert keine  $x \in \mathbb{R}$ , so dass  $x0 = 1$ .

(c) Magma. Es gilt

$$\begin{aligned} \bar{a} - (\bar{b} - \bar{c}) &= \bar{a} + [-(\bar{b} - \bar{c})] \\ &= \bar{a} + (-\bar{b}) + \bar{c} \\ (\bar{a} - \bar{b}) - \bar{c} &= \bar{a} + (-\bar{b}) + (-\bar{c}) \\ &\neq \bar{a} - (\bar{b} - \bar{c}) \end{aligned}$$

Deswegen ist  $-$  nicht assoziativ.

(d) Nichts.  $*$  ist keine Verknüpfung.

□

**Aufgabe 8.** Es sei  $(M, \cdot)$  ein Magma,  $(H, \odot)$  eine Halbgruppe und  $\alpha : H \rightarrow M$  eine surjektive Abbildung, die die Bedingung  $\alpha(a \odot b) = \alpha(a) \cdot \alpha(b)$  für alle  $a, b \in H$  erfüllt.

Zeigen Sie

(a) Dann ist auch  $M$  eine Halbgruppe.

(b) Ist  $H$  ein Monoid mit neutralem Element  $e$ , dann ist  $M$  ein Monoid mit neutralem Element  $\alpha(e)$ .

(c) Ist  $(H, \odot, e)$  sogar eine Gruppe, dann ist  $(M, \cdot, \alpha(e))$  eine Gruppe.

*Beweis.* (a) Sei  $\beta, \gamma, \delta \in M$ . Weil  $\alpha$  surjektiv ist, gilt  $\beta = \alpha(a), \gamma = \alpha(b), \delta = \alpha(c), a, b, c \in H$ . Es gilt

$$\beta \cdot (\gamma \cdot \delta) = \alpha(a) \cdot (\alpha(b) \cdot \alpha(c))$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha(a) \cdot (\alpha(b \odot c)) \\
&= \alpha(a \odot (b \odot c)) \\
&= \alpha((a \odot b) \odot c) \\
&= \alpha(a \odot b) \cdot \alpha(c) \\
&= (\alpha(a) \cdot \alpha(b)) \cdot \alpha(c) \\
&= (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta
\end{aligned}$$

(b) Sei  $\beta \in M$ . Noch einmal haben wir  $\beta = \alpha(b), b \in H$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\beta \cdot \alpha(e) &= \alpha(b) \cdot \alpha(e) \\
&= \alpha(b \odot e) \\
&= \alpha(b) \\
&= \beta
\end{aligned}$$

und ähnlich auch für  $\alpha(e) \cdot \beta = \beta$ .

(c) Wir müssen nur zeigen, dass es ein Inverse gibt. Sei  $M \ni \beta = \alpha(a), a \in H$ . Weil  $H$  eine Gruppe ist, existiert  $a^{-1} \in H$ , so dass  $a \odot a^{-1} = e$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\beta \cdot \alpha(a^{-1}) &= \alpha(a) \cdot \alpha(a^{-1}) \\
&= \alpha(a \odot a^{-1}) \\
&= \alpha(e)
\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 9.** Wir wollen die folgende Verknüpfungstabelle so vervollständigen, dass  $(\{\partial, \eta, L\}, \odot, \eta)$  zu einer Gruppe wird.

$\odot$	$\partial$	$\eta$	$L$
$\partial$			
$\eta$			
$L$			

- (a) Begründen Sie, dass es nur höchstens eine solche Verknüpfungstafel geben kann.
- (b) Füllen Sie die Tafel so, dass eine Gruppe entsteht und begründen Sie, dass Sie die Verknüpfungstafel einer Gruppe gefunden haben.

*Beweis.* Notation: Ich schreibe  $ab$  statt  $a \odot b$ , für  $a, b \in \{\partial, \eta, L\}$ . Weil  $\eta$  das neutrale Element ist, muss die Verknüpfungstabelle so aussehen:

$\bullet$	$\partial$	$\eta$	$L$
$\partial$		$\partial$	
$\eta$	$\partial$	$\eta$	$L$
$L$		$L$	

Wir brauchen Bedingungen, die mögliche Gruppe einzuschränken.

**Lemma 1.9.** *Sei  $G$  eine Gruppe,  $x, y, z \in G$ , und*

$$zx = zy.$$

*Es gilt dann  $x = y$*

*Beweis.*

$$x = z^{-1}zx = z^{-1}zy = y.$$

□

**Korollar 1.10.** *In jeder Zeile und Spalte kommt jedes Element nur einmal vor.*

Leider ist es noch nicht genug, die Verknüpfungstabelle einzuschränken. Wir fangen deswegen an, und nehme an, dass  $\partial^2 = L$  ist. Wir betrachten die erste Spalte und Zeile, und kommen zu die Schlussfolgerung, dass  $\partial L = L\partial = \eta$ .

$\bullet$	$\partial$	$\eta$	$L$
$\partial$	$\eta$	$\partial$	$L$
$\eta$	$\partial$	$\eta$	$L$
$L$	$L$	$L$	$L$

Hier gibt es ein Problem:  $L\partial = L$ , und auch  $L\eta = L$ . Daraus folgt  $\partial = \eta$ , ein Widerspruch. Wir nehmen jetzt an,  $\partial^2 = L$ . Man kann die Verknüpfungstabelle ausfüllen.

$\bullet$	$\partial$	$\eta$	$L$
$\partial$	$L$	$\partial$	$\eta$
$\eta$	$\partial$	$\eta$	$L$
$L$	$\eta$	$L$	$\partial$

Das ist die einzige Lösung (es gibt keine Möglichkeiten mehr). Die Gruppe ist  $\cong C_3$ . Man kann beachten, dass  $\partial^2 = L, L^2 = \partial$ . Per Definition ist es abgeschlossen. Es gilt auch

$$\partial^{-1} = \partial^2 = L$$



$$L^{-1} = L^2 = \partial$$

Jetzt beweisen wir Assoziativität. Wir betrachten

$$a(bc) \stackrel{?}{=} (ab)c, \quad a, b, c \in \{\partial, \eta, L\}.$$

Im Fall, worin  $a, b$  oder  $c$  das neutrale Element  $\eta$  ist, folgt die Gleichung. Im Fall, worin nichts  $\eta$  ist, können wir  $L = \partial^2$  einsetzen. Jetzt ist die Gleichung

$$\partial^x (\partial^y \partial^z) = (\partial^x \partial^y) \partial^z, \quad x, y, z \in \{1, 2\},$$

was immer gilt, weil die beide Seite gleich  $\partial^{x+y+z}$  sind. Deswegen ist  $\bullet$  assoziativ.  $\square$

**Aufgabe 10.** Wir definieren die drei Abbildungen  $c_1, c_2, c_3 : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$  durch die Abbildungsvorschriften

$$\begin{array}{cccc} c_1(1) = 2 & c_1(2) = 1 & c_1(3) = 4 & c_1(4) = 3 \\ c_2(1) = 3 & c_2(2) = 4 & c_2(3) = 1 & c_2(4) = 2 \\ c_3(1) = 4 & c_3(2) = 3 & c_3(3) = 2 & c_3(4) = 1 \end{array}$$

Zeigen Sie:  $U := \{\text{id}, c_1, c_2, c_3\}$  ist eine Untergruppe von  $S(\{1, 2, 3, 4\})$ .

*Beweis.* Die folgende Aussagen können durch direkte Verkettung bewiesen werden:

$$\begin{aligned} c_1 \circ c_2 &= c_3 \\ c_2 \circ c_3 &= c_1 \\ c_3 \circ c_1 &= c_2 \\ c_1 \circ c_1 &= \text{id} \\ c_2 \circ c_2 &= \text{id} \\ c_3 \circ c_3 &= \text{id} \end{aligned}$$

Deswegen ist jede Elemente invertierbar. Es folgt daraus auch, dass  $U$  abgeschlossen ist.  $\text{id}$  ist natürlich das neutrale Element.  $\square$

**Aufgabe 11.** Es sei

$$\mathcal{L} := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{es existieren } a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, \text{ sodass für alle } x \in \mathbb{R} f(x) = ax + b\}.$$

- (a) Zeigen Sie:  $(\mathcal{L}, \circ, \text{id})$  ist eine Gruppe, aber nicht abelsch.
- (b) Wir definieren die Relation  $\sim \subseteq \mathcal{L} \times \mathcal{L}$  durch die Festlegung  $f \sim g$  genau dann, wenn  $f(x) - f(0) = g(x) - g(0)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt.

Zeigen Sie, dass dies eine Äquivalenzrelation ist und bestimmen Sie die Menge aller Äquivalenzklassen von  $\sim$ .

*Beweis.* (a) Sei  $f, g \in \mathcal{L}$ ,  $f = ax + b$ ,  $g = cx + d$ ,  $a \neq 0 \neq c$ . Es gilt

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= a(cx + d) + b \\ &= acx + ad + b\end{aligned}$$

Weil  $a \neq 0 \neq c$ , gilt  $ac \neq 0$ . Deswegen gilt, für

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = acx + ad + b$$

$h \in \mathcal{L}$ .  $(\mathcal{L}, \circ, \text{id})$  ist dann unter  $\circ$  abgeschlossen. Die Verkettung von Abbildungen ist immer assoziativ. Sei jetzt  $e \in \mathcal{L}$ ,  $e(x) = 1x + 0 = x$ . Es gilt dann

$$e \circ f = f \circ e = f,$$

also  $e$  ist ein neutrales Element. Sei  $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$ . Weil  $a \neq 0$ , sind  $1/a$  und  $b/a$  wohldefiniert, und  $1/a \neq 0$ . Es gilt

$$\begin{aligned}(f \circ f^{-1})(x) &= a\left(\frac{x}{a} - \frac{b}{a}\right) + b \\ &= x - b + b \\ &= x \\ (f^{-1} \circ f) &= \frac{1}{a}(ax + b) - \frac{b}{a} \\ &= x + \frac{b}{a} - \frac{b}{a} \\ &= x\end{aligned}$$

Deswegen gilt  $f \circ f^{-1} = e = f^{-1} \circ f$ , also  $f^{-1}$  ist die Inverse von  $f$ .  $\mathcal{L}$  ist dann eine Gruppe.

(b) (i) (Reflexivität) Es gilt

$$f(x) - f(0) = f(x) - f(0)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

(ii) (Symmetrie) Falls gilt

$$f(x) - f(0) = g(x) - g(0)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ , gilt auch

$$g(x) - g(0) = f(x) - f(0), x \in \mathbb{R}.$$

(iii) (Transitivität) Sei  $f, g, h \in \mathcal{L}$ , für die gilt

$$\begin{aligned}f \sim g &\iff f(x) - f(0) = g(x) - g(0), x \in \mathbb{R} \\ g \sim h &\iff g(x) - g(0) = h(x) - h(0), x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Es gilt, von die Transitivität der  $=_{\subseteq} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dass

$$f(x) - f(0) = h(x) - h(0), x \in \mathbb{R},$$

also  $f \sim h$

Ich vermute, dass die Äquivalenzklasse sind  $f, g \in \mathcal{L}, f(x) = ax + b, g(x) = cx + d, a \neq 0 \neq c$ , so dass

$$f \sim g \iff a = c.$$

Wir beweisen es:  $f(0) = b, g(0) = d$ , und daher  $f(x) - f(0) - ax, g(x) - g(0) = cx$ . Falls

$$ax = cx \forall x \in \mathbb{R},$$

muss  $a = c$ . Für  $a \neq c$  gilt es, dass es mindestens ein Punkt  $x_0 \in \mathbb{R}$  gibt, worauf  $ax_0 \neq cx_0$ . Deswegen sind die Äquivalenzklassen, für  $f, g \in \mathcal{L}, f = ax + b, g = cx + d$

$$f \sim g \iff a = c.$$

□

## 1.4 Blatt 4

### Aufgabe 12. Direktes Produkt

- (a) Zeigen Sie: Sind  $(G, *, e_G)$  und  $(H, \star, e_H)$  Gruppen, dann ist auch  $G \times H$  mit der Verknüpfung

$$\odot (G \times H) \times (G \times H) \rightarrow G \times H, \quad (g_1, h_1) \odot (g_2, h_2) := (g_1 * g_2, h_1 \star h_2)$$

und dem neutralen Element  $(e_G, e_H)$  eine Gruppe. Diese Gruppe nennt man auch das *direkte Produkt* von  $G$  und  $H$ .

- (b) Zeigen Sie: Sind  $(R, +, \cdot)$  und  $(S, \star, *)$  Ringe, dann ist auch  $R \times S$  mit den Verknüpfung  $\oplus$  und  $\odot$ , definiert durch  $(r_1, s_1) \oplus (r_2, s_2) := (r_1 + r_2, s_1 \star s_2)$  bzw.  $(r_1, s_1) \odot (r_2, s_2) := (r_1 \cdot r_2, s_1 * s_2)$  ein Ring.
- (c) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist  $(K, +, \cdot)$  ein Körper, dann ist auch  $K \times K$  mit den Verknüpfungen wie in (b) ein Körper.

*Beweis.* (a) (i) (Assoziativität)

$$\begin{aligned} (g_1, h_1) \odot ((g_2, h_2) \odot (g_3, h_3)) &= (g_1, h_1) \odot (g_2 * g_3, h_2 \star h_3) \\ &= (g_1 * (g_2 * g_3), h_1 \star (h_2 \star h_3)) \\ &= ((g_1 * g_2) * g_3, (h_1 \star h_2) \star h_3) \\ &= (g_1 * g_2, h_1 \star h_2) \odot (g_3, h_3) \\ &= ((g_1, h_1) \odot (g_2, h_2)) \odot (g_3, h_3) \end{aligned}$$

(ii) (Neutrales Element)

$$(g_1, h_1) \odot (e_G, e_H) = (g_1, h_1) = (e_G, e_H) \odot (g_1, h_1).$$

(iii) (Existenz des Inverses) Sei  $(g_1, h_1) \in G \times H$ . Weil  $G$  und  $H$  Gruppe sind, gibt es Elemente  $g_1^{-1} \in G, h_1^{-1} \in H$ , sodass  $g_1 * g_1^{-1} = e_G = g_1^{-1} * g_1$  und  $h_1 \star h_1^{-1} = e_H = h_1^{-1} \star h_1$ . Es gilt

$$(g_1, h_1) \odot (g_1^{-1}, h_1^{-1}) = (g_1 * g_1^{-1}, h_1 \star h_1^{-1}) = (e_G, e_H),$$

$$\text{und \u00e4hnlich auch } (g_1^{-1}, h_1^{-1}) \odot (g_1, h_1) = (e_G, e_H)$$

Schluss:  $(G \times H, \odot, (e_G, e_H))$  ist eine Gruppe.

(b) (i)  $(R \times S, \oplus, (0_R, 0_S))$  ist eine abelsche Gruppe.

Folgt aus (a).

(ii)  $\oplus$  ist assoziativ:

Beweis l\u00e4uft \u00e4hnlich zu (a), die Behauptung folgt aus der Assoziativit\u00e4t von  $\cdot$  und  $*$ .

(iii) Distributivgesetz:

$$\begin{aligned} (r_1, s_1) \odot ((r_2, s_2) \oplus (r_3, s_3)) &= (r_1, s_1) \odot (r_2 + r_3, s_2 \star s_3) \\ &= (r_1 \cdot (r_2 + r_3), s_1 * (s_2 \star s_3)) \\ &= (r_1 \cdot r_2 + r_1 \cdot r_3, s_1 * s_2 \star s_1 * s_3) \\ &= (r_1 \cdot r_2, s_1 * s_2) \oplus (r_1 \cdot r_3, s_1 * s_3) \\ &= [(r_1, s_1) \odot (r_2, s_2)] \oplus [(r_1, s_1) \odot (r_3, s_3)] \end{aligned}$$

(c) Falsch. Sei  $x, y \in K$  beliebige Elemente von  $K$ . Es ist klar, dass  $(0, 0)$  das Nullelement ist, weil

$$(x, y) \oplus (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y).$$

Sei jetzt  $x \neq 0 \neq y$ . Es gilt

$$(x, 0) \odot (0, y) = (x \cdot 0, 0 \cdot y) = (0, 0),$$

also es gibt Nullteiler. □

**Aufgabe 13.** Zeigen Sie: In einem Ring  $(R, +, \cdot)$  gilt genau dann die K\u00fcrzungsregel

$$\text{Falls } a \in R \setminus \{0\} \text{ und } x, y \in R \text{ beliebig sind, dann gilt } a \cdot x = a \cdot y \implies x = y$$

wenn  $R$  nullteilerfrei ist.

*Beweis.* 1.  $R$  hat Nullteiler  $\implies$  die Kürzungsregel gilt nicht.

Per Ausnahme gibt es  $x \in R \setminus \{0\}$  mit Nullteiler  $a \in R \setminus \{0\}$ , also  $a \cdot x = 0$ . Es gilt auch, dass  $a \cdot 0 = 0$ , daher

$$a \cdot x = a \cdot 0 = 0.$$

Aber  $x \neq 0$ , und die Kürzungsregel gilt nicht.

2.  $R$  nullteilerfrei  $\implies$  Kürzungsregel gilt.

Seien  $a \in R \setminus \{0\}$  und  $x, y \in R$  beliebig und

$$\begin{aligned} a \cdot x &= a \cdot y \\ a \cdot x + [-(a \cdot y)] &= a \cdot y + [-(a \cdot y)] \\ 0 &= a \cdot x - a \cdot y \\ &= a \cdot (x - y) \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass entweder  $a = 0$  oder  $x - y = 0$ . Weil wir schon ausgenommen haben, dass  $a \neq 0$ , gilt  $x - y = 0$ , oder  $x = y$ .  $\square$

**Aufgabe 14. (Verknüpfungsverträglich)** Es seien  $(G, \cdot, e_G), (H, *, e_H)$  Gruppen und  $\alpha : G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Zeigen Sie

- (a)  $U = \{u \in G \mid \alpha(u) = e_H\}$  ist eine Untergruppe von  $G$ .
- (b)  $\alpha(G)$  ist eine Untergruppe von  $H$ .
- (c) Durch  $a \sim b \iff ab^{-1} \in U$  wird eine verknüpfungsverträgliche Äquivalenzrelation auf  $G$  definiert.

*Beweis.* (a) (i) Neutrales Element.

$\alpha(e_G) = e_H$ , weil, für alle  $x \in G$  gilt

$$\alpha(x) = \alpha(x \cdot e_G) = \alpha(x) * \alpha(e_G).$$

(ii)  $U$  ist abgeschlossen.

Sei  $x, y \in U$ , also  $\alpha(x) = e_H = \alpha(y)$ . Es gilt

$$\alpha(x \cdot y) = \alpha(x) * \alpha(y) = e_H * e_H = e_H$$

also  $x \cdot y \in U$ .

(iii) Existenz des Inverses

Sei  $x \in U$ , und  $x \cdot x^{-1} = e_G$ . Es gilt

$$e_H = \alpha(e_G) = \alpha(x \cdot x^{-1}) = \alpha(x) * \alpha(x^{-1}) = e_H * \alpha(x^{-1}) = \alpha(x^{-1}),$$

also  $x^{-1} \in U$ .

(b) (a) Neutrales Element

$\alpha(e_G) = e_H$ , der Beweis ist schon in (a) geschrieben.

(b)  $\alpha(G)$  ist abgeschlossen.

Sei  $\alpha(G) \ni y_1 = \alpha(x_1)$  bzw.  $\alpha(G) \ni y_2 = \alpha(x_2)$ , für  $x_1, x_2 \in G$ .  
Es gilt

$$y_1 * y_2 = \alpha(x_1) * \alpha(x_2) = \alpha(x_1 \cdot x_2) \in \alpha(G).$$

(c) Existenz des Inverses

Sei  $\alpha(G) \ni y = \alpha(x)$ . Sei auch  $x^{-1} \in G$ , sodass  $x \cdot x^{-1} = e_G = x^{-1} \cdot x$ . Es gilt

$$y * \alpha(x^{-1}) = \alpha(x) * \alpha(x^{-1}) = \alpha(x \cdot x^{-1}) = \alpha(e_G) = e_H,$$

also  $\exists \alpha(x^{-1}) \in \alpha(G)$ , für die gilt  $y * \alpha(x^{-1}) = e_H = \alpha(x^{-1}) * y$ .

(c) In (i) - (iii) beweisen wir, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Dann beweisen wir, dass sie verknüpfungsverträglich ist. Sei im Beweis  $x, y, z, w \in G$  beliebige Elemente.

(i) (Reflexivität)  $x \sim x$ , weil  $x \cdot x^{-1} = e_G \in U$ .

(ii) (Symmetrie) Sei  $x \sim y$ , also  $xy^{-1} \in U$ . Es gilt dann,  $(xy^{-1})^{-1} = yx^{-1}$ . Weil  $U$  eine Gruppe ist, gilt  $(xy^{-1})^{-1} \in U$ , also  $yx^{-1} \in U$ . Daraus folgt  $y \sim x$ .

(iii) (Transitivität) Sei  $x \sim y$  und  $y \sim z$ , also  $x \cdot y^{-1} \in U$  und  $y \cdot z^{-1} \in U$ . Es folgt

$$x \cdot z^{-1} = \underbrace{x \cdot y^{-1}}_{\in U} \cdot \underbrace{y \cdot z^{-1}}_{\in U} \in U,$$

also  $x \sim z$ .

(iv) Sei  $x \sim y$  und  $z \sim w$ , also  $x \cdot y^{-1} \in U$  und  $z \cdot w^{-1} \in U$ . Wir möchten zeigen, dass  $x \cdot z \sim y \cdot w$ , also

$$x \cdot z \cdot (y \cdot w)^{-1} = x \cdot z \cdot w^{-1} \cdot y^{-1} \in U.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \alpha(x \cdot z \cdot w^{-1} \cdot y^{-1}) &= \alpha(x) * \alpha(z \cdot w^{-1}) * \alpha(y^{-1}) \\ &= \alpha(x) * e_H * \alpha(y^{-1}) \\ &= \alpha(x \cdot y^{-1}) \\ &= e_H \end{aligned}$$

also  $x \cdot z \sim y \cdot w$ . □

### Aufgabe 15. (Rechnen in verschiedenen Ringen)

- (a) Bestimmen Sie das inverse Element von  $\bar{6}$  in  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$  bzw.  $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$  oder weisen Sie nach, dass es nicht existiert.
- (b) Bestimmen Sie die Charakteristik von  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  bzw.  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ , wobei die beiden Teile des Produktes als Ringe interpretiert werden und die Verknüpfung wie in 12(b) definiert wird.
- (c) Bestimmen Sie alle  $z \in \mathbb{C}$ , die die Gleichung  $z^2 + 2$  erfüllen.
- (d) Berechnen Sie  $(7+i)(6-i)^{-1}$  und geben Sie das Ergebnis als komplexe Zahl gemäß Definition 2.4.14 an.
- (e) Bestimmen Sie die Einerstelle von  $27^{101}$ .

*Beweis.* (a) (i)  $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \bar{6} = \bar{2}$ , und es gibt kein inverse Element.

$$\begin{aligned}\bar{2} \cdot \bar{0} &= \bar{0} \\ \bar{2} \cdot \bar{1} &= \bar{2} \\ \bar{2} \cdot \bar{2} &= \bar{4} = \bar{0} \\ \bar{2} \cdot \bar{3} &= \bar{6} = \bar{2}\end{aligned}$$

(ii)  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \bar{6} = \bar{1}$ . Daher ist  $\bar{6} = \bar{6}^{-1}$ .

(iii)  $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}) \bar{6} \cdot \bar{6} = \bar{36} = \bar{1}$ .

(iv)  $(\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}) \bar{6} \cdot \bar{6} = \bar{36} = \bar{1}$ .

- (b) Im Allgemeinen ist die Charakteristik von  $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$  das kleinste gemeinsame Vielfache von  $a$  und  $b$ . Es gilt  $n \cdot 1_{\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}}$ , und auch  $n \cdot 1_{\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}}$ . Für  $\mathbb{N} \ni n < \text{kgV}(a, b)$  kann die beides gleichzeitig per Definition nicht gelten. Die Antworten folgen:

(i)  $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$  15

(ii)  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$  6

- (c)  $z^2 + 2 = 0$ ,  $z^2 = -2$ . Wir haben  $|z|^2 = |2|$ , und  $|z| = \sqrt{2}$ . Daraus folgt:

$$z = \pm\sqrt{2}i.$$

(d)

$$\begin{aligned}\frac{7+i}{6-i} &= \frac{(7+i)(6+i)}{(6-i)(6+i)} \\ &= \frac{42 + 13i - 1}{36 + 1} \\ &= \frac{41 + 13i}{37} \\ &= \left(\frac{41}{37}, \frac{13}{37}\right)\end{aligned}$$

(e)  $27^{101} = (3^3)^{101} = 3^{303}$ . Sei  $a$  die Einerstelle von  $3^{303}$ . Es gilt

$$3^{303} \equiv a \pmod{10}.$$

Wir berechnen

$$\begin{aligned} 3^1 &= 3 \equiv 3 \pmod{10} \\ 3^2 &= 9 \equiv 9 \pmod{10} \\ 3^3 &= 27 \equiv 7 \pmod{10} \\ 3^4 &\equiv 1 \pmod{10} \\ 3^5 &\equiv 3 \pmod{10} \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} 3^{303} &= 3^{4 \times 75 + 3} \\ &\equiv 3^3 \pmod{10} \\ &\equiv 7 \pmod{10} \end{aligned}$$

also die Einerstelle von  $27^{101}$  ist 7. □

**Aufgabe 16.** Wir können analog zur Konstruktion komplexer Zahlen vorgehen, um aus  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  größere Ringe zu konstruieren, d.h. für festes  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir auf  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  die Addition  $\oplus$  bzw. Multiplikation  $\odot$  durch

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

bzw.

$$(a_1, b_1) \odot (a_2, b_2) := (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

für alle  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Entscheiden Sie, für welche  $n \in \{2, 3, 4\}$  mit dieser Konstruktion ein Körper entsteht.

*Beweis.* ( $n = 2$ ) Es ist kein Körper, weil es nicht nullteilerfrei ist.

$$(\bar{1}, \bar{1}) \odot (\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{2}) = (\bar{0}, \bar{0}).$$

( $n = 3$ ) Es ist ein Körper. Wir wissen, weil 3 eine Primzahl ist, dass  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  ein Körper ist. Wir vermuten, dass das inverse Element

$$(a, b)^{-1} = \left( a(a^2 + b^2)^{-1}, -b(a^2 + b^2)^{-1} \right),$$

was wohldefiniert ist, weil  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  ein Körper ist. Wir wissen (und werden benutzen), dass Multiplikation in der ganzen Zahlen kommutativ ist. Es folgt

$$(a, b) \odot (a, b)^{-1} = \left( a^2(a^2 + b^2)^{-1} - b^2(a^2 + b^2)^{-1}, 0 \right)$$



$$\begin{aligned}
&= \left( (a^2 + b^2) (a^2 + b^2)^{-1}, 1 \right) \\
&= (1, 0),
\end{aligned}$$

was das neutrale Element ist (beweis gleich wie der Beweis bzgl.  $\mathbb{C}$ ).

( $n = 4$ ) Es ist noch einmal kein Körper, weil es nicht nullteilerfrei ist.

$$(\bar{2}, \bar{2}) \odot (\bar{2}, \bar{2}) = (\bar{0}, \bar{4} + \bar{4}) = (\bar{0}, \bar{0}). \quad \square$$

## 1.5 Blatt 5

**Aufgabe 17.** Es sei  $K$  ein Körper. Ferner seien  $a, b \in K[t] \setminus \{0\}$  Polynome.

Wir definieren  $r_0 := a, r_1 := b$  und definieren für  $k \in \mathbb{N}$   $q_k$  und  $r_{k+1}$  als Polynome, die

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \quad \deg(r_{k+1}) < \deg(r_k)$$

erfüllen, falls  $r_k \neq 0$  und ansonsten definieren wir  $r_{k+1} = r_k = 0$ .

- (a) Zeigen Sie: Es gibt ein minimales  $k_0 \in \mathbb{N}$ , sodass  $r_k = 0$  für alle  $k > k_0$ .
- (b) Zegen Sie: Mit dieser Wahl ist  $r_{k_0} \neq 0$  und  $r_{k_0}$  ist ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$ .
- (c) Zeigen Sie: Ist  $s \in K[t]$  ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$ , dann ist  $s$  auch ein Teiler von  $r_{k_0}$ .

*Beweis.* (a) Es gilt  $\deg(r_k) < \deg(r_k)$ , also die Folge  $\deg(r_k)$  ist streng monoton fallend. Weil es nur endliche Möglichkeiten  $k$  für die Grad eines Polynomes mit  $k < \deg(b)$  gibt, muss es ein Zahl  $k'_0$  geben, mit  $\deg(r_{k'_0}) = -\infty$ .

(Die Möglichkeiten sind  $\{-\infty, 0, 1, \dots, \deg(b)\}$ .)

$\deg(r_{k_0}) = -\infty$  genau dann, wenn  $r_{k_0} = 0$ . Es folgt per Definition,  $r_{k_0+1} = 0$  und  $r_k = 0 \forall k \geq k_0$  per Induktion.

Weil  $\{0, 1, \dots, k'_0\}$  endlich ist, gibt es ein minimales Zahl  $k_0$  mit die gewünschte Eigenschaft.

Mit dieser Wahl ist  $r_{k_0} \neq 0$ .

(b)

Sonst wäre es ein Widerspruch, weil  $k_0$  nicht die kleinste Zahl mit diese Eigenschaft wäre. Falls  $r_{k_0} = 0$ , wäre  $k_0 - 1$  eine kleine Zahl mit die gewünschte Eigenschaft.

- (i) Wir beweisen zuerst die folgende Behauptung:

Sei  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k+1}$ . Dann ist  $p$  auch ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$ .

Per Definition teilt  $p$   $r_k$ . Wir wissen auch, dass

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}.$$

Weil  $p$  teilt  $r_k$ , teilt  $p$   $q_k r_k$  auch. Da  $p$  teilt auch  $r_{k+1}$ , teilt  $p$   $q_k r_k + r_{k+1}$ , also  $p$  teilt  $r_{k-1}$ . Dann ist  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$ .

- (ii) Sei  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_{k-1}$  und  $r_k$ ,  $k \leq k_0$ . Dann ist  $p$  auch ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$ .

Wir beweisen es per Induktion. Für  $k = 1$  ist es klar, dass alle gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  auch gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  sind.

Jetzt nehmen wir an, dass es für eine beliebige  $\mathbb{N} \ni k < k_0$  gilt, dass alle gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$  auch gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  sind.

Jetzt betrachten wir  $r_k$  und  $r_{k+1}$ . Sei  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k+1}$ . Aus (i) folgt, dass  $p$  auch ein Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$  ist. Per Induktionsvoraussetzung ist  $p$  auch ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$ .

- (iii) Insbesondere gilt, dass alle gemeinsamer Teiler  $p$  von  $r_{k_0}$  und  $r_{k_0-1}$  auch gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  sind.
- (iv) In (a) haben wir schon bewiesen, dass  $r_{k_0}$  ein Teiler von  $r_{k_0-1}$  ist. Daraus folgt, dass  $r_{k_0}$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_{k_0}$  und  $r_{k_0-1}$  ist. Es folgt, dass  $r_{k_0}$  ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  ist.

- (c) Der Beweis läuft ähnlich:

- (i) Wir beweisen per Induktion:

Sei  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$ .  $p$  ist dann ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$  für alle  $k \in \{0, 1, \dots, k_0\}$ .

- (ii) Induktionsvoraussetzung: Wir nehmen an, dass es für beliebige  $\mathbb{N} \ni k \leq k_0 - 1$ , dass alle gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  auch gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$  sind.
- (iii) Wir betrachten  $p$ , was ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  ist, also per Induktionsvoraussetzung ist  $p$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_k$  und  $r_{k-1}$ .

Es gilt  $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k$ , also weil  $p \mid r_k$  teilt, teilt  $p \mid q_k r_k$ . Es folgt, dass  $p \mid r_{k-1} - q_k r_k$ , und  $p \mid r_{k+1}$ . Also  $p$  ist ein gemeinsamer Teiler von  $r_{k+1}$  und  $r_k$ .

Insbesondere gilt, dass wenn  $s \in K[t]$  ein gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$  ist, ist  $s$  ein gemeinsamer Teiler von  $r_{k_0}$  und  $r_{k_0-1}$ , also  $s$  ist ein Teiler von  $r_{k_0}$ .  $\square$

**Aufgabe 18.** (a) Zeigen Sie: Ist  $K$  ein endlicher Körper, so gibt es ein Polynom  $p \neq 0$ , das alle  $x \in K$  als Nullstelle hat. Folgern Sie daraus, dass die Abbildung  $K[t] \rightarrow \text{Abb}(K, K), f \rightarrow (x \mapsto f(x))$  in diesem Fall nicht injektiv ist.

(b) Zeigen Sie: Ist  $p \in K[t]$  ein Polynom vom Grad 0, 1, 2 oder 3, das keine Nullstelle in  $K$  hat, dann hat von zwei Polynomen  $f, g$  mit  $f \cdot g = p$  mindestens eines Grad 0.

(c) Bestimmen Sie mit dem vietaschen Nullstellensatz alle rationalen Nullstellen von

$$q = 99 \cdot t^3 - 63 \cdot t^2 - 44 \cdot t + 28 \in \mathbb{Q}[t].$$

(d) Beweisen Sie, dass das Polynom  $t^8 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$  keine rationalen Nullstellen hat.

(e) Es seien  $f = (2 + 3i)X^7 - 5$  und  $g = X^2 - 2i$  in  $\mathbb{C}[X]$  gegeben. Bestimmen Sie wie im Existenzbeweis von Satz 2.4.26 die Polynome  $q, r \in \mathbb{C}[X]$  mit  $\deg(r) < \deg(g)$  und

$$f = q \cdot g + r.$$

*Beweis.* (a) Wir beweisen es konstruktiv. Sei  $p = \prod_{r \in K} (x - r)$ . Es gilt, für alle  $x \in K$ , dass  $x - x = 0$ , also  $p(x) = 0$ . Aber  $p \neq 0$ , z.B. ist das Koeffizient  $a_n = 1$ , wobei  $n = |K|$ .

Wir wissen, dass die Abbildung das konstruierte Polynom auf die Nullfunktion abbildet. Aber die Abbildung bildet auch das Nullpolynom auf die Nullfunktion ab. Also wir haben  $K[t] \ni 0 \neq p \in K[t]$ , aber die Abbildung bildet 0 und  $p$  auf die gleiche Funktion, also es ist nicht injektiv.

(b) Es gilt

$$\deg(p) = \deg(f) + \deg(g),$$

also es gibt nur zwei Möglichkeiten für  $\deg(f)$  und  $\deg(g)$ : Entweder haben wir  $0 + 3 = 3$  oder  $1 + 2 = 3$ .

Sei  $\deg(f) = 1$  und  $\deg(g) = 2$ , mit  $p = f \cdot g$ . Per Definition ist  $f(t) = a_0 + a_1 t, a_0, a_1 \in K$ . Sei  $t = -a_1^{-1} a_0 \in K$ . Es gilt  $\tilde{f}(t) = a_0 - a_1 a_1^{-1} a_0 = 0$ , also  $t$  ist eine Nullstelle von  $f$ .

Es folgt daraus, dass  $t$  ist eine Nullstelle von  $p$ , ein Widerspruch zu die Annahme, dass  $p$  keine Nullstellen hat.

Jetzt bleibt nur eine Möglichkeit, dass von  $f, g$  mindestens eines (eigentlich genau eine) Grad 0 hat.

- (c) Für alle rationale Nullstellen  $a/b, a \in \mathbb{N} \cup \{0\}, b \in \mathbb{Z}, a, b$  teilerfremd gilt

$$a|28 \quad b|99.$$

Weil  $28 = 2^2 \times 7$  und  $99 = 3^2 \times 11$ , sind die Möglichkeiten dafür:

$$\begin{aligned} a &\in \{1, 2, 4, 7, 14, 28\} \\ b &\in \{1, 3, 9, 11, 33, 99\} \end{aligned}$$

Man kann alle 36 Kombinationen probieren, die rationale Nullstellen sind:

$$\lambda_1 = -\frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{7}{11}, \quad \lambda_3 = \frac{2}{3}.$$

- (d) Wir verwenden Satz 2.4.37. Sei  $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, p, q \in \mathbb{Z}, q > 0$  teilerfremd, eine Nullstelle von  $t^8 - 2$ . Dann gilt

$$p|-2 \quad q|1,$$

also  $q = 1$  und  $p \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , dann  $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Aber für keine mögliche  $x$  gilt  $x^8 - 2 = 0$ , also  $t^8 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$  hat keine rationale Nullstellen.

- (e)

$$\begin{aligned} (2 + 3i)X^7 - 5 &= (X^2 - 2i)((2 + 3i)X^5 - (6 - 4i)X^3 \\ &\quad - (8 + 12i)X) + \underbrace{(24 - 16i)X - 5}_r. \quad \square \end{aligned}$$

**Aufgabe 19.** Beweisen oder widerlegen Sie folgende Behauptungen:

- (a)  $\mathbb{R}$  wird mit der gewöhnlichen Addition und Multiplikation ein  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.
- (b)  $\mathbb{Z}$  wird mit der gewöhnlichen Addition und der Multiplikation  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} : \bar{0} \cdot z = 0, \bar{1} \cdot z = z$  zu einem  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -Vektorraum.
- (c) Der Ring  $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$  wird mit der Multiplikation  $a \cdot (z, r) = (az, ar)$  zu einem  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- (d) Der Ring  $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$  wird mit der Multiplikation  $a \cdot (z, r) = (az, ar)$  zu einem  $\mathbb{C}$ -Vektorraum.
- (e) Jeder  $\mathbb{C}$ -Vektorraum ist mit der entsprechend eingeschränkten Multiplikation auch ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

*Beweis.* (a) Wahr. Wir wissen, dass  $(\mathbb{R}, +, 0)$  eine abelsche Gruppe ist.

Die andere Gruppenaxiome folgen aus die analoge Axiome für Addition und Multiplikation in  $\mathbb{R}$ , wenn man  $(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1)$  als Unterring von  $(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1)$  betrachtet.

(b) Falsch. Das Distributivgesetz wird verletzt. Sei  $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$  und daher  $a + a \neq 0$ . Es gilt

$$\begin{aligned} a + a &= \bar{1} \cdot a + \bar{1} \cdot a \\ &\neq (\bar{1} + \bar{1})a \\ &= \bar{0} \cdot a \\ &= 0 \end{aligned}$$

(c) Wahr. Es folgt ähnlich zu (a):

Wir haben  $+, \cdot : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . Wir wissen, dass  $(\mathbb{R}, +|_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}, \cdot|_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}, 0, 1)$  ein Unterring ist. Daraus folgt, dass  $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$  mit der Multiplikation  $a \cdot (z, r) = (az, ar)$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum ist.

(d) Falsch. Es gilt, z.B.  $(1, 1) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}, i \in \mathbb{C}$ , aber

$$i \cdot (1, 1) = (i, i) \notin \mathbb{C} \times \mathbb{R}.$$

□

**Aufgabe 20.** Es sei  $(V, +)$  eine abelsche Gruppe. Zeigen Sie:

(a) Die Menge  $\text{End}(V)$  aller Homomorphismen von  $V \rightarrow V$  bildet mit den Verknüpfungen

$$\oplus : \text{End}(V) \times \text{End}(V) \rightarrow \text{End}(V), f \oplus g := (V \rightarrow V, x \rightarrow f(x) + g(x))$$

und  $\circ$  der gewöhnlichen Hintereinanderausführung von Abbildungen, einen Ring mit 1.

(b) Enthält  $\text{End}(V)$  einen Körper  $K$ , dann ist  $(V, +)$  mit der skalaren Multiplikation  $k \cdot v := k(v)$  ein  $K$ -Vektorraum.

*Beweis.* (a) (i) Wir wissen, weil  $(V, +)$  abelsch ist, dass  $(\text{End}(V), \oplus)$  auch eine abelsche Gruppe ist.

(ii) Wir wissen auch, dass Verkettung von Funktionen assoziativ ist.

(iii) Distributivgesetz: Sei  $f, g, h \in \text{End}(V)$ . Es gilt, für beliebige  $x \in V$ ,

$$\begin{aligned} [f \circ (g \oplus h)](x) &= f(g(x) + h(x)) \\ &= f(g(x)) + f(h(x)) && f \text{ ist ein Homomorphismus} \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x) \\ &= [(f \circ g) \oplus (f \circ h)](x) \end{aligned}$$

Weil  $x$  beliebig war, ist  $f \circ (g \oplus h) = (f \circ g) \oplus (f \circ h)$

- (iv) Sei  $1 \in \text{End}(V)$ ,  $x \rightarrow x$ . Sei außerdem  $f \in \text{End}(V)$ , und  $x \in V$  beliebig. Es gilt

$$f \circ 1 = 1 \circ f = f,$$

also  $\text{End}(V)$  ist ein Ring mit 1.

- (b)  $V$  ist eine abelsche Gruppe (das haben wir vorausgesetzt). Wir müssen nur die andere Axiome betrachten. In folgendes Sei  $\lambda, \mu \in K$  beliebiger Elemente von der Körper und  $v, w \in V$ . Weil  $K$  ein Körper ist, enthält  $K$  1.

- (i)  $(\lambda \oplus \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$  folgt per Definition von  $\oplus$ .  
(ii)  $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$  gilt, weil  $\lambda$  ein Homomorphismus ist.  
(iii)

$$\begin{aligned} (\lambda \circ \mu) \cdot v &= \lambda(\mu(v)) \\ &= \lambda \cdot (\mu \cdot v) \end{aligned}$$

- (iv) Es gilt  $1 \cdot v = 1(v) = v$  per Definition von 1. □

## 1.6 Blatt 6

**Aufgabe 21.** Entscheiden Sie, welche der folgenden Mengen ein Unterraum des jeweils angegebenen Vektorraums sind.

- (a)  $\{p \in \mathbb{R}[t] \mid \deg(p) \leq 4\} \subseteq \mathbb{R}[t]$ .  
(b)  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  mit  $\mathbb{R}$  als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.  
(c)  $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$  mit  $\mathbb{C}$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.  
(d)  $\{p \in \mathbb{Q}[t] \mid \forall a \in \mathbb{Q} : \tilde{p}(-a) = \tilde{p}(a)\}$ , wobei  $\tilde{p}$  die zu  $p$  gehörige Polynomfunktion bezeichnet, als Teilmenge von  $\mathbb{Q}[t]$ .  
(e)  $\{(1, 2, 3) + t \cdot (4, 5, 6) \mid t \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, 0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ .

*Beweis.* (a) Ja. Sei  $p_1 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$  und  $p_2 = b_0 + b_1t + b_2t^2 + b_3t^3 + b_4t^4$ . Es gilt

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t \\ &\quad + (a_2 + b_2)t^2 + (a_3 + b_3)t^3 + (a_4 + b_4)t^4 \end{aligned}$$

was auch ein Polynom mit  $\text{Grad} \leq 4$  ist.

Sei  $x \in \mathbb{R}$ . Dann ist

$$xp_1 = xa_0 + xa_1t + xa_2t^2 + xa_3t^3 + xa_4t^4,$$

noch ein Polynom mit  $\text{Grad} \leq 4$ .

(b) Nein. Es ist sogar kein Vektorraum, weil  $0 \notin \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

(c) Nein. Sei  $z \in B$  mit  $|z| = a < 1$ . Dann ist

$$\left| \frac{1}{a^2} z \right| = \frac{1}{a^2} |z| = \frac{1}{a} > 1,$$

also  $B$  ist nicht unter Skalarmultiplikation abgeschlossen.

(d) Ja. Sei  $p_1, p_2$  beliebige Elemente von der Menge, und  $x \in \mathbb{R}$  beliebig. Es gilt  $p_1 \tilde{+} p_2 = \tilde{p}_1 + \tilde{p}_2$ , und per Definition

$$\begin{aligned}\tilde{p}_1(a) &= \tilde{p}_1(-a) \\ \tilde{p}_2(a) &= \tilde{p}_2(-a)\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$p_1 \tilde{+} p_2(a) = \tilde{p}_1(a) + \tilde{p}_2(a) = \tilde{p}_1(-a) + \tilde{p}_2(-a) = p_1 \tilde{+} p_2(-a).$$

Außerdem ist  $x\tilde{p}_1 = x\tilde{p}_1$ , und

$$x\tilde{p}_1(a) = x\tilde{p}_1(a) = x\tilde{p}_1(-a) = x\tilde{p}_1(-a).$$

(e) Nein. Wir wissen, dass  $(1, 2, 3)$  ein Element von unserer Menge ist. Dann sollte  $2(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$  auch ein Element sein. Wir würden dann schreiben

$$(1, 2, 3) + t(4, 5, 6) = (2, 4, 6),$$

also

$$t(4, 5, 6) = (1, 2, 3).$$

Aus  $6t = 3$  haben wir  $t = \frac{1}{2}$ . Dann ist  $5t = \frac{5}{2} \neq 2$ , ein Widerspruch, also es ist kein Untervektorraum.  $\square$

**Aufgabe 22.** Entscheiden Sie, welche der folgenden Familien im jeweiligen Vektorraum linear unabhängig sind

(a)  $((1, 2, 3), (5, 4, 3), (6, 6, 6))$  in  $\mathbb{R}^3$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

(b)  $((1, i), (i, -1))$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{C}^2$ .

(c)  $((1, i), (i, -1))$  im  $\mathbb{C}$ -Vektorraum  $\mathbb{C}^2$ .

(d)  $(1, 1+t, 1+t+t^2)$  im  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -Vektorraum  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[t]$ .

(e)  $((1, 2, 3), (5, 4, 3), (6, 6, 7))$  in  $\mathbb{R}^3$  als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.

*Beweis.* (a) Nein, weil

$$(1, 2, 3) + (5, 4, 3) + (-1)(6, 6, 6) = 0.$$

(b) Ja. Sei  $a, b \in \mathbb{R}$ . Es gilt

$$a(1, i) + b(i, -1) = (a + bi, ai - b).$$

Wir würden  $a + bi = 0$  und  $ai - b = 0$ . Aber wir wissen, dass das nur möglich ist, wenn  $a = b = 0$ , also  $(1, i)$  und  $(i, -1)$  sind linear unabhängig.

(c) Nein, weil

$$i(1, i) + (-1)(i, -1) = (i, -1) - (i, -1) = 0,$$

und wir haben  $i \neq 0$ .

(d) Ja. Sei  $a, b, c \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , sodass

$$a(1 + t + t^2) + b(1 + t) + c(1) = at^2 + (a + b)t + (a + b + c) = 0.$$

Per Definition der Nullpolynom gilt  $a = 0$ . Dann ist  $b + a = 0$ , oder  $b = 0$ . Zuletzt gilt  $a + b + c = 0$ , also  $c = 0$  weil  $a = b = 0$ .

(e) Ja. Sei  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , sodass  $a(1, 2, 3) + b(5, 4, 3) + c(6, 6, 7) = 0$ . Es gilt

$$\begin{aligned} -6c &= a + 5b \\ -6c &= 2a + 4b \\ -7c &= 3a + 3b \end{aligned}$$

Aus den zweiten und ersten Gleichungen folgt

$$a + 5b = 2a + 4b,$$

also  $a = b$ . Aus der ersten oder zweiten Gleichung folgt  $c = -a$ . Aus der dritten Gleichung folgt

$$-7(-a) = 7a = 3a + 3b = 6a.$$

Weil  $7a = 6a$  muss  $a = 0$  sein. Dann ist  $b = c = 0$ . Also die Vektoren sind linear unabhängig.  $\square$

**Aufgabe 23.** Entscheiden Sie, welche der folgenden Familien ein Erzeugendensystem des jeweiligen Vektorraums sind

- (a)  $((1, 2, 3), (5, 4, 3), (6, 6, 6))$  in  $\mathbb{R}^3$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- (b)  $(\exp it)_{t \in \mathbb{Q}}$  in  $\mathbb{C}$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- (c)  $(1 + t^n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $\mathbb{Q}[t]$  als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.
- (d)  $(\tilde{p})_{p \in \mathbb{R}[t]}$  für den Vektorraum aller Funktionen  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- (e)  $((1, 2, 3), (5, 4, 3), (6, 6, 7))$  in  $\mathbb{R}^3$  als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.



*Beweis.* (a) Nein. Wir betrachten  $(6, 6, 5)$ . Wir hoffen, dass es als Summe

$$(6, 6, 5) = a(1, 2, 3) + b(5, 4, 3) + c(6, 6, 6)$$

dargestellt werden kann, wobei  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Weil  $(6, 6, 6)$  als linear Kombination der anderen 2 Vektoren geschrieben werden kann, können wir oBdA schreiben

$$(6, 6, 5) = a'(1, 2, 3) + b'(5, 4, 3) + (6, 6, 6),$$

oder einfach

$$(0, 0, -1) = a'(1, 2, 3) + b'(5, 4, 3).$$

wobei  $a', b' \in \mathbb{R}$ . Dann ist  $a' + 5b' = 0$ , oder  $a = -5b'$ . Es gilt also

$$\begin{aligned} 0 &= 2a' + 4b' \\ &= 2(-5b') + 4b' \\ &= -6b' \end{aligned}$$

also  $b' = 0$ . Daraus folgt  $a' = 0$ . Aber

$$0(1, 2, 3) + 0(5, 4, 3) = (0, 0, 0) \neq (0, 0, -1).$$

- (b) Nein. Wir können komplexe Zahlen mit nicht rationale Winkel nicht erreichen.
- (c) Ja. Sei  $v_n = 1 + t^n$   $n \in \mathbb{N}_0$  der Erzeugendensystem. Es ist  $v_0 = 1 + 1 = 2$ . Dann ist  $v_n - \frac{1}{2}v_0 = t^n$   $n \in \mathbb{N}$ . Weil wir wissen, dass  $t^n$  ein Erzeugendensystem ist, ist dann auch  $(1 + t^n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ein Erzeugendensystem.
- (d) Nein. Alle solche Funktionen  $\tilde{p}$  sind stetig, also lineare Kombinationen davon  $a_1\tilde{p}_1 + a_2\tilde{p}_2 + \dots$  sind auch stetig. Aber es gibt unstetige Funktionen  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , z.B.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ -1 & x > 0 \end{cases}.$$

- (e) Ja. Es gilt

$$\begin{aligned} (0, 0, 1) &= (6, 6, 7) - (5, 4, 3) - (1, 2, 3) \\ (1, 0, 0) &= -2(1, 2, 3) + (5, 4, 3) + 3(0, 0, 1) \\ (0, 1, 0) &= \frac{1}{2} [(1, 2, 3) - (1, 0, 0) - 3(0, 0, 1)] \end{aligned}$$

Weil alle Elemente der Standardbasis als Linearkombination von unserem System geschrieben werden können, können alle Elemente in  $\mathbb{R}^3$  auch. Dann ist es ein Erzeugendensystem. Weil es linear unabhängig ist, ist es eine Basis.  $\square$

**Aufgabe 24.** (a) Zeigen Sie: Ist  $(b_i)_{i \in B}$  eine Basis des  $\mathbb{R}$ -Vektorraums  $V$  und  $i_0 \in B$ , dann ist auch  $(b_i - 2b_{i_0})_{i \in B}$  eine Basis von  $V$ .

(b) Zeigen Sie: Ist  $K$  ein unendlicher Körper und sind  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$  Elemente von  $K$  mit  $x_i \neq x_j$  für  $i \neq j$ , so ist  $(b_k)_{k \in \{0,1,2,3,\dots,n\}}$  mit

$$b_k = \frac{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (t - x_i)\right) \left(\prod_{i=k+1}^n (t - x_i)\right)}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)\right) \left(\prod_{i=k+1}^n (x_k - x_i)\right)}$$

für jedes  $n \in \mathbb{N}_0$  eine Basis von  $K_{\leq n}[t] = \{p(t) \in K[t] \mid \deg(p) \leq n\}$ .

(c) Geben Sie mit Hilfe der Basis aus der vorigen Teilaufgabe ein rationales Polynom vom Grad höchstens 4 an, dessen Polynomfunktion die Funktionswerte  $f(1) = 1$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 9$ ,  $f(4) = 17$ ,  $f(5) = 6000$  hat.

*Beweis.* (a)  $(b_i - 2b_{i_0})_{i \in B}$  ist...

(i) Linear unabhängig

Sei  $(a_k)_{k \in B}$ ,  $a_k \in R$ , nicht alle 0, sodass

$$\sum_{i \in B} a_i (b_i - 2b_{i_0}) = 0.$$

Es ist dann

$$\sum_{B \ni i \neq i_0} a_i b_i + 2 \left( \sum_{B \ni i \neq i_0} a_i \right) b_{i_0} - a_{i_0} b_{i_0} = 0.$$

Die Koeffizienten sind nicht alle null, also  $(b_i)_{i \in B}$  ist nicht linear unabhängig, ein Widerspruch, weil es ist dann kein Basis.

(ii) Ein Erzeugendesystem

Sei  $v \in V$  beliebig und  $a_i \in \mathbb{R}$ , sodass

$$v = \sum_{i \in B} a_i b_i,$$

was immer möglich ist, weil  $(b_i)_{i \in B}$  eine Basis ist. Sei dann

$$c_i = \begin{cases} a_i & i \neq i_0 \\ -2 \sum_{B \ni i \neq i_0} a_i - a_{i_0} & i = i_0 \end{cases}.$$

Es gilt dann

$$\sum_{i \in B} c_i (b_i - 2b_{i_0}) = \sum_{B \ni i \neq i_0} c_i (b_i - 2b_{i_0}) + c_{i_0} (b_{i_0} - 2b_{i_0})$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{B \ni i \neq 0} c_i b_i - 2 \sum_{B \ni i \neq i_0} b_{i_0} - c_{i_0} b_{i_0} \\
&= \sum_{B \ni i \neq i_0} a_i b_i + a_{i_0} b_{i_0} \\
&= \sum_{i \in B} a_i b_i \\
&= v
\end{aligned}$$

Weil  $v$  beliebig war, haben wir einen Erzeugendensystem. Die Behauptung folgt.

- (b) Wir betrachten die Wirkung der Polynomfunktion  $\tilde{b}_k$  auf ein Punkt  $x_i$ . Es gilt, für  $i \neq k$ ,  $\tilde{b}_k(x_i) = 0$ . Für  $i = k$  ist

$$\tilde{b}_k(x_k) = \frac{\left( \prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left( \prod_{i=k+1}^n (x_k - x_i) \right)}{\left( \prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left( \prod_{i=k+1}^n (x_k - x_i) \right)} = 1.$$

Sei  $p \in K[t]$  ein Polynom mit Grad  $\leq n$ . Wir wissen, dass nachdem wir  $\tilde{p}(x_i)$  für alle  $1 \leq i \leq n$  wissen, ist das Polynom eindeutig. Sei jetzt  $p(x_i) = a_i$  für alle  $i$ . Es ist  $p' = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ . Dann gilt  $\tilde{p}'(x_i) = a_i$  für alle  $i$ , also  $p' = p$ , also  $(b_k)$  ist ein Erzeugendensystem.

Weil wir genau  $\dim(K_{\leq n}[t]) = n+1$   $b_k$  haben, ist es ein Basis, sonst wäre die Dimension nicht eindeutig.

- (c) Sei  $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5$ . Wir betrachten zuerst

$$c_k = \left( \prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left( \prod_{i=k+1}^n (x_k - x_i) \right)$$

für  $k =$

- (0)  $c_0 = 24$
- (1)  $c_1 = -6$
- (2)  $c_2 = 4$
- (3)  $c_3 = -6$
- (4)  $c_4 = 24$

Dann betrachten wir die Polynomfunktion:

$$\tilde{p} = \sum_{i=0}^4 \left( \frac{1}{c_i} \prod_{i \neq k=0}^4 (t - x_i) \right).$$

$p$  ist dann ein Polynom mit die gewünschte Nullstellen. Nach Vereinfachung ist

$$\frac{5971x^4}{24} - \frac{9951x^3}{4} + \frac{208985x^2}{24} - \frac{49751x}{4} + 5970.$$

□

## 1.7 Blatt 7

**Aufgabe 25.** Wir betrachten den Unterraum  $U$  von  $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}[t]$ , der von

$$B = (\bar{1}, t^2 + t, t^3 - t^2, t + t^3, t^7, t^6 + t^5 + t^3, t^4 - \bar{5})$$

erzeugt wird.

- (a) Entscheiden Sie, ob  $B$  eine Basis von  $U$  ist. Finden Sie andernfalls eine Basis  $B'$  von  $U$ , die nur aus Elementen von  $B$  besteht.
- (b) Zeigen Sie: Die Polynome

$$(t^7 - t^3 - t - \bar{5}, \bar{2}t^7 - \bar{2}\bar{7}, t^6 + t^5 - t^4 + t^3 + \bar{5})$$

liegen alle in  $U$  und sie sind linear unabhängig.

- (c) Bestimmen Sie eine Umnummerierung von  $B'$ , die die Aussage des Austauschsatzes 2.6.8 mit  $(w_1, w_2, w_3) = (t^7 - t^3 - t - \bar{5}, \bar{2}t^7 - \bar{2}\bar{7}, t^6 + t^5 - t^4 + t^3 + \bar{5})$  erfüllt.

*Beweis.* (a) Nein. Per Definition ist  $B$  ein Erzeugendensystem. Es bleibt nur zu zeigen, dass es linear unabhängig ist.

Es ist aber nicht linear unabhängig. Es gilt

$$-(t^3 + t) + (t^2 + t) + (t^3 - t^2) = 0,$$

also es ist nicht linear unabhängig. Eine Basis  $B'$  ist

$$B' = \{\bar{1}, t^2 + t, t^3 + t, t^7, t^6 + t^5 + t^3, t^4 - \bar{5}\}$$

(also  $B$  ohne  $t^3 - t^2$ .)

- (b) Es gilt

$$\begin{aligned} t^7 - t^3 - t - \bar{5} &= t^7 - (t^3 + t) - \bar{5}(\bar{1}) \\ \bar{2}t^7 - \bar{2}\bar{7} &= \bar{2}t^7 - \bar{2}\bar{7}(\bar{1}) \\ t^6 + t^5 - t^4 + t^3 + \bar{5} &= (t^6 + t^5 + t^3) - (t^4 - \bar{5}) \end{aligned}$$

also die liegen alle in  $U$ . Sei  $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$ , so dass

$$\begin{aligned} x_1(t^7 - t^3 - t - \bar{5}) + x_2(\bar{2}t^7 - \bar{2}\bar{7}) \\ + x_3(t^6 + t^5 - t^4 + t^3 + \bar{5}) &= 0 \end{aligned}$$

Aus Vergleich des Koeffizienten von  $t$  gilt  $x_1 = \bar{0}$ . Dann vergleich wir den Koeffizient von  $t^7$  und erhalten  $x_2 = \bar{0}$ . Dann muss  $x_3 = \bar{0}$ , also sie sind linear unabhängig.

(c)

$$B' = \{t^3 + t, t^7, t^4 - \bar{5}, \bar{1}, t^2 + t, t^6 + t^5 + t^3\}. \quad \square$$

**Aufgabe 26.** Bestimmen Sie die Dimension der folgenden Vektorräume.

(a)  $V_1 = \{p \in \mathbb{Q}[x] \mid p(0) = 0 \wedge \deg(p) \leq 6\}$

(b)  $V_2 = \{p \in \mathbb{Q}[x] \mid \forall a \in \mathbb{Q} : p(-a) = -p(a)\}$

(c)  $V_3 = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} : v_i - v_{n-i+1} = 0\}$

*Beweis.* (a) Sei  $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$ . Es gilt  $p(0) = a_0$ . Also wir müssen  $a_0 = 0$ . Dann ist  $V_1$  gespannte durch

$$B_1 = \{t, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6\}.$$

Die Vektoren sind linear unabhängig, also ist  $\dim(V_1) = 6$ .

(b) Ein Polynom in  $V_2$  muss dann nur gerade Potenzen enthalten. Dann ist ein Basis für  $V_2$

$$B_2 = \{x^{2n}, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

also  $\dim(B_2)$  ist abzählbar.

(c) Ein Basis für  $V_3$  ist  $\{(1, 0, \dots, 0, 1), (0, 1, \dots, 1, 0), \dots, (0, \dots, 1, \dots, 0)\}$ , also die Dimension ist

$$\dim(V_3) = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

□

**Aufgabe 27.** Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{5} & \bar{6} & \bar{7} & \bar{8} \\ \bar{4} & \bar{3} & \bar{2} & \bar{1} \end{pmatrix} \in (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^{3 \times 4}.$$

(a) Bringen Sie  $A$  mit elementaren Zeilenoperationen auf Zeilenstufenform. Lesen Sie anschließend den Zeilenrang von  $A$  ab.

(b) Bringen Sie  $B = A^T$  mit elementaren Zeilenoperationen auf Zeilenstufenform. Lesen Sie anschließend den Zeilenrang von  $B$  ab.

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{5} & \bar{6} & \bar{7} & \bar{8} \\ \bar{4} & \bar{3} & \bar{2} & \bar{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 + \bar{6}R_1} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{0} & \bar{7} & \bar{3} & \bar{10} \\ \bar{4} & \bar{3} & \bar{2} & \bar{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + \bar{7}R_1} \\ & \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{0} & \bar{7} & \bar{3} & \bar{10} \\ \bar{0} & \bar{6} & \bar{1} & \bar{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \bar{8}} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{0} & \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} \\ \bar{0} & \bar{6} & \bar{1} & \bar{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + 5R_2} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} \\ \bar{0} & \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

also der Zeilenrang von  $A$  ist 2.

(b)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{2} & \overline{6} & \overline{3} \\ \overline{3} & \overline{7} & \overline{2} \\ \overline{4} & \overline{8} & \overline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 + \overline{9}R_1} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{7} & \overline{6} \\ \overline{3} & \overline{7} & \overline{2} \\ \overline{4} & \overline{8} & \overline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + \overline{8}R_1} \\
& \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{7} & \overline{6} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{1} \\ \overline{4} & \overline{8} & \overline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 + \overline{7}R_1} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{7} & \overline{6} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{10} & \overline{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \overline{8}} \\
& \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{1} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{10} & \overline{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + \overline{8}R_2} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{1} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{10} & \overline{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 + R_2} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{5} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{1} & \overline{4} \\ \overline{0} & \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

also der Zeilenrank von  $A^T$  ist 2.  $\square$ 

**Aufgabe 28.** Wir betrachten  $U = \text{span}((1, 2, 5, 6), (5, 4, 3, 2), (4, 3, 6, 5)) \subseteq \mathbb{Q}^4$ .

(a) Bringen Sie

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

mit elementaren Zeilenoperationen auf Zeilenstufenform. Die entstandenen Zeilenvektoren nennen wir ab jetzt  $b_1, b_2, b_3$ .

(b) Begründen Sie, dass  $b_1, b_2, b_3$  linear unabhängig sind.(c) Begründen Sie, dass  $b_1, b_2, b_3$  in  $U$  liegen.

(d) Folgern Sie mit Hilfe der vorigen beiden Aussagen, dass sowohl  $((1, 2, 4, 5), (5, 4, 3, 2), (4, 3, 6, 5))$  als auch  $(b_1, b_2, b_3)$  eine Basis von  $U$  bilden.

(e) Nutzen Sie die Basis  $(b_1, b_2, b_3)$ , um herauszufinden, welche der Vektoren  $u_1 = (1, 1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0, 0)$  bzw.  $u_3 = (1, 2, 3, 4)$  in  $U$  enthalten sind. Geben Sie in diesem Fall zudem die Koeffizienten der Linearkombination

$$\lambda_i(1, 2, 5, 6) + \mu_i(5, 4, 3, 2) + \tau_i(4, 3, 6, 5) = u_i$$

an.

*Beweis.* (a)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 5R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & -6 & -22 & -28 \\ 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 4R_1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & -6 & -22 & -28 \\ 0 & -5 & -14 & -19 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times -\frac{1}{6}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{11}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -5 & -14 & -19 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + 5R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{11}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{13}{3} & \frac{13}{3} \end{pmatrix}$$

(b) Sei  $q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Q}$ , so dass

$$q_1 b_1 + q_2 b_2 + q_3 b_3 = 0.$$

Wir betrachten zuerst die erste Komponent. Weil die erste Komponent nur in  $b_1$  ungleich 0 ist, muss  $q_1 = 0$ . Die zweite Komponent ist nur in  $b_2$  ungleich 0, also  $q_2 = 0$ . Daraus folgt, weil  $b_3 \neq 0$ , dass  $q_3 = 0$ , also  $b_1, b_2, b_3$  sind linear unabhängig.

(c) Durch elementare Zeilenoperationen arbeiten wir immer nur mit linear Kombinationen von Zeilen, also das Ergebnis muss eine lineare Kombination sein.

Wir berechnen es explizit, weil wir es später brauchen werden:

$$\begin{aligned} b_1 &= (1, 2, 5, 6) \\ b_2 &= \frac{5}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{1}{6}(5, 4, 3, 2) \\ b_3 &= \frac{1}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{5}{6}(5, 4, 3, 2) + (4, 3, 6, 5) \end{aligned}$$

(d) Wir wissen aus Satz 2.4.18, dass die Erzeugendensysteme sind. Dann ist es nur zu zeigen: Die Systeme sind linear unabhängig. Wir wissen, dass  $b_1, b_2, b_3$  linear unabhängig sind.

Wir nehmen an, dass es Zahlen  $x, y, z \in \mathbb{Q}$  gibt, nicht alle null, so dass

$$x(1, 2, 4, 5) + y(5, 4, 3, 2) + z(4, 3, 6, 5) = (0, 0, 0, 0).$$

Dann können wir  $x(1, 2, 4, 5) + y(5, 4, 3, 2) + z(4, 3, 6, 5)$  als Summe von  $b_1, b_2, b_3$  schreiben. Dann haben wir ein linear Kombination von  $b_1, b_2, b_3$  mit Koeffizienten nicht alle 0, aber das Kombination ist 0, also  $b_1, b_2, b_3$  wären dann nicht linear unabhängig.

(e) (1) Es gilt

$$x_1(1, 2, 5, 6) + y_1(0, 1, \frac{11}{3}, \frac{14}{3}) + z_1(0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3}) = (1, 1, 1, 1).$$

Daraus folgt:  $x_1 = 1$  und  $y_1 = -1$ , also

$$z_1(0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3}) + (1, 1, 4/3, 4/3) = (1, 1, 1, 1).$$

Wir entscheiden uns für  $z_1 = -\frac{1}{13}$  und die Behauptung folgt.

$$(1, 1, 1, 1) = (1, 2, 5, 6) - (0, 1, 11/3, 14/3) - \frac{1}{13}(0, 0, 13/3, 13/3)$$

$$\begin{aligned}
&= (1, 2, 5, 6) - \left[ \frac{5}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{1}{6}(5, 4, 3, 2) \right] \\
&\quad - \frac{1}{13} \left[ \frac{1}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{5}{6}(5, 4, 3, 2) + (4, 3, 6, 5) \right] \\
&= \frac{2}{13}(1, 2, 5, 6) + \frac{3}{13}(5, 4, 3, 2) - \frac{1}{13}(4, 3, 2, 5)
\end{aligned}$$

(2) Es würde gelten

$$(1, 1, 0, 0) = x_2(1, 2, 5, 6) + y_2 \left( 0, 1, \frac{11}{3}, \frac{14}{3} \right) + z_2 \left( 0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3} \right).$$

Daraus folgt:  $x_2 = 1$  und  $y_2 = -1$ , also

$$\left( 1, 1, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) + z_2 \left( 0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3} \right) = (1, 1, 0, 0).$$

Wir entscheiden uns für  $z_2 = -4/13$ , und die Gleichung ist erfüllt, also  $(1, 1, 0, 0)$  liegt in  $U$ . Es folgt:

$$\begin{aligned}
(1, 1, 1, 1) &= (1, 2, 5, 6) - (0, 1, 11/3, 14/3) - \frac{4}{13}(0, 0, 13/3, 13/3) \\
&= (1, 2, 5, 6) - \left[ \frac{5}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{1}{6}(5, 4, 3, 2) \right] \\
&\quad - \frac{4}{13} \left[ \frac{1}{6}(1, 2, 5, 6) - \frac{5}{6}(5, 4, 3, 2) + (4, 3, 6, 5) \right] \\
&= \frac{3}{26}(1, 2, 5, 6) + \frac{11}{26}(5, 4, 3, 2) - \frac{4}{13}(4, 3, 2, 5)
\end{aligned}$$

(3) Es würde gelten

$$(1, 2, 3, 4) = x_3(1, 2, 5, 6) + y_3 \left( 0, 1, \frac{11}{3}, \frac{14}{3} \right) + z_3 \left( 0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3} \right).$$

Daraus folgt:  $x_3 = 1$  und  $y_3 = 0$ , also

$$(1, 2, 3, 4) = (1, 2, 5, 6) + z_3 \left( 0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3} \right).$$

Dann sei  $z_3 = -\frac{6}{13}$ , und die Gleichung wurde erfüllt, also es liegt in  $U$ . Dann ist

$$\begin{aligned}
(1, 2, 3, 4) &= (1, 2, 5, 6) - \frac{6}{13} \left( 0, 0, \frac{13}{3}, \frac{13}{3} \right) \\
&= (1, 2, 5, 6) - \frac{6}{13} \left( \frac{1}{6}(1, 2, 5, 6) \right. \\
&\quad \left. - \frac{5}{6}(5, 4, 3, 2) + (4, 3, 6, 5) \right) \\
&= \frac{12}{13}(1, 2, 5, 6) + \frac{5}{13}(5, 4, 3, 2) - \frac{6}{13}(4, 3, 6, 5). \quad \square
\end{aligned}$$



## 1.8 Blatt 8

**Aufgabe 29.** Entscheiden Sie, welche der folgenden Abbildungen linear sind.

- (a)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \ (x, y) \rightarrow x \cdot y$
- (b)  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \ (x, y) \rightarrow x + y$
- (c)  $h : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t] \ p(t) \rightarrow p(t^2)$
- (d)  $k : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  mit  $k(t) = t + 2$
- (e)  $l : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $l(z) = \bar{z}$  mit  $\mathbb{C}$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum
- (f)  $l$ , aber mit  $\mathbb{C}$  als  $\mathbb{C}$ -Vektorraum

*Beweis.* (a) Nein.  $f((1, 1)) = 1 \cdot 1 = 1$ , aber  $f(2(1, 1)) = f((2, 2)) = 2 \cdot 2 = 4 \neq 2(1)$ .

- (b) Ja. Sei  $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ . Es gilt

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= f((x_1 + y_1, x_2 + y_2)) \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ &= f((x_1, x_2)) + f((y_1, y_2)) \end{aligned}$$

Sei außerdem  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} f(\lambda(x_1, x_2)) &= f((\lambda x_1, \lambda x_2)) \\ &= \lambda x_1 + \lambda x_2 \\ &= \lambda(x_1 + x_2) \\ &= \lambda f((x_1, x_2)) \end{aligned}$$

- (c) Ja. Sei  $p, q \in \mathbb{Q}[t]$ ,  $p = p_0 + p_1 t + p_2 t^2 + \dots + p_n t^n$  und  $q = q_0 + q_1 t + q_2 t^2 + \dots + q_n t^n$ . Es gilt

$$\begin{aligned} h(p(t)) &= p_0 + p_1 t^2 + p_2 t^4 + \dots + p_n t^{2n} \\ h(q(t)) &= q_0 + q_1 t^2 + q_2 t^4 + \dots + q_n t^{2n} \\ h(p(t)) + h(q(t)) &= (p_0 + q_0) + (p_1 + q_1) t^2 + \dots + (p_n + q_n) t^{2n} \\ &= h(p + q) \end{aligned}$$

Sei außerdem  $\lambda \in \mathbb{Q}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} h(\lambda p(t)) &= \lambda p_0 + \lambda p_1 t^2 + \lambda p_2 t^4 + \dots + \lambda p_n t^{2n} \\ &= \lambda (p_0 + p_1 t^2 + \dots + p_n t^{2n}) \\ &= \lambda h(p(t)) \end{aligned}$$

(d) Nein. Es gilt  $k(2) = 4$ , aber  $k(2 \cdot 2) = k(4) = 6 \neq 2k(2) = 8$ .

(e) Ja. Sei  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ , Es gilt  $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ .

Sei außerdem  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Es gilt dann

$$\overline{\lambda z_1} = \bar{\lambda} \bar{z}_1 = \lambda \bar{z}_1.$$

(f) Nein. Die erste Eigenschaft bleibt wie in (e), aber die zweite nicht.  
Sei  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Es gilt

$$\overline{\lambda z_1} = \bar{\lambda} \bar{z}_1 \neq \lambda \bar{z}_1$$

solange  $\lambda \notin \mathbb{R}$ . Sei z.B.  $\lambda = i$ ,  $z_1 = i$ . Dann gilt  $\lambda z_1 = -1$  und  $\overline{\lambda z_1} = -1$ . Das ist aber ungleich  $\lambda \bar{z}_1 = i(\bar{i}) = i(-i) = 1$ .  $\square$

**Aufgabe 30.** Entscheiden Sie, welche der folgenden linearen Abbildungen injektiv, surjektiv bzw. bijektiv sind.

(a)  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, x \rightarrow Ax$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 42 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b)  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, x \rightarrow Ax$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 42 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

(c)  $\mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t], p(t) \rightarrow p'(t)$

(d)  $\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$  mit  $(z, w) \rightarrow (z+w, z-\bar{w})$ , wobei wir  $\mathbb{C}^2$  als  $\mathbb{R}$ -Vektorraum auffassen.

(e)  $\text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}$  mit  $f \rightarrow \text{Re}(f|_{\mathbb{R}}) + \text{Im}(f|_{\mathbb{R}})$ , wobei  $f|_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f|_{\mathbb{R}}(x) := f(x)$  für  $x \in \mathbb{R}$  und  $\text{Re}$  bzw.  $\text{Im}$  den Real bzw. Imaginärteil bezeichnen.

*Beweis.* (a) Nicht injektiv, weil die Spalten nicht linear unabhängig sind.  
Insbesondere gilt

$$A \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es ist surjektiv, weil die erste zwei Spalten eine Basis sind.

(b)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 42 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \times \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 42 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 4R_1} \\
& \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 42 & 0 \\ 0 & -\frac{7}{3} & -\frac{14}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \times 18} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 42 & 0 \\ 0 & -42 & -84 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 42 & 0 \\ 0 & 0 & -84 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

also es ist injektiv und surjektiv, daher bijektiv.

(c) Nicht injektiv. Sei  $p = x + 1$  und  $q = x + 2$ . Dann ist  $p' = q' = 1$ , aber  $p \neq q$ .

Es ist aber surjektiv. Sei  $\mathbb{Q}[t] \ni p = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$ . Dann ist  $q = a_0 t + \frac{a_1}{2} t^2 + \frac{a_2}{3} t^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$  ein Polynom, dessen Bild  $p$  ist.

(d) Es ist nicht injektiv. Sei  $(z_1, w_1), (z_2, w_2) \in \mathbb{C}^2$ ,  $z_1 = 0, z_2 = i, w_1 = 2 + 3i, w_2 = 2 + 2i$ . Es gilt dann

$$\begin{aligned}
(z_1 + w_1, z_1 - \bar{w}_1) &= (2 + 3i, -2 + 3i) \\
(z_2 + w_2, z_2 - \bar{w}_2) &= (2 + 3i, -2 + 3i)
\end{aligned}$$

Es ist auch nicht surjektiv. Es gilt

$$\operatorname{Im}(z_1 + w_1) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(w_1)$$

und

$$\operatorname{Im}(z_1 - \bar{w}_1) = \operatorname{Im}(z_1) - \operatorname{Im}(\bar{w}_1) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2).$$

Dann gilt für alle  $(z, w)$  im Bild, dass  $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z)$ . Da es gibt Punkte in  $\mathbb{C}^2$ , die das nicht erfüllen, ist die Abbildung nicht surjektiv.

(e) Es ist nicht injektiv. Sei  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x$ . Dadurch definieren wir zwei Abbildungen  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ :

$$\begin{aligned}
f(x) &= h(x) \\
g(x) &= ih(x)
\end{aligned}$$

Dann gilt  $f \neq g$ . Aber

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re}(f) &= \operatorname{Im}(g) = h \\
\operatorname{Im}(f) &= \operatorname{Re}(g) = 0
\end{aligned}$$

also die zwei Funktionen werden auf die gleiche Funktion abgebildet.

Es ist aber surjektiv. Für jede  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definieren wir  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $g = f$ . Dann wird  $g$  auf  $f$  abgebildet.  $\square$

**Aufgabe 31.** Geben Sie je eine lineare Abbildung mit den folgenden Eigenschaften an. Sie müssen Ihre Aussagen ausnahmsweise nicht beweisen.

- (a)  $L_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $L(x) = x$  nur für  $x = (0, 0)$ .
- (b)  $L_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , sodass  $L_2((1, 1, 1)) = L_2((1, 1, 0))$ .
- (c)  $L_3 : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t]$ , sodass  $\deg(L_3(p(t))) \geq 3\deg(p(t))$  für alle  $p \in \mathbb{Q}[t]$ .
- (d)  $L_3 : V \rightarrow V$ , die injektiv, aber nicht surjektiv ist, für einen  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum Ihrer Wahl.
- (e)  $L_5 : (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 \rightarrow (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ , sodass es genau drei verschiedene Elemente  $x, y, z \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$  mit  $L_5(x) = L_5(y) = L_5(z) = (1, 0)$  gibt.

*Beweis.* (a)  $L_1((x, y)) = (2x, 2y)$  ist linear, aber  $L(x) = x$  nur für  $x = (0, 0)$ .

(b) Projektor:  $L_2((x, y, z)) = (x, y)$ .

(c)  $p(t) \rightarrow p(t^3)$  (wie in 29)

(d) Für  $V = \mathbb{Q}[t]$ :  $L_5 : p(t) \rightarrow p(t)t$ . □

**Aufgabe 32.** Die folgenden linearen Abbildungen können jeweils auch in der Form  $x \rightarrow Ax$  mit einer Matrix  $A$  geschrieben werden. Bestimmen Sie für jede der Abbildungen eine geeignete Matrix.

(a)  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  mit

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+b \\ b-c \end{pmatrix}.$$

(b)  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \\ x+y \end{pmatrix}.$$

(c)  $f \circ g$ .

(d)  $g \circ f$ .

*Beweis.* (a)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir verifizieren es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ b-c \end{pmatrix}.$$

(b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Noch einmal können wir direkt verifizieren:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \\ x+y \end{pmatrix}.$$

(c) Die Matrixdarstellung ist nur das Produkt:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(d) Noch einmal:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad \square$$

**Aufgabe 33.** Wir betrachten die Abbildung  $S_n : \mathbb{Q}[t]_{\leq n} \rightarrow \mathbb{Q}[t]_{\leq n}$  mit  $p(t) \rightarrow p'(t) + \widetilde{p(0)}t^n$ .

- (a) Beweisen Sie:  $S_n$  ist für jedes  $n \in \mathbb{N}$  linear.
- (b) Untersuchen Sie  $S_n$  auf Injektivität, Surjektivität und Bijektivität.
- (c) Beweisen Sie:  $S_n^k(t^k) = k!$  und  $S_n^{n-k}(t^n) = n!/k!t^k$  für  $k = 0, \dots, n$ .
- (d) Folgern Sie:  $S_n^{n+1}(p(t)) = n!p(t)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ ,  $p(t) \in \mathbb{Q}[t]_{\leq n}$ .

*Beweis.* (a) Sei  $q, p \in \mathbb{Q}[t]_{\leq n}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} S_n(q+p) &= (q+p)'(t) + \widetilde{q+p(0)}t^n \\ &= q'(t) + p'(t) + \widetilde{q(0)}t^n + \widetilde{p(0)}t^n \\ &= (q'(t) + \widetilde{q(0)}t^n) + (p'(t) + \widetilde{p(0)}t^n) \\ &= S_n(q) + S_n(p). \end{aligned}$$

Sei außerdem  $\lambda \in \mathbb{Q}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} S_n(\lambda q) &= (\lambda q)'(t) + \widetilde{\lambda q(0)}t^n \\ &= \lambda q'(t) + \lambda \widetilde{q(0)}t^n \\ &= \lambda (q'(t) + \widetilde{q(0)}t^n) \\ &= \lambda S_n(q) \end{aligned}$$

(b) Wir schreiben die Wirkung von  $S_n$  auf einem Polynom:

$$S_n : (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, \dots, na_n, a_0).$$

Daraus folgt die Injektivität und Surjektivität: Sei  $p = (a_0, a_1, \dots, a_n)$  und  $q = (b_0, b_1, \dots, b_n)$ . Wann ist  $S_n(p) = q$ ? Es gilt genau dann, wenn

$$(a_1, 2a_2, 3a_3, \dots, na_n, a_0) = (b_0, b_1, b_2, \dots, b_n).$$

Dann ist es klar:  $a_1 = b_0$ ,  $2a_2 = b_1$ ,  $\dots$ . Weil alle Koeffizienten noch rational sind, ist  $p$  in  $\mathbb{Q}[t]_{\leq n}$ . Es folgt auch daraus, dass  $p$  eindeutig ist, also es ist injektiv.

(c) Wir zeigen es per Induktion: Sei  $k = 0$ . Dann ist  $t^0 = 1 = 0!$ . Wir nehmen jetzt an, dass für beliebiges  $\mathbb{N} \ni k < n$  gilt

$$S_n^k(t^k) = k!.$$

Dann betrachten wir

$$\begin{aligned} S_n^{k+1}(t^{k+1}) &= S_n^k(S_n(t^{k+1})) \\ &= S_n^k((k+1)t^k) \\ &= (k+1)S_n^k(t^k) \\ &= (k+1)k! \\ &= (k+1)! \end{aligned}$$

Wie beweisen die andere Behauptung per Rückwärtsinduktion. Es gilt, für  $k = n$ :

$$S_n^{n-n}(t^n) = S_n^0(t^n) = t^n = n!/k!t^k.$$

Dann nehmen wir an, dass es für  $1 \leq k \leq n$  gilt. Es gilt

$$\begin{aligned} S_n^{n-(k-1)}(t^n) &= S_n(S_n^{n-k}(t^n)) \\ &= S_n(n!/k!t^k) \\ &= \frac{n!}{k!} S_n(t^k) \\ &= \frac{n!}{k!} k t^{k-1} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!} t^{k-1} \end{aligned}$$

(d) Wir schreiben ein beliebiges Polynom  $p \in \mathbb{Q}[t]_{\leq n}$  als Linearkombination von Potenzen von  $t$ . Für  $0 \leq k \leq n$  gilt

$$S_n^{n+1}(t^k) = S_n^{n-k}(S_n(S_n^k(t^k)))$$

$$\begin{aligned}
&= S_n^{n-k}(S_n(k!)) \\
&= S_n^{n-k}(k!t^n) \\
&= k!S_n^{n-k}(t^n) \\
&= \frac{k!n!}{k!}t^k \\
&= n!t^k
\end{aligned}$$

Daraus folgt, für ein beliebiges Polynom  $p \in \mathbb{Q}[t]_{\leq n}$ :

$$\begin{aligned}
S_n^{n+1}p &= S_n^{n+1}(a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n) \\
&= S_n^{n+1}(a_0) + S_n^{n+1}(a_1t) + \cdots + S_n^{n+1}(a_nt^n) \\
&= n!a_0 + n!a_1t + \cdots + n!a_nt^n \\
&= n!(a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n) \\
&= n!p.
\end{aligned}$$

□

## 1.9 Blatt 10

**Aufgabe 34.** Die Fibonacci-Folge ist definiert durch  $f_0 := 0, f_1 := 1$  und  $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Zeigen Sie: Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix}.$$

*Beweis.* Per Definition gilt

$$\begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}.$$

Dann beweisen wir die Behauptung per Induktion. Weil  $M^0 = E_2$  für alle 2x2 Matrizen, gilt die Behauptung für  $n = 0$ . Jetzt nehmen wir an, dass es für beliebiges  $n \in \mathbb{N}$  gilt. Es folgt:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_{n+2} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{n+1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Die Behauptung für alle  $n \in \mathbb{N}$  folgt. □

**Aufgabe 35.** Es sei  $A \in K^{n \times n}$  eine Matrix mit  $A^m = 0$ . Zeigen Sie: Dann gilt  $(E_n - A)(E_n + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}) = E_n$ .


*Beweis.* Es gilt

$$\begin{aligned} (E_n - A)(E_n + A + \cdots + A^{m-1}) &= E_n + A + \cdots + A^{m-1} \\ &\quad - A - A^2 - \cdots - A^m \overset{0}{=} \\ &= E_n. \end{aligned} \quad \square$$

**Aufgabe 36.** Entscheiden Sie jeweils, ob es eine lineare Abbildung  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  gibt, die die gegebenen Eigenschaften erfüllt. Entscheiden Sie zudem, ob diese eindeutig ist. Falls es genau eine solche Abbildung gibt, skizzieren Sie das Bild des Quadrates mit den Eckpunkten  $P = (0, 0)$ ,  $Q = (1, 0)$ ,  $R = (1, 1)$ ,  $S = (0, 1)$  unter dieser Abbildung in einem geeigneten Koordinatensystem. Sie müssen Ihre Skizze nicht begründen.

- (a) *fro* mit  $fro((1, 0)) = (1, 0)$  und  $fro((0, 1)) = (1, 1)$ .
- (b) *pa* mit  $pa((3, 6)) = (1, 1)$ ,  $pa((4, 7)) = (3, 4)$  und  $pa((7, 13)) = (9, 3/4)$ .
- (c) *hewe* mit  $hewe((1, 3)) = (2, 6)$ ,  $hewe((2, 3)) = (8, 12)$  und  $hewe((3, 6)) = (10, 18)$ .
- (d) *ihn* mit  $ihn((2, 4)) = (6, 16)$  und  $ihn((-1, 2)) = (-3, 4)$ .
- (e) *un* mit  $un((2, 3)) = (3, 4)$  und  $un((4, 6)) = (6, 8)$ .
- (f) *ach* mit  $ach((1, 0)) = (1, 0)$  und  $ach(3/5, -1/5) = (12/25, -4/25)$ .
- (g) *ten* mit  $ten((2, 4)) = (1, 2)$  und  $ten((1, 1)) = (2, 4)$

*Beweis.* (a) Es existiert und ist eindeutig.




- (b) Existiert nicht, weil

$$\begin{aligned} pa((3, 6)) &= (1, 1) \\ pa((4, 7)) &= (3, 4) \\ pa((3, 6) + (4, 7)) &= pa((7, 13)) \end{aligned}$$




$$\begin{aligned}
 &= (9, 3/4) \\
 &\neq (1, 1) + (3, 4) \\
 &= pa((3, 6)) + pa((4, 7))
 \end{aligned}$$

(c) Existiert und ist eindeutig




(d) Existiert und ist eindeutig.




(e) Existiert, ist aber nicht eindeutig, weil die Wirkung auf einem 1-Dimensionalen Unterraum definiert ist.

(f) Existiert und ist eindeutig.



(g) Existiert und ist eindeutig



□

**Aufgabe 37.** Für einen Körper  $K$  und zwei quadratische, gleich große Matrizen  $A, B \in K^{n \times n}$  definieren wir den Kommutator  $[A, B]$  von  $A$  und  $B$  als  $[A, B] := AB - BA \in K^{n \times n}$ .

(a) Berechnen Sie  $[A, B]$  für  $K = \mathbb{R}$ ,  $n = 3$  und

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Finden Sie ein Beispiel für  $A \neq B$  mit  $[A, B] = 0$ , wobei  $A$  und  $B$  keine skalaren Vielfachen der Einheitsmatrix sein sollen.

Es definiert also  $[\cdot, \cdot] : K^{n \times n} \times K^{n \times n} \rightarrow K^{n \times n}$  eine Verknüpfung auf  $K^{n \times n}$ . Zeigen Sie:

- (c) Die Verknüpfung hat für kein  $n \in \mathbb{N}$  ein Linksneutrales, d.h. es existiert für kein  $E \in K^{n \times n}$  mit  $[E, A] = A$  für alle  $A \in K^{n \times n}$ .
- (d) Zeigen Sie für die Matrizen  $A, B$  aus Teilaufgabe (a)  $[[A, B], B] \neq 0$  und folgern Sie: Die Verknüpfung  $[\cdot, \cdot]$  ist für  $n = 3$  nicht assoziativ.

*Beweis.* (a) Es gilt

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & 16 & 0 \\ 5 & 8 & 0 \\ 8 & 13 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 14 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 7 & 14 \end{pmatrix}$$

$$[A, B] = \begin{pmatrix} 10 & 9 & -14 \\ 5 & 4 & -8 \\ 8 & 6 & -14 \end{pmatrix}$$

- (b) Irgendeine skalare Vielfache gilt: Wenn  $A = kB$ , ist  $AB = kB^2 = BA$  und  $AB - BA = 0$ . Ein konkretes Beispiel ist

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (c) Sei  $A = E_n$ . Für alle Matrizen  $E \in K^{n \times n}$  gilt:

$$\begin{aligned} [E, E_n] &= EE_n - E_n E \\ &= E - E = 0 \neq E_n \end{aligned}$$

- (d) Es gilt

$$[A, B]B = \begin{pmatrix} 11 & -14 & 0 \\ 3 & -11 & 0 \\ 2 & -22 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B[A, B] = \begin{pmatrix} 35 & 31 & -50 \\ 20 & 17 & -30 \\ 35 & 30 & -52 \end{pmatrix}$$

Jetzt ist es klar, dass  $[[A, B], B] \neq 0$ , weil die Matrizen ungleich sind.

Aber  $[A, [B, B]] = 0$ , weil  $[B, B] = B^2 - B^2 = 0$ .  $\square$

**Aufgabe 38.** Sind  $v_1, \dots, v_n$  linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{R}^m$ , dann nennen wir

$$P(v_1, \dots, v_n) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \forall i \in \{1, \dots, n\} : 0 \leq \lambda_i \leq 1\}$$

das von  $v_1, \dots, v_n$  aufgespannte  $n$ -Parallelotop.

- (a) Zeigen Sie: Jedes Rechteck  $[0, a] \times [0, b] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$  ist ein 2-Parallelotop und jeder Quader  $[0, a] \times [0, b] \times [0, c] = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c\}$  ist ein 3-Parallelotop.

- (b) Es sei  $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  gegeben durch die Matrix


$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Skizzieren Sie  $L([0, 2] \times [0, 3] \times [0, 1])$  in einem geeigneten Koordinatensystem. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

- (c) Zeigen Sie: Ist  $\phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  eine bijektive lineare Abbildung und  $P(v_1, \dots, v_n)$  ein  $n$ -Parallelotop, dann ist  $\phi(P(v_1, \dots, v_n)) = P(\phi(v_1), \dots, \phi(v_n))$  und dies ist ein  $n$ -Parallelotop.
- (d) Es sei  $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  mit  $p(x, y, z) = (x, y)$ . Bestimmen und skizzieren Sie  $p(P((1, 0, 0), (0, 1, 0), (2, 2, 1)))$ . Begründen Sie, dass dies kein Parallelotop ist.

*Beweis.* (a) Per Definition ist  $[0, 1] \times [0, 1] = P((a, 0), (0, 1))$  und  $[0, a] \times [0, b] \times [0, c] = P((a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c))$ .

- (b)



- (c) Es gilt wegen Linearität

$$\phi(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 \phi(v_1) + \dots + \lambda_n \phi(v_n),$$

also

$$\phi(P(v_1, \dots, v_n)) = P(\phi(v_1), \dots, \phi(v_n)).$$


Es bleibt linear Unabhängigkeit zu zeigen. Per Definition müssen  $v_1, \dots, v_n$  linear unabhängig sein. Alle  $v_1, \dots, v_n$  sind unterschiedlich und ungleich null, weil  $\phi$  bijektiv (insbesondere injektiv) ist. Falls  $\phi(v_1), \dots, \phi(v_n)$  linear abhängig wäre, wäre

$$\begin{aligned} 0 &= a_1\phi(v_1) + \dots + a_n\phi(v_n) \\ &= \phi(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) \end{aligned} \quad \text{Linearität}$$

Weil  $\phi$  bijektiv ist, ist deren Kern trivial und  $a_1v_1 + \dots + a_nv_n = 0$ , was nur möglich ist, wenn  $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ . Daraus folgt:  $\phi(v_1), \dots, \phi(v_n)$  sind linear unabhängig und die Behauptung folgt.

(d) Sei  $v_1 = (1, 0, 0)$ ,  $v_2 = (0, 1, 0)$ ,  $v_3 = (2, 2, 1)$ . Weil  $p$  linear ist, ist

$$\begin{aligned} p(\lambda_1v_1 + \dots + \lambda_3v_3) &= \lambda_1p(v_1) + \dots + \lambda_3p(v_3) \\ &= \lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) + \lambda_3(2, 2) \end{aligned}$$



Es ist klar, dass die Menge entweder ein 1 oder 2-Parallelotop sein kann, weil es keine 3 linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{R}^2$  gibt. Ein 1-Parallelotop ist eine Teilmenge  $P(v) \subseteq \text{span}v$ , also die Menge ist kein 1-Parallelotop.

Dann muss es ein 2-Parallelotop sein. Aber das ist auch unmöglich, weil 2-Parallelotops Dreiecke sind, also die Menge ist kein Parallelotop.  $\square$

**Aufgabe 39.** Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein endlich dimensionaler  $K$ -Vektorraum. Wir betrachten den Vektorraum  $V^* := \text{Hom}_K(V, K)$ .

- (a) Zeigen Sie: Ist  $B = (b_1, \dots, b_n)$  eine Basis von  $V$ , dann wird für jedes  $i \in \{1, \dots, n\}$  durch  $b_i^*(b_j) := \delta_{ij}$  für  $j = 1, \dots, n$  eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung festgelegt.

(b) Zeigen Sie:  $(b_1^*, \dots, b_n^*)$  ist ein Erzeugendensystem von  $V^*$ ,

(c) Zeigen Sie:  $(b_1^*, \dots, b_n^*)$  ist linear unabhängig.

Sei  $W$  ein weiterer endlich dimensionaler Vektorraum mit Basis  $(\beta_1, \dots, \beta_m)$  und  $L : V \rightarrow W$  linear.

(d) Zeigen Sie: Die Abbildung  $L^* : W^* \rightarrow V^*$  mit  $\omega \rightarrow \omega \circ L$  ist linear.

(e) Die Abbildung  $L$  habe bezüglich der Basen  $(b_1, \dots, b_n)$  und  $(\beta_1, \dots, \beta_m)$  die Darstellungsmatrix  $A$ . Zeigen Sie, dass  $L^*$  bezüglich der Basen  $(\beta_1^*, \dots, \beta_m^*)$  und  $(b_1^*, \dots, b_n^*)$  die Darstellungsmatrix  $A^T$  hat.

*Beweis.* (a) Die Wirkung auf einem Vektor ist eindeutig bestimmt. Sei  $v \in V$  mit Basisdarstellung  $v = v_1 b_1 + \dots + v_n b_n$ . Es gilt

$$\begin{aligned} b_i^*(v) &= b_i^*(v_1 b_1 + \dots + v_n b_n) \\ &= v_1 b_i^*(b_1) + \dots + v_n b_i^*(b_n) && \text{Linearität} \\ &= v_i \end{aligned}$$

(b) Sei  $v^* \in V^*$ , also eine lineare Abbildung  $V \rightarrow K$ .

Wir setzen  $a_i = v^*(b_i) \in K$ . Das Ziel ist:

$$v^* = \sum_{i=1}^n a_i b_i^*.$$

Sei  $V \ni v = v_1 b_1 + \dots + v_n b_n$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i^* \right) (v) &= \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i^* \right) \left( \sum_{j=1}^n v_j b_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i v_j b_i^*(b_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i v_j \delta_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i v_i \\ &= \sum_{i=1}^n v_i v^*(b_i) \\ &= v^* \left( \sum_{i=1}^n v_i b_i \right) \\ &= v^*(v). \end{aligned}$$

Weil  $v$  beliebig war, ist  $v^* \in \text{span}(b_1^*, \dots, b_n^*)$ . Weil  $v^*$  beliebig war, ist es ein Erzeugendensystem.

- (c) Sei  $\lambda_1 b_1^* + \dots + \lambda_n b_n^* = 0$ . Wir wenden die Gleichung auf einem Basisvektor  $b_i$  an. Die rechte Seite ist natürlich 0. Die linke Seite ist

$$(\lambda_1 b_1^* + \dots + \lambda_n b_n^*)(b_i) = \lambda_i = 0.$$

Daraus folgt:  $\lambda_i = 0$  für alle  $i$ .

- (d) Sei  $k \in K$ ,  $\omega \in W^*$  und  $v \in V$ . Es gilt

$$\begin{aligned} (L^*(a\omega))v &= a\omega(L(v)) \\ &= a(\omega(L(v))) \\ &= a(L^*(\omega)(v)) \end{aligned}$$

Weil  $v$  beliebig war, ist

$$L^*(a\omega) = aL^*(\omega).$$

Sei jetzt  $\omega_1, \omega_2 \in W^*$ . Es gilt

$$\begin{aligned} L^*(\omega_1 + \omega_2)(v) &= (\omega_1 + \omega_2)(L(v)) \\ &= \omega_1(L(v)) + \omega_2(L(v)) \\ &= (L^*(\omega_1) + L^*(\omega_2))(v) \end{aligned}$$

also

$$L^*(\omega_1 + \omega_2) = L^*(\omega_1) + L^*(\omega_2).$$

- (e) Es gilt  $L^*(\beta_i^*) = \beta_i^* \circ L$ . Wir möchten diese als linear Kombination von  $b_j^*$  darstellen. Sei die Matrixdarstellung von  $L^*$   $B$ , also

$$\beta_i^* \circ L = \sum_{j=1}^n B_{ji} b_j^*.$$

Wir wenden die Gleichung auf  $b_k$  an und erhalten, weil  $b_j^*(b_k) = \delta_{jk}$

$$\beta_i^*(L(b_k)) = B_{ki}.$$

Aus der Matrixdarstellung erhalten wir  $L(b_k) = \sum_{i=1}^m A_{ik} \beta_i$ . Daraus folgt:

$$\beta_i^* \left( \sum_{j=1}^m A_{jk} \beta_j \right) = A_{ik} = B_{ki}.$$

Weil für die Komponente der Matrizen  $A$  und  $B$  gilt  $A_{ik} = B_{ki}$ , ist  $B = A^T$ .  $\square$





---

## Lineare Algebra 2

---

### 2.1 Blatt 1 (30/33)

**Aufgabe 40.** (a) Bestimmen Sie alle komplexwertigen Lösungen der Gleichung

$$x^2 = u + iv,$$

in Abhängigkeit von  $u, v \in \mathbb{R}$

(b) Führen Sie das Nullstellenproblem

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

mit  $a \in \mathbb{C} \setminus 0, b \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{C}$  auf den Fall in (a) zurück. Geben Sie weiterhin eine geschlossene Darstellung aller Lösungen für den Fall  $a = 1$  an.

Hat alles geklappt, sollte bei Ihnen speziell für den Fall  $a = 1$  und  $\operatorname{Im}(b) = \operatorname{Im}(c) = 0$  die entsprechende Mitternachtsformel dastehen.

*Beweis.* (a)  $|x^2| = |x|^2 = |u + iv| = \sqrt{u^2 + v^2}$

Daraus folgt:

$$|x| = (u^2 + v^2)^{1/4},$$

$$x = (u^2 + v^2)^{1/4} e^{i\theta}.$$

Setze es in  $x^2 = u + iv$  ein und löse die Gleichungen für  $\theta$ . Sei  $\varphi = \operatorname{atan}_2(u, v)$  Dann ist:

$$\theta = \frac{\varphi}{2} \text{ oder } \theta = \frac{\varphi + 2\pi}{2}.$$

(b)

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0,$$

d.h.

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm p$$

wobei  $p$  die Lösung zu  $p^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$  ist. Im Fall  $a = 1$  und  $\text{Im}(b) = \text{Im}(c) = 0$ , daraus folgt:

$$x = -\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{b^2 - 4c}.$$

□

**Aufgabe 41.** Finden Sie für die Polynome  $p, d \in \mathbb{C}[x]$  jeweils solche  $q, r \in \mathbb{C}[x]$  mit  $\deg(r) < \deg(d)$ , dass  $p = qd + r$  gilt.

(a)  $p = x^7 + x^5 + x^3 + 1, d = x^2 + x + 1$

(b)  $p = x^5 + (3 - i)x^3 - x^2 + (1 - 3i)x + 1 + i, d = x^2 + i$

(c) Wie sehen  $s, r$  aus, wenn man in (a) und (b) jeweils die Rollen von  $p$  und  $d$  vertauscht? D.h. bestimmen Sie  $s, r \in \mathbb{C}[x]$  mit  $\deg r < \deg p$ , sodass  $d = sp + r$  gilt.

*Beweis.* (a)

$$\begin{array}{r}
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{x^7} \phantom{+ x^5} \phantom{+ x^3 + 1} \\
\phantom{x^2 + x + 1) } x^7 \phantom{+ x^5} \phantom{+ x^3 + 1} \\
\hline
\phantom{x^2 + x + 1) } -x^7 - x^6 - x^5 \\
\hline
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{-x^7 -} x^6 \\
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{-x^7 -} x^6 + x^5 + x^4 \\
\hline
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{-x^7 -} \phantom{x^6 +} x^5 + x^4 + x^3 \\
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{-x^7 -} \phantom{x^6 +} -x^5 - x^4 - x^3 \\
\hline
\phantom{x^2 + x + 1) } \phantom{-x^7 -} \phantom{x^6 +} \phantom{x^5 +} \phantom{x^4 +} \phantom{x^3} 1
\end{array}$$

Daher

$$q = x^5 - x^4 + x^3, r = 1.$$

(b)  $q = x^3 + (3 - 2i)x - x, r = -(1 + 6i)x + (1 + 2i)$

(c)  $r = d, s = 0$

□

**Aufgabe 42.** Seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -38 \\ -46 \\ -18 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gegeben.

(a) Bestimmen Sie  $\text{Im}(A)$  und  $\ker(A)$

(b) Bestimmen Sie  $\text{Lös}(A, b)$  und  $\text{Lös}(A, c)$ .

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{R_2-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times -\frac{1}{3}} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\text{im}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Sei dann  $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4$ . Wenn  $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \ker(A)$ , gilt

$$\begin{aligned} t_3 &:= x_3 \\ t_4 &:= x_4 \\ x_1 &= x_3 - x_4 = t_3 - t_4 \\ x_2 &= -x_3 - 2x_4 = -t_3 - 2t_4 \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\ker(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(b)

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 & -38 \\ 2 & 1 & -1 & 4 & -46 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -18 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_2-2R_1} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 & -38 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & 30 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -18 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-R_1} \\ \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 & -38 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & 30 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & 20 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_2 \times -\frac{1}{3}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 & -38 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -10 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+2R_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 & -38 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_1-2R_2} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -18 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 - x_3 + x_4 &= -18 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 &= -10 \end{aligned}$$

Deswegen ist  $\text{Lös}(A, b)$

$$\begin{pmatrix} -18 + x_3 - x_4 \\ -10 - x_3 - 2x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(c)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 4 & | & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & | & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -6 & | & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & | & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{R_2 \times -\frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es gibt keine Lösungen, weil  $0 \neq 1$ , also  $\text{Lös}(A, c) = \emptyset$

□

**Aufgabe 43.** Gegeben seien die  $\mathbb{R}$ -Vektorräume  $V$  mit Basis  $B_V = \{v_1, v_2, v_3\}$  und Basis  $B_W = \{w_1, w_2, w_3\}$ . Wir definieren einen linearen Operator  $T : V \rightarrow W$  wie folgt:

$$T(v_1) = w_1 + w_3 \quad T(v_2) = w_1 + w_2, \quad T(v_3) = -w_1 - w_2 - w_3.$$

(a)  $w_1, w_2, w_3 \in \text{span}\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ , weil

$$\begin{aligned} w_1 &= T(v_1) + T(v_2) + T(v_3) \\ w_2 &= (-1)(T(v_3) + T(v_1)) \\ w_3 &= (-1)(T(v_2) + T(v_3)) \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$W = \text{span}(w_1, w_2, w_3) = \text{span}(T(v_1), T(v_2), T(v_3)).$$

Daraus folgt:

$$\text{im}(T) = \mathbb{R}^3, \quad \ker(T) = \{0\}.$$

(b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$B_W^* = \{w_1 + w_3, w_1 + w_2, -w_1 - w_2 - w_3\}.$$

(d)

$$B_V^* = \{v_1 + v_2 + v_3, -(v_1 + v_3), -(v_2 + v_3)\}.$$

## 2.2 Blatt 2

**Aufgabe 44.** Es seien die Punkte  $x_0, x_1, \dots, x_n$  mit  $x_i \in \mathbb{R}$  gegeben. Wir definieren den Operator

$$\Phi : \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, p \rightarrow y, \text{ mit } p(x_i) = y_i, i = 0, \dots, n$$

wobei wir mit  $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$  den Raum der Polynome mit reellen Koeffizienten vom Grad höchsten  $n$  bezeichnen und  $p(x)$  die Auswertung des Polynoms  $p$  im Punkt  $x$  beschreibt.

- (a) Zeigen Sie: Sind die Punkte  $x_i$  paarweise verschieden, so ist die Abbildung  $\Phi$  wohldefiniert und isomorph. (Eine Konsequenz hieraus ist die eindeutige Lösbarkeit der Polynominterpolation.)
- (b) Was passiert, wenn Sie nicht fordern, dass die  $x_i$  paarweise verschieden sind? Kann  $\Phi$  im Allgemeinen noch injektiv (surjektiv) sein?

*Beweis.* (a) Injektiv: Nehme an, dass es zwei unterschiedliche Polynome  $p_1, p_2$  gibt, mit  $p_1(x_i) = p_2(x_i) \forall i = 0, \dots, n$ . Dann ist  $p(x) := p_1(x) - p_2(x)$  auch ein Polynom, mit  $p(x_i) := 0 \forall i \in \{0, \dots, n\}$ . Weil  $\deg(p) \leq n$  ist, folgt daraus, dass  $\forall x, p(x) = 0, p_1(x) = p_2(x)$ . Das ist ein Widerspruch.

Surjektive: Sei  $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ . Dann ist

$$p(x) = (x - y_0)(x - y_1) \dots (x - y_n)$$

auch ein Polynom mit  $\Phi(p) = (y_0, \dots, y_n)$ .

Linearität: Sei  $p_1(x), p_2(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x], a \in \mathbb{R}$ . Sei auch  $p(x) = p_1(x) + p_2(x)$ . Es gilt dann

$$p(x_i) = p_1(x_i) + p_2(x_i), i = 0, \dots, n$$

und daher

$$\Phi(p) = \Phi(p_1 + p_2) = \Phi(p_1) + \Phi(p_2).$$

Es gilt auch, für  $p(x) := ap_1(x)$ , dass

$$p(x_i) = ap_1(x_i), i = 0, \dots, n,$$

und daher

$$\Phi(p) = \Phi(ap_1) = a\Phi(p_1).$$

- (b) Nein. Sei, zum Beispiel,  $n = 1, x_0 = x_1 = 0$ . Dann gilt

$$\Phi(x) = (0, 0)^T$$

$$\Phi(x^2) = (0, 0)^T$$

Aber die zwei Polynome sind ungleich.

□

**Aufgabe 45.** (a) Es sei eine Matrix  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  gegeben. Wir bilden die erweiterte Matrix

$$B = (A|1_n)$$

mit  $1_n$  die Einheitsmatrix in  $\mathbb{K}^n$ . Zeigen Sie:  $A$  ist genau dann invertierbar, wenn  $A$  durch elementare Zeilenumformung in die Einheitsmatrix überführt werden kann. Verifizieren Sie weiterhin: Werden die dafür benötigten Zeilenumformungen auf ganz  $B$  angewendet, so ergibt sich im hinteren Teil, wo zu Beginn die Einheitsmatrix stand, genau  $A^{-1}$ .

(b) Es sei nun

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie  $A^{-1}$ .

*Beweis.* (a) Definiert  $(x, y), x \in \mathbb{K}^n, y \in \mathbb{K}^m$  durch  $\mathbb{K}^{n+m} \ni (x, y) = (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ . Eine solche erweiterte Matrix bedeutet eine Gleichungssystem durch

$$B(x, -y) = Ax - 1_n y = 0,$$

wobei  $x, y \in \mathbb{K}^n$ . Für jeder  $x \in \mathbb{K}^n$  gibt es  $y \in \mathbb{K}^n$ , so dass  $B(x, -y) = 0$ . Nehme an, dass wir durch elementare Zeilenumformung

$$B = (A|1_n) \rightarrow (1_n, A') := B'$$

kann. Die Gleichungssystem ist dann  $x = A'y$ . Dadurch können wir für jeder  $y \in \mathbb{K}^n$  eine  $A'y = x \in \mathbb{K}^n$  rechnen, für die gilt, dass  $Ax = y$ . Das heißt, dass  $A' = A^{-1}$ .

(b)

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 - 3R_1} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \times -1} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -6 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -6 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \times -1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -6 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 - R_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -6 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 + R_4} \\
& \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -6 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 46.** Es seien die Vektorräume  $V, W$  über  $\mathbb{K}$  gegeben mit  $\dim(V) = n$  und  $\dim(W) = m$ . Wir betrachten eine lineare Abbildung

$$T : V \rightarrow W, v \rightarrow T(v)$$

Seien  $B_V$  und  $B_W$  Basen von  $V$ , bzw.  $W$ . Wir nehmen an  $T$  ist nicht die konstante Nullabbildung. Beweisen Sie:

- (a) Der Kern von  ${}_{B_W}[T]_{B_V}$  ist entweder trivial (d.h. nur die 0) oder hängt nur von der Wahl von  $B_V$  ab, aber nicht von  $B_W$ .
- (b) Das Bild von  ${}_{B_W}[T]_{B_V}$  ist entweder der ganze  $\mathbb{K}^m$  oder hängt nur von der Wahl von  $B_W$  ab, aber nicht von  $B_V$ .
- (c) Der Rang von  ${}_{B_W}[T]_{B_V}$  ist unabhängig von  $B_W$  und  $B_V$ .

*Beweis.* Nach Korollar 5.43 gilt, für  $A, A' \subseteq V$  und  $B, B' \subseteq W$  Basen der Vektorräume  $V$  und  $W$  über  $\mathbb{K}$ , und  $\Phi \in \text{Hom}(V, W)$ .

$${}_{B'}[\Phi]_{A'} = {}_{B'}[\text{id}_W]_B \cdot {}_B[\Phi]_A \cdot {}_A[\text{id}_V]_{A'}.$$

**Lemma 2.1.** Jeder Basiswechsel für sowohl  $B_V$  als auch  $B_W$  kann als zwei Basiswechseln interpretiert werden, wobei eine Basiswechsel nur  $B_V$  verändert, und die andere nur  $B_W$ .

*Beweis.*

$${}_{B'}[\Phi]_{A'} = {}_{B'}[\text{id}_W]_B \cdot {}_B[\Phi]_A \cdot {}_A[\text{id}_V]_{A'} = {}_{B'}[\text{id}_W]_B ({}_B[\text{id}_W]_B \cdot {}_B[\Phi]_A \cdot {}_A[\text{id}_V]_{A'}) {}_A[\text{id}_V]_A.$$

(In den Klammern gibt es zuerst ein Basiswechsel in  $V$ , dann ein Basiswechsel in  $W$ ). Ein ähnliche Argument zeigt, dass wir zuerst ein Basiswechseln in  $W$  betrachten kann. □

**Korollar 2.2.** In die Aufgabe muss man nur das Fall betrachten, in dem entweder  $B_V$  oder  $B_W$  sich verändert.

- (a) Nehme an,  $\ker({}_{B_W}[T]_{B_V}) \neq 0$ . Die zwei Fälle

(i) Nur  $B_W$  sich verändert.

Sei  $v \in \mathbb{K}^n$ ,  ${}_B[\Phi]_A v = 0$ . Es gilt

$${}_{B'}[\Phi]_A = {}_{B'}[\text{id}_W]_B [{}_{B'}[\Phi]_{AA} [\text{id}_V]_A] v = {}_{B'}[\text{id}_W]_{BB} [{}_{B'}[\Phi]_{AA}] v = {}_{B'}[\text{id}_W]_B (0) = 0.$$

Sei jetzt  ${}_B[\Phi]_A v \neq 0$ . Solange wir zeigen, dass

$${}_{B'}[\text{id}_W]_B u \neq 0$$

für  $\mathbb{K}^m \ni u \neq 0$ , sind wir fertig. Aber  ${}_{B'}[\text{id}_W]_B u = 0$ , nur wenn  $u = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n, v_i \in B' = 0$  wegen der linear Unabhängigkeit.

(ii) Nur  $B_V$  sich verändert. Es stimmt leider nicht, dass  $\ker({}_{B_W}[T]_{B_V})$  von  $B_V$  abhängig sein *muss*. Sei zum Beispiel  $B_K$  ein Basis für  $\ker({}_{B_W}[T]_{B_V})$ , und  $B_V$  und  $B'_V$  Basen von  $V$ , für die gilt  $B_K \subset B_V, B_K \subset B'_V$ . Jetzt ist der Kern einen invarianten Unterraum von  $B$  unter  ${}_{B'_V}[T]_{B_V}$ , also der Kern verändert sich nicht, wenn der Basis sich verändert.

Wenn der Kern kein invarianter Unterraum ist, gilt es natürlich, dass der Kern sich durch das Basiswechsel verändert.

(b) Nehme an, dass  $\text{im}({}_{B_W}[T]_{B_V}) \neq \mathbb{K}^m$ . Wir betrachten noch einmal die zwei Fälle

(i) Nur  $B_V$  sich verändert. Weil  ${}_{B_V}[\text{id}]_{B'_V} : V \rightarrow V$  bijektiv ist, gilt

$$\begin{aligned} \text{im}({}_{B_W}[T]_{B'_V}) &= \{ {}_{B_W}[T]_{B'_V} v \mid v \in \mathbb{K}^m \} = \{ {}_{B_W}[T]_{B_V B'_V} [{}_{B'_V}[\text{id}]_{B'_V}] v \mid v \in \mathbb{K}^m \} \\ &= \{ {}_{B_W}[T]_{B_V} v \mid v \in \mathbb{K}^m \} = \text{im}({}_{B_W}[T]_{B'_V}) \end{aligned}$$

(ii)  $B_W$  sich verändert. Jetzt gilt

$${}_{B'_W}[T]_{B_V} = {}_{B'_W}[\text{id}]_{B_W B_W} [{}_{B_W}[T]_{B_V}].$$

Leider ist es noch falsch, dass das Bild von  $B_W$  abhängig sein *muss* wegen eines ähnliches Arguments zu das Kern.

(c) Weil das Bild von  $B_V$  unabhängig ist, ist der Rang auch von  $B_V$  unabhängig.

Weil  ${}_{B'_W}[\text{id}]_{B_W}$  bijektiv als Abbildung  $\mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^m$  ist, ist es auch bijektiv für alle Teilmengen  $U \subseteq \mathbb{K}^m$ . Das Bild vor und nach dem Basiswechsel sind dann isomorph. Deswegen ist der Rang von  $B_W$  unabhängig.

□

**Aufgabe 47.** Es wird gerechnet.



- (a) Wir definieren die lineare Abbildung  $T(x) = A \cdot x$  mit  $A$  gegeben wie in 2(b). Wir definieren die Basen

$$B_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad B_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Berechnen Sie

$${}_{B_2}[T]_{B_1}.$$

- (b) Wir schauen nochmal auf Aufgabe 1. Es seien die paarweise verschiedene Punkte  $x_0, x_1, \dots, x_n$  gegeben und die Abbildung  $\Phi$  wie zuvor. Gegeben sei die kanonische Basis

$$B := \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

vom  $\mathbb{R}^n$  sowie die Basen

$$B_M := \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

und

$$B_l := \{l_0(x), l_1(x), l_2(x), \dots, l_n(x)\}, \quad \text{mit} \quad l_i(x) := \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Bestimmen Sie

$${}_B[\Phi]_{B_M}, \quad \text{und} \quad {}_B[\Phi]_{B_l}.$$

Ausgehend von den entstandenen Matrizen: Stellen Sie eine Vermutung, welche Basis für große  $n$  bevorzugt wird.

*Beweis.* Wir berechnen

$${}_{B_2}[\text{id}]_{B_1}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Daraus folgt:

$$_{B_2}[\text{id}]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen  $\{_{B_2}[\text{id}]_{B_1}\}^{-1}$

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2+R_1} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4+R_1} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-R_1} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \times -1} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-2R_2} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4+3R_2} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_3} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+3R_4} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2+2R_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \times -1} \\ & \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

also

$$_{B_1}[\text{id}]_{B_2} = \{_{B_2}[\text{id}]_{B_1}\}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned} {}_{B_1}[\text{id}]_{B_2} A_{B_2} [\text{id}]_{B_1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & 0 \\ -5 & 1 & -5 & -4 \\ 8 & 1 & 10 & 7 \\ -7 & 0 & -12 & -9 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Sei  $p_k(x) = x^k \in B_M$ . Es folgt, dass  $\Phi(p_k(x)) = \{x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k\}$ . Deswegen gilt

$${}_B[\Phi]_{B_M} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

Betrachten Sie dann  $l_k(x)$ . Weil  $(x - x_i)$  für  $i \neq k$  vorkommt, gilt  $l_k(x_i) = 0 \forall i \neq k$ . Für  $i = k$  gilt  $l_k(x_k) = \prod_{i \neq j=0}^n \frac{x_k - x_j}{x_k - x_j} = 1$ . Es gilt daher

$${}_B[\Phi]_{B_l} = I_n = \text{diag}_n(1, 1, \dots, 1).$$

Ich vermute, dass  $B_l$  für große  $n$  bevorzugt wird...  $\square$

## 2.3 Blatt 3

**Aufgabe 48.** (a) Berechnen Sie alle möglichen Matrixprodukte der folgenden Matrizen. Was muss jeweils für die Dimensionen erfüllt sein?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$D = (-1 \ 2 \ 0 \ 8), E = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 5 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, F = (-1 \ 2 \ 0).$$

(b) Eine Blockmatrix ist eine Matrix von der Form

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ A_2 & A_4 \end{pmatrix}$$

mit Matrizen  $A_1 \in \mathbb{K}^{n \times m}$ ,  $A_2 \in \mathbb{K}^{n' \times m}$ ,  $A_3 \in \mathbb{K}^{n \times m'}$ ,  $A_4 \in \mathbb{K}^{n' \times m'}$ . Sei weiterhin

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_3 \\ B_2 & B_4 \end{pmatrix}$$

mit ebenso Einträgen aus  $\mathbb{K}$ . Wer nun meint, die Multiplikation von  $A$  und  $B$  sei so simpel wie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} A_1B_1 + A_3B_2 & A_1B_3 + A_3B_4 \\ A_2B_1 + A_4B_2 & A_2B_3 + A_4B_4 \end{pmatrix}$$

hat tatsächlich recht. Beweisen Sie diese Formel und geben Sie gleichzeitig die  $B_i$ 's für die benötigten Matrizenräume an, sodass die Rechnung wohldefiniert ist.

*Beweis.* (a) Für  $A$  eine  $n \times m$  Matrize, und  $B$  eine  $p \times q$  Matrize, ist  $AB$  wohldefiniert, nur wenn  $m = p$

Die Matrizenprodukte sind

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & -5 & -3 \\ 6 & 8 & -6 & -8 \end{pmatrix}$$

$$AE = \begin{pmatrix} 13 & 15 \\ 30 & 55 \\ 43 & 100 \end{pmatrix}$$

$$FA = (-1 \ 7 \ 8)$$

$$BC = \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$CD = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & 0 & 64 \\ -7 & 14 & 0 & 56 \end{pmatrix}$$

$$DC = (55)$$

$$CF = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & 0 \\ -7 & 14 & 0 \end{pmatrix}$$

$$FE = (-1 \ 6)$$

(b) Wir brauchen  $B_1 \in \mathbb{K}^{m \times p}$ ,  $B_2 \in \mathbb{K}^{m' \times p}$ ,  $B_3 \in \mathbb{K}^{m \times q}$ ,  $B_4 \in \mathbb{K}^{m' \times q}$  für  $p, q \in \mathbb{N}$ . Wir bezeichnen, für  $v_1 \in \mathbb{K}^a$ ,  $v_2 \in \mathbb{K}^b$ , das Vektor  $(v_1, v_2) \in \mathbb{K}^{a+b}$ . Sei jetzt  $v_1 \in \mathbb{K}^p$ ,  $v_2 \in \mathbb{K}^q$ .

$$\begin{aligned} AB(v_1, v_2) &= A \begin{pmatrix} B_1 & B_3 \\ B_2 & B_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= A \underbrace{\begin{pmatrix} B_1 v_1 + B_3 v_2 \\ B_2 v_1 + B_4 v_2 \end{pmatrix}}_{\in \mathbb{K}^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ A_2 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 v_1 + B_3 v_2 \\ B_2 v_1 + B_4 v_2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} A_1(B_1 v_1 + B_3 v_2) + A_3(B_2 v_1 + B_4 v_2) \\ A_2(B_1 v_1 + B_3 v_2) + A_4(B_2 v_1 + B_4 v_2) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} A_1 B_1 + A_3 B_2 & A_1 B_3 + A_3 B_4 \\ A_2 B_1 + A_4 B_2 & A_2 B_3 + A_4 B_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad \square
\end{aligned}$$

**Aufgabe 49.** Es seien  $V$  und  $W$  Vektorräume über  $K$ , nicht notwendigerweise endlich-dimensional und

$$\Phi : V \rightarrow W$$

eine lineare Abbildung. Beweisen Sie:

- (a) Die duale Abbildung  $\Phi^*$  ist injektiv genau dann, wenn  $\Phi$  surjektiv ist.  
Hinweis: Die Richtung  $\implies$  beweisen Sie am einfachsten als eine Kontraposition.
- (b) Die duale Abbildung  $\Phi^*$  ist surjektiv genau dann, wenn  $\Phi$  injektiv ist.  
Hinweis: Die Rückrichtung lässt sich am einfachsten direkt beweisen. Nutzen Sie in dem Fall die Injektivität von  $\Phi$  aus, um für ein beliebiges  $v^* \in V^*$  eine lineare Abbildung im Bild von  $\Phi^*$  zu konstruieren, die die gleichen Werte wie Abbildung  $v^*$  liefert.
- (c) Im Falle der Invertierbarkeit gilt

$$(\Phi^{-1})^* = (\Phi^*)^{-1}.$$

*Beweis.* (a) Sei  $\Phi$  surjektiv, und  $w_1^*, w_2^* \in W^*$ . Es gilt  $\Phi w_1^* = w_1^* \circ \Phi$ ,  $\Phi w_2^* = w_2^* \circ \Phi$ . Die zwei Abbildungen  $w_1^* \circ \Phi$  und  $w_2^* \circ \Phi$  sind unterschiedliche, solange es mindestens ein  $v \in V$  gibt, sodass  $(w_1^* \circ \Phi)(v) \neq (w_2^* \circ \Phi)(v)$ . Wir haben aber ausgenommen, dass  $w_1^* \neq w_2^*$ . Das bedeutet, dass es  $w \in W$  gibt, so dass  $w_1^*(w) \neq w_2^*(w)$ . Weil  $\Phi$  surjektiv ist, ist  $w = \Phi(v)$  für eine  $v$ . Dann ist  $(w_1^* \circ \Phi)(v) \neq (w_2^* \circ \Phi)(v)$ , also  $\Phi^*$  ist injektiv.

Jetzt nehmen wir an, dass  $\Phi$  nicht surjektiv ist, also es gibt ein Unterraum  $U \subseteq W$ , sodass  $U \setminus \{0\} \cap \text{im}(\Phi) = \emptyset$ . Dann können wir zwei lineare Abbildungen  $w_1^*$  und  $w_2^*$  definieren, die auf  $\text{im}(\Phi)$  gleich sind, aber auf  $U$  ungleich sind. Es gilt  $\Phi^*(w_1) = \Phi^*(w_2)$ , aber  $w_1 \neq w_2$ , also  $\Phi^*$  ist nicht injektiv.

- (b) Zuerst beweisen wir:  $\Phi$  nicht injektiv  $\implies \Phi^*$  nicht surjektiv. Sei  $v_1, v_2 \in V, v_1 \neq v_2$  und  $\Phi(v_1) = \Phi(v_2) = w$ . Es gibt eine lineare Abbildung  $v^* \in V^*$ , so dass  $v^*(v_1) \neq v^*(v_2)$ . Sei aber  $w^* \in W^*$ . Es gilt  $(\Phi^* w^*)(v) = (w^* \circ \Phi)(v)$ . Dann ist

$$\Phi^* w^*(v_1) = \Phi^*(w) = \Phi^* w^*(v_2),$$

also  $\Phi^*(w^*) \neq v^*$  für alle  $w^* \in W^*$ . Es folgt:  $\Phi^*$  ist nicht surjektiv.

Jetzt beweisen wir  $\Phi$  injektiv  $\implies \Phi^*$  surjektiv. Sei  $v^* \in V^*$ . Wir definieren eine Abbildung (momentan nicht unbedingt linear) so: Für alle  $w \in \text{im}(\Phi)$ , also  $w = \Phi(v)$ , ist  $w^*(w) = v^*(v)$ . Für  $w \notin \text{im}(\Phi)$  ist  $w^*(w) = 0$ .

Es ist klar, dass  $w^* \circ \Phi = v^*$ . Wir müssen nur zeigen, dass  $w^*$  linear ist, also  $w^* \in W^*$ .

- (1) Sei  $w \in W$ ,  $a \in \mathbb{K}$ . Falls  $w \notin \text{im}(\Phi)$ , ist auch  $aw \notin \text{im}(\Phi)$ . Es gilt daher

$$w^*(aw) = aw^*(w) = 0.$$

Falls  $w \in \text{im}(\Phi)$ , also  $w = \Phi v$  für ein  $v \in V$ , gilt auch  $aw = \Phi(av)$ , und

$$w^*(aw) = v^*(av) = av^*(v) = aw^*(w).$$

Daraus folgt:  $w^* \in W^*$ , und  $\Phi^*(w^*) = v^*$ .

- (c) In den letzten Teilaufgaben haben wir bewiesen, dass wenn  $\Phi$  bijektiv ist, ist  $\Phi^*$  auch bijektiv. Die Rückrichtung stimmt auch. Wir müssen nur Gleichheit zeigen.

#### Vereinfachung

Wir müssen nur zeigen, per Definition eine Inverseabbildung, dass

$$\Phi^* \circ (\Phi^{-1})^* = \text{id}_{V^*}.$$

(Wir müssen nicht zeigen, dass  $(\Phi^{-1})^* \circ \Phi^* = \text{id}_W$ , weil die beide Abbildungen bijektiv sind.)

Es gilt, für  $v^* \in V^*$ ,  $(\Phi^{-1})^*(v^*) = v^* \circ \Phi^{-1}$ . Daraus folgt

$$\begin{aligned} (\Phi^* \circ (\Phi^{-1})^*)(v^*) &= \Phi^*(v^* \circ \Phi^{-1}) \\ &= v^* \circ \Phi^{-1} \circ \Phi \\ &= v^* \end{aligned}$$

□

#### Aufgabe 50. (Darstellung eines Unterraums)

- (a) Es sei  $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ . Beweisen Sie: Das Gleichungssystem  $Ax = b$  hat genau dann eine Lösung in  $x \in \mathbb{K}^m$ , wenn für alle  $y \in \mathbb{K}^n$  aus  $A^T y = 0$  folgt  $b^T y = 0$ .

- (b) Es sei

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^4.$$

(c) Verwenden Sie (a) um eine Matrix  $B$  zu konstruieren, sodass gilt

$$U = \ker(B).$$

*Beweis.* (a) (a) Sei  $x$  eine Lösung,  $Ax = b$ , und  $y \in \mathbb{K}^m$  beliebig, sodass  $A^T y = 0$ . Es gilt dann:

$$x^T A^T y = b^T y = 0.$$

(b) Wir machen eine Basisergänzung:

$$\mathbb{R}^4 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir brauchen  $B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ , sodass

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & w_{1,1} & w_{2,1} \\ 0 & 0 & w_{1,2} & w_{2,2} \\ 0 & 0 & w_{1,3} & w_{2,3} \\ 0 & 0 & w_{1,4} & w_{2,4} \end{pmatrix} := C,$$

wobei  $(w_{1,1}, w_{1,2}, w_{1,3}, w_{1,4})^T$  und  $(w_{2,1}, w_{2,2}, w_{2,3}, w_{2,4})^T$  linear unabhängig sind, also  $B = CA^{-1}$ . Weil

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

Wir nehmen außerdem

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

also

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

## 2.4 Blatt 4

**Aufgabe 51.** Wir definieren mit  $S_n$  die Menge der bijektiven Abbildungen

$$\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}.$$

Dann ist bekannterweise  $(S, \circ)$  mit

$$\sigma_2 \circ \sigma_1(i) = \sigma_2(\sigma_1(i))$$

eine Gruppe. Wir führen für gewöhnlich eine Abbildungstabelle

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

mit  $i_1, \dots, i_n$  paarweise verschieden, um zu signalisieren  $\sigma(k) = i_k$  für  $k = 1, \dots, n$ .

- (a) Eine übliche Darstellung bei Elementen aus  $S_n$  ist die Zykelschreibweise. Ein Zyklus der Länge  $k$  mit  $k \leq n$  hat die Form

$$\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$$

und signalisiert  $i_1 \rightarrow i_2, i_2 \rightarrow i_3$ , usw.  $i_k \rightarrow i_1$  unter  $\sigma$ . Ist die Zahl  $i_j$  nicht im Zyklus vertreten, so wird sie unter  $\sigma$  auf sich selbst abgebildet. Speziell für  $k = 1$  erhalten wir die Identität und schreiben

$$\sigma = (1).$$

Geben Sie an, wie viele unterschiedliche Abbildungen  $\sigma$  durch ein Zyklus der Länge  $k$  realisiert werden können! Kann jedes Element in  $S_3$  ( $S_4$ ) als ein Zyklus geschrieben werden?

- (b) Wir definieren die Menge der (Permutations-)Matrizen

$$P_n := \{P \in \mathbb{K}^{n \times n} : P = (e_{i_1}, \dots, e_{i_n}, \text{ mit } i \leq i_k \leq n \text{ und alle } i_k \text{ paarweise verschieden})\}$$

mit  $e_i$  der  $i$ -te Einheitsvektor. Verifizieren Sie:  $(P_n, \cdot)$  ist mit der herkömmlichen Matrixmultiplikation eine Gruppe! Bestimmen Sie weiterhin einen bijektiven Gruppenmorphismus

$$\Phi : (S_n, \circ) \rightarrow (P_n, \cdot),$$

sodass gilt

$$\Phi(\sigma)e_i = s_j \iff \sigma(i) = j.$$

Beweisen Sie, dass sich jedes  $P$  aus  $P_n$  schreiben lässt als

$$P = \prod_{k=1}^{n-1} V_{i_k j_k},$$

mit  $V_{ij}$  definiert wie in Lemma 5.56.



*Beweis.* (a) Es gibt  $n!$  Möglichkeiten für eine Folge  $(i_1 i_2 \dots i_k)$ , aber wir können die zyklisch permutieren und  $\sigma$  verändert sich nicht. Deswegen gibt es  $n!/n = (n-1)!$  unterschiedliche Abbildungen, die durch ein Zyklus der Länge  $k$  realisiert werden können.

Ja, jedes Element in  $S_3$  kann als ein Zyklus geschrieben werden. Das können wir explizit machen:

$$\begin{array}{ccc} (1) & (12) & (23) \\ (13) & (132) & (123) \end{array}$$

Weil wir 6 Elemente haben, und  $|S_3| = 3! = 6$ , haben wir alle Elemente.

Das stimmt aber nicht für  $S_4$ . Sei

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Falls es als Zyklus geschrieben werden kann, muss das Zyklus den Länge 4 haben, weil  $\sigma(i) \neq i$  für alle  $i$ . Wir fangen obdA mit 1 an. Dann ist das Zyklus  $(12\dots)$ . Aber weil  $\sigma(2) = 1$ , hört das Zyklus auf, und  $\dots = \emptyset$ . Dann ist das Zyklus nicht mit Länge 4.

(b) Sei  $A, B \in P_n$  beliebige Elemente von  $P_n$ ,

$$\begin{aligned} A &= (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ B &= (e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) \end{aligned}$$

(i)  $G$  ist abgeschlossen: Wir betrachten  $ABe_k$  für  $k$  beliebig.

$$ABe_k = Ae_{j_k} = e_{i_{j_k}},$$

also

$$AB = (e_{i_{j_1}}, e_{i_{j_2}}, \dots, e_{i_{j_n}}) \in P_n.$$

Das  $i_{j_k}$  paarweise verschieden sind folgt daraus, dass  $j_k$  alle paarweise verschieden sind.

(ii) Neutrales element: Wir wissen aus der linearen Algebra, dass

$$1_n = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in P_n$$

das neutrales Element ist.

(iii) Assoziativität: Wir wissen auch, dass Matrizenmultiplikation assoziativ ist.

(iv) Existenz des Inverses: Sei jetzt  $p_k$ , sodass  $i_{p_k} = k$ .

## Bemerkung

Man kann  $i, p : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  interpretieren. Dann ist  $i$  eine bijektive Abbildung, und das Existenz einer inversen Abbildung  $p$  folgt daraus. Deswegen ist unsere Entscheidung immer möglich.

Wir betrachten  $A(e_{p_1}, e_{p_2}, \dots, e_{p_n})$ , und dafür die Wirkung der Abbildung auf einem beliebigen Basiselement  $e_k$ :

$$A(e_{p_1}, e_{p_2}, \dots, e_{p_n})e_k = Ae_{p_k} = e_{i_{p_k}} = e_k.$$

- (c) Sei  $i$  eine bijektive Abbildung  $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ . Wir schreiben  $i_k$  oder  $i(k)$  als das Bild von  $k$ . Wir vermuten, dass die gewünschte Homomorphismus

$$\Phi : i \rightarrow (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$$

ist.

$$(i) \quad \Phi(\sigma)e_j = e_{\sigma_j}, \text{ also } \Phi(\sigma)e_i = e_{\sigma_i} \iff \sigma(i) = j.$$

- (ii) Injektiv: Sei  $\sigma, \sigma' \in S_n$ ,  $\sigma \neq \sigma'$ , insbesondere gilt  $\sigma(i) \neq \sigma'(i)$ . Es gilt dann

$$\begin{array}{ccc} \Phi(\cdot) & \begin{array}{l} \xrightarrow{\sigma} \\ \xrightarrow{\sigma'} \end{array} & \begin{array}{l} (e_{\sigma_1}, \dots, \boxed{e_{\sigma_i}}, \dots, e_{\sigma_n}) \\ (e_{\sigma'_1}, \dots, \boxed{e_{\sigma'_i}}, \dots, e_{\sigma_n}) \end{array} \\ & & \neq \end{array}$$

also  $\Phi(\sigma) \neq \Phi(\sigma')$ .

- (iii) Surjektiv: Sei  $M = (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ . Wie im letzten Teilaufgabe können wir eine Abbildung  $i(k) = i_k$  definieren, und  $\Phi(i) = M$ .
- (iv) Homomorphismusgesetz: Es ist zu zeigen, für  $i, j \in S_n$  und

$$\begin{aligned} M_1 &= (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = \Phi(i) \\ M_2 &= (e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) = \Phi(j), \end{aligned}$$

dass

$$\Phi(i \circ j)(e_k) = M_1 M_2 e_k$$

für alle  $k$  gilt. Per Definition ist

$$\Phi(i \circ j)e_k = e_{i(j(k))} = e_{i_{j_k}}.$$

Es gilt auch

$$M_1 M_2 e_k = M_1 e_{j(k)} = e_{i(j(k))} = e_{i_{j_k}}.$$

(d) Es gilt

$$\Phi((ij)) = V_{ij}$$

per die vorherige Definition. Dann ist die Behauptung klar. Sei  $P \in P_n$

- (i) Weil  $\Phi$  bijektiv ist, ist  $P = \Phi(\sigma)$  für eine  $\sigma \in S_n$ .
- (ii)  $\sigma$  kann als Produkt von  $n - 1$  Transpositionen dargestellt werden (wenn weniger als  $n - 1$ , können wir id hinzufügen), z.B.  $\sigma = (a_1 b_1)(a_2 b_2) \dots (a_{n-1} b_{n-1})$ .
- (iii) Das Bild von ein Transposition ist ein Matriz  $V_{ij}$ .
- (iv) Dann ist

$$\begin{aligned}\Phi(\sigma) &= \Phi((a_1 b_1)) \Phi((a_2 b_2)) \dots \Phi(a_{n-1} b_{n-1}) \\ &= V_{a_1 b_1} V_{a_2 b_2} \dots V_{a_{n-1} b_{n-1}} \\ &= P.\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 52.** Gegeben sei die Permutation

$$S_9 \ni \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 3 & 9 & 7 & 6 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Stellen sie  $\sigma$  als Produkt von Transpositionen dar.
- (b) Berechnen Sie das Signum von  $\sigma$ .

*Beweis.* (a) Zuerst berechnen wir die disjunkter Zyklus

$$\begin{aligned}Z_1 &= (1249578) \\ Z_2 &= (6) \\ Z_3 &= (3)\end{aligned}$$

Dann haben wir

$$\sigma = (18)(17)(15)(19)(14)(12).$$

#### Begründung

Es gilt, für ein Zyklus

$$(a_1 a_2 \dots a_n) = \underbrace{(a_1 a_n)(a_1 a_{n-1}) \dots (a_1 a_2)}_{\sigma'}.$$

Wir betrachten zuerst  $\sigma'(a_1)$ . Dann ist  $(a_1 a_2)a_1 = a_2$ .  $a_2$  kommt nie wieder vor, also  $\sigma'(a_1) = a_2$ . Dann betrachten wir  $a_k$ ,  $k \neq 1$ . Wir haben  $(a_1 a_k)a_k = a_1$ .  $a_1$  kommt sofort wieder vor, und ist  $(a_1 a_{k+1})a_1 = a_{k+1}$ .  $a_{k+1}$  kommt nicht wieder vor, also  $\sigma'(a_k) = a_{k+1}$ .

(b) Wir haben

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}((18))\operatorname{sgn}((17)) \dots \operatorname{sgn}((12)) = (-1)^6 = 1. \quad \square$$

**Aufgabe 53.** Sei  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n \geq 2$ . Eine Matrix  $A \in M_n(\mathbb{R})$  heißt *symmetrisch* bzw. *antisymmetrisch*, wenn  $A^T = A$  bzw.  $A^T = -A$  gilt. Seien  $\operatorname{SM}_n(\mathbb{R})$  bzw.  $\operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$  die Untermengen von  $M_n(\mathbb{R})$ , die aus allen symmetrischen bzw. antisymmetrischen Matrizen bestehen.

(a) Zeigen Sie, dass  $\operatorname{SM}_n(\mathbb{R}), \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$  Untervektorräume von  $M_n(\mathbb{R})$  sind.

(b) Zeigen Sie, dass

$$A^T + A \in \operatorname{SM}_n(\mathbb{R}), \quad A - A^T \in \operatorname{AS}_n(\mathbb{R}), \quad \forall A \in M_n(\mathbb{R}).$$

Folgern Sie, dass  $M_n(\mathbb{R}) = \operatorname{SM}_n(\mathbb{R}) \oplus \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$ .

(c) Bestimmen Sie  $\dim(\operatorname{SM}_n(\mathbb{R}))$  und  $\dim(\operatorname{AS}_n(\mathbb{R}))$ .

(d) Seien  $A, B \in \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$  asymmetrische Matrizen. Zeigen Sie, dass der *Kommutator*  $[A, B] := AB - BA$  wieder antisymmetrisch ist.

*Beweis.* (a) Sei  $M, N \in \operatorname{SM}_n(\mathbb{R})$ , und  $a, b \in \mathbb{R}$ . Es gilt

$$(aM)^T = aM^T = aM,$$

also  $aM \in \operatorname{SM}_n(\mathbb{R})$ . Es gilt auch

$$(aM + bN)^T = aM^T + bN^T = aM + bN,$$

also  $aM + bN \in \operatorname{SM}_n(\mathbb{R})$ .

Sei jetzt  $M, N \in \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$ . Ähnlich folgt

$$(aM)^T = aM^T = a(-M) = -aM,$$

und

$$(aM + bN)^T = aM^T + bN^T = a(-M) + b(-N) = -(aM + bN)$$

also  $\operatorname{SM}_n(\mathbb{R})$  und  $\operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$  sind Untervektorräume.

(b) Es gilt

$$\begin{aligned} (A + A^T)^T &= A^T + (A^T)^T \\ &= A^T + A = A + A^T \\ (A - A^T)^T &= A^T - (A^T)^T \\ &= A^T - A = -(A - A^T) \end{aligned}$$

Für alle  $A \in M_n(\mathbb{R})$  gilt

$$A = \frac{1}{2}(\underbrace{A + A^T}_{\in \operatorname{SM}_n(\mathbb{R})} + \underbrace{A - A^T}_{\in \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})}),$$

also  $M_n(\mathbb{R}) = \operatorname{SM}_n(\mathbb{R}) \oplus \operatorname{AS}_n(\mathbb{R})$ .

- (c) In ein Matriz gibt es genau  $n \times n$  freie Parameter. Aber für symmetrische Matrizen haben wir  $M_{xy} = M_{yx}$ , also wir haben nur

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

freie Parameter in  $\text{SM}_n(\mathbb{R})$ . Für die antisymmetrischen Matrizen gilt eine ähnliche Argument, aber die Elemente auf dem Diagonal müssen 0 sein. Wir haben daher nur

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

freie Parameter, also

$$\begin{aligned} \dim(\text{SM}_n(\mathbb{R})) &= \frac{n(n+1)}{2} \\ \dim(\text{AS}_n(\mathbb{R})) &= \frac{n(n-1)}{2} \end{aligned}$$

- (d) Es gilt

$$\begin{aligned} [A, B]^T &= (AB - BA)^T \\ &= (AB)^T - (BA)^T \\ &= B^T A^T - A^T B^T \\ &= (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB \\ &= -(AB - BA) \end{aligned}$$

also  $[A, B]$  ist antisymmetrisch. □

**Aufgabe 54.** Gegeben sind die Matrizen  $A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & t^2 & 1 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix}$  und  $B(t) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & -1 & 1-t \\ 2 & 0 & t \end{pmatrix}, A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, t \in \mathbb{R}.$$

- (a) Bestimmen Sie  $\text{rang}(A(t))$  und  $\text{rang}(B(t))$  in Abhängigkeit von  $t$ .  
 (b) Berechnen Sie die Inversen  $(A(0))^{-1}$  und  $(B(1))^{-1}$ .

*Beweis.* (a) Wir verwenden das Gauß-Algorithmus

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & t^2 & 1 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & t^2 - 1 & 0 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \times t}$$

$$\begin{pmatrix} t & t & t \\ 0 & t^2 - 1 & 0 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} t & t & t \\ 0 & t^2 - 1 & 0 \\ 0 & 1 - t & 1 - t \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \times t+1} \begin{pmatrix} t & t & t \\ 0 & t^2 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - t^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} t & t & t \\ 0 & t^2 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - t^2 \end{pmatrix}$$

Für  $t \neq 0, t^2 - 1 \neq 0$ , also  $t \notin \{-1, 0, 1\}$ , ist es offenbar,  $\text{rang}(A(t)) = 3$  ist.

Für  $t = \pm 1$  ist  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , also  $Ae_1 = Ae_2 = Ae_3 \neq 0$ . Daraus folgt, dass  $\text{rang}(A(\pm 1)) = 1$ .

Obwohl es vom Gauß-Algorithmus so aussieht, dass  $\text{rang}(A(0)) \neq 3$ , ist eigentlich  $\text{rang}(A(0)) = 3$ . Wenn  $t = 0$  gilt

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Man beachte dann, dass

$$\begin{aligned} A(e_3 - e_1) &= (0, 0, 1)^T \\ A(e_3 - e_2) &= (0, 1, 0)^T \\ A(e_1 + e_2 - e_3) &= (1, 0, 0)^T \end{aligned}$$

Weil wir jede Basiselement erreichen können, können wir also jedes Element  $v \in \mathbb{R}^3$  erreichen. Deswegen gilt  $\text{rang}(A(0)) = 3$ . Zusammenfassung:

$$\text{rang}(A(t)) = \begin{cases} 1 & t = \pm 1, \\ 3 & \text{sonst.} \end{cases}.$$

Wir machen etwas ähnliches für  $B$  :

$$\begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & -1 & 1 - t \\ 2 & 0 & t \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & -1 & 1 - t \\ 0 & -2t & t \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times 2t} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & -2t & -2(t-1)t \\ 0 & -2t & t \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & -2t & -2(t-1)t \\ 0 & 0 & t(2t-1) \end{pmatrix}$$

Offenbar gilt, dass wenn  $t \neq 0$  und  $t \neq 1/2$ , ist  $\text{rang}(B(t)) = 3$ . Wenn  $t = 1/2$ , ist die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

also  $\text{rang}(B(1/2)) = 2$ . Wenn  $t = 0$  dürfen wir das Ergebnis des Gauß-Algorithmuses nicht direkt nutzen, weil wir durch  $2t$  multiplizieren haben. Stattdessen schreiben wir

$$B(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jetzt ist es klar, dass

$$\text{im}(B(0)) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

also  $\text{rang}(B(0)) = 2$ .

(b) Wir haben

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2-R_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+R_2} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1+R_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1-R_3} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \times -1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Also  $(A(0))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Es gilt auch

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-R_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-R_2} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1+R_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \times -1} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

also

$$(B(1))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

## 2.5 Blatt 6

**Aufgabe 55.** Betrachten Sie eine obere Dreiecksmatrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mit den Zahlen  $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}$  auf der Diagonalen.

- (a) Zeigen Sie, dass  $A$  genau dann invertierbar ist, wenn  $D := d_1 \dots d_n \neq 0$  gilt. Beweisen Sie, dass in diesem Fall die zu  $A$  inverse Matrix ebenfalls eine obere Dreiecksmatrix ist.
- (b) Seien nun alle Einträge von  $A$  ganze Zahlen und  $A$  invertierbar. Zeigen Sie, dass die inverse Matrix  $A^{-1}$  aus rationalen Einträgen besteht, wobei (im gekürzten Fall) als Nenner höchstens  $D$  auftritt.

*Beweis.* (a) Es genügt zu zeigen, dass  $\det(A) = d_1 \dots d_n$  für ein Dreiecksmatrix gilt. Wir beweisen es per Induktion auf  $n$ . Für  $n = 1$  ist  $\det(A_1) = A_{11}$ . Wir nehmen an, dass die Behauptung für  $n - 1$  gilt, wobei  $n \in \mathbb{N}$  beliebig ist. Wir betrachten ein  $n \times n$  Dreiecksmatrix  $A_n$  und eine Laplaceentwicklung auf der ersten Spalte.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ & A_{n-1} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{matrix}} & & & \end{pmatrix}$$

Also  $\det(A_n) = a_{11}\det(A_{n-1})$ . Als Induktionsannahme haben wir angenommen, dass  $\det(A_{n-1}) = a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$ . Daraus folgt:

$$\det(A_n) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Das Ergebnis folgt daraus und aus Proposition 6.28.

- (b) Wir beweisen es durch Durchführung des Gauß-Algorithmus.

Wir fangen an mit der zweiten Spalte bzw. zweiten Zeile. Wir dividieren die zweite Zeile durch  $a_{22}$ . Das Matrix sieht so aus

$$\left( \begin{array}{ccccc|ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & a_{23}/a_{22} & \dots & a_{2n}/a_{22} & 0 & 1/a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right).$$



Dann subtrahieren wir  $a_{12}$  mal die zweite Zeile von die erste Zeile. Weil der Eintrag in der linken Seite der zweiten Zeile eine rationale Zahl mit Nenner höchstens  $a_{22}$  ist, werden alle Einträge in der zweiten Spalte des ehemaligen Einheitsmatrix auch rationale Zahlen mit Nenner höchstens  $\frac{1}{a_{22}}$ .

Danach dividieren wir die dritte Zeile durch  $a_{22}a_{33}$ . Dann sieht das Matrix so aus

$$\left( \begin{array}{ccccc|ccccc} a_{11} & 0 & a_{13} & \dots & a_{1n} & 1 & -1/a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & a_{23}/a_{22} & \dots & a_{2n}/a_{22} & 0 & 1/a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1/a_{22} & \dots & 1 & 0 & 0 & 1/(a_{22}a_{33}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right).$$

Alle Einträge in der dritten Spalte sind Vielfachen von  $1/a_{22}$ , also wir können alle Einträge darin 0 machen durch subtrahieren ein Vielfaches von die dritte Zeile, was das Nenner nicht erhöhen kann.

Ähnlich machen wir weiter. Wir dividieren die vierte Zeile durch  $1/a_{22}a_{33}a_{44}$ . Alle Einträge in die vierte Spalte werden nur Vielfachen von  $1/a_{22}a_{33}$ . Zuletzt dividieren wir die erste Zeile durch  $a_{11}$ , damit das Matrix auf der linken Seite das Einheitsmatrix ist. Dann kann das Nenner höchstens  $a_{11} \dots a_{nn}$  sein.  $\square$

**Aufgabe 56.** Es sei im Folgenden  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Wir definieren die Spur

$$\text{tr} : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad A \rightarrow \sum_{i=1}^n (A)_{ii}.$$

Zeigen Sie:

- (a) Die Spur ist ein lineares Funktional in  $M_n(\mathbb{K})^*$ .
- (b) Für  $A, B \in M_n(\mathbb{K})$  gilt

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

- (c) Für  $A \in GL_n(\mathbb{K})$  und  $B \in M_n(\mathbb{K})$  gilt

$$\text{tr}(ABA^{-1}) = \text{tr}(B).$$

- (d) Ist  $f \in M_N(\mathbb{K})^*$  ein lineares Funktional mit

$$f(AB) = f(BA), \quad f(1) = n$$

für  $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ , dann gilt bereits  $f = \text{tr}$ .

*Beweis.* (a) Sei  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(xA + yB) &= \sum_{i=1}^n (xA + yB)_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^n [(xA)_{ii} + (yB)_{ii}] \\ &= \sum_{i=1}^n (xA)_{ii} + \sum_{i=1}^n (yB)_{ii} \\ &= x \sum_{i=1}^n (A)_{ii} + y \sum_{i=1}^n (B)_{ii} \\ &= x \operatorname{tr}(A) + y \operatorname{tr}(B). \end{aligned}$$

(b) Es gilt

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n A_{ik} B_{ki} \quad \text{wir dürfen endliche Summe umordnen} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{ki} B_{ik} \quad \text{wir vertauschen } i \text{ und } k \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n B_{ik} A_{ki} \quad \mathbb{K} \text{ ist kommutativ} \\ &= \operatorname{tr}(BA) \end{aligned}$$

(c) Es gilt

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(ABA^{-1}) &= \operatorname{tr}((AB)A^{-1}) \\ &= \operatorname{tr}(A^{-1}(AB)) \\ &= \operatorname{tr}(A^{-1}AB) \\ &= \operatorname{tr}(AB) \end{aligned}$$

(d) Wir betrachten ein Basis für  $M_n(\mathbb{K})$ . Das gewählte Basis ist die Elementarmatrizen  $E_{ij}$  (s. Proposition 5.54). Es gilt

$$E_{ii}E_{ij} = E_{ij} \quad E_{ij}E_{ii} = 0 \quad i \neq j.$$

Es folgt  $f(E_{ij}) = f(E_{ii}E_{ij}) = f(E_{ij}E_{ii}) = f(0) = 0$ , also  $f(M)$  ist nicht von nichtdiagonale Elemente abhängig.

Danach betrachten wir die diagonale Elemente. Wir können ein Permutationsmatrix (ein Matrix mit die Zeilen  $i$  und  $j$  vertauscht)  $P$  betrachten. Es gilt  $P^{-1} = P$  und

$$P^{-1}\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n)P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n).$$

Weil  $f$  angewandt auf die beide Seite der Gleichung wegen (c) gleich sein muss, ist  $f$  unabhängig von ein Umordnung der diagonale Elemente. Zuletzt gilt

$$f(1) = \sum_{i=1}^n f(E_{ii}) = nf(E_{11}) = n,$$

also

$$f(E_{ii}) = 1 \quad \text{für alle } i.$$

Dann ist  $f = \text{tr}$ . □

**Aufgabe 57.** Bestimmen Sie zu den folgenden linearen Abbildungen jeweils alle Eigenwerte und Eigenräume. Entscheiden Sie weiterhin, ob die entsprechende Abbildung diagonalisierbar ist.

(a)

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \rightarrow Ax,$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \quad x \rightarrow Ax,$$

mit  $A$  wie in (a).

(c)

$$T : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K}), \quad A \rightarrow \text{tr}(A)1.$$

(d)

$$T : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K}), \quad A \rightarrow A^T.$$

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 0 & 1 \\ 1 & -1 - \lambda & 0 \\ -4 & 2 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (-1 - \lambda)(-1 - \lambda)(2 - \lambda) - 0 + (2 - (1 + \lambda)(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\lambda - \lambda^3 \\
&= -\lambda(1 + \lambda^2)
\end{aligned}$$

also  $\lambda = 0$  ist ein Eigenwert, aber  $1 + \lambda^2 = 0$  hat keine Lösung in  $\mathbb{R}$ , also es gibt nur ein Eigenwert, also  $T$  ist nicht diagonalisierbar.

- (b) Das charakteristische Polynom hat 3 unterschiedliche Eigenwerte,  $\lambda = 0$  und  $\lambda = \pm 1$ . Weil alle Eigenwerte unterschiedlich sind und der Eigenraum mindestens Dimension 1 hat, ist es diagonalisierbar.
- (c) Sei  $A \in M_n(\mathbb{K})$ .  $A$  ist ein Eigenvektor von  $T$  genau dann, wenn

$$A = \lambda \operatorname{tr}(A) 1_n.$$

Also gilt, dass  $A$  diagonal ist und

$$n \operatorname{tr}(A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$$

also es gibt nur ein Eigenwert  $n$  und der Eigenraum ist gespannt durch

$$\operatorname{span}(1_n),$$

was ein 1-dimensionaler Vektorraum ist. Für  $n > 1$  kann es kein Basis sein, und  $T$  ist nicht diagonalisierbar. Für  $n = 1$  ist  $T$  die Identität, also es ist schon diagonal.

- (d) Sei  $A \in M_n(\mathbb{K})$ .  $A$  ist ein Eigenvektor genau dann, wenn

$$A^T = \lambda A.$$

Wir können hier sofort zwei Eigenwerte und deren Eigenräume lesen:

$$\begin{aligned}
\lambda = 1 & : A \in \operatorname{SM}_n(\mathbb{K}) \\
\lambda = -1 & : A \in \operatorname{AS}_n(\mathbb{K})
\end{aligned}$$

Die Dimension der Eigenräume wissen wir schon

$$\begin{aligned}
\dim(\operatorname{SM}_n(\mathbb{K})) &= \frac{n(n+1)}{2} \\
\dim(\operatorname{AS}_n(\mathbb{K})) &= \frac{n(n-1)}{2}
\end{aligned}$$

Es gilt

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2,$$

also wir können eine Basis für  $M_n(\mathbb{K})$  finden mit genau  $\frac{n(n+1)}{2}$  Vektoren aus  $\lambda = 1$  Eigenraum und  $\frac{n(n-1)}{2}$  Vektoren aus dem  $\lambda = -1$  Eigenraum. Daraus folgt:  $T$  ist diagonalisierbar.  $\square$

**Aufgabe 58.** Über einen algebraisch vollständigen Körper  $\mathbb{K}$  zerfällt das charakteristische Polynom  $\chi_A(x)$  einer Matrix  $A \in M_n(\mathbb{K})$  immer in Linearfaktoren

$$\chi_A(x) := \det(A - x1) = (\lambda_1 - x)^{\mu_1} \cdots (\lambda_m - x)^{\mu_m}.$$

Dabei ist der Exponent  $\mu_i$  die algebraische Vielfachheit zum Eigenwert  $\lambda_i$  und  $n = \mu_1 + \cdots + \mu_m$ . Es sei  $V_{\lambda_i}$  der Eigenraum zum Eigenwert  $\lambda_i$ , dann bezeichnen wir die Dimension des Eigenraums

$$d_i := \dim(V_{\lambda_i})$$

als geometrische Vielfachheit von  $\lambda_i$ . Zeigen Sie: Es gilt immer

$$\mu_i \geq d_i, \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

*Hinweis: Führen Sie einen Basiswechsel mit einer möglichst geschickt gewählten Basis  $B$  durch.*

*Beweis.* Sei  $\lambda_i$  ein Eigenwert mit geometrische Vielfachheit  $d_i$ . Das heißt, dass wir  $d_i$  linear unabhängige Vektoren finden können, so dass  $Av = \lambda_i v$  für alle solche Vektoren. Dann ergänzen wir die Basis, so dass die ersten  $d_i$  Vektoren in der Basis Eigenvektoren mit Eigenwert  $\lambda_i$  sind. Das charakteristische Polynom verändert sich nicht, wenn wir ein Basiswechsel machen. Also das charakteristische Polynom ist gleich das charakteristische Polynom von

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda 1_{d_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\det(A' - x1_n) = (x - \lambda)^{d_i} \det(C),$$

also die algebraische Vielfachheit von  $\lambda_i$  ist mindestens die geometrische Vielfachheit.  $\square$

## 2.6 Blatt 7

**Aufgabe 59.** Beweisen oder Widerlegen Sie:

- (a) Es sei  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  und  $p \in \mathbb{K}[x]$  ein beliebiges Polynom, dann gilt: Ist  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A$ , dann ist  $p(\lambda)$  ein Eigenwert von  $p(A)$ .
- (b) Angenommen wir haben in (a) eine Konstellation in der  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A$  und  $p(\lambda)$  ein Eigenwert von  $p(A)$  ist, dann stimmen jeweils auch die geometrischen Vielfachheiten überein.
- (c) Eine  $n \times n$  Matrix mit  $n$  paarweise verschiedenen Eigenwerten ist invertierbar.

- (d) Im Falle der Intervierbarkeit ist  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  genau dann, wenn  $\lambda^{-1}$  ein Eigenwert von  $A^{-1}$  ist.
- (e) Sind zwei Matrizen  $A$  und  $B$  ähnlich, dann haben sie denselben Eigenwert.
- (f) Sind zwei Matrizen  $A$  und  $B$  äquivalent, dann haben sie denselben Eigenwert.
- (g) Sind zwei Matrizen  $A$  und  $B$  ähnlich so folgt: Ist  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A$  dann ist  $\lambda$  ein Eigenwert von  $(A + B)/2$ .

*Beweis.* (a) Wahr. Sei  $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ .

Sei  $v$  ein Eigenvektor von  $A$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
 p(A)v &= (a_0 + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n)v \\
 &= a_0v + a_1Av + a_2A^2v + \dots + a_nA^nv \\
 &= a_0v + a_1\lambda v + a_2\lambda^2v + \dots + a_n\lambda^nv \\
 &= (a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n)v \\
 &= p(\lambda)v
 \end{aligned}$$

- (b) Wahr. Aus (a) wissen wir, dass die Eigenvektoren sich nicht verändern. Also bezüglich  $A$  entscheiden wir uns für eine Basis, deren Dimension die geometrische Vielfachheit ist, dann bleibt die auch eine Basis für den Eigenraum bezüglich des Eigenwertes  $p(\lambda)$ .
- (c) Wahr. Es gibt eine Basis von  $n$  Eigenvektoren (es ist eine Basis, weil die linear unabhängig sind (Korollar 6.59)).  
Dann ist  $\{\lambda_i v_i | i \in 1, 2, \dots, n\}$  auch eine Basis, weil Multiplikation durch ein Konstante die lineare Unabhängigkeit nicht verletzt.
- (d) Wahr. Sei  $v$  ein Eigenvektor von  $A$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Es gilt per Definition

$$Av = \lambda v.$$

Außerdem gilt

$$Av = A^{-1}AAv = A^{-1}A(\lambda v) = \lambda A^{-1}Av,$$

also

$$\frac{1}{\lambda}Av = A^{-1}(Av).$$

Das heißt, dass  $Av$  ein Eigenvektor von  $A^{-1}$  mit Eigenwert  $\lambda^{-1}$  ist.

Sei jetzt  $v$  ein Eigenvektor von  $A^{-1}$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Ähnlich gilt

$$A^{-1}v = AA^{-1}A^{-1}v = AA^{-1}(\lambda v) = \lambda AA^{-1}v$$

und die andere Richtung folgt.

- (e) Wahr. Sei  $A = Q^{-1}BQ$ . Sei außerdem  $v$  ein Eigenvektor von  $A$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Es gilt  $QA = BQ$  und

$$\begin{aligned} QAv &= Q\lambda v = \lambda(Qv) \\ &= BQv = B(Qv) \end{aligned}$$

also  $Qv$  ist ein Eigenvektor von  $B$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Wir können die Rollen von  $A$  und  $B$  vertauschen, um die andere Richtung zu zeigen.

- (f) Falsch.

#### Definition

Seien  $A, B \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$ . Dann heißen  $A$  und  $B$  äquivalent, falls es  $Q \in GL_n(\mathbb{K})$  und  $P \in GL_m(\mathbb{K})$  gibt, sodass

$$A = QBP.$$

Sei  $A = \text{diag}(4, 4)$ ,  $B = \text{diag}(1, 1)$ ,  $Q = P = \text{diag}(2, 2)$ . Dann hat  $A$  nur den Eigenwert 4 während  $B$  nur den Eigenwert 1 hat.

- (g) Falsch. Sei

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A = P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann hat  $B$  die Eigenwerte 3 und -1, aber  $(A + B)/2$  hat charakteristisches Polynom  $x^2 - 2x - 4$ . Durch Einsetzen können wir zeigen, dass weder 3 noch -1 Nullstellen sind, aber die Diskriminante ist  $> 0$ , also wir haben zwei unterschiedliche Nullstellen.

Das zeigt, dass  $B$  bzw.  $A$  Eigenwerte hat, die keine Eigenwerte von  $(A + B)/2$  sind und  $(A + B)/2$  hat Eigenwerte, die keine Eigenwerte von  $A$  bzw.  $B$  sind.  $\square$

**Aufgabe 60.** Es seien  $A, B$  in  $\mathbb{K}^{n \times n}$  diagonalisierbar und  $D_A, D_B$  zugehörige Diagonalmatrizen. Zeigen Sie:

- (a) Existiert ein  $U \in GL_n(\mathbb{K})$  mit

$$D_A = U^{-1}AU, \quad D_B = U^{-1}BU$$

so gilt für den Kommutator  $[A, B] = 0$ .

- (b) Ist  $[A, B] = 0$ , dann existiert eine geordnete Basis  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  aus Eigenvektoren von  $A$  zu den Eigenwerten  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  bezüglich derer gilt

$${}_V[B]_V = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_r \end{pmatrix}$$

mit  $B_1 \in \mathbb{K}^{d_1 \times d_1}$  und  $d_i$  die geometrische Vielfachheit von  $\lambda_i$  für  $i = 1, \dots, r$ .

(c) Jedes der  $B_i$  wie in (b) ist selbst wieder diagonalisierbar für  $i = 1, \dots, r$ .

(d) Ist  $[A, B] = 0$ , so existiert ein  $U$  mit

$$D_A = U^{-1}AU, \quad D_B = U^{-1}BU.$$

*Beweis.* (a) Es gilt

$$\begin{aligned} [A, B] &= AB - BA \\ &= UD_AU^{-1}UD_BU^{-1} - UD_BU^{-1}UD_AU^{-1} \\ &= UD_AD_BU^{-1} - UD_BD_AU^{-1} \\ &= UD_AD_BU^{-1} - UD_AD_BU^{-1} && \text{Diagonalmatrizen kommutieren} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(b) Sei  $v$  ein Eigenvektor von  $A$  mit Eigenwert  $\lambda$ . Es gilt

$$\begin{aligned} [A, B]v &= 0v = 0 \\ &= (AB - BA)v \\ &= ABv = B(\lambda v) \\ &= \lambda Bv = A(Bv) \end{aligned}$$

Dann ist  $Bv$  ein Eigenvektor von  $A$  mit gleichen Eigenwert. Wir wählen eine geordnete Basis aus Eigenvektoren, so dass alle Eigenvektoren mit gleichen Eigenwerte nebeneinander stehen.

Wir haben schon gezeigt, dass  $Bv$  ein Vektor mit dem gleichen Eigenwert ist, also er liegt noch im Eigenraum. Das heißt, dass die nicht (block-)diagonal Terme null sein müssen und das Matrix ist block-diagonal (wobei die Spalten die Wirkung von  $B$  auf einem Vektor der Basis bzw. Eigenvektor von  $A$  darstellen). Als Darstellung der Wirkung eines Eigenraumes ist es auch klar, dass die Dimension die Dimension des Eigenraumes ist, was per Definition die geometrische Vielfachheit ist.

(c) Wir betrachten das charakteristische Polynom von  $B_i$ , und bezeichnen es mit  $p_i(\lambda)$ . Es gilt  $p_1(\lambda)p_2(\lambda)\dots p_r(\lambda) = p(\lambda)$ , wobei  $p(\lambda)$  das charakteristische Polynom für  ${}_V[B]_V$  ist.

Dann ist jeder Eigenwert von einem  $B_i$  auch ein Eigenwert von  ${}_V[B]_V$ , und zu jedem Eigenwert von  $B$  gehört ein Eigenvektor. Wir wissen, dass wir aus solche Eigenvektoren eine Basis bilden können (weil  $B$  diagonalisierbar ist), also wir können aus eine Teilmenge eine Basis für  $B_i$  bilden.



- (d) Wir können das Bild und Zielbereich von  $B_i$  als einen Eigenraum von  $A$  betrachten. Aus (c) wissen wir, dass wir durch ein Basiswechsel  $B_i$  diagonalisieren können. Weil das Bild genau ein Eigenraum ist, enthält die Basis nur Eigenvektoren von  $A$ , also  $A$  bleibt diagonal, während  $B$  jetzt nach der Basiswechsel diagonal ist.

Wir haben dann  $A$  und  $B$  gleichzeitig diagonalisiert. Sei  $U$  das Matrix mit Vektoren von die Basis als Spalten. Dann gilt

$$D_A = U^{-1}AU \quad D_B = U^{-1}BU. \quad \square$$

**Aufgabe 61.** Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

ein reelle Matrix.

- (a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von  $A$ .  
 (b) Bestimmen Sie alle Eigenwerte und dazugehörige Eigenräume.  
 (c) Im Falle der Diagonalisierbarkeit, bestimmen Sie explizit die Projektoren  $P_1, \dots, P_r$  auf die  $r$ -vielen Eigenräume, sodass gilt

$$A = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i.$$

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1-\lambda & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) [(1-\lambda)((1-\lambda)(3-\lambda) + 1) + (\lambda - 3 + 1) + (2 + 1 - \lambda)] \\ &= (1-\lambda) [(1-\lambda)(3 + \lambda^2 - 4\lambda + 1) + \lambda - 2 + 2 - \lambda] \\ &= (1-\lambda)^2 (3 + \lambda^2 - 4\lambda + 1) \\ &= (1-\lambda)^2 (\lambda^2 - 4\lambda + 4) \\ &= (1-\lambda)^2 (\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

(b) Die Eigenwerte sind 1 und 2. Es gilt

$$A - 1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Eine Basis für den Eigenraum bzw. Kern von  $A - 1$  ergibt sich sofort:

$$ER_1 = \text{span} \left( \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Weil wir schon 2 Vektoren gefunden haben, und die algebraische Vielfachheit 2 ist, haben wir den ganzen Eigenraum gefunden. Es gilt auch

$$A - 2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Eine Basis ergibt sich sofort:

$$ER_2 = \text{span} \left( \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

(c) Wir schreiben eine neue Basis von Eigenvektoren:

$$ER_1 = \text{span} \left( \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

und

$$ER_2 = \text{span} \left( \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Dann sind die Projektoren

$$P'_1 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 1 \ 0) + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ -1 \ -2)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
P'_2 &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ -2 \ 1) + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (2 \ -1 \ 0 \ 1) \\
&= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Dann ist  $P'_1, P'_2$  eine Zerlegung der Eins. Die gewünschte Projektoren sind

$$\begin{aligned}
P_1 &= AP'_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
P_2 &= AP'_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ 6 & -4 & 2 & 2 \\ 10 & -3 & -4 & 7 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

und es gilt  $A = P_1 + P_2$ . □

## 2.7 Blatt 10

**Aufgabe 62.** Betrachten Sie den Vektorraum  $\mathbb{C}^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  mit dem Standardskalarprodukt  $\langle v, w \rangle = \bar{v}^T w$  für alle  $v, w \in \mathbb{C}^n$ . Sei  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . Zeigen Sie die folgenden Aussagen.

- (a) Die adjungierte Abbildung von  $A$ , wie in Definition 7.66, ist gerade durch die in Definition 7.13 beschriebene adjungierte Matrix  $A^* = \overline{A^T}$  gegeben.
- (b) Es gilt  $\text{tr}(A^*) = \overline{\text{tr}(A)}$ .
- (c) Es gilt  $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$ .
- (d)  $\lambda \in \mathbb{C}$  ist genau dann Eigenwert von  $A$ , wenn  $\bar{\lambda}$  Eigenwert von  $A^*$  ist.

Sei  $A$  nun ein invertierbarer und adjungierbarer Endomorphismus auf dem unitären Vektorraum  $V$ . Dann gilt

(e)  $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$ .

*Beweis.* (a) Es gilt

$$\begin{aligned}
 \langle A^* v, w \rangle &= (A^* v)^T w \\
 &= v^T (\overline{A^*})^T w \\
 &= v^T \overline{(A^T)^T} w \\
 &= v^T \overline{(A^T)}^T w \\
 &= v^T \overline{A} w \\
 &= v^T A w \\
 &= \langle v, A w \rangle
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(A^*) &= \sum_{i=1}^n (A^*)_{ii} \\
 &= \sum_{i=1}^n (\overline{A^T})_{ii} \\
 &= \sum_{i=1}^n \overline{A_{ii}^T} \\
 &= \sum_{i=1}^n \overline{A_{ii}} \\
 &= \overline{\sum_{i=1}^n A_{ii}} \\
 &= \overline{\operatorname{tr}(A)}.
 \end{aligned}$$

(c) Wir brauchen aus den vorherigen Übungsblätter:  $\det(A^T) = \det A$ .  
Wir wissen auch aus den Eigenschaften der komplexe Konjugierte

$$\overline{\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^k a_{ij}} = \sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^k \overline{a_{ij}} \quad (2.1)$$

Es folgt daraus:

$$\begin{aligned}
 \det(A^*) &= \det(\overline{A^T}) \\
 &= \overline{\det(A^T)} \\
 &= \overline{\det(A)}
 \end{aligned} \quad (2.1)$$

(d) Sei  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A$ . Es gilt dann

$$\det(A^* - \bar{\lambda}I) = \det(\overline{A^T} - \bar{\lambda}I)$$

$$\begin{aligned}
&= \det(\overline{A}^T - \overline{\lambda} I^T) \\
&= \det(\overline{(A - \lambda I)}^T) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Umgekehrt: Sei  $\overline{\lambda}$  ein Eigenwert von  $A^*$ . Es gilt:

$$\begin{aligned}
\det(A - \lambda I) &= \det(\overline{(\overline{A} - \overline{\lambda} I)}) \\
&= \det(\overline{((\overline{A}^T - \lambda I^T))^T}) \\
&= 0
\end{aligned}$$

(e) Sei  $v, w \in V$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\langle (A^*)^{-1}w, v \rangle &= \langle (A^*)^{-1}w, AA^{-1}v \rangle \\
&= \langle A^*(A^*)^{-1}w, A^{-1}v \rangle \\
&= \langle w, A^{-1}v \rangle
\end{aligned}$$

also  $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ . □

**Aufgabe 63.** Betrachten Sie die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}$$

im unitären Vektorraum  $\mathbb{C}^4$ , versehen mit dem Standardskalarprodukt  $\langle x, y \rangle := \overline{x}^T y$ . Sei  $U = \text{span}\{v_1, v_2\}$ . Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von  $U$  sowie von  $U^\perp$ .

*Beweis.*

$$U^\perp = \ker \begin{pmatrix} -i & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\begin{pmatrix} -i & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -i & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2iR_1} \begin{pmatrix} -i & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & i & 4i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \times i} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -i & -2i \\ 0 & 2 & i & 4i \end{pmatrix}$$

Eine Basis für den Kern ist dann

$$\begin{pmatrix} i \\ -i/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2i \\ -2i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der Gram-Schmidt-Algorithmus ergibt dann Orthonormalbasen. Für  $U$  ist  $\langle v_2, v_1 \rangle = 3i$ ,  $\langle v_1, v_1 \rangle = 6$ . Dann ist eine Basis

$$\left\{ v_1, v_2 - \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3/2 \\ 2 \\ i/2 \\ -i \end{pmatrix} \right\}.$$

Daraus ergibt sich eine Orthonormalbasis für  $U$ :

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{15}} \begin{pmatrix} 3/2 \\ 2 \\ i/2 \\ -i \end{pmatrix} \right\}.$$

Für  $U^\perp$  ist ähnlich eine Basis

$$\left\{ 3 \begin{pmatrix} 2i \\ -i \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2i \\ -4i \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}. \quad \square$$

**Aufgabe 64.** Sei  $V_n \subset \mathbb{C}[x]$  der Unterraum der Polynome vom Grad  $\leq n$ . Sei

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f(x)} g(x) \, dx$$

für  $f, g \in V_n$ .

- Zeigen Sie, dass durch  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ein Skalarprodukt auf  $V_n$  definiert ist.
- Starten Sie mit der Basis der Monome  $1, x, x^2, x^3$  und führen Sie den Gram-Schmidt-Algorithmus durch, um eine Orthonormalbasis von  $V_3$  bezüglich  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  zu finden.

*Beweis.* (a) Die Linearitätseigenschaften folgen alle aus der Linearität des Integrals. Es bleibt positiv Definitheit zu zeigen.

(Es wurde nicht geschrieben, welche Definition des Integrals hier benutzt wurde. Ich benutze das Lebesgue-Integral, weil es einfacher ist).

Es gilt

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 |f(x)|^2 \, dx.$$

Weil  $|f| \geq 0$ , ist das Integral  $\geq 0$ . Es ist 0 genau dann, wenn  $|f(x)|^2$   $\lambda_1$ -fast überall 0 ist. Das Integral ist 0 genau dann, wenn  $|f(x)|^2$   $\lambda_1$ -fast überall 0 ist. Aber alle Polynome sind stetig.  $|f|^2$  ist dann als Verkettung stetiger Funktionen auch stetig und eine  $\lambda_1$ -fast überall 0 stetige Funktion ist überall 0. Daraus folgt:  $f = 0$ , das Nullpolynom.

(b) (i) Das erste Element ist 1. Es gilt

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 \, dx = 1.$$

(ii)  $\langle x, 1 \rangle = \int_0^1 |x| \, dx = 1/2$ . Das zweite Element ist  $x - 1/2$ . Es gilt

$$\left\langle x - \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{12}.$$

(iii)

$$\begin{aligned} \langle x^2, 1 \rangle &= \int_0^1 x^2 \, dx = 1/3 \\ \left\langle x^2, x - \frac{1}{2} \right\rangle &= 1/12 \end{aligned}$$

Das zweite Element ist

$$x^2 - \frac{1}{3} - \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

Es gilt

$$\left\langle x^2 - x + \frac{1}{6}, x^2 - x + \frac{1}{6} \right\rangle = \frac{1}{180}.$$

(iv)

$$\begin{aligned} \langle x^3, 1 \rangle &= 1/4 \\ \left\langle x^3, x - \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{3}{40} \\ \left\langle x^3, x^2 - x + \frac{1}{6} \right\rangle &= \frac{1}{120} \end{aligned}$$

Dann ist das dritte Element

$$x^3 - \frac{1}{4} - \frac{9}{10} \left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{2} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) = x^3 - \frac{3x^2}{2} + \frac{3x}{5} - \frac{1}{20}.$$

Insgesamt ist die Orthogonalbasis

$$\left\{ 1, x - \frac{1}{2}, x^2 - x + \frac{1}{6}, x^3 - \frac{3x^2}{2} + \frac{3x}{5} - \frac{1}{20} \right\}.$$

Wir normalisieren dann alle Elemente und erhalten die Orthonormalbasis

$$\left\{ 1, \sqrt{3}(2x - 1), \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1), \sqrt{7}(20x^3 - 30x^2 + 12x - 1) \right\}.$$

□

**Aufgabe 65.** Sei  $V$  ein euklidischer oder unitärer Vektorraum und  $M, N \subseteq V$  Teilmengen von  $V$ .

- (a) Sei  $N \subseteq M$ . Zeigen Sie, dass dann  $M^\perp \subseteq N^\perp$  gilt.
- (b) Zeigen Sie  $M \subseteq (M^\perp)^\perp$  und geben Sie ein Beispiel für einen euklidischen oder unitären Vektorraum  $V$ , sowie eine Teilmenge  $M \subseteq V$  an, sodass  $M \neq (M^\perp)^\perp$ .
- (c) Zeigen Sie, dass das Orthogonalkomplement von  $M$  durch

$$M^\perp = \bigcap_{v \in M} \ker v^\flat$$

gegeben ist, wobei  $v^\flat = \langle v, \cdot \rangle \in V^*$  wie in Bemerkung 7.2iii.

- (d) Zeigen Sie, dass  $(M^\perp)^{\perp\perp} = (M^{\perp\perp})^\perp$  gilt.
- (e) Zeigen Sie, dass  $M^\perp + N^\perp \subset (M \cap N)^\perp$  gilt.
- (f) Zeigen Sie, dass  $(M + N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp$  gilt, wenn  $M$  und  $N$  Unterräume von  $V$  sind.

Beweisen oder widerlegen Sie:

- (g) Es gilt  $M^\perp \cup N^\perp \subset (M \cup N)^\perp$ .
- (h) Es gilt  $(M \cup N)^\perp \subset M^\perp \cup N^\perp$ .

*Beweis.* (a) Sei  $v \in M^\perp$ . Per Definition gilt  $\langle v, w \rangle = 0$  für alle  $w \in M$ . Dann gilt es auch für alle  $w \in N$ , weil  $N \subseteq M$ . Dann ist  $M^\perp \subseteq N^\perp$ .

- (b) Sei  $v \in M^\perp$ ,  $w \in M$ . Per Definition ist  $\langle v, w \rangle = 0$  für alle solche  $w$ . Daraus folgt:  $v \in (M^\perp)^\perp$  und  $M \subseteq (M^\perp)^\perp$ .

Gegenbeispiel: Sei  $V = \mathbb{C}[x]$  mit innerem Produkt

$$\langle a_0 + a_1x + \cdots + a_nx_n, b_0 + b_1x + \cdots + b_mx_m \rangle = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} a_i b_i$$

und  $M$  die Menge aller Polynome  $f$ , so dass für die Polynomfunktion  $f(1) = 1$  gilt. Dann ist  $M^\perp = \{0\}$  und  $(M^\perp)^\perp = V$ . Aber  $M \neq V$  offenbar gilt.

- (c) Die Definitionen sind gleich: Auf der linken Seite haben wir alle Vektoren  $w \in V$ , so dass  $\langle v, w \rangle = 0$  für alle  $v \in M$ .

Per Definition ist  $w \in \ker v^\flat$  genau dann, wenn  $\langle v, w \rangle = 0$ . Wenn  $w$  in alle  $\ker v^\flat$  liegt, gilt das für alle  $v$ , was genau der Definition von  $M^\perp$  ist.



(d)

$$(M^\perp)^{\perp\perp} = ((M^\perp)^\perp)^\perp = (M^{\perp\perp})^\perp.$$

(e) Sei

$$v := \underbrace{v_M}_{\in M^\perp} + \underbrace{v_N}_{\in N^\perp} \in M^\perp + N^\perp$$

und  $w \in M \cap N$ . Dann ist

$$\begin{aligned} \langle w, v \rangle &= \langle w, v_M \rangle \xrightarrow{0} & w \in M \\ &+ \langle w, v_N \rangle \xrightarrow{0} & w \in N \\ &= 0 \end{aligned}$$

also  $v \in (M \cap N)^\perp$ . Daraus folgt:  $M^\perp + N^\perp \subseteq (M \cap N)^\perp$ .(f) Sei  $v \in M^\perp \cap N^\perp$  und

$$w := \underbrace{w_M}_{\in M} + \underbrace{w_N}_{\in N} \in M + N$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \langle v, w_M \rangle \xrightarrow{0} & v \in M^\perp \\ &+ \langle v, w_N \rangle \xrightarrow{0} & v \in N^\perp \\ &= 0 \end{aligned}$$

also  $(M + N)^\perp \supseteq M^\perp \cap N^\perp$ .Sei jetzt  $v \in (M + N)^\perp$  und  $w \in M$ . Da  $M + N \supseteq M$  und  $M + N \supseteq N$  gilt, ist

$$\begin{aligned} (M + N)^\perp &\subseteq M^\perp \\ (M + N)^\perp &\subseteq N^\perp \end{aligned}$$

und daher

$$(M + N)^\perp \subseteq M^\perp \cap N^\perp.$$

(g) Falsch. Sei  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $M = \text{span}((1, 0, 0)^T)$ ,  $N = \text{span}((0, 1, 0)^T)$ . Es gilt

$$\begin{aligned} M^\perp &= \text{span} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ N^\perp &= \text{span} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ (M \cup N)^\perp &= \text{span} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

(h) Wahr. Es gilt  $M \cup N \supseteq M$  und  $M \cup N \supseteq N$ . Daraus folgt:

$$\begin{aligned}(M \cup N)^\perp &\subseteq M^\perp \\ (M \cup N)^\perp &\subseteq N^\perp\end{aligned}$$

Die Behauptung folgt.  $\square$

## 2.8 Blatt 11

**Aufgabe 66.** Betrachten Sie die folgenden  $3 \times 3$ -Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i & 0 \\ -1+i & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie die adjungierten Abbildungen  $A^*$  und  $B^*$ .
- Bestimmen Sie die Eigenwerte von  $A$  und  $B$ .
- Überprüfen Sie, dass sich aus den Eigenvektoren der Matrix  $A$  eine Orthonormalbasis des  $\mathbb{C}^3$  mit Standardskalarprodukt bauen lässt. Führen Sie das selbe auch mit Matrix  $B$  durch.
- Bestimmen Sie unitäre Matrizen  $U, V \in M_3(\mathbb{C}^3)$ , sodass  $UAU^*$  und  $VBV^*$  diagonal sind. Können Sie zudem erreichen, dass  $U$  und  $V$  orthogonal sind?

*Beweis.* (a)

$$A^* = A, \quad B^* = \begin{pmatrix} 1-i & -1-i & 0 \\ 1+i & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

(b)  $A$ :

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2-\lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda)((2-\lambda)^2 - 1) - (1-\lambda) + (\lambda-1) \\ &= (2-\lambda)^3 - (2-\lambda) - 2 + 2\lambda \\ &= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 4\end{aligned}$$

Offensichtlich ist  $\lambda = 1$  ein Nullstelle des Polynoms. Es gilt

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 4 = (\lambda - 1)(-\lambda^2 + 5\lambda - 4)$$

$$= -(\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$$

also die Eigenwerte von  $A$  sind 1 und 4.

Ähnlich für  $B$ :

$$\begin{aligned}\det(B - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1 - i - \lambda & -1 - i & 0 \\ 1 + i & 1 - i - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - i - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 3(1 - i)\lambda^2 + 4i\lambda \\ &= -\lambda(\lambda - (1 - i))(\lambda - (2 - 2i))\end{aligned}$$

also die Eigenwerte sind 0,  $1 - i$  und  $2 - 2i$ .

(c) Wir berechnen die Eigenvektoren:

Für  $A$ :

$$\begin{aligned}\text{EW} &= 4 : (1, 1, 1)^T \\ \text{EW} &= 1 : (-1, 0, 1)^T \\ \text{EW} &= 1 : (-1, 1, 0)^T\end{aligned}$$

Die Eigenräume für die Eigenwerte 4 und 1 sind schon orthogonal. Im Eigenraum  $\text{EW}=1$  können wir den Gram-Schmidt-Algorithmus durchführen, da lineare Kombinationen von Eigenvektoren mit gleichen Eigenwerte noch Eigenvektoren sind. Eine Orthonormalbasis ist dann

$$\begin{aligned}\text{EW} &= 4 : \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T \\ \text{EW} &= 1 : \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T \text{ und} \\ &\quad \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)^T\end{aligned}$$

Die Eigenvektoren von  $B$  sind

$$\begin{aligned}\text{EW} &= 0 : (i, 1, 0)^T \\ \text{EW} &= 1 - i : (0, 0, 1)^T \\ \text{EW} &= 2 - 2i : (-i, 1, 0)^T\end{aligned}$$

Die Vektoren sind schon orthogonal, also wir normalisieren die Vektoren, um eine Orthonormalbasis zu bekommen.

$$\begin{aligned}\text{EW} &= 0 : \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1, 0)^T \\ \text{EW} &= 1 - i : (0, 0, 1)^T \\ \text{EW} &= 2 - 2i : \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1, 0)\end{aligned}$$

- (d) Wir schreiben die Orthonormalbasis von Eigenvektoren von  $A$  als die Zeilen der Matrix  $U$ .

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Ähnlich für  $V$ :

$$V = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}.$$

$U$  ist schon orthogonal.  $V$  ist unitär und kann nicht orthogonal werden.  $\square$

**Aufgabe 67.** Betrachten Sie die reelle Matrix

$$P = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass  $P$  ein Orthogonalprojektor bezüglich des Standardskalarprodukts ist.
- (b) Bestimmen Sie den Rang von  $P$ .
- (c) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis des Bildes und des Kerns von  $P$  sowie den Basiswechsel  $O$  von der Standardbasis auf diese Basis.
- (d) Verifizieren Sie, dass  $O$  orthogonal ist. Können Sie einen solchen orthonormalen Basiswechsel finden, dass  $\det O = 1$  gilt?

*Beweis.* (a) Schritt 1:  $P$  ist ein Projektor. Durch direktes Rechnen:

$$P^2 = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = P.$$

Da  $P^* = P$ , ist  $P$  ein Orthogonalprojektor nach Proposition 7.79.

- (b)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times 5} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{5}{3} & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{R_3 \times 5} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 \\ -\frac{5}{6} & \frac{5}{3} & \frac{25}{6} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_1} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Der Rang ist 2.

(c) Eine Basis des Bildes ist die erste 2 Spalten, also

$$\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Wir ergänzen es bis eine Basis für den ganzen Vektorraum:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Daraus ergibt sich eine Orthonormalbasis durch den Gram-Schmidt-Verfahren:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die ersten 2 Vektoren sind eine Orthonormalbasis des Bildes, der dritte eine Orthonormalbasis des Kerns. Der Basiswechselmatrix ist

$$O = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{15}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

(d)

$$OO^T = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{15}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} & \sqrt{\frac{2}{15}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 1, 1).$$

Er hat schon Determinante 1. Sonst könnten wir die erste zwei Spalten vertauschen.  $\square$

**Aufgabe 68.** Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Jede Matrix  $P \in M_n(\mathbb{C})$  mit  $P^2 = P$  ist ein Orthogonalprojektor bezüglich eines *geeigneten* Skalarprodukts auf  $V$ .
- (b) Eine invertierbare Matrix  $A \in M_n(\mathbb{R})$  ist orthogonal für ein geeignet gewähltes Skalarprodukt auf  $\mathbb{R}^n$ .

*Beweis.* (a) Da  $P$  ein Projektor ist, ist  $\mathbb{C}^n = \ker P \oplus \text{im } P$ . Die Frage ist: Können wir uns für ein Skalarprodukt entscheiden, so dass  $\ker P = (\text{im } P)^\perp$ ?

Wir entscheiden uns für eine Basis von  $\ker P$  bzw. von  $\operatorname{im} P$ , was wir mit  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  bezeichnen. Sei die Matrix  $A^{-1}$  so definiert: Die Spalten sind die Basisvektoren von  $\ker P$  bzw.  $\operatorname{im} P$ . Dann schickt  $A$  die Basisvektoren nach der Standardbasis. Wir definieren dann  $B = A^T A$ . Wir definieren dann ein Skalarprodukt  $\langle v_1, v_2 \rangle = (v_1)^T B v_2$ , was noch ein Skalarprodukt ist, da  $B$  positiv definit ist.

Es gilt dann, für  $b_i \neq b_j$ :

$$\begin{aligned} \langle b_i, b_j \rangle &= (b_i)^T B b_j \\ &= (b_i)^T A^T A b_j \\ &= (A b_i)^T (A b_j) \\ &= 0 \end{aligned}$$

wobei wir benutzt haben, dass die Standardbasis bzgl. des Standardskalarprodukts orthonormal ist. Daraus folgt, dass  $\ker P = (\operatorname{im} P)^\perp$  bzgl. dieses Standardskalarprodukts, also nach Proposition 7.79 ist  $P$  ein Orthogonalprojektor.

(b) Falsch. Sei  $n = 1$  und Endomorphismus  $Ax = 2x$ , dann ist

$$\langle 2x, 2x \rangle = 4 \langle x, x \rangle \neq \langle x, x \rangle$$

unabhängig vom Wahl von  $x$ .

□

**Aufgabe 69.** Seien  $V, W$  euklidische Vektorräume und  $A$  eine lineare Abbildung  $V \rightarrow W$ .

(a) Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden drei Aussagen:

- i. Für alle  $v_1, v_2 \in V$  gilt:  $\langle v_1, v_2 \rangle_V = 0 \implies \langle Av_1, Av_2 \rangle_W = 0$ .
- ii. Für alle  $v_1, v_2 \in V$  gilt:  $\|v_1\|_V = \|v_2\|_V \implies \|Av_1\|_W = \|Av_2\|_W$ .
- iii. Es existieren eine Konstante  $\alpha > 0$  und eine Isometrie  $\Phi : V \rightarrow W$  mit  $A = \alpha\Phi$ .

(b) Zeigen Sie, dass es genau dann Konstanten  $C_1, C_2 > 0$  gibt, sodass

$$C_1 \langle v_1, v_2 \rangle_V \leq \langle Av_1, Av_2 \rangle_W \leq C_2 \langle v_1, v_2 \rangle_V$$

für alle  $v_1, v_2 \in V$  gilt, wenn  $A = \alpha\Phi$  für eine Konstante  $\alpha > 0$  und eine Isometrie  $\Phi : V \rightarrow W$  erfüllt ist. Bestimmen Sie die bestmöglichen Parameter  $C_1$  und  $C_2$ .

*Beweis.* (a) (i)  $\implies$  (ii) Sei  $v_1, v_2 \in V$ , so dass  $\|v_1\| = \|v_2\|$ . Es gilt

$$\langle v_1 + v_2, v_1 - v_2 \rangle = \langle v_1, v_1 \rangle - \langle v_2, v_2 \rangle$$

=0

Voraussetzung

Aus (i) folgt dann

$$\langle A(v_1 + v_2), A(v_1 - v_2) \rangle = 0$$

und

$$\|Av_1\| = \|Av_2\|.$$

(ii)  $\implies$  (iii) Sei  $v_1, v_2 \in V$  mit  $|v_1| = |v_2|$ . Es gilt  $|Av_1| = |Av_2|$ . Wir teilen die zweite Gleichung durch die erste Gleichung und erhalten

$$\frac{|Av_1|}{|v_1|} = \frac{|Av_2|}{|v_2|} := \alpha.$$

Da dies für alle Paare  $v_1, v_2$  gilt, gilt es für alle Vektoren, also  $|Av| = \alpha|v|$  für alle  $v \in V$ . Außerdem ist.

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \frac{1}{2} (|u+v|^2 - |u|^2 - |v|^2) \\ \langle Au, Av \rangle &= \frac{1}{2} (|A(u+v)|^2 - |Au|^2 - |Av|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\alpha^2|u+v|^2 - \alpha^2|u|^2 - \alpha^2|v|^2) \\ &= \frac{\alpha^2}{2} (|u+v|^2 - |u|^2 - |v|^2) \\ &= \alpha^2 \langle u, v \rangle \\ \left\langle \frac{A}{\alpha}u, \frac{A}{\alpha}v \right\rangle &= \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

Dann ist  $A/\alpha$  ein Isometrie.

(iii)  $\implies$  (i)

Sei  $A = \alpha\Phi$ . Seien  $v_1, v_2 \in V$ , so dass  $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ . Es folgt

$$\begin{aligned} \langle Av_1, Av_2 \rangle &= \langle \alpha\Phi v_1, \alpha\Phi v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \langle \Phi v_1, \Phi v_2 \rangle \\ &= \alpha^2(0) = 0 \end{aligned}$$

(b) Es gilt

$$\begin{aligned} \langle Av_1, Av_2 \rangle &= \langle \alpha\Phi v_1, \alpha\Phi v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \langle \Phi v_1, \Phi v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \langle v_1, v_2 \rangle \end{aligned} \quad \Phi \text{ ist Isometrie}$$

also  $C_1 = C_2 = \alpha^2$ , und wir haben Gleichheit.  $\square$





## CHAPTER THREE

---

### Analysis 2

---

Ich habe die Übungen für Analysis 2 mit Lukas Then gemacht.

### 3.1 Blatt 1 (17.5/21)

**Aufgabe 70.** Berechnen Sie Ableitungen der folgenden Funktionen:

(a)  $f(x) = \frac{\arctan \sin x^2}{e^{1-x}}$  für  $x \in \mathbb{R}$

(b)  $g(x) = x^{(x^x)}$  für  $x > 0$

(a)

$$f(x) = e^{x-1} \arctan \sin x^2.$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x-1} \frac{d}{dx} \arctan \sin x^2 + (\arctan \sin x^2) \frac{d}{dx} e^{x-1} \\ &= \frac{e^{x-1}}{1 + \sin^2 x^2} \frac{d}{dx} \sin x^2 + (\arctan \sin x^2) e^{x-1} \frac{d}{dx} (x - 1) \\ &= \frac{e^{x-1}}{1 + \sin^2 x^2} (\cos x^2)(2x) + (\arctan \sin x^2) e^{x-1} \\ &= \frac{2x \cos x^2 e^{x-1}}{1 + \sin^2 x^2} + (\arctan \sin x^2) e^{x-1} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} g(x) &= x^{(x^x)} \\ \ln g(x) &= x^x \ln x \end{aligned}$$

**Lemma 3.1.**

$$\begin{aligned} h(x) &:= x^x \\ h'(x) &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

*Beweis.*

$$\ln h(x) = x \ln x.$$

$$\frac{d}{dx} \ln h(x) = \frac{d}{dx} (x \ln x)$$

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \ln x + 1$$

$$h'(x) = h(x) (1 + \ln x)$$

$$= x^x (1 + \ln x)$$

Man kann auch  
 $x^x = e^{x \ln x}$  verwenden  
 und Kettenregeln  
 benutzen.

□

Dann gilt

$$\frac{d}{dx} \ln g(x) = \frac{d}{dx} (x^x \ln x)$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{1}{x} x^x + (\ln x) \frac{d}{dx} (x^x)$$

$$= \frac{x^x}{x} + (\ln x) x^x (1 + \ln x)$$

$$g'(x) = g(x) x^x \left[ \frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right]$$

$$= x^{x^x+x} \left[ \frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right]$$

$$= x^{x^x+x-1} [1 + x \ln x + x \ln^2 x]$$

**Aufgabe 71.** Untersuchen Sie, für welche Argumente des Definitionsbereiches die folgenden Funktionen differenzierbar sind:

(a)  $f(x) = |x|, x \in \mathbb{R}$

(b)  $g(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

(c)  $h(z) = \bar{z}, z \in \mathbb{C}$

- (a) Für  $x_0 \neq 0$  gibt es eine Umgebung auf  $x_0$ , worin  $|x| = x$  oder  $|x| = -x$ . Dann ist die Ableitung von  $|x|$  gleich mit die Ableitung von entweder  $x$  oder  $-x$ , also  $f'(x_0)$  existiert für  $x_0 \neq 0$ .

Für  $x_0 = 0$  gilt  $|0| = 0$ , und auch

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

Weil die beide ungleich sind, existiert die Grenzwert und daher auch die Ableitung nicht.

- (b) Sei  $x_0 \neq 0$  und  $y_0 = x_0^2$ . Dann für  $0 < \epsilon < y_0$  existiert keine  $\delta > 0$ , sodass  $|x - x_0| < \delta \implies |g(x) - g(x_0)| < \epsilon$ .

Beweis: Es gibt zwei Fälle:

- (i)  $x_0 \in \mathbb{Q}$ . Dann in jeder offenen Ball  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  gibt es ein Zahl  $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , also  $|g(x) - g(x_0)| = g(x_0) = y_0 > \epsilon$
- (ii) Sei  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . Dann in jeder offenen Ball  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  gibt es ein Zahl  $x \in \mathbb{Q}$ , also  $|g(x) - g(x_0)| = g(x) > y_0 > \epsilon$

Sei  $x_0 = 0$ . Dann gilt  $g(x_0) = 0$ , und auch:

- (i)  $x \in \mathbb{Q}$ , also

$$\begin{aligned} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

- (ii) oder  $x \notin \mathbb{Q}$ , also

$$g(x) - g(0) = 0 - 0 = 0 \implies \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = 0.$$

Deshalb ist

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = 0.$$

- (c) Zu berechnen:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{z - z_0}}{z - z_0}.$$

Sei  $z = z_0 + x, x \in \mathbb{R}$ . Dann, falls die Grenzwert existiert, ist es gleich

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{z - z_0}}{z - z_0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overline{z_0 + x - z_0}}{z_0 + x - z_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\bar{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Sei jetzt  $z = z_0 + ix, x \in \mathbb{R}$ . Falls die Grenzwert existiert ist es gleich

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{z - z_0}}{z - z_0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overline{z_0 + ix - z_0}}{z_0 + ix - z_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overline{ix}}{ix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-ix}{ix} \\
&= -1
\end{aligned}$$

Weil das Grenzwert, wenn durch zwei Richtungen berechnet wurde, ungleich ist, existiert das Grenzwert nicht (für alle  $z \in \mathbb{C}$ )

**Aufgabe 72.** Man zeige, dass die Gleichung

$$x = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

auf  $[0, 1]$  genau eine Lösung besitzt.

Sei  $f(x) = x - \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ . Dann ist die Gleichung gleich  $f(x) = 0$ .  $f(x)$  ist auf  $[0, 1]$  stetig, und auf  $(0, 1)$  differenzierbar.

$$\begin{aligned}
f(0) &= 0 - 1 = -1 \\
f(1) &= 1 - 0 = 1
\end{aligned}$$

Wegen des Zwischenwertsatzes gibt es mindestens eine Lösung zu der Gleichung  $f(x) = 0$ . Dann

$$f'(x) = 1 + \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) > 0 \text{ für } x \in [0, 1].$$

$f$  ist dann monoton wachsend, und es gibt maximal eine Lösung zu  $f(x) = 0$ .

Deswegen besitzt die Gleichung genau eine Lösung.

**Aufgabe 73.** Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

(a)  $\lim_{k \rightarrow \infty} k \ln \frac{k-1}{k}$

(b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\ln x}}{e^x}$

(a)

$$k \ln \frac{k-1}{k} = \frac{\ln(k-1) - \ln k}{1/k}.$$

Weil  $\ln x$  und  $1/x$  auf  $x \in (0, \infty)$  differenzierbar sind, kann man den Satz von L'Hopital verwenden:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dk} [\ln(k-1) - \ln k] &= \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k-1)} \\
\frac{d}{dk} \frac{1}{k} &= -\frac{1}{k^2}
\end{aligned}$$

Dann gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k(k-1)}}{-\frac{1}{k^2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left( -\frac{k}{k-1} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{k \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{1 - \frac{1}{k}} \right) \\
&= -1
\end{aligned}$$

Weil das Grenzwert auf  $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  existiert, ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \ln \left( \frac{k-1}{k} \right) = -1.$$

(b)

$$\frac{x^{\ln x}}{e^x} = \frac{(e^{\ln x})^{\ln x}}{e^x} = \frac{e^{\ln^2 x}}{e^x} = e^{\ln^2 x - x} = e^{x \left( \frac{\ln^2 x}{x} - 1 \right)}.$$

**Lemma 3.2.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^p x}{x^q} = 0, \quad p, q > 0.$$

*Beweis.*

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^p x}{x^q} &= \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{p/q}} \right)^q \\
&= \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x(x^{p/q})} \right)^q && \text{L'Hopital} \\
&= 0^q = 0
\end{aligned}$$

□

**Korollar 3.3.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x \left( \frac{\ln^2 x}{x} - 1 \right) \right] = -\infty.$$

Deswegen ist

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\ln x}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \left( \frac{\ln^2 x}{x} - 1 \right)} = 0.$$

**Aufgabe 74.** Überprüfen Sie die Funktion  $f : [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & -1 \leq x < 1 \\ \frac{8}{\pi} \arctan \frac{1}{x} & x \geq 1 \end{cases}$$

auf lokale und globale Extrema.

Es gilt

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & -1 < x < 1 \\ \frac{8}{\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \left( -\frac{1}{x^2} \right) & x > 1 \end{cases}.$$

Es ist klar, dass  $x = 0$  eine Lösung zu  $f'(x) = 0$  ist. Weil  $f''(0) = 2 > 0$ , ist es ein lokales Minimum. Es gibt auch  $a, b \in \mathbb{R}, a < 1 < b$ , wofür gilt

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0 & x &\in (a, 1) \\ f'(x) &< 0 & x &\in (1, b) \end{aligned}$$

Falls  $f(1) \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ , ist  $f(1)$  ein lokales Maximum (sogar wenn  $f$  nicht auf 1 stetig ist). Weil

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2$$

und

$$f(1) = \frac{8}{\pi} \arctan 1 = \frac{8}{\pi} \frac{\pi}{4} = 2$$

ist  $f(1)$  ein lokales Maximum. Weil  $f(x) < 2$  für  $x > 1$  kann kein Punkt  $x > 1$  ein globales Maximum sein. Es gilt auch, dass

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2.$$

Außer  $x \in \{-1, 0, 1\}$  gibt es keine Möglichkeiten für ein globales Maximum. Daher sind die globale Maxima auf  $x \in \{-1, 1\}$

Für  $x \in [1, 1)$  gilt  $f(x) \geq 1$ . Dennoch ist

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{\pi} \arctan \left( \frac{1}{x} \right) = 0.$$

Deswegen gibt es *keine* globales Maximum auf  $\mathbb{R}$ . Wenn man  $f(\infty)$  definiert durch  $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ , ist  $f(\infty)$  das globale Maximum.

Tipfehler - Maximum sollte Minimum sein.

## 3.2 Blatt 2

**Aufgabe 75.** Es seien  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbare Funktionen für  $n \in \mathbb{N} \setminus 0$  und  $D \subset \mathbb{R}$  offen. Zeigen Sie, dass  $f \cdot g$  ebenfalls  $n$ -mal differenzierbar ist und weiterhin

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

für jedes  $x \in D$  gilt.

*Beweis.* Wir zeigen es per Induktion, für  $n = 1$  ist es das Produktregel. Nehme jetzt an, dass  $f, g$   $(n + 1)$ -mal differenzierbar Funktionen sind und

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

gilt (weil alle  $(n + 1)$ -mal differenzierbar Funktionen sind auch  $n$ -mal differenzierbar). Dann ist  $(f \cdot g)^{(n)}(x)$  differenzierbar, weil die rechte Seite

eine Linearkombination von Produkte aus (zumindest) einmal differenzierbar Funktionen. Es gilt auch,

$$\begin{aligned}
 (f \cdot g)^{(n)}(x) &= \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)}(x) g^{(n-k)}(x) + f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x)) \quad n = 1 \text{ Fall} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)}(x) g^{(n-k)}(x) + \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}(x)
 \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 76.** i) Betrachten Sie die Funktionenfolge  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 x^2 + 1}.$$

Beweisen Sie, dass  $(f_n), n \in \mathbb{N}$  gegen eine zu bestimmende Grenzfunktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gleichmäßig konvergiert, diese jedoch nicht differenzierbar auf  $\mathbb{R}$  ist. Warum ist das kein Widerspruch zu Proposition 5.5.2?

ii) Untersuchen Sie

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}, x \in \mathbb{R}.$$

auf Differenzierbarkeit.

*Beweis.* i)

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}.$$

Es ist klar, dass  $f_n(x)$  konvergiert gegen  $\sqrt{x^2} = |x|$ . Sei dann  $r(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x|$ . Für  $x > 0$  gilt

$$\begin{aligned}
 r(x) &= \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - x \\
 r'(x) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}} - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{x}{\sqrt{x^2}} - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Deswegen ist  $r(x)$  monoton fallend auf  $(0, \infty)$ . Ähnlich beweist man, dass  $r(x)$  monoton wachsend auf  $(-\infty, 0)$  ist. Deswegen ist  $x = 0$  ein globales Maximum, und  $r(x) \leq r(0) = \frac{1}{n}$ . Daher konvergiert  $(f_n)$  gleichmäßig.

Man berechnet:

$$f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}}.$$

Die Folge der Ableitungen konvergiert gegen  $\frac{x}{\sqrt{x^2}} = \operatorname{sgn}(x)$ , falls  $x \neq 0$ , und 0, falls  $x = 0$ . Es konvergiert aber nicht lokal gleichmäßig in eine Umgebung  $U$  auf 0.

Sei  $1 > \epsilon > 0$  gegeben, und nehme an, dass existiere  $N \in \mathbb{N}$ , für die gilt,

$$|f'_n(x) - g(x)| \leq \epsilon \quad n > N, x \in U,$$

wobei

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}.$$

Nehme eine solche Abbildung  $f'_n(x)$ . Weil  $f'_n$  stetig ist, und  $f'_n(0) = 0$ , gibt es eine Umgebung  $0 \in V$ , in der gilt, dass  $|f'_n(x) - f'_n(0)| = f'_n(x) \leq 1 - \epsilon, x \in V$ . Sei dann  $0 \neq x \in V$ , und  $|1 - f'_n(x)| > \epsilon$ , also die Folge  $f'_n$  konvergiert nicht lokal gleichmäßig.

Man kann auch beachten, dass  $f'_n(x)$  stetig für alle  $n \in \mathbb{N}$  und  $x \in \mathbb{R}$  ist. Wenn die Folge lokal gleichmäßig in eine Umgebung auf 0 konvergiert, wäre das Grenzwert auch stetig. Weil das Grenzwert nicht stetig ist, kann die Folge nicht lokal gleichmäßig konvergieren.

Deswegen ist es kein Widerspruch zu den Korollar, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

- ii) Es gilt  $\left| \frac{\cos(nx)}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$ . Daher konvergiert die Reihe gleichmäßig (Weierstraßsches Majorantenkriterium).

Jetzt ist  $\frac{d}{dx} \frac{\cos(nx)}{n^3} = -\frac{\sin(nx)}{n^2}$ . Weil  $\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ , konvergiert

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right|$  gleichmäßig. Deswegen ist  $f$  differenzierbar, mit Ableitung

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ -\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]. \quad \square$$



**Aufgabe 77.** Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \max \{x, 0\}$$

gleichmäßig durch Polynome approximiert werden kann.

*Beweis.* Wir wissen schon, dass es  $q_n(x)$  existiert,  $q_n(x)$  Polynome, und  $q_n(x) \rightarrow |x|$  gleichmäßig. Es gilt auch

$$f(x) = \frac{|x|}{2} + \frac{x}{2}.$$

Daher konvergiert gleichmäßig

$$\frac{q_n(x)}{2} + \frac{x}{2} \rightarrow f(x). \quad \square$$

**Aufgabe 78.** i) Es seien  $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$  und  $g : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbare Funktionen mit  $n \in \mathbb{N}_0$ . Zeigen Sie, dass auch  $g \circ f$   $n$ -mal differenzierbar ist.

ii) Zeigen Sie, dass  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

eine unendlich oft differenzierbare Funktion definiert ist. Bestimmen Sie zudem  $f^{(n)}(0)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$

*Beweis.* i)

**Satz 3.4.** Die Ableitung von ein Produkt  $f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)$  ist

$$\sum_{i=1}^n f_1(x)f_2(x)\dots \frac{df_i(x)}{dx} \dots f_n(x).$$

*Beweis.* Wir beweisen es per Induktion. Für  $n = 2$  ist es das Produktregel. Jetzt nehme an, dass es für eine  $n \in \mathbb{N}$  richtig ist, und

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (f_1(x)f_2(x)\dots f_{n+1}(x)) &= \frac{d}{dx} (f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)) f_{n+1}(x) \\ &\quad + (f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)) \frac{df_{n+1}}{dx} \\ &= \left( \sum_{i=1}^n f_1(x)f_2(x)\dots \frac{df_i(x)}{dx} \dots f_n(x) \right) \\ &\quad + (f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)) f'_n(x) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} f_1(x)f_2(x)\dots \frac{df_i(x)}{dx} \dots f_{n+1}(x) \end{aligned}$$

$\square$

**Korollar 3.5.** *Alle Monome von differenzierbare Funktionen sind differenzierbar, und die Ableitung ist noch eine lineare Kombination von Monome.*

**Korollar 3.6.** *Sei  $f$   $k$ -mal differenzierbar. Dann alle Monome von*

$$f'(x), f''(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$$

*sind differenzierbar.*

**Satz 3.7.**  $\frac{d^k}{dx^k}(f \circ g)$  *ist ein Monom von Ableitungen von  $f$  und  $g$  (höchstens die  $k$ -ste Ableitung), sofern  $f$  und  $g$ ,  $n$ -mal differenzierbar sind.*

*Beweis.* Für  $k = 1$  gilt

$$\frac{d}{dx}(f \circ g)(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Nehme an, dass es für ein  $k \in \mathbb{N}, k < n$  gilt. Dann per Korollar 3.5 gilt es auch für  $k + 1$ . Per Induktion ist die Verkettung dann  $n$ -mal differenzierbar,  $\square$

ii)

**Lemma 3.8.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^p}{x^k} = 0, k > 0.$$

*Beweis.* Wir beweisen es per Induktion auf  $p$ . Für  $p = 1$  verwenden wir den Satz von L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{kx^{k-1}(k)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{kx^k} = 0. \quad \square$$

Jetzt nehme an, dass es für  $p$  gilt. Wir zeigen, dass es für  $p \rightarrow p + 1$  auch gilt.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^{p+1}}{x^k} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(p+1)(\ln x)^p}{kx^{k-1}(x)} = \frac{p+1}{k} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^p}{x^k} = 0.$$

**Lemma 3.9.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^p e^{-kx} = 0, k > 0.$$

*Beweis.* Nimm  $x = e^\xi$ . Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{-k} (\ln x)^p = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-k\xi} \xi^p = 0. \quad \square$$

Die Ableitungen  $f^{(n)}(x), x \neq 0$  haben den Form  $p_n\left(\frac{1}{x}\right) \exp\left(\frac{1}{x^2}\right)$ , wobei  $p_n(x)$  eine Polynome ist.

**Proposition 1.**  $f^{(n)}(0) = 0$

*Beweis.* Wir beweisen es per Induktion.  $f^{(0)}(0) = 0$  per Definition.

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (f^{(n-1)}(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} p_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x p_n(x) e^{-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Deswegen ist  $f$  überall (inkl. 0) differenzierbar, mit alle Ableitungen  $f^{(n)}(0) = 0$  □

□

**Aufgabe 79.** Es seien  $K_1, K_2 \subset \mathbb{K}$  nichtleere, kompakte Mengen und die Folgen stetiger Funktionen  $f_n : K_1 \rightarrow K_2$  sowie  $g_n : K_2 \rightarrow K$  seien gleichmäßig konvergent gegen  $f : K_1 \rightarrow K_2$  bzw.  $g : K_2 \rightarrow K$ . Beweisen Sie, dass auch

$$g_n \circ f_n \rightarrow g \circ f$$

gleichmäßig auf  $K_1$  gilt.

*Beweis.* Sei  $\epsilon > 0$  gegeben. Dann per Definition existiert  $n_2 \in \mathbb{N}$ , sodass

$$|g_n(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}, x \in K_2, n \geq n_2 \quad (3.1)$$

Weil  $g$  stetig und auf eine kompakte Menge definiert ist, ist  $g$  gleichmäßig stetig, und es existiert  $\delta > 0$ , für die gilt

$$|g(a) - g(b)| < \frac{\epsilon}{2}, \quad |a - b| < \delta \quad (3.2)$$

Es gibt auch  $n_1 \in \mathbb{N}$ ,  $|f_n(x) - f(x)| < \delta, x \in K_1, n \geq n_1$ . Für  $n > n_1$  gilt daher auch

$$|g(f_n(x)) - g(f(x))| < \frac{\epsilon}{2}, n > n_1, x \in K_1 \quad (3.3)$$

Sei  $N = \max(n_1, n_2)$ . Für  $n \geq N$  gilt Eq. (3.1) und Eq. (3.3) auch, weil  $N \geq n_1$  und  $N \geq n_2$ . Dann für  $n \geq N$  gilt.

$$\begin{aligned} |g(f(x)) - g_n(f_n(x))| &= |g(f(x)) - g(f_n(x)) + g(f_n(x)) - g_n(f_n(x))| \\ &\leq \underbrace{|g(f(x)) - g(f_n(x))|}_{< \epsilon/2 \text{ (3.3)}} + \underbrace{|g(f_n(x)) - g_n(f_n(x))|}_{< \epsilon/2 \text{ (3.1)}} \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

Also  $g_n \circ f_n \rightarrow g \circ f$  gleichmäßig. □

### 3.3 Blatt 3

**Aufgabe 80.** (a) Benutzen Sie Proposition 5.6.9, um zu zeigen, dass

$$g(x) = \sin(x) \cosh(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

durch die zugehörige Taylorreihe im Punkt  $x_0 = 0$  mit Konvergenzradius  $R = +\infty$  dargestellt wird.

(b) Zeigen Sie, dass  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

*nicht* durch ihre Taylorreihe um  $x = 0$  dargestellt wird. Warum ist dies kein Widerspruch zu Proposition 5.6.9?

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned} g(x) &= \sin(x) \cosh(x) \\ &= \left( \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4i} (e^{(i+1)x} + e^{(i-1)x} - e^{(1-i)x} - e^{-(i+1)x}) \\ &= \frac{i}{4} [e^{-(i+1)x} + e^{(1-i)x} - e^{(i+1)x} - e^{(i-1)x}] \\ g^{(n)}(x) &= \frac{i}{4} [(-(i+1))^n e^{-(i+1)x} + (1-i)^n e^{(1-i)x} \\ &\quad - (1+i)^n e^{(i+1)x} - (i-1)^n e^{(i-1)x}] \\ |g^{(n)}(x)| &\leq \frac{1}{4} (\sqrt{2})^n [|e^{-(i+1)x}| + |e^{(1-i)x}| + |e^{(i+1)x}| + |e^{(i-1)x}|] \end{aligned}$$

Die Bedingungen sind jetzt erfüllt: Sei  $B_r(0)^{cl}$  ein abgeschlossenes Ball für beliebige  $r > 0$ . Sei außerdem

$$c = \sup_{x \in B_r(0)^{cl}} \frac{1}{4} [|e^{-(i+1)x}| + |e^{(1-i)x}| + |e^{(i+1)x}| + |e^{(i-1)x}|]$$

$$\alpha = \sqrt{2}$$

Es gilt  $c \neq \infty$ , weil die Abbildung in den Klammern stetig ist, und ist daher auf eine eingeschränkte Menge auch eingeschränkt. Es folgt:

$$\|g^{(n)}\|_{B_r(0)^{cl}} \leq c\alpha^n \quad (5.6.23)$$


Also die formale Taylorreihe hat einen Konvergenzradius  $R > r$  und konvergiert gegen auf  $B_r(0)^{cl}$  gegen  $g$ . Weil das für alle  $r > 0$  gilt, konvergiert die Taylorreihe gegen  $f$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , und die Konvergenzradius  $R = +\infty$ .

- (b) Es ist klar, dass es nicht durch ihre Taylorreihe dargestellt wird. Die Taylorreihe ist  $0 + 0x + 0x^2 + \dots = 0$ , aber  $f(x) \neq 0$  für  $x \neq 0$ .

Wir berechnen jetzt  $f^{(n)}(a)$ . Es gilt

$$\begin{aligned} f(a) &= \exp(-1/a^2) \\ f'(x) &= \frac{2}{x^2} \exp(-1/x^2) \\ f''(x) &= \left[ \frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right] \exp(-1/x^2) \\ f'''(x) &= \left[ \frac{8}{x^9} - \frac{36}{x^7} + \frac{24}{x^5} \right] \exp(-1/x^2) \quad \square \end{aligned}$$

Aber das Supremum ist nicht nur durch die Koeffizienten beeinflusst, sondern auch das Maximumpunkt...



Also



**Aufgabe 81.** Es sei  $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ . Geben Sie das Taylorpolynom  $P_2$  von  $f$  mit Entwicklungspunkt  $x_0 = 1$  an und schätzen Sie den maximalen Fehler von  $|f(x) - P_2(x)|$  auf dem Intervall  $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$  ab.

*Beweis.* Es gilt  $f(x) = x^{1/3}$ , und daher

$$f^{(n)}(x) = \left[ \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right] x^{\frac{1}{3}-n},$$

also

$$f^{(n)}(1) = \prod_{i=1}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right).$$

Es gilt daher

$$P_2(x) = 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{9}(x-1)^2.$$

Wir wissen schon

$$|R_{n,x_0}(f)(h)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!} \quad (5.6.20)$$

Hier ist  $n = 2$ , und  $|h| \leq \frac{1}{2}$ .

#### Vereinfachung

(Nur in diesem Problem, falsch im Allgemeinen) Der maximale Fehler ist gleich  $\sup_{t \in [-1,1]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!}$ , wobei  $h = \frac{1}{2}$ ,  $n = 2$ , und  $x_0 = 1$ .

*Beweis.* Wir betrachten zuerst  $R_{n,x_0}(f)(\xi)$  für  $0 \leq \xi \leq h$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \sup_{\xi \in [0,h]} R_{n,x_0}(f)(\xi) &\leq \sup_{\xi \in [0,h]} \left[ \sup_{t \in [0,1]} |f^{(n)}(x_0 + t\xi) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|\xi|^n}{(n-1)!} \right] \\ &= \sup_{\xi \in [0,h]} \left[ \sup_{t \in [0,1]} |f^{(n)}(x_0 + t\xi) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!} \right] \\ &= \sup_{t \in [0,1]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

Ähnlich gilt auch

$$\sup_{\xi \in [-h,0]} R_{n,x_0}(f)(\xi) = \sup_{t \in [-1,0]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!}.$$

Weil wir den maximalen Fehler auf dem ganzen Intervall schätzen möchten, ist die gewünschte Antwort daher

$$\sup_{\xi \in [-h,h]} R_{n,x_0}(f)(\xi) = \sup_{t \in [-1,1]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \frac{|h|^n}{(n-1)!}. \quad \square$$

Wir betrachten deswegen

$$\begin{aligned} &\sup_{t \in [-1,1]} |f^{(n)}(x_0 + th) - f^{(n)}(x_0)| \\ &= \sup_{t \in [-1,1]} \left| \left[ \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right] (x_0 + th)^{\frac{1}{3}-n} - \left[ \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right] \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right| \sup_{t \in [-1, 1]} \left| \left( 1 + \frac{t}{2} \right)^{-5/3} - 1 \right| \\
&= \left| \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right| \left| \left( 1 - \frac{1}{2} \right)^{-5/3} - 1 \right| \\
&= \left| \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right| (2^{5/3} - 1)
\end{aligned}$$

Also der maximale Fehler ist

$$\underbrace{\frac{1}{4}}_{|0.5|^2} \left| \prod_{i=0}^{n-1} \left( \frac{1}{3} - i \right) \right| (2^{5/3} - 1) = \frac{1}{18} (2^{5/3} - 1). \quad \square$$

**Aufgabe 82.** Bestimmen Sie die Taylorpolynome vom Grad 30 der folgenden Funktionen in  $x_0$ .

- (a)  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$  im Punkt  $x_0 = 2$ .
- (b)  $g(x) = \sin^2(\pi x)$  in  $x_0 = 3$ .
- (c)  $h(x) = \sin^{-1}(x)$  in  $x_0 = 0$ .

*Beweis.* (a)

$$\begin{aligned}
f(2) &= 2^3 - 3(2)^2 + 3(2) + 2 = 4 \\
f'(x) &= 3x^2 - 6x + 3 \\
f'(2) &= 3 \\
f''(x) &= 6x - 6 \\
f''(2) &= 6 \\
f'''(x) &= 6 = f(2) \\
f''''(x) &= 0
\end{aligned}$$

Das Taylorpolynom ist dann

$$4 + 3(x - 2) + 3(x - 2)^2 + (x - 2)^3.$$

(b)

$$\begin{aligned}
g(x) &= \sin^2(\pi x) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2\pi x)) \\
g(3) &= 0 \\
g'(x) &= \pi \sin(2\pi x) \\
g^{(n)}(x) &= (-1)^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(2\pi)^n}{2} \begin{cases} \sin(2\pi x) & n \text{ ungerade} \\ \cos(2\pi x) & n \text{ gerade} \end{cases} \quad n \geq 1
\end{aligned}$$

$$g^{(n)}(3) = (-1)^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(2\pi)^n}{2} \begin{cases} 0 & n \text{ ungerade} \\ 1 & n \text{ gerade} \end{cases} \quad n \geq 1$$

Das Taylorpolynom vom Grad 30 ist

$$\sum_{n=1}^{15} \left[ (-1)^{\lfloor (2n-1)/2 \rfloor} \frac{(2\pi)^{2n}}{2(2n)!} (x-3)^{2n} \right].$$

(c)

$$h(x) = \sin^{-1} x$$

$$h(0) = 0$$

$$h'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}$$

$$h'(0) = 1$$

Sei  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ . Wir wissen, dass die Taylorreihe von  $(1+x)^\alpha$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (5.6.41)$$

ist, wobei  $\binom{\alpha}{n} = \frac{1}{n!} [\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)]$ . Die Taylorreihe von  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  folgt:

$$\begin{aligned} T_0\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-x^2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-1)^n (x^{2n}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_n \quad b_n = 0, n \text{ ungerade} \end{aligned}$$

Es gilt daher, für die Koeffizienten der Taylorreihe von  $\sin^{-1}(x)$

$$T_0(\sin^{-1}(x))(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

dass  $a_n = b_{n-1}/n$ , für  $n \geq 1$ . Es ist dann

$$T_0(\sin^{-1}(x))(x) = \sum_{n=0}^{14} \frac{1}{2n+1} \binom{-1/2}{n} (-1)^n (x^{2n+1}). \quad \square$$

**Aufgabe 83.** Bestimmen Sie die Ober- und Untersummen von  $\exp : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  für die markierten Zerlegungen  $(J_n, \Xi_n)$  mit der Auswahl  $\Xi_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Zeigen Sie anschließend, dass die zugehörigen Ober- und Untersummen gegen denselben Wert konvergieren.

*Beweis.*



Wir werden später die folgende Lemma brauchen:

**Lemma 3.10.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n (1 - e^{-1/n}) = 1.$$

*Beweis.*

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n (1 - e^{-1/n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-1/n}}{1/n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{-x}}{x} && x = 1/n \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x}}{1} && \text{L'Hopital} \\ &= 1 && \square \end{aligned}$$

(a)

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_{\Xi_n}(f) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{1}{n} \exp \left( \frac{k+1}{n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \exp \left( \frac{k+1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{n} \frac{(e-1)e^{1/n}}{e^{1/n} - 1} \\ &= \frac{1}{n} \frac{e-1}{1 - e^{-1/n}} \end{aligned}$$

Es folgt daraus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathfrak{D}_{\Xi_n}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n(1 - e^{-1/n})} = e-1.$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathfrak{U}_{\Xi_n}(f) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{1}{n} \exp \left( \frac{k}{n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \exp \left( \frac{k}{n} \right) \\ &= \frac{1}{n} \frac{e-1}{e^{1/n} - 1} \\ &= \frac{1}{n} \frac{e-1}{e^{1/n} (1 - e^{-1/n})} \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathfrak{U}_{\Xi_n}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n(e^{1/n} (1 - e^{-1/n}))} = e-1. \quad \square$$

### 3.4 Blatt 4

**Aufgabe 84.** In dieser Aufgabe beweisen wir, dass die Verknüpfung zweier Riemann-integrierbarer Funktionen i.A. nicht Riemann-integrierbar ist. Dazu gehen wir wie folgt vor:

- (a) Es sei  $q : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$  eine Abzählung von  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ , d.h. eine bijektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  nach  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ . Weiterhin sei

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{n} & x = q_n. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass  $f$  Riemann-integrierbar ist.

- (b) Weiterhin sei

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1] \setminus \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \\ 1 & x = \frac{1}{n} \text{ für ein } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass  $g$  Riemann-integrierbar ist, die Verknüpfung  $g \circ f$  mit der Funktion  $f$  jedoch nicht.

*Beweis.* (a) Wir betrachten eine uniforme Zerlegung

$$\mathcal{J}_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1 \right\},$$

und die Intervalle

$$I_n(k) = \left[ \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right].$$

Es gilt  $\inf_{x \in I_n(k)} f(x) = 0$ . Wir müssen daher nur beweisen

**Ziel**

Für jedes  $\epsilon > 0$  gibt es eine Zerlegung  $\mathcal{J}_n$ , sodass

$$\mathcal{O}_{\mathcal{J}(n)} < \epsilon.$$

Die wichtigste Bemerkung ist: jedes  $q_x$  kommt maximal zweimal vor (das passiert im Fall wenn  $q_x = k/n$  für eine  $k \in \{0, \dots, n\}$ ). Es folgt dann für  $n = 2p$  gerade,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\mathcal{J}(n)} &\leq \sum_{j=1}^p \frac{1}{2p} \frac{2}{j} \\ \int_0^1 f(x) \, dx &\leq \lim_{p \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^p \frac{1}{2p} \frac{2}{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &< \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} (1 + \ln p) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Also  $f$  ist integrierbar mit  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ .

(b) Sei  $\epsilon > 0$  beliebig. Wir definieren für jedes  $n \in \mathbb{N}$  so eine Zerlegung:

Sei  $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}$ . Außer  $[x_0, x_1]$  gibt es dann nur endlich viele  $x = \frac{1}{n}$  (eigentlich gibt es genau  $n - 1$ ). Sei dann

$$\mathcal{J}_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \frac{1}{n-1} - \frac{\epsilon}{2^{n-1}}, \frac{1}{n-1} + \frac{\epsilon}{2^{n-1}}, \frac{1}{n-2} - \frac{\epsilon}{2^{n-1}}, \right. \\ \left. \frac{1}{n-2} + \frac{\epsilon}{2^{n-2}}, \frac{1}{n-3} - \frac{\epsilon}{2^{n-3}}, \dots, 1 - \frac{\epsilon}{2}, 1 \right\}$$

**Bemerkung:** In der Intervall  $\left[ \frac{1}{n-p} + \frac{\epsilon}{2^{n-p}}, \frac{1}{n-p-1} - \frac{\epsilon}{2^{n-p-1}} \right]$  gibt es keine Zahlen mit dem Form  $1/n, n \in \mathbb{Z}$ , also  $\sup f = 0$  auf solchen Intervalle. Es gilt dann

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\mathcal{J}_n} &= \frac{2}{n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\epsilon}{2^j} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{O}_{\mathcal{J}_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{2}{n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\epsilon}{2^j} \right] \\ &= \epsilon \end{aligned}$$

Weil  $\epsilon$  beliebig war, ist dann

$$\int_0^1 g(x) dx = 0,$$

also  $g$  ist integrierbar mit

$$\int_0^1 g(x) dx = 0.$$

(c) Es gilt

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Sei  $h := g \circ f$ .  $h$  ist nicht auf  $[0, 1]$  integrierbar. Sei  $\mathcal{J} = \{0 = t_0, t_1, \dots, t_N = 1\}$ . Es gibt, für alle Intervalle  $[a, b] \subseteq [0, 1]$ , zwei Punkte

$$\begin{array}{ll} \mathbb{Q} \ni x_0 \in [a, b] & \text{dichtheit von } \mathbb{Q} \\ \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \ni x_1 \in [a, b] & \mathbb{Q} \text{ ist nur abzählbar} \end{array}$$

Also gilt

$$\sup (h|_{[a,b]}) = 1 \quad (3.4)$$

$$\inf (h|_{[a,b]}) = 0 \quad (3.5)$$

Daraus folgt, für jede Zerlegung  $\mathcal{J}$  von  $[0, 1]$ , dass

$$\mathcal{O}_{\mathcal{J}}(f) = 1$$

$$\mathcal{U}_{\mathcal{J}}(f) = 0$$

also  $h$  ist nicht auf  $[0, 1]$  integrierbar.  $\square$

**Aufgabe 85.** Es sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar auf dem echten Intervall  $[a, b]$  mit

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

Zeigen Sie, dass es ein echtes Intervall  $J \subset [a, b]$  gibt, auf dem  $f$  strikt positiv ist, d.h. mit  $f(x) > 0$  für alle  $x \in J$ .

Hinweis: Eine Möglichkeit ist, die Charakterisierung der Darboux-Integrierbarkeit zu benutzen und Untersummen zu betrachten.

*Beweis.* Wir beweisen es per Widerspruch. Nehme an, dass in jedem Intervall es mindestens ein Punkt  $x_0$  gibt, für die  $f(x_0) \leq 0$ . Insbesondere gilt das für alle abgeschlossen Intervalle  $[c, d] \subseteq [a, b]$ .

Sei jetzt  $\mathcal{J}$  eine beliebige Zerlegung von  $[a, b]$ ,  $\mathcal{J} = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$ , mit die übliche Voraussetzung  $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_N$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\mathcal{J}} &= \sum_{i=1}^N \inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]}) (t_i - t_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^N (0)(t_i - t_{i-1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Weil  $\mathcal{J}$  beliebig war, gilt das für alle Zerlegungen, und

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0,$$

also

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0,$$

ein Widerspruch.  $\square$

**Aufgabe 86.** Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) Ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion und  $|f|$  integrierbar auf  $[a, b]$ , so ist es auch  $f$ .
- (b) Ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrierbar und  $f(x) \geq \delta$  für alle  $x \in [a, b]$  und ein  $\delta > 0$ , so ist auch  $\frac{1}{f}$  über  $[a, b]$  integrierbar.
- (c) Sind  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrierbar, so gilt

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b g(x) \, dx.$$

*Beweis.* (a) Falsch. Sei  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Dann ist  $|f| = 1$  integrierbar (Proposition 6.1.6). Wir müssen jetzt nur beweisen, dass  $f$  nicht integrierbar ist. Der Beweis ist gleich zu der Beweis in der vorherigen Aufgabe. Wir müssen nur statt (3.5) schreiben

$$\inf (h|_{[a,b]}) = -1$$

- (b) Wahr.

#### Bemerkung

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \geq \delta$  für ein  $\delta > 0$ . Es gilt dann

$$\begin{aligned} \frac{1}{\inf(f)} &= \sup \left( \frac{1}{f} \right) \\ \frac{1}{\sup(f)} &= \inf \left( \frac{1}{f} \right) \end{aligned}$$

wegen der Monotonie von  $x \rightarrow 1/x$ .

Wir haben auch

#### Korollar

**(Korollar aus Proposition 6.2.3(vi))**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist genau dann integrierbar, wenn es zu jedem  $\epsilon > 0$  eine Zerlegung  $\mathcal{J} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_N\}$  von  $I$  gibt, sodass

$$\sum_{i=1}^N [\sup (f|_{[a,b]}) - \inf (f|_{[a,b]})] (t_i - t_{i-1}) < \epsilon.$$

Wir arbeiten mit dem Korollar. Sei  $\mathcal{J} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_N\}$  eine Zerlegung von  $[a, b]$ . Es gilt

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^N \left[ \sup \left( \frac{1}{f} \Big|_{[t_{i-1}, t_i]} \right) - \inf \left( \frac{1}{f} \Big|_{[t_{i-1}, t_i]} \right) \right] (t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^N \left[ \frac{1}{\inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]})} - \frac{1}{\sup (f|_{[t_{i-1}, t_i]})} \right] (t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^N \left[ \frac{\sup (f|_{[t_{i-1}, t_i]}) - \inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]})}{\sup (f|_{[t_{i-1}, t_i]}) \inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]})} \right] (t_i - t_{i-1}) \\ &\leq \frac{1}{\delta^2} \sum_{i=1}^N [\sup (f|_{[t_{i-1}, t_i]}) - \inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]})] (t_i - t_{i-1}) \end{aligned}$$

Per Hypothese gibt es eine Zerlegung  $\mathcal{J}$  von  $[a, b]$ , für die gilt

$$\sum_{i=1}^N [\sup (f|_{[t_{i-1}, t_i]}) - \inf (f|_{[t_{i-1}, t_i]})] < \epsilon \delta^2.$$

Dies ist genau die gewünschte Zerlegung, also nach dem Korollar ist  $f$  integrierbar.

(c) Falsch. Sei  $f$  und  $g$  Treppenfunktionen,  $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \\ g(x) &= \begin{cases} 1 & 0.5 < x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

Es gilt  $(f \cdot g)(x) = 0$ , und daher  $\int_0^1 (f \cdot g)(x) dx = 0$ . Jetzt sei  $\mathcal{J} = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\mathcal{J}}(f) &\geq \sup \left( f|_{[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]} \right) \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \\ &= 1(1/4) = 1/4 \\ \mathcal{U}_{\mathcal{J}}(g) &\geq \sup \left( g|_{[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]} \right) \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= 1(1/4) = 1/4 \end{aligned}$$

Also  $\int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{4} > 0$ , und gleich für  $\int_0^1 g(x) dx$ . Daher ist

$$\int_0^1 (f \cdot g)(x) dx = 0 \neq \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 g(x) dx. \quad \square$$

**Aufgabe 87. (Wanderdüne)** Man gebe eine Folge von nicht-negativen Funktionen  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  an, sodass

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ ,
- $f_n \not\rightarrow 0$  für jedes  $x \in [0, 1]$ .

*Beweis.* Sei

$$g_{a,b}(x) = \begin{cases} 1 & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es gilt

$$\int_0^1 g_{a,b}(x) dx = (b - a).$$

Sei jetzt  $n \in \mathbb{N}$ , und  $k(n)$  das Zahl, sodass


$$\frac{k(k+1)}{2} \leq n < \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

gilt. Das ist immer möglich, weil  $x \rightarrow x(x+1)/2$  monoton wachsend ist. Sei

$$p(k(n)) := \frac{k(n)(k(n)+1)}{2}$$

$$f_n(x) = g_{\frac{n-p(n)}{k(n)+1}, \frac{n-p(n)+1}{k(n)+1}}(x)$$

Wir beweisen die gewünschte Eigenschaften:



**Figure 3.1:** Im Allgemein ergibt sich für  $p(k) \leq n < p(k+1)$  eine Überdeckung von  $[0, 1]$  mit Treppen mit Länge  $1/(k(n)+1)$ .

- (i) Es gilt  $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{k(n)+1}$ . Weil  $k(n)$  wachsend ist, und  $k(n) \rightarrow \infty$  gilt, ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

- (ii) Sei  $x \in [0, 1]$  und  $n \in \mathbb{N}$  beliebig. Sei auch  $q = \lfloor x(k(n) + 2) \rfloor$ . Es gilt dann

$$f_{p(k(n)+1)+q}(x) \neq 0,$$

also  $f_n(x) \not\rightarrow 0$  für jedes  $x \in [0, 1]$ . □

### 3.5 Blatt 5

**Aufgabe 88. (Stückweise Integrierbarkeit)** Zeigen Sie: ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar auf  $[a, c]$  und  $[c, b]$  für ein  $c \in (a, b)$ , so auch auf  $[a, b]$ .

*Beweis.* Sei  $\epsilon > 0$  beliebig. Weil  $f$  auf sowohl  $[a, c]$  als auch  $[c, b]$  integrierbar ist, gibt es eine Zerlegung  $\mathcal{J}_1 = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_n = c\}$  bzw.  $\mathcal{J}_2 = \{x_n = c, x_{n+1}, \dots, x_{n+k} = b\}$  von  $[a, c]$  bzw.  $[c, b]$ , so dass

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\mathcal{J}_1} - \mathcal{U}_{\mathcal{J}_1}(f) &< \frac{\epsilon}{2} \\ \mathcal{O}_{\mathcal{J}_2} - \mathcal{U}_{\mathcal{J}_2} &< \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

Dann ist  $\mathcal{J} = \mathcal{J}_1 \cup \mathcal{J}_2$  eine Zerlegung von  $[a, b]$  und

$$\mathcal{O}_{\mathcal{J}} - \mathcal{U}_{\mathcal{J}} < \epsilon.$$

Weil  $\epsilon$  beliebig war, ist  $f$  integrierbar. □

**Aufgabe 89. (Bestimmte Integrale)** Berechnen Sie die folgenden bestimmten und unbestimmten Integrale :

- (a)  $\int_1^4 \sin(\sqrt{x}) dx$ ,
- (b)  $\int_0^{1/2} \arcsin(x) dx$ ,
- (c)  $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$ ,
- (d)  $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx$ .

*Beweis.* (a)  $u = \sqrt{x}, du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ , also  $dx = 2u du$ . Wenn  $x = 1$  ist  $u = 1$ , und  $x = 4$  ist  $u = 2$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int_1^4 \sin(\sqrt{x}) dx &= \int_1^2 \sin(u)(2u du) \\ &= 2 \int_1^2 u \sin u du \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= 2 \left[ u(-\cos u) \Big|_1^2 + \int_1^2 \cos u \, du \right] \quad \text{partielle Integration} \\
&= 2 \left[ (\cos(1) - 2 \cos(2)) + [\sin u]_1^2 \right] \\
&= 2 \cos 1 - 4 \cos 2 + 2 \sin 2 - 2 \sin 1
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\int_0^{1/2} \arcsin(x) \, dx &= x \arcsin(x) \Big|_0^{1/2} - \int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) - \int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\
u &= 1 - x^2, \quad du = -2x \, dx.
\end{aligned}$$

Wenn  $x=0$ , ist  $u=1$ .Wenn  $x=1/2$ , ist  $u=3/4$ .

$$\begin{aligned}
\int_0^{1/2} \arcsin(x) \, dx &= \frac{\pi}{2} - \int_1^{3/4} \frac{1}{(-2)} \frac{1}{\sqrt{u}} \, du \\
&= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_1^{3/4} u^{-1/2} \, du \\
&= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \int_{3/4}^1 u^{-1/2} \, du \\
&= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} [2u^{1/2}]_{3/4}^1 \\
&= \frac{\pi}{2} - 1 + \sqrt{\frac{3}{4}} \\
&= -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

(c) Substitution:  $x = \tan \theta$ ,  $dx = \sec^2 \theta \, d\theta$ , für  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ . Es gilt  $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ . Es folgt

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx &= \int \frac{1}{(1+\tan^2 \theta)^2} (\sec^2 \theta \, d\theta) \\
&= \int \frac{1}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta \, d\theta \\
&= \int \cos^2 \theta \, d\theta \\
&= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\
&= \frac{1}{2} \left[ \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]
\end{aligned}$$

Es gilt auch  $\sin \theta = \sin \tan^{-1} x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  und  $\cos \theta = \cos \tan^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ . Daraus folgt

$$\sin 2\theta = \sin \theta \cos \theta = \frac{x}{1+x^2}.$$

Dann ist

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \left( \tan^{-1} x + \frac{x}{1+x^2} \right).$$

(d)

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{x^2}{2} \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x^2}{2} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} (-2x) dx \\ &= 0 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ u &= 1-x^2 \quad du = -2x dx \\ x^3 dx &= \frac{1}{-2} x^2 (-2x dx) \\ &= -\frac{1}{2} x^2 du \\ &= -\frac{1}{2} (1-u) du \end{aligned}$$

Wenn  $x=0$  ist  $u=1$

Wenn  $x=1$  ist  $u=0$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx &= + \frac{1}{2} \int_1^0 \left( -\frac{1}{2} \frac{1-u}{\sqrt{u}} \right) du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{1-u}{\sqrt{u}} du \\ &= \frac{1}{4} \left[ 2\sqrt{u} - \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} \left[ 2 - \frac{2}{3} \right] \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 90. (Der Hauptsatz)** Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) Eine integrierbare Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  besitzt eine Stammfunktion.
- (b) Eine stetige Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  besitzt eine Stammfunktion.

- (c) Eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , welche eine Stammfunktion auf  $[a, b]$  besitzt, ist integrierbar.

*Hinweis:*  $F(x) = \sqrt{x^3} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  für  $x \neq 0$

*Beweis.* (a) Falsch. Sei  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} < x < 1. \end{cases}$$

Es gilt dann

$$\int_0^x f(x) \, dx = \begin{cases} 0 & x \leq \frac{1}{2} \\ x - \frac{1}{2} & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

- (b) Ja (Proposition 6.4.1 und Definition 6.4.2).

- (c) Nein. Sei  $F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F = \begin{cases} \sqrt{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

und

$$F' = f = -x^{-1/2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{3\sqrt{x}}{2} \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Dann ist  $f$  nicht integrierbar, weil es nicht auf  $[0, 1]$  eingeschränkt ist ( $x^{1/2} \rightarrow \infty$  wenn  $x \rightarrow 0$ ).  $\square$

**Aufgabe 91. (Riemann-Lemma)** Es sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) \, dx = 0 \quad (5.1)$$

gilt. Verifizieren Sie dazu:

- (i) Zeigen Sie, dass zu jedem  $\epsilon > 0$  eine stückweise konstante Funktion  $T : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  existiert mit

$$\int_a^b |f(x) - T(x)| \, dx \leq \epsilon.$$

- (ii) Zeigen Sie (5.1) für beliebige, stückweise konstante Funktionen.

- (iii) Folgern Sie die Behauptung.

*Beweis.* (i) Weil  $f$  integrierbar ist, können wir eine Zerlegung  $\mathcal{J} = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b\}$  finden, so dass

$$\mathcal{O}_{\mathcal{J}}(f) - \mathcal{U}_{\mathcal{J}}(f) \leq \epsilon.$$

Wir definieren zwei stückweise konstante Funktionen:

$$\tau(x) = \begin{cases} \sup_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} & x_i \leq x < x_{i+1}, 0 \leq i < n-1 \\ \sup_{x_{n-1} \leq x \leq x_n} & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\sigma(x) = \begin{cases} \inf_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} & x_i \leq x < x_{i+1}, 0 \leq i < n-1 \\ \inf_{x_{n-1} \leq x \leq x_n} & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

Dann sind  $\tau$  und  $\sigma$  Treppenfunktionen mit  $\sigma \leq f \leq \tau$  auf  $[a, b]$ . Es gilt außerdem per Definition

$$\begin{aligned} \epsilon &\geq \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(f) - \mathcal{U}_{\mathcal{J}}(f) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left( \sup_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x) - \inf_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x) \right) (x_{i+1} - x_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} (\tau(x_i) - \sigma(x_i)) (x_{i+1} - x_i) \\ &\geq \sum_{i=0}^{n-1} (\tau(x_i) - f(x_i)) (x_{i+1} - x_i) \\ &= \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(\tau - \sigma) \\ &\geq \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(\tau - f) \\ &\geq \int_a^b (\tau - f)(x) \, dx \\ &= \int_a^b |\tau(x) - f(x)| \, dx \end{aligned}$$

(ii) Wir beweisen es zuerst für konstante Funktionen

$$\int_a^b k \sin nx \, dx = \frac{k}{n} (-\cos nx) \Big|_a^b,$$

also

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b k \sin nx \, dx \right| &= \left| \frac{k}{n} (\cos nb - \cos na) \right| \\ &\leq \frac{k}{n} [|\cos nb| + |\cos na|] \\ &\leq \frac{k}{n} (2) \end{aligned}$$

also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b k \sin nx \, dx \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2k}{n} = 0.$$

Statt eine stückweise konstante Funktion integrieren wir dann mehrere Male eine konstante Funktion. Danach summieren wir die Ergebnisse. Weil alle Ergebnisse gegen 0 geht, geht die Summe auch gegen 0, also die Behauptung gilt für stückweise konstante Funktionen.

(iii) Sei

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f(x) - \tau(x) + \tau(x)] \sin nx \, dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_a^b (f(x) - \tau(x)) \sin nx \, dx + \int_a^b \tau(x) \sin nx \, dx \right] \\ \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, dx \right| &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left| \int_a^b (f(x) - \tau(x)) \sin nx \, dx \right| + \left| \int_a^b \tau(x) \sin nx \, dx \right| \right] \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_a^b |f(x) - \tau(x)| \, dx + \int_a^b |\sin nx| \, dx \right] \end{aligned}$$

Wir nehmen dann  $N \in \mathbb{N}$  hinreichend groß, so dass für alle  $n > N$  gilt

$$\int_a^b \tau(x) \sin nx \, dx \leq \frac{\epsilon}{2}$$

(Möglich wegen (b)). Dann ist

$$\left| \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \epsilon.$$

Weil  $\epsilon$  beliebig war, gilt die Behauptung.  $\square$

**Aufgabe 92.** Für eine gegebene Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  kann unter bestimmten Voraussetzungen (z.B.  $f \in C^1([a, b])$ , wir kommen in der Vorlesung darauf zurück) die Länge des Funktionsgraphen durch


$$L(f) = \int_a^b \sqrt{1 + |f'(x)|^2} \, dx$$

bestimmt werden.

(i) Begründen Sie kurz anschaulich, warum diese Formel wahr sein kann. *Hinweis: Pythagoras.*

(ii) Bestimmen Sie über obige Identität den Umfang eines Einheitskreises.


*Beweis.* (i)



also intuitiv wäre

$$L(f) = \int_a^b \sqrt{(dx)^2 + \left(\frac{df}{dx} dx\right)^2} = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

(ii) Wir berechnen zuerst die Länge eines Hälftes des Kreises, also



Es gilt

$$f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

und

$$\begin{aligned} L(f) &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1}{1-x^2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \arcsin(x) \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi, \end{aligned}$$

also der Umfang ist  $2\pi$ . □

## 3.6 Blatt 6

**Aufgabe 93.** Im Folgenden ist  $a \in \mathbb{R}$  und  $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ . Zeigen oder widerlegen Sie:

- (a) Sind  $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  uneigentlich integrierbar, so auch  $f + g$ .
- (b) Sind  $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  uneigentlich integrierbar, so auch  $f \cdot g$ .
- (c) Sind  $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  uneigentlich integrierbar und  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, so auch  $g \circ f$ .

- (d) Es sei  $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, nicht-negativ und uneigentlich integrierbar. Dann konvergiert

$$\int_0^1 \sqrt{f(x)} \, dx.$$

*Beweis.* (a) Wahr. Sei  $a < c < b$ . Wir wissen, dass  $f + g$  auf  $[a, c]$  integrierbar für alle solchen  $c$  ist und außerdem

$$\int_a^c (f + g)(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_a^c g(x) \, dx.$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow b} \int_a^c (f + g)(x) \, dx &= \lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) \, dx + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_a^c g(x) \, dx \\ &= \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx \end{aligned}$$

also  $f + g$  ist integrierbar.

- (b) Falsch. Sei  $f, g : [-1, 0) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = g(x) = \frac{1}{\sqrt{-x}}$ . Das uneigentliche Integral existiert:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{-x}} \, dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \lim_{x_0 \rightarrow 0} \int_{x_0}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx \\ &= \lim_{x_0 \rightarrow 0} 2\sqrt{x} \Big|_{x_0}^1 \\ &= \lim_{x_0 \rightarrow 0} (2 - \sqrt{x_0}) \\ &= 2 \end{aligned}$$

Aber  $fg = \frac{1}{-x}$  und

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{1}{-x} \, dx &= \int_0^1 \frac{1}{x} \, dx \\ &= \lim_{x_0 \rightarrow 0} \ln x \Big|_{x_0}^1 \\ &= \lim_{x_0 \rightarrow 0} (-\ln x_0) \end{aligned}$$

Der Grenzwert existiert nicht.

- (c) Falsch. Sei  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$  und  $f : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{-\sqrt{x}}$ . Dann ist  $g \circ f = \frac{1}{-x}$ .

Wir haben schon gezeigt, dass  $f$  integrierbar ist,  $g \circ f$  aber nicht.

- (d) Wir betrachten nur das Fall, in dem  $f \geq 1$ . Sonst können wir  $f + 1$  betrachten. Weil die konstante Funktion 1 uneigentlich (sogar eigentlich) auf  $[0, 1]$  integrierbar ist, konvergiert das uneigentliche Integral  $\int_0^1 f(x) dx$  genau dann, wenn  $\int_0^1 f(x) + 1 dx$  konvergiert.

Wir betrachten der Grenzwert, durch den das uneigentliche Riemann-Integral definiert ist. Weil  $f$  nichtnegativ ist, ist

$$I(x_0) = \int_{x_0}^1 \sqrt{f(x)} dx$$

ein Monoton fallend Funktion von  $x_0$ . Der Grenzwert existiert also genau dann, wenn  $I(x_0)$  von oben beschränkt ist.

Wir definieren außerdem:

$$J(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx.$$

Weil  $f$  integrierbar ist, ist  $J(x_0)$  von oben beschränkt. Weil  $\sqrt{f} \leq f$  gilt, ist  $I(x_0) \leq J(x_0) \forall x_0 \in (0, 1]$ . Daraus folgt, dass  $I$  beschränkt ist, also  $\sqrt{f}$  ist uneigentlich Riemann-integrierbar.  $\square$

**Aufgabe 94.** Untersuchen Sie die folgenden uneigentlichen Riemannintegrale auf Konvergenz bzw. absolute Konvergenz:

- (a)  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ ,
- (b)  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ ,
- (c)  $\int_{-\infty}^{\infty} \sin(x^2) dx$ .

*Beweis.* (a) Wir betrachten zuerst  $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ . Weil  $e^{-x^2}$  monoton fallend ist, konvergiert das Integral genau dann, wenn

$$\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k^2}$$

konvergiert. Es gilt  $e^{-k^2} \geq e^{-k}$  für  $k \in \mathbb{N}$  und

$$\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}$$

konvergiert, weil es eine geometrische Reihe ist.

Nachdem wir gezeigt haben, dass  $\int_{-\infty}^1 f(x) dx$  existiert, existiert auch das Integral  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ . Es gilt, für  $c \leq -1$ , dass

$$\int_c^1 f(x) dx = \int_c^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx$$



und

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^1 f(x) \, dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{-1} f(x) \, dx + \int_{-1}^1 f(x) \, dx.$$

Weil  $\exp(-x^2)$  auf  $\mathbb{R}$  stetig ist, ist  $\exp(-x^2)$  auf  $[-1, 1]$  integrierbar, also der Grenzwert  $\int_{-\infty}^1 e^{-x^2} \, dx$  existiert genau dann, wenn  $\int_c^{-1} e^{-x^2} \, dx$ . Aber wir wissen, weil  $\exp(-(-x)^2) = \exp(-x^2)$ , dass

$$\int_c^{-1} e^{-x^2} \, dx = \int_1^c e^{-x^2} \, dx,$$

also

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{-1} e^{-x^2} \, dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c e^{-x^2} \, dx.$$

Weil der Grenzwert auf der rechten Seite existiert, existiert der Grenzwert auf der linken Seite, also  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx$  existiert.

Weil  $e^{-x^2} > 0$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , konvergiert das Integral genau dann, wenn es absolut konvergiert, also es konvergiert absolut.

(b) Es steht schon im Skript, dass

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$$

existiert. Aus

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}.$$

existiert auch  $\int_{-\infty}^0 \frac{\sin x}{x}$ , daher auch

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx.$$

Wir untersuchen es also für absolut Konvergenz. Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi N} \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, dx &= \sum_{j=0}^{N-1} \int_{2\pi j}^{2\pi(j+1)} \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, dx \\ &\geq \sum_{j=0}^{N-1} \frac{1}{2\pi(j+1)} \int_{2\pi j}^{2\pi(j+1)} |\sin x| \, dx \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} \frac{2}{\pi(j+1)} \end{aligned}$$

Dann nehmen wir die Limes  $N \rightarrow \infty$ . Weil die Summe divergent ist, ist das Integral auch divergent.

- (c) Wie vorher ist  $\sin((-x)^2) = \sin x$ , also wir müssen nur zeigen, dass  $\int_0^\infty \sin(x^2)$  konvergiert bzw. absolut konvergiert.

Sei  $u = x^2$ ,  $du = 2x dx = 2\sqrt{u} dx$  und  $\mathbb{R} \ni a, b, 0 < a < b$ . Es folgt:

$$\int_a^b \sin x^2 dx = \int_{a^2}^{b^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du.$$

Dann machen wir partielle Integration

$$\begin{aligned} \int_{a^2}^{b^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du &= \left. \frac{-\cos u}{\sqrt{u}} \right|_{a^2}^{b^2} - \int_{a^2}^{b^2} \frac{\cos u}{2u^{\frac{3}{2}}} du \\ \left| \int_{a^2}^{b^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du \right| &\leq \left| \left. \frac{-\cos u}{\sqrt{u}} \right|_{a^2}^{b^2} \right| + \int_{a^2}^{b^2} \frac{1}{2u^{3/2}} du \\ &\geq \frac{1}{b} + \frac{1}{a} - \left. \frac{1}{\sqrt{u}} \right|_{a^2}^{b^2} \\ &= \frac{2}{a}, \end{aligned}$$

was unabhängig von der oberen Grenze ist. Also  $\int_a^\infty x^2 \sin(x^2)$  konvergiert für alle  $a$ . Da  $\sin(x^2)$  überall in  $\mathbb{R}$  definiert und stetig ist, ist auch

$$\int_0^\infty \sin(x^2) dx$$

konvergent. Daraus folgt, dass

$$\int_{-\infty}^\infty \sin(x^2) dx$$

konvergent ist. Wir untersuchen es dann für absolut Konvergenz. Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi N} \left| \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} \right| dx &= \sum_{j=1}^{N-1} \int_{2\pi j}^{2\pi(j+1)} \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} dx \\ &\geq \sum_{j=0}^{N-1} \frac{1}{2\sqrt{2\pi j}} \int_{2\pi j}^{2\pi(j+1)} |\sin x| dx \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} \frac{2}{\sqrt{2\pi j}} \end{aligned}$$

Weil die Summe divergent ist, divergiert auch das Integral. □

**Aufgabe 95.** Beweisen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

*Beweis.* Es gilt, für alle  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned}\ln 2 &= \ln 2n - \ln n \\ &= \int_1^{2n} \frac{1}{x} dx - \int_1^n \frac{1}{x} dx \\ &= \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx\end{aligned}$$

also wir brauchen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j}.$$

Es gilt

$$\sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j} \leq \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j+1}$$

weil  $\frac{1}{x}$  auf  $(0, \infty)$  monoton fallend ist. Außerdem ist

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j} - \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j+1} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} \right] \\ &= 0\end{aligned}$$

also wenn wir die Limes gegen  $\infty$  nehmen, konvergiert die beide Summen gegen den gleichen Wert, also das Integral.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx.$$

Die Behauptung folgt.  $\square$

**Aufgabe 96.** Wir zeigen die Irrationalität von  $\pi$  durch einen Widerspruch. Angenommen, es gälte  $\pi = \frac{a}{b}$  für  $a, b \in \mathbb{N}$ . Außerdem seien  $f, F : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$\begin{aligned}f(x) &= x^n \frac{(a - bx)^n}{n!}, \\ F(x) &= f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).\end{aligned}$$

für  $n \in \mathbb{N}$ .

(a) Zeigen Sie, dass  $f^{(k)}(0), f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{N}$  für alle  $k \in \mathbb{N}$  gilt.

(b) Zeigen Sie

$$f(x) \sin x = (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)'.$$

Folgern Sie anschließend, dass  $F(\pi) + F(0)$  ebenfalls eine natürliche Zahl ist, was allerdings nicht mit den Eigenschaften von  $x \rightarrow f(x) \sin x$  für hinreichend großes  $n \in \mathbb{N}$  vereinbar ist.

*Beweis.* (a) Wir leiten es ab. Sei  $g(x) = x^n$ ,  $h(x) = (a - bx)^n$ . Es gilt

$$f^{(p)}(x) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} g^{(k)}(x) h^{(p-k)}(x).$$

Es gilt außerdem

$$g^{(k)}(x) = n(n-1) \dots (n-k+1) x^{n-k},$$

also  $g^{(k)}(0) \neq 0$  genau dann, wenn  $k = n$  und in diesem Fall ist  $g^{(n)}(0) = n!$ . Ähnlich ist  $h^{(k)}(x) = n(n-1) \dots (n-k+1)(-b)^k(a - bx)^{n-k}$ , also  $h^{(k)}(0) \in \mathbb{N}$ . Dann im Summe müssen wir nur dem Fall  $k = n$  betrachten, also

$$f^{(p)}(0) = \binom{p}{n} h^{(p-n)}(0) \in \mathbb{N}.$$

Ähnlich bei  $\pi$  gilt  $g^{(k)}(\pi) = n(n-1) \dots (n-k+1) \pi^{n-k}$  und

$$\begin{aligned} g^{(k)}(\pi) &= n(n-1) \dots (n-k+1)(-b)^k(a - b\pi)^{n-k} \\ &= n(n-1) \dots (n-k+1)(-b)^k(a - b(a/b))^{n-k} \\ &= \begin{cases} 0 & k \neq n \\ n!(-b)^n & k = n \end{cases} \\ &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

also wir betrachten im Summe nur den Fall  $p - k = n$ , also

$$f^{(p)}(x) = \frac{1}{n!} \binom{p}{p-n} g^{(p-n)}(\pi) h^{(n)}(\pi) = \binom{p}{p-n} g^{(p-n)}(\pi) (n!) (-b)^n \in \mathbb{N}.$$

(b) Es gilt

$$\begin{aligned} (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)' &= F''(x) \sin x + F'(x) \cos x - F'(x) \cos x + F(x) \sin x \\ &= [F''(x) + F(x)] \sin x \\ &= \sin(x) [\cancel{f^{(2)}(x)} - \cancel{f^{(4)}(x)} + \cancel{f^{(6)}(x)} - \dots + (-1)^n \cancel{f^{(2n+2)}(x)} \\ &\quad + f(x) - \cancel{f^{(2)}(x)} + \cancel{f^{(4)}(x)} - \dots + (-1)^n \cancel{f^{(2n)}(x)}] \\ &= f(x) \sin x + (-1)^n f^{(2n+2)}(x). \end{aligned}$$

Es bleibt zu zeigen:  $f^{(2n+2)}(x) = 0$ . Wir wissen:  $g^{(n+1)}(x) = h^{(n+1)}(x) = 0$ . Aus

$$f^{(2n+2)}(x) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{2n+2} g^{(k)}(x) h^{(2n+2-k)}(x).$$

Weil entweder  $k$  oder  $2n+2-k \geq n+1$  ist, sind alle Terme im Summe 0, also  $f^{(2n+2)} = 0$  und

$$f(x) \sin x = (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)'.$$

- (c)  $F(x)$  und  $F(\pi)$  sind natürliche Zahlen, weil sie Summen von Ableitungen von  $f$  sind, und wir wissen, dass alle Ableitungen bei 0 oder  $\pi$  ganze Zahlen sind.

Wir integrieren die beide Seite

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx &= \int_0^\pi (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)' \, dx \\ &= [F'(x) \sin x - F(x) \cos x]_0^\pi \\ &= -F(\pi) \cos \pi + F(0) \cos 0 \\ &= F(0) + F(\pi)\end{aligned}$$

Wir wissen auch, dass  $f(x)$  und  $\sin x \geq 0$  für  $x \in [0, \pi]$  sind, also  $F(0) + F(\pi) \geq 0$  und  $F(0) + F(\pi)$  ist eine natürliche Zahl. Aber:

$$\begin{aligned}\left| \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx \right| &\leq \int_0^\pi |f(x) \sin x| \, dx \\ &\leq \int_0^\pi |f(x)| \, dx \\ &\leq \pi \sup_{x \in [0, \pi]} f(x)\end{aligned}$$

Weil  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{x^n} = 0$  für alle  $x > 0$ , können wir  $f(x)$  beliebig klein machen. Insbesondere gilt für hinreichend groß  $n$   $f(x) \leq 1$ . Dann ist das Integral keine ganze Zahl, ein Widerspruch.  $\square$

## 3.7 Blatt 8

**Aufgabe 97.** Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf Stetigkeit:

$$(a) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$(b) \quad g : (\mathcal{C}^1((a, b)), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathcal{C}(a, b), \|\cdot\|_\infty) \text{ mit}$$

$$g(u(x)) := u'(x).$$

- (c) Eine beliebige Funktion  $h : (X, d_{\text{disk}}) \rightarrow (Y, d)$ , wobei  $d_{\text{disk}}$  die diskrete Metrik und  $(Y, d)$  ein beliebiger metrischer Raum ist.

*Beweis.* (a) Nicht stetig. Wir betrachten eine Folge  $(y_n), y_n \in \mathbb{R}, y_n \searrow 0$  und die Folge  $(1, y_n) \in \mathbb{R}^2$ . Dann ist  $(1, y_n) \rightarrow (1, 0)$  und

$$f(1, 0) = 0.$$

Aber

$$\begin{aligned} f(1, y_n) &= \frac{y_n^2}{1 + y_n^4} \\ &= \frac{1}{y_n^{-2} + y_n^2} \\ &\geq \frac{1}{y_n^2} = y_n^{-2} \end{aligned}$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(1, y_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n^{-2} = \infty \neq 0.$$

(b) Nicht stetig. Sei  $f_n$  die Funktionfolge

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} \exp(-nx^2).$$

Weil  $\exp(-nx^2) \leq 1 \ \forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$  konvergiert  $f_n \rightarrow 0$  mit Ableitung  $0' = 0$ .

Aber

$$f'_n(x) = -2x\sqrt{n} \exp(-nx^2).$$

Wir berechnen das Maximumpunkt:

$$f''_n(x) = 2\sqrt{n} \exp(-nx^2)(2nx^2 - 1) = 0$$

also  $x^2 = \frac{1}{2n}$  und

$$f'_n\left(\sqrt{\frac{1}{2n}}\right) = -\sqrt{\frac{2}{e}}.$$

Daraus folgt, dass  $g(f_n)$  keine konvergente Folge ist, obwohl  $f_n$  eine konvergente Folge ist, also  $g$  kann nicht stetig sein.

(c) Wir brauchen hier: Alle Mengen sind bzgl. der diskreten Metrik offen. Wegen  $\{x_0\} = B_{1/2}(x_0)$  sind alle Punktmengen in der Topologie. Weil beliebige Vereinigungen von offene Mengen auch offen sind, sind alle Mengen in der Topologie, also die Topologie ist einfach die Potenzmenge.

Sei  $U \subseteq Y$  offen.  $h^{-1}(U) \subseteq X$ , aber wir haben schon gezeigt, dass alle Teilmengen offen sind, also  $h^{-1}(U)$  ist offen. Daraus folgt:  $h$  ist stetig.  $\square$

**Aufgabe 98.** Untersuchen Sie die folgenden metrischen Räume auf Vollständigkeit:

- (a)  $(X, d)$ , wobei  $X \neq \emptyset$  und  $d$  die diskrete Metrik darstellt.
- (b)  $(\mathcal{P}, \|\cdot\|_\infty)$ .

(c)  $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_p)$  für  $1 \leq p < \infty$ .

Hinweis: Finden Sie stetige Funktionen, welche eine Treppenfunktion approximieren.

*Beweis.* (a) Vollständig. Sei  $(a_n), a_n \in X$  eine Cauchy-folge, also es gibt  $N \in \mathbb{N}$ , so dass  $|a_n - a_m| < 1/2 \forall n, m > N$ . Aus der Definition folgt, dass  $a_n = a_m \forall n, m > N$ . Dann ist  $a_n, n > N$  (egal welche  $N$ ) der Grenzwert, weil  $a_n$  nach  $N$  eine konstante Folge ist.

(b) Vollständig. (Hier ist es angenommen, dass  $\mathcal{P}$  die Menge der Polynome ist).

Sei  $p, q$  Polynome. Dann ist  $p - q$  ein Polynom. Alle Polynome sind bei  $\pm\infty$  divergent, also  $\|p - q\| = \infty$ . Daraus folgt, dass wenn  $(a_n), a_n \in \mathcal{P}$  eine Cauchy-folge ist, ist  $(a_n)$  nach einer Zahl eine konstante Folge, also es konvergiert gegen ein Polynom (das Konstant).

(c) Nicht vollständig. Wir betrachten die Funktionfolge  $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n = \begin{cases} -1 & -1 \leq x \leq -1/n \\ nx & -1/n \leq x \leq 1/n \\ 1 & 1/n \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Sei  $x > 0$ . Es gibt dann  $N \in \mathbb{N}$ , so dass  $1/N < x$ . Dann ist  $f_n(x) = 1$  für alle  $n \geq N$ , also  $f_n(x) \rightarrow 1$ . Ähnlich ist  $f_n(x) \rightarrow -1$  für alle  $x < 0$ . Außerdem ist  $f_n(0) = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  (eine konstante Folge), also  $f_n(0) \rightarrow 0$ . Dann ist die Grenzfunktion

$$f = \begin{cases} -1 & -1 \leq x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

was offenbar nicht stetig ist. Es bleibt zu zeigen: Die Folge ist eine Cauchyfolge. Wir betrachten  $n, m \in \mathbb{N}$  mit  $M = \min(n, m)$ . Dann ist

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\| &= \int_{-1}^1 |f_n - f_m| dx \\ &= \left[ \int_{-1}^{-1/M} |f_n - f_m|^p dx \right]^{1/p} + \left[ \int_{-1/M}^{1/M} |f_n - f_m|^p dx \right]^{1/p} \\ &\quad + \left[ \int_{1/M}^1 |f_n - f_m|^p dx \right]^{1/p} \\ &= \left[ \int_{-1/M}^{1/M} |f_n - f_m|^p dx \right]^{1/p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \left[ \int_{-1/M}^{1/M} 2^p \, dx \right]^{1/p} \\
&= 2 \left( \frac{2}{M} \right)^{1/p} \\
&\rightarrow 0 \quad M \rightarrow \infty
\end{aligned}$$

also die Folge ist eine Cauchyfolge.  $\square$

**Aufgabe 99.** Wir beweisen den Existenz- und Eindeutigkeitsatz von Picard-Lindelöf für Anfangswertprobleme. Er besagt (vereinfacht): Ist  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  Lipschitz-stetig (mit Konstante  $L$ ), so besitzt die Gleichung

$$x'(t) = f(x(t)), \quad x(a) = x_0, \quad \forall t \in [a, b] \quad (3.6)$$

für jedes  $b > a$  eine eindeutige Lösung (dies ist eine Differentialgleichung, die Lösung ist also eine Funktion  $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , welche stetig differenzierbar ist). Gehen Sie wie folgt vor:

(a) Es sei

$$x(t) = x_0 + \int_a^t f(x(s)) \, ds, \quad \forall t \in [a, b]. \quad (3.7)$$

Zeigen Sie für  $x \in \mathcal{C}^1([a, b])$ :

$$x \text{ erfüllt (3.6)} \iff x \text{ erfüllt (3.7)}.$$

(b) Beweisen Sie, dass die Abbildung  $F : (\mathcal{C}([a, b]), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathcal{C}([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$  definiert durch

$$F(y(t)) = y_0 + \int_a^t f(y(s)) \, ds$$

eine Lipschitz-stetige Selbstabbildung ist mit Lipschitz-Konstante  $L(b-a)$  ist.

(c) Folgern Sie mithilfe des Banachschen Fixpunktsatzes die Existenz einer eindeutigen Lösung zu (3.6), in dem Sie zunächst  $b-a$  klein genug wählen. Anschließend iterieren Sie das Argument endliche Male (warum?), um eine Lösung für ein beliebiges  $b > a$  zu konstruieren. Begründen Sie außerdem, warum die Lösung  $x \in \mathcal{C}^1([a, b])$  erfüllt.

*Beweis.* Keine Zeit T-T  $\square$

**Aufgabe 100.** Zur Wiederholung: Der Rang  $\partial A$  einer Menge  $A \subset X$  ist definiert als die Menge der Punkte in  $X$ , welche sowohl Berührungspunkte von  $A$  als auch  $A^c$  sind.



Es seien  $(X, d)$  ein metrischer Raum,  $x_0 \in X$  und  $r > 0$ . Zeigen Sie, dass für  $B_r(x_0) := \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$  die folgenden Relationen gelten:

$$\begin{aligned}\partial B_r(x_0) &\subset S_r(x_0) := \{x \in X : d(x, x_0) = r\} \\ B_r(x_0)^{cl} &\subset K_r(x_0) := \{x \in X : d(x, x_0) \leq r\}.\end{aligned}$$

Beweisen oder widerlegen Sie: Es gelten auch die umgekehrten Inklusionen.

*Beweis.* Sei  $x \in X, d(x, x_0) > r$ . Sei  $\epsilon = (d(x, x_0) - r)/2$ . Wir behaupten, dass  $B_\epsilon(x) \cap B_r(x_0) = \emptyset$ . Sei  $y \in B_r(x_0)$ . Es folgt aus der Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}d(x, x_0) &\leq d(x_0, y) + d(y, x) \\ d(y, x) &\geq d(x, x_0) - d(x_0, y) \\ &\geq d(x, x_0) - r \\ &= 2\epsilon\end{aligned}$$

also  $x$  ist kein Berührungspunkt von  $B_r(x_0)$  und

$$B_r(x_0)^{cl} \subset K_r(x_0).$$

Jetzt sei  $x \in B_r(x_0)$ . Es gilt  $B_r(x_0)^c = \{x \in X : d(x, x_0) > r\}$ . Sei noch einmal  $\epsilon = \frac{r-d(x, x_0)}{2}$ . Wir zeigen:  $x$  ist kein Berührungspunkt von  $B_r(x_0)^c$ , also  $B_\epsilon(x) \cap B_r(x_0)^c = \emptyset$ . Sei  $y \in B_r(x_0)^c$ . Es gilt

$$\begin{aligned}d(x_0, y) &\leq d(x_0, x) + d(x, y) \\ d(y, x) &\geq d(y, x_0) - d(x_0, x) \\ &\geq r - d(x_0, x) \\ &= 2\epsilon\end{aligned}$$

also alle solche Punkte sind keine Berührungspunkte von  $B_r(x_0)^c$  und es folgt daraus:

$$\partial B_r(x_0) \subset S_r(x_0).$$

Die Umkehrrichtung ist falsch. Sei  $X = \{a, b\}$  und die Metrik definiert:

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & (x, y) = (a, b) \text{ oder } (x, y) = (b, a) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}.$$

Wir betrachten  $B_1(a) = \{a\}$ . Dann ist  $b$  kein Berührungspunkt von  $B_1(a)$ , weil  $B_1(b) = \{b\}$  und  $\{b\} \cap \{a\} = \emptyset$ . Dann ist  $b$  in weder  $\partial B_r(x_0)$  noch  $B_r(x_0)^{cl}$ , obwohl  $d(a, b) = 1 \leq 1$ .  $\square$

### 3.8 Blatt 9

**Aufgabe 101.** Sei  $M$  eine Menge mit  $\#M = \infty$ . Eine Menge  $A \subset M$  sei als offen definiert, falls  $M = \emptyset$  oder  $M \setminus A$  endlich ist. Zeigen Sie, dass dies tatsächlich eine Topologie definiert. Ist diese Topologie metrisierbar?

*Beweis.* (i)  $\emptyset$  ist per Definition offen.

(ii)  $M \setminus M = \emptyset$ , was endlich ist, also  $M$  ist offen.

(iii) Sei  $A_i, i \in I$  offene Mengen. Es gilt

$$M \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \subseteq M \setminus A_j$$

für alle  $j \in I$ . Da  $M \setminus A_j$  endlich ist, ist auch  $\bigcup_{i \in I} A_i$  offen.

(iv) Sei  $A_i, i \in \{1, \dots, n\} := I$  offene Mengen. Es gilt

$$M \setminus \bigcap_{i \in I} A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} (M \setminus A_i).$$

Weil  $I$  endlich ist, und alle Mengen  $M \setminus A_i$  endlich sind, ist  $\bigcap_{i \in I} A_i$  offen.

Es ist aber nicht metrisierbar, weil es nicht Hausdorff ist. Sei  $x, y \in M$ ,  $x \neq y$ . Wir nehmen an, dass es offene Mengen  $U, V$  gibt, so dass  $U \cap V = \emptyset$  und  $x \in U, y \in V$ . Weil  $U \cap V = \emptyset$ , ist  $V \subseteq M \setminus U$ , also  $V$  ist endlich. Aber  $M \setminus V$  ist dann unendlich, also  $V$  ist nicht offen, ein Widerspruch.  $\square$

**Aufgabe 102.** Zeigen Sie, dass

$$M = \left\{ \left( x, \sin \left( \frac{1}{x} \right) \right)^T \mid x \in (0, 1) \right\} \cup \{0\} \times [-1, 1]$$

zusammenhängend, aber nicht wegzusammenhängend in  $\mathbb{R}^n$  ist.

*Beweis.* Sei

$$M_1 = \left\{ \left( x, \sin \left( \frac{1}{x} \right) \right)^T \mid x \in (0, 1) \right\}$$

$$M_2 = \{0\} \times [-1, 1]$$

$M_1$  und  $M_2$  sind offenbar wegzusammenhängend (und daher zusammenhängend). Wir fahren per Widerspruch fort: Nehme an, dass es  $U, V$  offen gibt, so dass  $U \cup V = M$ . Es muss gelten, dass  $M_1$  und  $M_2$  Teilmengen von entweder  $U$  oder  $V$  sind, sonst wäre  $M_1$  oder  $M_2$  nicht zusammenhängend. Die beide müssen in unterschiedliche Mengen sein, also oBdA  $M_1 \subseteq U$  und  $M_2 \subseteq V$ , sonst wäre die andere Menge leer.

Wir betrachten  $(0, 0) \in M_2 \subseteq V$ . Weil  $V$  offen ist, gibt es einen Kugel  $B_r((0, 0)) \subseteq V$ . Per Definition von  $U$  und  $V$  ist  $B_r((0, 0)) \cap M_1 = \emptyset$ . Wir zeigen, dass dies nicht der Fall ist.

Es gilt

$$M_1 = \left\{ \left( \frac{1}{x}, \sin x \right)^T \mid x \in (1, \infty) \right\}.$$

Es gibt  $N$ , so dass  $\frac{1}{N} < r$ . Weil  $\sin x$  unendlich viele Nullstellen hat, gibt es eine Nullstelle nach  $N$ , also es gibt ein Punkt  $(x, 0) \in \mathbb{R}^2$  mit  $x < r$ , also  $(x, 0) \in B_r((0, 0))$ , ein Widerspruch.

Jetzt zeigen wir:  $M$  ist nicht wegzusammenhängend. Wir zeigen, dass es keinen Weg zwischen  $M_2$  und  $(1, \sin 1)$  gibt. Falls es einen solchen Weg gibt, gibt es  $t_1 \geq 0$ , so dass  $\gamma(t) \notin M_2 \forall t \geq t_1$ , also wir nehmen oBdA an, dass  $\gamma(0) \in M_2$  und  $\gamma(t) \in M_1 \forall t \in (0, 1]$ . Sei  $\gamma(0) = (0, a)$ .

Weil  $\text{im}(\gamma) \subseteq M$ , muss dann gelten, dass  $\gamma((0, 1]) = M_1$ . Sei  $B_r((0, a))$  ein offener Kugel um  $(0, a)$  bzw.  $\gamma(0)$ , mit  $r$  hinreichend klein, so dass  $|1 - a| > r$  oder  $|r| < |a|$  gilt (also der Kugel enthält keine Punkte von der Form  $(x, 1)$  oder  $(x, 0)$ ).

Sei  $[0, x)$  ein offener Kugel von  $[0, 1]$  um 0. Wie vorher gibt es dann mindestens ein Punkt (eigentlich unendlich viel)  $t$ , so dass  $\gamma(t) = (x, 1)$  bzw.  $(x, 0)$  für  $x \in [0, 1]$ , also  $f(B_x(0)) \not\subseteq B_r((0, a))$ , wobei  $f(x) = \sin(1/x)$ . Dann kann  $K$  nicht wegzusammenhängend sein.  $\square$

**Aufgabe 103.** Es seien  $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$  sowie  $r > 0$ . Wir betrachten die Menge  $K := \{x_0\} \cup K_r(x_1)$  und die konvexe Hülle dieser Menge ist gegeben durch

$$\text{conv}K := \{tx_0 + (1-t)x \mid t \in [0, 1], x \in K_r(x_1)\}.$$

Zeigen Sie, dass  $\text{conv}K$  kompakt ist.

*Hinweis: Wählen Sie geschickt eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge.*

*Beweis.* Wir betrachten  $K' \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$  mit

$$K' = \{(x, x_0, t) \mid x \in K_r(x_1) \text{ und } t \in [0, 1]\}.$$

Als Produkt kompakte Mengen ist  $K'$  kompakt. Sei  $f : \mathbb{R}^{2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$  mit

$$f(x, x_0, t) = tx_0 + (1-t)x.$$

$f$  ist stetig und das Bild von  $K'$  ist  $K$ . Daraus folgt:  $K$  ist kompakt.  $\square$

## 3.9 Blatt 10

**Aufgabe 104. (Stetigkeit, partielle und totale Differenzierbarkeit)**  
Sind die Funktionen mit den Funktionswerten

(a)  $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/4},$

$$(b) \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{für } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

$$(c) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^2 + y^2)^{3/2}}{(x^2 + y^2)^2 + y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

stetig, partiell oder total differenzierbar in  $(0, 0)$ ?

*Beweis.* (a) Die Funktion ist stetig. Sei  $\epsilon > 0$  gegeben. Sei  $\delta = \epsilon^2$ . Dann für alle  $r \in \mathbb{R}^2$ , so dass  $\|r - 0\| = \|r\| < \delta$  gilt  $f(x, y) = (\|r\|^2)^{1/4} = \|r\|^{1/2} < \epsilon$ .

Die Funktion ist nicht partiell differenzierbar. Für die Gerade  $x = 0$  gilt  $f(0, y) = (y^2)^{1/4} = \sqrt{|y|}$ . Aber  $g(y) = \sqrt{|y|}$  ist nicht bei 0 differenzierbar. Ähnlich ist sie auch nicht durch  $x$  partiell differenzierbar.

Weil die Funktion nicht partiell differenzierbar ist, ist sie auch nicht total differenzierbar.

(b) Die Funktion ist stetig. Es gilt

$$\left| (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \right| \leq (x^2 + y^2).$$

Da  $x^2 + y^2 \rightarrow 0$  wenn  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , gilt es auch für  $f(x, y)$  und  $f(x, y)$  ist in  $(0, 0)$  stetig.

Sie ist nicht partiell differenzierbar. z.B. Für die Gerade  $y = 0$  ist  $f(x, 0) = x^2 \sin(1/|x|)$ , was nicht differenzierbar bei 0 ist. Ähnlich existiert auch  $\frac{\partial f}{\partial y}$  nicht.

Weil  $f$  nicht partiell differenzierbar ist, ist  $f$  nicht total differenzierbar.

(c) Die Funktion ist stetig. Es gilt

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{y(x^2 + y^2)^{3/2}}{(x^2 + y^2)^2 + y^2} \\ &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}} \end{aligned}$$

Da  $\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow \infty$  wenn  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , geht die Funktion  $f(x, y) \rightarrow 0$ . Dann ist  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ , also die Funktion ist stetig.

Sie ist auch partiell differenzierbar. Da  $f(x, 0) = 0$ , ist  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ . Es gilt

$$f(0, y) = \frac{y(y^2)^{3/2}}{y^4 + y^2}.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^2)^{3/2}}{y^4 + y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|^3}{y^4 + y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y^2 + 1}\end{aligned}$$

Da  $\frac{1}{y^2+1}$  stetig ist und  $\frac{1}{y^2+1} \rightarrow 0$  wenn  $y \rightarrow 0$ , existiert der Grenzwert. Der Grenzwert ist auch 0.

Sie ist aber nicht total differenzierbar. Falls eine Ableitung existiere, kann die Ableitung durch die partielle Ableitungen dargestellt werden. Diese Darstellung liefert eine totale Ableitung von 0. Es würde also gelten:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\|(x, y)\|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\|(x, y)\|} = 0.$$

Es gilt aber

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\|(x, y)\|} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{(x^2 + y^2) + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\frac{x^2}{y} + y + \frac{y}{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 105. (Tangenten von Kurven)** Für eine stetig differenzierbare Kurve  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt  $t \in [a, b]$  ein regulärer Punkt, falls  $\gamma'(t) \neq 0$ . Andernfalls nennen wir  $t$  ein singulären Punkt.

Bestimmen Sie die Menge der regulären/singulären Punkte folgender Kurven:

- (a)  $\gamma_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  mit  $\gamma_1(t) = (t^2, t^3)^T$ ,
- (b)  $\gamma_2 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit  $\gamma_2(t) = (\cos^3(t), \sin^3(t))^T$ ,
- (c)  $\gamma_3 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit  $\gamma_3(t) = (t \cos t, t \sin t, t)^T$ .

*Beweis.* (a)  $\gamma_1(t) = (2t, 3t^2)^T$ .

Singulären Punkte:  $\{0\}$ .

Regulären Punkte:  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

(b)  $\gamma_2'(t) = (3 \cos^2(t)(-\sin t), 2 \sin^2(t) \cos t)$ , also

Singulären Punkte:  $S = \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi\}$

Regulären Punkte:  $[0, 2\pi] \setminus S$ .

(c)  $\gamma_3'(t) = (\cos t - t \sin t, \sin t - t \cos t, 1)^T$

Die Ableitung ist nie der Nullvektor, also

Singulären Punkte:  $\emptyset$

Regulären Punkte:  $[0, 2\pi]$ . □

**Aufgabe 106. (Rechnen mit der Kettenregel)** Der reelwertigen Funktionen  $f(u_1, \dots, u_n)$  und  $u_1(x_1, \dots, x_m), \dots, u_n(x_1, \dots, x_m)$  seien auf den offenen Mengen  $U \subset \mathbb{R}^n$  bzw.  $G \subset \mathbb{R}^m$  erklärt, und die Funktion

$$\varphi(x_1, \dots, x_m) := f(u_1(x_1, \dots, x_m), \dots, u_n(x_1, \dots, x_m))$$

existiere auf  $G$ .

Im Folgenden ist jeweils die Ableitung  $D\varphi$  der Funktion  $\varphi$  zu berechnen:

(a)  $f(u, v, w) = u^2 + v^2 + w^2$ ;  $u(t) = e^t \cos t$ ,  $v(t) = e^t \sin t$ ,  $w(t) = e^t$ ,

(b)  $f(u, v) = \ln(u^2 + v^2)$  für  $(u, v) \neq (0, 0)$ ;  $u(x, y) = xy$ ,  $v(x, y) = \sqrt{x}/y$  für  $x, y > 0$ ,

(c)  $f(u, v, w) = uv + vw - uw$ ;  $u(x, y) = x + y$ ,  $v(x, y) = x + y^2$ ,  $w(x, y) = x^2 + y$ .

*Beweis.* (a) Sei  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, t \rightarrow (u(t), v(t), w(t))^T$ . Es gilt

$$\begin{aligned} D(f \circ g)(t) &= Df(g(t))Dg(t) \\ &= (2u, 2v, 2w)(u'(t), v'(t), w'(t))^T \\ &= 2uu'(t) + 2vv'(t) + 2ww'(t) \\ &= 2(e^t \cos t)(e^t \cos t - e^t \sin t) \\ &\quad + 2(e^t \sin t)(e^t \sin t + e^t \cos t) + 2e^{2t} \\ &= 4e^{2t}. \end{aligned}$$

(b) Sei  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y))^T$ . Es gilt

$$\begin{aligned} Df &= \left( \frac{2u}{u^2 + v^2}, \frac{2v}{u^2 + v^2} \right) \\ Dg &= \begin{pmatrix} y & x \\ \frac{1}{2\sqrt{xy}} & \sqrt{x} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und daher

$$D(f \circ g)(x, y) = Df(g(x, y))Dg(x, y)$$

$$\begin{aligned}
&= \left( \frac{2xy}{x^2y^2 + \frac{x}{y^2}}, \frac{2\sqrt{x}/y}{x^2y^2 + \frac{x}{y^2}} \right) \begin{pmatrix} y & x \\ \frac{1}{2\sqrt{xy}} & \sqrt{x} \end{pmatrix} \\
&= \left( \frac{1 + 2xy^4}{x + x^2y^4}, \frac{2y(1 + xy^2)}{1 + xy^4} \right)
\end{aligned}$$

(c) Sei  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y), w(x, y))^T$ . Es gilt

$$Df(u, v, w) = (v - w, u + w, v - u)$$

$$Dg(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2y \\ 2x & 1 \end{pmatrix}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
D(f \circ g)(x, y) &= Df(g(x, y)) Dg(x, y) \\
&= (x + y^2 - x^2 - y, x^2 + x + 2y, y^2 - y) \\
&\quad \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2y \\ 2x & 1 \end{pmatrix} \\
&= (y(1 + y) + 2x(1 - y + y^2), \\
&\quad x + 2xy + x^2(2y - 1) + 2y(3y - 1)). \quad \square
\end{aligned}$$

**Aufgabe 107.** Beweisen Sie die Differenzierbarkeit der folgenden Funktionen und geben Sie die Ableitung an:

(a)  $f(x) = x^T A x$  für  $x \in \mathbb{R}^n$  und ein  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,

(b)  $f(X, Y) = XY$  für  $(X, Y) \in \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{n \times k}$ .

*Beweis.* (a) Wir berechnen  $f'(x_0)$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
f(x_0 + \delta x) &= (x_0 + \delta x)^T A (x_0 + \delta x) \\
&= x_0^T A x_0 + (\delta x)^T A x_0 + (x_0)^T A (\delta x) \\
&\quad + (\delta x)^T A (\delta x) \\
&= f(x_0) + ((x_0)^T A^T \delta x)^T + (x_0)^T A (\delta x) \\
&\quad + (\delta x)^T A (\delta x) \\
&= f(x_0) + x_0^T A^T (\delta x) + (x_0)^T A (\delta x) \quad (x_0)^T A^T \delta x \in \mathbb{R} \\
&\quad + (\delta x)^T A (\delta x) \\
&= f(x_0) + x_0^T (A^T + A) (\delta x) + (\delta x)^T A (\delta x)
\end{aligned}$$

Wir identifizieren  $Df(x_0) = x_0^T (A^T + A)$ . Es bleibt zu zeigen, dass  $(\delta x)^T A (\delta x)$  eigentlich die Restabbildung ist. Da

$$\lim_{\|\delta x\| \rightarrow 0} \left| \frac{(\delta x)^T}{\|\delta x\|} A \delta x \right| \leq \lim_{\|\delta x\| \rightarrow 0} \|A\| \|\delta x\| = 0,$$

gilt die Behauptung.

(b) Ähnlich berechnen wir  $f'(X_0, Y_0)$ . Es gilt

$$\begin{aligned} f(X_0 + \delta X, Y_0 + \delta Y) &= (X_0 + \delta X)(Y_0 + \delta Y) \\ &= X_0 Y_0 + (\delta X) Y_0 + X_0 (\delta Y) + (\delta X)(\delta Y) \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 108.** Zeigen Sie, dass die Funktion  $f(x, y) = xy$  für  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  einen kritischen Punkt in  $(x, y) = (0, 0)$  besitzt, aber kein Extremum.

*Beweis.*

$$f'(x, y) = (y, x)^T$$

und  $f'(0, 0) = (0, 0)$ . Die Funktion besitzt in  $(0, 0)$  daher einen kritischen Punkt. Es ist aber kein Extremum. Es gilt  $f(0, 0) = 0$ . Es ist kein Maximum, weil auf der Gerade  $x = y = t$  gilt  $f(t, t) = t^2 > 0$  für  $t \neq 0$ , also in jede offene Menge bzw. offenem Kugel gibt es mindestens ein Punkt  $(x, y) = (t, t)$ , so dass  $f(x, y) > 0 = f(0, 0)$ . Ähnlich gilt, auf der Gerade  $(x, y) = (t, -t)$ ,  $f(t, -t) = -t^2 < 0$ , also  $f(0, 0)$  ist kein Minimum. Dann besitzt  $f$  kein Extremum in  $(0, 0)$ . □



## CHAPTER FOUR

---

### Vertiefung Analysis

---

Ich habe die Übungen für Vertiefung Analysis mit Lucas Wollman gemacht.

#### 4.1 Blatt 1

**Aufgabe 109.** Seien  $X, Y$  nichtleere Mengen,  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung und  $\mathcal{A}, \mathcal{S}$   $\sigma$ -Algebren über  $X$  sowie  $\mathcal{B}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $Y$ . Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a)  $\mathcal{A} \cup \mathcal{S}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra über  $X$ .
- (b)  $\mathcal{A} \cap \mathcal{S}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra über  $X$ .
- (c)  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{S}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra über  $X$ .
- (d)  $f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) \subseteq X \mid B \in \mathcal{B}\}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra über  $X$ .
- (e)  $f(\mathcal{A}) = \{f(A) \subseteq Y \mid A \in \mathcal{A}\}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra über  $Y$ .

*Beweis.* (a) Falsch. Sei

$$\begin{aligned} X &= \{a, b, c\} \\ \mathcal{A} &= \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, X\} \\ \mathcal{S} &= \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, X\} \end{aligned}$$

Dann ist

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{S} = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{b, c\}, X\}.$$

keine  $\sigma$ -Algebra, weil

$$\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\} \notin \mathcal{A} \cup \mathcal{S}.$$

(b) Richtig.

$$(1) X \in \mathcal{A}, X \in \mathcal{S} \implies X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{S}$$

(2) Sei  $A \in \mathcal{A} \cap \mathcal{S}$ . Dann  $A \in \mathcal{A}$  und  $A \in \mathcal{S}$ .

Daraus folgt:  $A^c \in \mathcal{A}$  und  $A^c \in \mathcal{S}$ . Deswegen ist  $A^c \in \mathcal{A} \cap \mathcal{S}$ .

(3) Sei  $(A_j), A_j \in \mathcal{A} \cap \mathcal{S}$ . Dann gilt:

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}$$

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{S}$$

Daraus folgt

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A} \cap \mathcal{S}.$$

(c) Falsch.  $X \in \mathcal{A}, X \in \mathcal{S} \implies X \notin \mathcal{A} \setminus \mathcal{S}$

(d) Richtig.

(1)  $f^{-1}(Y) = X \in f^{-1}\mathcal{B}$

(2) Sei  $A = f^{-1}(B)$

$$X - A = f^{-1}(\underbrace{Y - B}_{\in \mathcal{B}}) \in f^{-1}(\mathcal{B}).$$

(3) Es folgt aus

$$\bigcup_{j \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_j) = f^{-1}\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} B_j\right).$$

(e) Falsch. Sei  $a \in Y$  und  $f$  die konstante Abbildung  $f(x) = a \forall x \in X$ . Dann gilt

$$f(\mathcal{A}) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

was keine  $\sigma$ -Algebra ist, solange  $Y \neq \{a\}$ .

□

**Aufgabe 110.** (a) Sei  $X := \mathbb{Q}$  und  $\mathcal{A}_\sigma(M)$  die von  $M := \{(a, b] \cap \mathbb{Q} \mid a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}$  erzeugte  $\sigma$ -Algebra. Zeigen Sie, dass  $\mathcal{A}_\sigma(M) = \mathcal{P}(\mathbb{Q})$  gilt.

(b) Seien  $X, Y$  nichtleere Mengen und  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung. Zeigen Sie: Für  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(Y)$  gilt

$$f^{-1}(\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})) = \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M})).$$

Das Urbild von  $\mathcal{M}$  ist hierbei analog zum Urbild einer  $\sigma$ -Algebra definiert durch

$$f^{-1}(\mathcal{M}) := \{f^{-1}(B) \subseteq X \mid B \in \mathcal{M}\}.$$

*Beweis.* (a)  $\{q\} \in \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M}) \forall q \in \mathbb{Q}$ , weil

$$\{q\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( q - \frac{1}{n}, q \right] \in \mathcal{A}_\sigma(M).$$

Es sollte den Schnitt mit  $\mathbb{Q}$  geben, also  $\left( q - \frac{1}{n}, q \right] \cap \mathbb{Q}$  statt  $\left( q - \frac{1}{n}, q \right]$

Weil  $\mathbb{Q}$  abzählbar ist, sind alle Teilmenge  $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$  abzählbar, daher

$$\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\{\{q\} | q \in \mathbb{Q}\}) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(M)$$

Es ist klar, dass

$$\mathcal{A}_\sigma(M) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}).$$

(b) Sei  $P = \{\mathcal{A} | \mathcal{A} \text{ ist eine } \sigma\text{-Algebra, } \mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}\}$ . Per Definition ist  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in P} \mathcal{A}$ . Dann ist es zu beweisen:

$$f^{-1} \left( \bigcap_{\mathcal{A} \in P} \mathcal{A} \right) = \bigcap_{\mathcal{A} \in P} f^{-1}(\mathcal{A}) \stackrel{?}{=} \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M})).$$

Jeder  $\sigma$ -Algebra  $f^{-1}(\mathcal{A})$  enthält  $f^{-1}(\mathcal{M})$ . Daraus folgt, dass

$$\mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M})) \subseteq \bigcap_{\mathcal{A} \in P} f^{-1}(\mathcal{A}).$$

$$f^{-1} \left( \bigcap_{\mathcal{A} \in P} \mathcal{A} \right) = \bigcap_{\mathcal{A} \in P} f^{-1}(\mathcal{A})$$

Jetzt betrachten wir

stimmt nicht. Es gilt zu sagen, weil  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})$ , gilt auch

$$\mathcal{M}' := f_* (\mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))).$$

Es ist schon in der Vorlesung bewiesen, dass  $\mathcal{M}'$  eine  $\sigma$ -Algebra ist, die  $\mathcal{M}$  und daher auch  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})$  enthält. Weil  $f^{-1}(\mathcal{M}')$  eine  $\sigma$ -Algebra ist, ist  $f^{-1}(\mathcal{M}') = \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))$ . Daraus folgt:

$$f^{-1}(\mathcal{M}) \subseteq f^{-1}(\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})) \\ \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M})) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})))$$

$$f^{-1}(\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{M})) \subseteq f^{-1}(\mathcal{M}') = \mathcal{A}_\sigma(f^{-1}(\mathcal{M})). \quad \square$$

**Aufgabe 111.** Wir betrachten  $\mathbb{R}^n$  mit der Standardmetrik, also ausgestattet mit der Euklidischen Norm  $\|\cdot\|$ . Für  $r > 0$  und  $x \in \mathbb{R}^n$  sei  $B_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^n | \|x - y\| < r\}$ . Definiere außerdem  $B_{\mathbb{Q}} := \{B_r(q) \subseteq \mathbb{R}^n | \mathbb{Q} \ni r > 0, q \in \mathbb{Q}^n\}$  und  $B_{\mathbb{R}} := \{B_r(x) \subseteq \mathbb{R}^n | r > 0, x \in \mathbb{R}^n\}$

(a) Zeigen Sie: Für jeder offene Menge  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  gilt  $A = \bigcup_{B_r(q) \in B_{\mathbb{Q}}} B_r(q)$  mit

$$M := \{B_r(q) \in B_{\mathbb{Q}} | B_r(q) \subseteq A\}.$$

(b) Folgern Sie nun  $\mathcal{A}_\sigma(B_{\mathbb{Q}}) = \mathcal{A}_\sigma(B_{\mathbb{R}}) = \mathcal{B}^n$

*Beweis.* (a) Es genügt zu beweisen, dass jeder offene Ball eine Vereinigung von  $\mathbb{Q}$ -Bälle sind.

Sei  $B_p(x), p \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$  eine offene Ball. Sei auch  $(a_i), a_i \in \mathbb{Q}^n$  eine Folge, für die gilt

$$\|x - a_i\| < r \forall i$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = x$$

Sei dann

$$M_i = B_{r-\|x-a_i\|}(a_i) \in B_{\mathbb{Q}}.$$

Leider ist der Beweis hier falsch, weil es sein kann, dass  $r - \|x - a_i\| \notin \mathbb{Q}$ .

Man muss eine durch  $r - \|x - a_i\|$  beschränkte Folge betrachten.

Es ist klar, dass jeder  $M_i \subseteq B_r(x)$  ist. Wir beweisen auch, dass  $\bigcup_{i=1}^{\infty} M_i = B_r(x)$ .

Sei  $y \in B_r(x)$ . Es gilt  $\|y - x\| = r_0 < r$ . Sei  $\xi = r - r_0$ . Weil  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$ , gibt es ein Zahl  $a_k$ , wofür gilt

$$\|a_k - x\| < \frac{\xi}{2}.$$

(Eigentlich existiert unendlich viel, aber die brauchen wir nicht). Es gilt dann

$$\|y - a_k\| \leq \|y - x\| + \|x - a_k\| \leq r_0 + \frac{\xi}{2} < r - \frac{\xi}{2} < r - \|x - a_i\|,$$

also  $y \in B_{r-\|x-a_k\|}(a_k)$ . Jetzt ist die Ergebnis klar: Weil jeder offene Menge eine Vereinigung von offene Bälle ist, gilt

$$A = \bigcup B_p(x) = \bigcup \bigcup B_r(q),$$

wobei  $p \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$  und  $r \in \mathbb{Q}, q \in \mathbb{Q}^n$

(b)  $\mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{R}}) = \mathcal{B}^n$  per Definition.

Aus  $B_{\mathbb{Q}} \subseteq B_{\mathbb{R}}$  folgt  $\mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{Q}}) \subseteq \mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{R}})$

Aus (a) folgt, dass

$$B_{\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{Q}}).$$

Dann

$$\mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{R}}) \subseteq \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{Q}})) = \mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{Q}}).$$

Deswegen

$$\mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{Q}}) = \mathcal{A}_{\sigma}(B_{\mathbb{R}}) = \mathcal{B}^n. \quad \square$$

**Aufgabe 112.** Sei  $X$  eine Menge,  $\mathcal{A}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $X$  und  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  eine Mengenfunktion.

(a) Sei  $\mu$   $\sigma$ -subadditiv,  $B \in \mathcal{A}$  und definiere  $\mu_B : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty], \mu_B(A) := \mu(A \cap B)$ . Zeigen Sie, dass  $\mu_B$  wohldefiniert und eine  $\sigma$ -subadditive Mengenfunktion ist.

(b)  $\mu$  erfülle die beiden Eigenschaften

- (1)  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$  für alle  $A, B \in \mathcal{A}$  mit  $A \cap B = \emptyset$ .  
 (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$  für alle  $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$  mit  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$

Zeigen Sie, dass  $\mu$   $\sigma$ -additiv ist.

*Beweis.* (a) Weil  $B \in \mathcal{A}$ , ist  $B \cap A \in \mathcal{A} \forall A \in \mathcal{A}$ .  $\mu_B$  ist daher wohldefiniert.

Sei  $(A_j), A_j \in \mathcal{A}, \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}$ . Sei auch  $B_j = A_j \cap B \in \mathcal{A}$ . Dann gilt

$$\mu_B \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \mu \left( B \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \mu \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_B(A_j)$$

- (b) Sei  $(A_j), A_j \in \mathcal{A}$  paarweise disjunkter Menge. Dann definiere  $B_j = \bigcup_{i=1}^j A_j$ . Für  $k$  endlich ist es klar,

$$\mu(B_k) = \sum_{i=1}^k \mu(A_i).$$

Weil  $B_i \subseteq B_{i+1}$ , (2) gilt auch:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) = \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right). \quad \square$$

## 4.2 Blatt 2

**Aufgabe 113.** (Maß über  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ) Für  $\lambda \in \mathbb{R}$  definiere

$$\mu_{\lambda} : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \mu_{\lambda}(A) := \sum_{k \in A} \exp(\lambda) \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Bestimmen Sie jeweils alle  $\lambda \in \mathbb{R}$ , für die

- (a)  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu_{\lambda})$  ein Maßraum ist.  
 (b)  $\mu_{\lambda}$  ein endliches Maß ist.  
 (c)  $\mu_{\lambda}$  ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

*Beweis.* (a)  $\mu_{\lambda}$  ist auf jedem Fall für endliche Teilmengen von  $\mathbb{N}$  wohldefiniert.

Weil  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$  konvergiert (absolut) für alle  $\lambda \in \mathbb{R}$ , konvergiert absolut alle Teilfolge.

$\mu_{\lambda}$  ist auch trivialerweise additiv, weil es eine Summe ist.

(b) Das passt für  $\lambda \in \mathbb{R}$ , weil

$$\sum_{k=1}^{\infty} \exp(\lambda) \frac{\lambda^k}{k!} = \exp(\lambda)(\exp(\lambda) - 1) < \infty.$$

(c) Wir brauchen

$$\exp(\lambda)(\exp(\lambda) - 1) = 1.$$

oder

$$\exp(\lambda) = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5}).$$

Weil  $\exp(\lambda)$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$  immer positiv ist, gibt es nur eine reelle Lösung:

$$\lambda = \ln \left[ \frac{1}{2} (1 + \sqrt{5}) \right].$$

□

**Aufgabe 114.** (vollständiger Maßraum) Sei  $X$  eine nichtleere Menge,  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $B \in \mathcal{A}$ . Definiere  $\mu_B : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ ,  $\mu_B(A) := \mu(A \cap B)$ .

- (a) Zeigen Sie, dass  $\mu_B$  ein Maß über  $\mathcal{A}$  ist.
- (b) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist  $(X, \mathcal{A}, \mu_B)$  ein vollständiger Maßraum, dann auch  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ .
- (c) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein vollständiger Maßraum, dann auch  $(X, \mathcal{A}, \mu_B)$ .

*Beweis.* (a) In der Übungsblatt 1. haben wir schon bewiesen, dass es wohldefiniert und eine Mengenfunktion ist.

Sei dann  $(A_j)$ ,  $A_j \in \mathcal{A}$  eine Folge disjunkte Menge. Es gilt

$$\begin{aligned} \mu_B \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) &= \mu \left( B \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) \\ &= \underbrace{\mu \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (B \cap A_i) \right)}_{\sigma\text{-additivität von } \mu} = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(B \cap A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_B(A_i) \end{aligned}$$

$\mu_B$  ist dann  $\sigma$ -additiv, und daher Maß.

- (b) Ja. Sei  $\mu(A) = 0$ . Weil  $A \cap B \subseteq A$  ist, gilt auch  $\mu_B(A) = 0$ . Weil  $(X, \mathcal{A}, \mu_B)$  vollständig ist, ist jede Teilmenge  $\mathcal{A} \ni A' \subseteq A$ .  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ist dann vollständig.

(c) Nein. Sei  $X = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{a\}$ ,  $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$ .

Das ist keine  $\sigma$ -Algebra, weil  $x \notin \mathcal{A}$ .

Sei auch  $\mu(\{b, c\}) \neq 0$ ,  $\mu(X) \neq 0$ ,  $\mu(\{a\}) \neq 0$ . Sei außerdem  $\mu_B(A) = \mu(\{a\} \cap A)$ . Dann ist  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  vollständig (es gibt keine Nullmengen), aber  $\mu_B(\{b, c\}) = \mu(\{a\} \cap \{b, c\}) = \mu(\emptyset) = 0$ . Deswegen ist  $\{b, c\}$  eine Nullmenge in  $(X, \mathcal{A}, \mu_B)$ , aber  $\{b\} \subseteq \{b, c\} \notin \mathcal{A}$ .  $\square$

**Aufgabe 115.** (a) Seien  $K_1, K_2 \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  mit  $\emptyset \in K_i$  für  $i = 1, 2$  und  $\nu_i : K_i \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\nu_i(\emptyset) = 0$  für  $i = 1, 2$ . Bezeichne nun mit  $\mu_i^*$  die analog zu Satz 1.37 von  $\nu_i$  induzierten äußeren Maße. Es existiere ein  $\alpha > 0$ , so dass

$$\forall I_1 \in K_1 \exists I_2 \in K_2 : I_1 \subseteq I_2 \text{ und } \alpha \nu_2(I_2) \leq \nu_1(I_1).$$

Zeigen Sie: Für alle  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  gilt  $\alpha \mu_2^*(A) \leq \mu_1^*(A)$ .

(b) Vervollständigen Sie den Beweis zu Satz 1.55: Zeigen Sie, dass

$$\lambda_a^*(A) \leq \lambda_l^*(A) \leq \lambda_n^*(A) \text{ und } \lambda_a^*(A) \leq \lambda_r^*(A) \leq \lambda_n^*(A)$$

für alle  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  gilt.

*Beweis.* (a) Für alle  $\epsilon > 0$  gibt es eine Überdeckung  $(A_{1,j}), A_{1,j} \in K_1$ , für die gilt

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{1,k} &\supseteq A \\ \sum_{k=1}^{\infty} \nu_1(A_{1,k}) &\leq \mu_1^*(A) + \epsilon \end{aligned}$$

Es gibt auch per Hypothese eine Folge  $(A_{2,k}), A_{2,k} \in K_2, A_{2,k} \supseteq A_{1,k}, \alpha \nu_2(A_{2,k}) \leq \nu_1(A_{1,k})$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{2,k} &\supseteq A \\ \sum_{k=1}^{\infty} \alpha \nu_2(A_{2,k}) &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \nu_1(A_{1,k}) < \mu_1^*(A) + \epsilon \end{aligned}$$

Weil das für alle  $\epsilon$  gilt, ist  $\alpha \mu_2^*(A) \leq \mu_1^*(A)$

(b) Es existiert, für jede Elemente  $(a, b) = J \in \mathbb{J}(n)$ , ein Element  $[a, b] \in \mathbb{J}_l(n) \supseteq (a, b)$ , und es gilt  $\text{vol}_n([a, b]) \leq \text{vol}_n((a, b))$ . Für jede Elemente  $[a, b] \in \mathbb{J}_l$  existiert auch  $\bar{\mathbb{J}}(n) \ni [a, b] \supseteq [a, b]$ , für die gilt  $\text{vol}_n([a, b]) \leq \text{vol}_n([a, b])$ . Daraus folgt die Behauptung:

$$\lambda_a^*(A) \leq \lambda_l^*(A) \leq \lambda_n^*(A) \text{ für alle } A \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Ähnlich folgt die andere Teil. Man muss nur  $(a, b]$  statt  $[a, b)$  einsetzen, und alle Aussagen bleiben richtig.  $\square$

**Aufgabe 116.** Zeigen Sie folgende Aussagen über das äußere Lebesgue-Maß:

- (a) Es gilt  $\lambda_n^*(A) = 0$  für alle abzählbaren Mengen  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ .
- (b) Seien  $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$  mit  $\lambda_n^*(B) = 0$ . Dann gilt  $\lambda_n^*(A \cup B) = \lambda_n^*(A)$ .
- (c) Es ist  $\lambda_1^*([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 1$ .
- (d) Es ist  $\lambda_2^*(\mathbb{R} \times \{0\}) = 0$ .

*Beweis.* (a) Sei  $A = \{x_1, x_2, \dots\}$ . Sei auch

$$M_\epsilon = \left\{ \left( x_i - \frac{\epsilon}{2^{i+1}}, x_i + \frac{\epsilon}{2^{i+1}} \right) \mid i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Für jede  $\epsilon > 0$  ist  $M_\epsilon$  eine Überdeckung von  $A$ . Es gilt auch:

$$\begin{aligned} \sum_{B \in M_\epsilon} \text{vol}_n(B) &= \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}_n \left( \left( x_i - \frac{\epsilon}{2^{i+1}}, x_i + \frac{\epsilon}{2^{i+1}} \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^i} \\ &= \epsilon \end{aligned}$$

Weil dann  $\lambda_n^*(A) \leq \epsilon \forall \epsilon > 0$ , ist  $\lambda_n^*(A) = 0$ .

(b) Weil äußere Maße  $\sigma$ -subadditiv sind, gilt

$$\lambda_n^*(A \cup B) \leq \lambda_n^*(A) + \lambda_n^*(B) = \lambda_n^*(A).$$

Weil  $A \subseteq A \cup B$ , gilt  $\lambda_n^*(A) \leq \lambda_n^*(A \cup B)$ . Daraus folgt:

$$\lambda_n^*(A \cup B) = \lambda_n^*(A).$$

(c) Weil  $\{[0, 1]\}$  eine Überdeckung von  $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$  ist, ist  $\lambda_1^*([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \leq 1$ . Wegen subadditivität gilt  $\lambda_1^*([0, 1]) = 1 \leq \lambda_1^*([0, 1]) + \lambda_1^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) \leq \lambda_1^*([0, 1]) + \lambda_1^*(\mathbb{Q})$ . Weil  $\mathbb{Q}$  abzählbar ist, gilt  $\lambda_1^*(\mathbb{Q}) = 0$  und daraus folgt  $1 \leq \lambda_1^*([0, 1])$ . Daher gilt  $\lambda_1^*([0, 1]) = 1$ .

(d) Sei für jeder  $\epsilon > 0$   $M_\epsilon$  die Überdeckung.

$$M_\epsilon = \left\{ \left( \frac{n}{2} - 1, \frac{n}{2} \right) \times \left( -\frac{\epsilon}{2^n}, \frac{\epsilon}{2^n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \left( -\frac{n}{2}, -\frac{n}{2} + 1 \right) \times \left( -\frac{\epsilon}{2^n}, \frac{\epsilon}{2^n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Es gilt  $\sum_{A \in M_\epsilon} \text{vol}_2(A) = 2\epsilon$ . Weil  $M_\epsilon$  für alle  $\epsilon > 0$  eine Überdeckung von  $\mathbb{R} \times \{0\}$  ist, gilt  $\lambda_2^*(\mathbb{R} \times \{0\}) = 0$ .  $\square$



### 4.3 Blatt 3

**Aufgabe 117.** Sei  $\lambda_n^*$  das äußere Lebesgue-Maß und  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

- (a)  $A$  ist  $\lambda_n^*$  messbar.
- (b) Es gilt  $\lambda_n^*(A \cap Q) + \lambda_n^*(A^c \cap Q) = \lambda_n^*(Q)$  für alle  $Q \in \mathbb{J}(n)$ .

*Beweis.*

**Definition 4.1.** Sei  $\mu^*$  ein äußeres Maß auf  $X$ . Eine Menge  $A \subseteq X$  heißt  $\mu^*$ -messbar, falls gilt

$$\mu^*(D) = \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D) \quad \forall D \subseteq X.$$

Weil alle Teilmengen  $I \in \mathbb{J}(n)$  solche Teilmengen  $D \subseteq X$  sind, gilt natürlich (a)  $\implies$  (b). Jetzt bleibt (b)  $\implies$  (a) zu zeigen. Es gibt, für jede  $\epsilon > 0$ , eine abzählbare Überdeckung  $M = \{Q_i, i \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{J}$  aus offene Intervalle von  $D$ , für die gilt  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(Q_i) = \lambda_n^*(D) + \epsilon$ . Für jede  $Q_i \in M$  gilt

$$\lambda_n^*(A \cap Q_i) + \lambda_n^*(A^c \cap Q_i) = \lambda_n^*(Q_i).$$

Außerdem gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A \cap Q_i) + \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A^c \cap Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(Q_i) = \lambda_n^*(D) + \epsilon.$$

Weil  $A \cap Q_i$  bzw.  $A^c \cap Q_i$  eine abzählbare Überdeckung von  $A$  bzw.  $A^c$  ist, gilt für  $Q = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$ :

$$\lambda_n^*(A \cap D) \leq \lambda_n^*(A \cap Q) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A \cap Q_i),$$

und ähnlich

$$\lambda_n^*(A^c \cap D) \leq \lambda_n^*(A^c \cap Q) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A^c \cap Q_i).$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} \lambda_n^*(A \cap D) + \lambda_n^*(A^c \cap D) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A \cap Q_i) + \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A^c \cap Q_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(Q_i) \leq \lambda_n^*(D) + \epsilon \end{aligned}$$

Weil  $\epsilon > 0$  beliebig war, ist

$$\lambda_n^*(A \cap D) + \lambda_n^*(A^c \cap D) \leq \lambda_n^*(D).$$

□

**Aufgabe 118.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \nu)$  ein Maßraum und  $\mu^*$  das von  $(\mathcal{A}, \nu)$  induzierte äußere Maß auf  $X$ , d.h. in Satz 1.37 ist  $K = \mathcal{A}$  und  $\nu = \nu$ . Nach Satz 1.59 induziert  $\mu^*$  ein Maß  $\mu := \mu^*|_{\mathcal{A}(\mu^*)}$  auf der  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A}(\mu^*)$ .

(a) Zeigen Sie, dass  $\mu$  eine sogenannte Erweiterung von  $\nu$  ist, also dass

- (1)  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}(\mu^*)$  und
- (2)  $\mu(A) = \nu(A)$  für alle  $A \in \mathcal{A}$  gilt.

(b) Gilt sogar  $\mu = \nu$ , also  $\mathcal{A} = \mathcal{A}(\mu^*)$ ?

*Beweis.* (a) Wir beweisen zuerst  $\mu(A) = \nu(A)$  für alle  $A \in \mathcal{A}$ . Es genügt zu beweisen, dass  $\nu(A) = \mu^*(A)$ . Es ist klar, dass  $\{A\}$  eine abzählbare Überdeckung von  $A$  ist, und daher  $\mu^*(A) \leq \nu(A)$ . Wir betrachten dann eine abzählbare Überdeckung  $(Q_i), Q_i \in \mathcal{A}, \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \supseteq A$ .  $\mu^*(A)$  ist die Infimum von solchen Folgen von Mengen. Es gilt wegen der Monotonie von  $\mu^*$  und der  $\sigma$ -Additivität von  $\nu$ :  $\sum_{i=1}^{\infty} \nu(Q_i) \geq \nu(A)$ . Daraus folgt

$$\mu(A) = \nu(A) \text{ für alle } A \in \mathcal{A}.$$

Jetzt beweisen wir (1). Sei  $A \in \mathcal{A}$ . Wir müssen zeigen, dass für alle  $D \subseteq X$ , gilt

$$\mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D) = \mu^*(D).$$

Sei  $(Q_i), Q_i \in \mathcal{A}$  eine abzählbare Überdeckung von  $D$ , für die gilt  $\sum_{i=1}^{\infty} \nu(Q_i) \leq \mu^*(D) + \epsilon, \epsilon > 0$  beliebig. Betrachten Sie

$$\mu^*(A \cap Q_i) + \mu^*(A^c \cap Q_i).$$

Weil sowohl  $A$  als auch  $Q_i$  in  $\mathcal{A}$  sind, gilt

$$\mu^*(A \cap Q_i) + \mu^*(A^c \cap Q_i) = \mu^*(Q_i).$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D) &\leq \mu^*(A \cap Q) + \mu^*(A^c \cap Q) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} (\mu^*(A \cap Q_i) + \mu^*(A^c \cap Q_i)) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(Q_i) \leq \mu^*(D) + \epsilon \end{aligned}$$

Weil  $\epsilon > 0$  beliebig war, gilt

$$\mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D) \leq \mu^*(D),$$

also  $A$  ist messbar.

(b) Nein. Sei zum Beispiel  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\sigma}(\mathbb{J}(n))$ , und  $\nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  das eingeschränkte Lebesgue-Maß. Dann ist  $\mu^* = \lambda_n^*$ , und daher  $\mu$  das Lebesgue-Maß. Es gilt aber

$$\{q\} \notin \mathcal{A}_{\sigma}(\mathbb{J}(n)), \quad q \in \mathbb{R},$$

obwohl jede Punktmenge  $\lambda_n^*$  messbar ist. □

## 4.4 Blatt 4

**Aufgabe 119.** (a) Seien  $(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$  messbare Räume,  $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  und  $a \in X$ . Zeigen Sie, dass

$$\{y \in Y \mid (a, y) \in C\} \in \mathcal{B}.$$

- (b) Sei  $K \subseteq \mathbb{R}^m$  kompakt und  $N \subseteq \mathbb{R}^n$  eine  $\lambda_n$ -Nullmenge. Zeigen Sie, dass dann  $K \times N$  eine  $\lambda_{m+n}$ -Nullmenge ist.
- (c) Sei  $M \subseteq \mathbb{R}^m$  eine  $\lambda_m$ -Nullmenge und  $N \subseteq \mathbb{R}^n$  eine  $\lambda_n$ -Nullmenge. Zeigen Sie, dass dann  $M \times N$  eine  $\lambda_{m+n}$ -Nullmenge ist.
- (d) Zeigen Sie Bemerkung 1.71, also dass  $\mathcal{L}(m) \otimes \mathcal{L}(n) \subsetneq \mathcal{L}(m+n)$ .

Hinweis: Sie dürfen hierfür annehmen, dass  $B \notin \mathcal{L}(n)$  tatsächlich existiert.

*Beweis.* (a) Zuerst betrachten wir den Fall, in dem  $C = A \times B \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . Es gilt dann

$$\{y \in Y \mid (a, y) \in C\} = \begin{cases} B & x \in A \\ \emptyset & x \notin A \end{cases}.$$

Weil sowohl  $\emptyset$  als auch  $B$  Elemente von  $\mathcal{B}$  sind, gilt die Aussage für solche Mengen  $C \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ .

Jetzt beweisen wir die Aussage im Allgemeinen: Sei  $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ . Dann gilt entweder:

- (i)  $C$  ist eine abzählbare Vereinigung von Mengen  $C = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i$ , wobei  $A_i \times B_i \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ .
- (ii)  $C$  ist eine abzählbare Schnitt von Mengen  $C = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i$ , wobei  $A_i \times B_i \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ .

Sei dann  $M \subseteq \mathbb{N}$  die Zahlen, sodass  $a \in A_i \iff i \in M$ . Es gilt, in der beiden Fälle

$$\{y \in Y \mid (a, y) \in C\} = \begin{cases} \bigcup_{i \in M} B_i & (i), \\ \bigcap_{i \in M} B_i & (ii). \end{cases}$$

was immer ein Element von  $\mathcal{B}$  ist.

- (b) Sei  $\epsilon > 0$  gegeben, und  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, A_i \in \mathbb{J}(m)$  eine endliche Überdeckung von  $K$ , wobei jedes  $\lambda_m(A_i) < \infty$ .

Das ist immer möglich, weil  $K$  kompakt ist. Wir können dann eine Überdeckung  $(A_i)$  von  $K$  wählen, und die Kompaktheit von  $K$  liefert eine endliche Teilüberdeckung.

Sei dann  $A = \max(\lambda_m(A_1), \lambda_m(A_2), \dots, \lambda_m(A_n))$ . Per Definition ( $N$  ist eine  $\lambda_n$ -Nullmenge) gibt es eine abzählbare Überdeckung  $(B_j), B_j \subseteq \mathbb{R}^n$ , sodass

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n(B_i) < \frac{\epsilon}{nA}.$$

Wir betrachten dann

$$M = \bigcup_{j=1}^n \{A_j \times B_i | i \in \mathbb{N}\},$$

was eine abzählbare Überdeckung von  $K \times N$  ist, aber  $\sum_{C \in M} \lambda_{n+m}(C) < \epsilon$ , also  $K \times N$  ist eine  $\lambda_{n+m}$ -Nullmenge.

(c) Wir haben, für alle Würfel  $I_m \in \mathbb{R}^m$  und  $I_n \in \mathbb{R}^n$ , dass

$$\lambda_{n+m}^*(I_n \times I_m) = \lambda_n^*(I_n) \lambda_m^*(I_m).$$

Sei  $\epsilon > 0$  gegeben. Per Definition gibt es eine Überdeckung  $(B_i), B_i \in \mathbb{R}^n$  von  $N$ , sodass

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \supseteq N \quad \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(B_i) \leq 1.$$

Wir haben daher

$$\lambda_n^* \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(B_i) \leq 1.$$

Sei  $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ . Es ist also  $\lambda_n(B) \leq 1$ . Sei  $(A_i), A_i \in \mathbb{R}^m$  eine Überdeckung von  $M$ , für die gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_m^*(A_i) < \epsilon.$$

Jetzt ist  $A_i \times B$  eine abzählbare Überdeckung von  $N \times M$ , und

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{n+m}^*(A_i \times B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n^*(A_i) < \epsilon,$$

also  $M \times N$  ist eine  $\lambda_{n+m}$ -Nullmenge.

(d) Wie im Skript betrachten wir  $\{0\} \times B, B \notin \mathcal{L}(n)$ . Es gilt  $\{0\} \times B \in \mathcal{L}(m+n)$ , weil  $\{0\} \times B$  eine  $\lambda_{n+m}$ -Nullmenge ist.

Jetzt versuchen wir,  $\{0\} \times B$  als eine abzählbare Schnitt

$$\{0\} \times B \stackrel{?}{=} \bigcap_{i=1}^{\infty} \underbrace{A_i \times B_i}_{\in \mathcal{L}(m) \times \mathcal{L}(n)}$$

darzustellen. Aber

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i = \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \times \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \right),$$

und wir wissen schon, dass es keine Folgen von Mengen  $(B_i), B_i \in \mathcal{B}$  existiert, sodass  $\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = B$ , also  $\{0\} \times B \notin \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ .  $\square$

**Aufgabe 120.** Sei  $A \in \mathcal{L}(n)$ . Beweisen oder widerlegen Sie:

(a) Es gilt

$$\lambda_n(A) = \inf \{ \lambda_n(K) \mid K \supseteq A, K \text{ kompakt} \}.$$

(b) Es gilt

$$\lambda_n(A) = \sup \{ \lambda_n(O) \mid O \subseteq A, O \text{ offen} \}.$$

*Beweis.* (a) Falsch. Betrachten Sie  $A = \mathbb{Q}$ . Weil  $\mathbb{Q}$  nicht beschränkt ist, gibt es keine kompakte Mengen  $K$  mit  $K \supseteq A$ . Deswegen ist

$$0 = \lambda_n(\mathbb{Q}) \neq \inf \{ \lambda_n(K) \mid K \supseteq A, K \text{ kompakt} \} = \infty.$$

**Bemerkung**

Erinnern Sie sich daran, dass wir  $\inf(\emptyset) = \infty$  definieren. Sonst kann man  $\lambda_n(\mathbb{R})$  betrachten.

(b) Falsch. Die Intuition dafür ist, dass

$$\lambda_n(A) = \sup \{ \lambda_n(K) \mid K \subseteq A, K \text{ kompakt} \}$$

Wenn wir eingeschränkte Mengen betrachten, gilt dass, nur wenn  $K$  abgeschlossen ist. Die meistens abgeschlossenen Mengen  $K$  sind der Abschluss einer offenen Menge  $K = \overline{U} = U + \partial U$ . Wir müssen daher nur eine offene Menge finden, sodass  $\partial U$  Maß  $> 0$  hat.

Konkretes Gegenbeispiel: Smith-Volterra-Cantor-Menge.

Wir definieren  $S_0 = [0, 1]$  und weiter induktiv

$$S_n = \bigcup_{k=1}^{2^{n-1}} \left( \left[ a_k, \frac{a_k + b_k}{2} - \frac{1}{2^{2n+1}} \right] \cup \left[ \frac{a_k + b_k}{2} + \frac{1}{2^{2n+1}}, b_k \right] \right),$$

wobei  $0 < a_1 < b_1 < \dots, a_{2^{n-1}}, b_{2^{n-1}}$  durch

$$S_{n-1} = \bigcup_{k=1}^{2^{n-1}} [a_k, b_k]$$

definiert sind. Sei jetzt  $S = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_n$ . Wir beweisen jetzt die Eigenschaften der Menge:

- (i) Alle Intervalle, aus den  $S_n$  besteht, haben die gleiche Länge.

Wir beweisen es per Induktion. Für  $S_0$  ist es trivial, weil es nur ein Intervall gibt. Jetzt nehmen wir an, das es für beliebige  $n \in \mathbb{N}$  gilt, also  $b_k - a_k = \Delta_n \forall k \in 2^{n-1}$ . Es gilt:

$$\frac{a_k + b_k}{2} - \frac{1}{2^{2n+1}} = a_k + \frac{\Delta_{n-1}}{2} - \frac{1}{2^{2n+1}},$$

und auch

$$\frac{a_k + b_k}{2} + \frac{1}{2^{2n+1}} = a_k + \frac{\Delta_{n-1}}{2} + \frac{1}{2^{2n+1}}.$$

Also alle Intervalle haben die Länge

$$\Delta_n = \frac{\Delta_{n-1}}{2} - \frac{1}{2^{2n+1}}.$$

Die Lösung ist

$$\Delta_n = 2^{-(2n+1)}(1 + 2^n).$$

- (ii) Das Innere von  $S$  ist leer.

Wir nehmen an, dass eine offene Intervall  $(a, b) \subseteq S$  gibt. Das Intervall hat Länge  $b - a$ . Aber, weil  $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = 0$  gilt, muss es ein  $S_n$  geben, für das gilt, dass die Intervalle Länge  $< b - a$  haben, also  $(a, b) \not\subseteq S$ .

- (iii) Also  $\{U | U \subseteq S, U \text{ offen}\} = \{\emptyset\}$ .

- (iv)  $\sup \{\lambda_n(O) | O \subseteq S, O \text{ offen}\} = \sup \{0\} = 0$ .

- (v)  $\lambda_n(S) \neq 0$ . In jedem Schritt nehmen wir Intervalle mit Maß

$$\frac{2^n}{2^{2n+2}},$$

also insgesamt nehmen wir Maß

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^{2n+2}} = \frac{1}{2}$$

raus. Daraus folgt  $\lambda_n(S) = \frac{1}{2} \neq 0$ . □

**Aufgabe 121.** (Maße von Matrixbildern)

- (a) Sei  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  eine invertierbare Matrix und  $\mu : \mathcal{B}^n \rightarrow [0, \infty]$  ein Maß. Zeigen Sie, dass  $\mu_S : \mathcal{B}^n \rightarrow [0, \infty], \mu_S(A) := \mu(SA)$  wohldefiniert und ein Maß ist.
- (b) Sei  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  nicht invertierbar. Zeigen Sie, dass  $\lambda_n(SA) = 0$  für alle  $A \in L(n)$  gilt.

*Beweis.* (a) (i) (Wohldefiniert) Wir müssen nur zeigen, dass  $SA$  offen ist. Wir definieren die übliche Norm auf Matrizen  $\|A\| = \sup_{|x|=1} |Ax|$ . Weil  $S$  invertierbar ist, muss  $\|A\| > 0$  gelten. Sei  $x \in A$  und eine  $r$ , sodass  $B_r(x) \subseteq A$ . Sei  $y \in B_r(x)$ . Es gilt

$$|Ay - Ax| \leq \|A\| |y - x| \leq \|A\| r$$

also  $B_{\|A\|r}(Sx) \subseteq SA$ . Daraus folgt, dass  $SA$  offen ist, und  $\mu_S$  wohldefiniert ist.

(ii) Wir haben auch,  $\mu_S(\emptyset) = \mu(S\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$ .

(iii) Sei  $(A_j), A_j \in \mathcal{L}(n)$  eine Folge von messbare Mengen. Wir betrachten

$$\begin{aligned} \mu_S \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) &= \mu \left( S \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu(SA_i) \quad (\sigma\text{-Additivität von } \mu) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu_S(A_i) \end{aligned}$$

Hier haben wir verwendet, dass  $SA_i$  noch paarweise disjunkt ist, weil  $S$  bijektiv (insbesondere injektiv) ist.

(b)  $\mu_S(A) := \mu(SA)$  ist noch Maß (vorherige Beweis gilt noch): Weil  $S$  nicht invertierbar ist, gibt es einen nichttrivialen Kern. Wir entscheiden uns für ein Vektor  $v_1 \in \ker(S)$ . Dann machen wir eine Basisergänzung, um eine Basis zu konstruieren:

$$B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

Wir bezeichnen  $[0, 1]^n \in \mathcal{L}(n)$  als

$$[0, 1]^n = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid (a_1, a_2, \dots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n\}.$$

für eine Menge  $M$ . Es gilt dann

$$\begin{aligned} S[0, 1]^n &= \{a_1 S(v_1) + a_2 S(v_2) + \dots + a_n S(v_n) \mid (a_1, a_2, \dots, a_n) \in M\} \\ &= \{a_2 S(v_2) + \dots + a_n S(v_n) \mid (a_1, a_2, \dots, a_n) \in M\} \end{aligned}$$

$\{S(v_1), S(v_2), \dots, S(v_n)\}$  ist keine Basis, weil der Nullvektor darin vorkommt (vielleicht mehr als einmal). Wir können jedoch eine Basisergänzung machen, die Nullvektoren einzusetzen. Sei die neue Basis

$$\{u_1, u_2, \dots, u_n\}.$$

Wir nehmen hier zum Beispiel an, dass  $u_i = S(v_i) \forall i \geq 2$ , also wir müssen nur  $S(v_1) = 0$  einsetzen. Das Argument ist gleich, wenn

das nicht stimmt. Sei  $M = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ . Dann ist  $\mu'(A) := \mu(M^{-1}SA)$  ein Maß, und

$$\mu'([0, 1]^n) = \mu(\{\{0\} \times (a_2, a_3, \dots, a_n) \mid (a_1, a_2, \dots, a_n) \in M\}) = 0.$$

Also  $\mu'$  ist ein Bewegungsinvariantes Maß mit  $\mu'([0, 1]^n) = 0$ . Daraus folgt, dass

$$\mu(SA) = 0 \quad \forall A \in \mathcal{L}(n). \quad \square$$

## 4.5 Blatt 5

**Aufgabe 122.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  nicht-negativ und messbar. Es existiere eine Menge  $A \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(A) > 0$  und  $f(x) > 0$  für alle  $x \in A$ . Zeigen Sie, dass ein  $\epsilon > 0$  und eine Menge  $B \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(B) > 0$  existieren, sodass  $f(x) > \epsilon$  für alle  $x \in B$  gibt.

*Beweis.* Wir beweisen es per Widerspruch. Wir nehmen an, dass die Behauptung falsch ist. Dann für jedes  $\epsilon > 0$  ist  $\{f > \epsilon\}$  eine Nullmenge. (Wir wissen, dass die Menge messbar ist, weil  $f$  messbar ist.)

Insbesondere gilt es für alle  $\mathbb{Q} \ni \epsilon > 0$ . Wir bezeichnen  $\mathbb{Q}^+ := \{x \mid x \in \mathbb{Q}, x > 0\}$ . Es gilt

$$A \subseteq \{f > 0\} = \bigcup_{x \in \mathbb{Q}^+} \{f > x\},$$

also

$$\begin{aligned} \mu(A) &\leq \mu(\{f > 0\}) \\ &\leq \sum_{x \in \mathbb{Q}^+} \mu(\{f > x\}) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Q}^+} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

also  $A$  ist eine Nullmenge, ein Widerspruch zu die Annahme, dass  $\mu(A) > 0$ .  $\square$

**Aufgabe 123.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein vollständiger Maßraum und  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  messbar für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Außerdem sei  $(f_n)$  punktweise  $\mu$ -fast überall konvergent, d.h. es existiert ein  $\mu$ -Nullmenge  $N \in \mathcal{A}$  und eine Funktion  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , sodass  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  für alle  $x \in X \setminus N$  gilt. Zeigen Sie, dass  $f$  messbar ist.

*Beweis.* Wir wissen, dass sowohl

$$f_s = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ als auch}$$



$$f_l = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

messbar sind. Es gilt auch  $f_s(x) = f_l(x)$ ,  $\forall x \in X \setminus N$ . Sei jetzt  $U \subseteq \mathbb{R}$  messbar. Es gilt  $f^{-1}(U) = [f^{-1}(U) \cap N^c] \cup [f^{-1}(U) \cap N]$ .

Es ist  $f^{-1}(U) \cap N \in \mathcal{A}$ , weil  $f^{-1}(U) \cap N \subset N$ ,  $N$  ist eine Nullmenge und  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ist vollständig. Es gilt auch

$$f^{-1}(U) \cap N^c = f_{l/s}^{-1}(U) \cap N^c,$$

wobei  $f_{l/s}$  bedeutet, dass entweder  $f_l$  oder  $f_s$  funktioniert (hier möchten wir betonen, dass die beide Funktionen auf  $X \setminus N$  gleich sind). Aber weil  $f_{l/s}$  messbar sind, ist

$$f^{-1}(U) \cap N^c = \underbrace{f_{l/s}^{-1}(U)}_{\in \mathcal{A}} \cap \underbrace{N^c}_{\in \mathcal{A}} \in \mathcal{A}.$$

Es ist dann

$$f^{-1}(U) \in \mathcal{A} \quad \forall U \subseteq \mathbb{R} \text{ messbar},$$

also  $f$  ist messbar. □

**Aufgabe 124.** Sei  $A \subsetneq \mathbb{R}$  nichtleer. Bestimmen Sie alle Funktionen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , welche bezüglich der  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A} := \{\emptyset, A, A^c, \mathbb{R}\}$  messbar sind.

*Beweis.* Es gilt immer  $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ . Außerdem wissen wir aus der Mengentheorie, dass  $f^{-1}(A) \cap f^{-1}(A^c) = \emptyset$ , und das Bild von einer nichtleeren Menge ist immer nichtleer. Die unterschiedliche Funktionen sind

$$\begin{array}{lll} f(A) = A & f(A^c) = A^c & f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}, \\ f(A) = A^c & f(A^c) = A & f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}. \end{array} \quad \square$$

**Aufgabe 125.** Der Beweis von Lemma 1.83 funktioniert anstelle von  $[0, 1]$  auch analog für jede beliebige Lebesgue-messbare Menge in  $\mathbb{R}$ , die keine Nullmenge ist. Das heißt für jede solche Menge existiert eine Teilmenge, die nicht Lebesgue-messbar ist. Sei nun  $f$  die Cantor-Funktion aus Präsenzübung 3 und definiere  $g : [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ ,  $x \rightarrow x + f(x)$ .

Wir definieren die Funktionenfolge  $(f_n)$  durch  $f_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \rightarrow x$  und

$$f_{n+1} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}f_n(3x) & 0 \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}f_n(3x - 2) & \frac{2}{3} \leq x \leq 1. \end{cases}.$$

Dann konvergiert  $f_n$  gleichmäßig gegen eine Grenzfunktion  $f$ .

- (a) Zeigen Sie, dass  $g$  bijektiv und die Umkehrfunktion  $g^{-1}$  messbar ist.
- (b) Zeigen Sie nun, dass der Maßraum  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}^1, \lambda_1|_{\mathcal{B}^1})$  nicht vollständig ist.

*Hinweis: Nutzen Sie eine geeignete nicht Lebesgue-messbare Menge.*

*Beweis.* (a) Wir wissen, dass  $f$  stetig und monoton wachsend ist. Daraus folgt, dass  $x \mapsto x + f(x)$  stetig und *streng* monoton wachsend ist. Es gilt auch  $g(0) = 0$  und  $g(1) = 2$ .

Das  $g$  surjektiv ist folgt aus dem Zwischenwertsatz.  $g$  ist auch injektiv. Sei  $x > y$ . Dann gilt  $g(x) > g(y)$ , insbesondere  $g(x) \neq g(y)$ .

Es gilt  $(g^{-1})^{-1} = g$ , also wir betrachten eine messbare Teilmenge von  $[0, 1]$ .

□

## 4.6 Blatt 6

**Aufgabe 126.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum,  $\alpha > 0$  und  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  messbar. Zeigen Sie:

- (a) Ist  $f$  nichtnegativ so gilt

$$\mu(\{f \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int f \, d\mu.$$

- (b) Ist  $f$  integrierbar, so haben  $\{f \geq \alpha\}$  und  $\{f \leq -\alpha\}$  endliches Maß.

*Beweis.* (a) Sei  $A = \{f \geq \alpha\}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int f \, d\mu &= \int (f\chi_A + f\chi_{A^c}) \\ &= \int_A f \, d\mu + \int_{A^c} f \, d\mu \\ &\geq \int_A f \, d\mu & \int_{A^c} f \, d\mu \geq 0, \text{ weil } f \text{ nichtnegativ ist.} \\ &\geq \int_A \alpha \, d\mu & f(x) \geq \alpha \, \forall x \in A \\ &= \alpha \mu(A) \end{aligned}$$

Also

$$\mu(\{f \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int f \, d\mu.$$

- (b) Wir beweisen es per Kontraposition, also wir nehmen an, dass  $\{f \geq \alpha\}$  oder  $\{f \leq -\alpha\}$  unendliches Maß hat. (Der Fall, in dem die beide unendliches Maß haben ist nicht ausgeschlossen.)

Wir nehmen an, dass  $\{f \geq \alpha\}$  unendliches Maß hat. Sei  $A = \{f \geq \alpha\}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int f^+ d\mu &= \int_A f^+ d\mu + \int_{A^c} f^+ d\mu \\ &\geq \int_A f^+ d\mu \\ &\geq \int_A \alpha d\mu \\ &= \alpha \mu(A) \\ &= \infty \end{aligned}$$

Dann ist  $\int f^+ d\mu = \infty$ , also  $f$  ist nicht integrierbar. Sei jetzt ähnlich  $A = \{f \leq -\alpha\}$ . Wenn  $A$  unendliches Maß hat, ist

$$\begin{aligned} \int f^- d\mu &= \int_A f^- d\mu + \int_{A^c} f^- d\mu \\ &\leq \int_A f^- d\mu \\ &\leq \int_A (-\alpha) d\mu \\ &= (-\alpha) \mu(A) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Also  $\int f^- d\mu = -\infty$ , und  $f$  ist noch einmal nicht integrierbar.  $\square$

**Aufgabe 127.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum,  $N, A, B \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(N) = 0 = \mu(A \cap B)$  und  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  integrierbar. Sei außerdem  $(f_j)$  eine Folge integrierbarer Funktionen von  $X$  nach  $\overline{\mathbb{R}}$  mit  $f_j \geq 0$   $\mu$ -fast überall und  $\sum_{j=1}^{\infty} f_j$  integrierbar. Zeigen Sie folgende Eigenschaften des Integrals:

- (a)  $\int_N f d\mu = 0$
- (b)  $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ .
- (c)  $\int \left( \sum_{j=1}^{\infty} f_j \right) d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_j d\mu$ .

*Beweis.* (a) Es gilt  $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$ . Sei dann  $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  die konstante Funktion mit  $g(x) = \infty \forall x \in X$ . Weil es konstant ist, ist  $g$  messbar. Es ist klar, dass  $|f(x)| \leq g(x) \forall x \in X$ , insbesondere für alle  $x \in N$ . Dann ist

$$\left| \int_N f d\mu \right| \leq \int_N |f| d\mu \leq \int_N g d\mu.$$

Wir müssen nur zeigen, dass  $\int_N g d\mu = 0$ . Sei  $g_j$  eine Folge einfache Funktionen, mit

$$g_j(x) = j \forall x \in X.$$

Dann konvergiert  $g_j$  gegen  $g$ , und für alle  $j$  gilt

$$\int_N g_j \, d\mu = j\mu(N) = j(0) = 0.$$

Per Definition gilt dann

$$\int_N g \, d\mu = 0,$$

und die Behauptung folgt.

(b) Es gilt

$$\begin{aligned} \int_{A \cup B} f \, d\mu &= \int \chi_{A \cup B} f \, d\mu \\ &= \int (\chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}) f \, d\mu \\ &= \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu - \int_{A \cap B} f \, d\mu \\ &= \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu \end{aligned} \quad (\text{a})$$

(c) Für endliche Summe wissen wir schon

$$\int \sum_{j=1}^n f_j \, d\mu = \sum_{j=1}^n \int f_j \, d\mu.$$

Sei  $p_n = \sum_{i=1}^n f_i$ .  $p_n$  konvergiert gegen eine Funktion  $p$ , weil  $f_i$  nichtnegativ sind, also die Reihe  $\sum_{i=1}^n f(x)$  ist für alle  $x$  monoton wachsend und in  $\overline{R}$  konvergent. Dann gilt

$$\int p_n \, d\mu \nearrow \int p \, d\mu,$$

also

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu = \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu. \quad \square$$

**Aufgabe 128.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  integrierbar. Definiere die Abbildung

$$\nu : \mathcal{A} \rightarrow \overline{R}, \quad \nu(A) := \int_A f \, d\mu.$$

Zeigen Sie:

(a)  $(X, \mathcal{A}, \nu)$  ist ein endlicher Maßraum.

- (b) Jede  $\mu$ -Nullmenge ist auch eine  $\nu$ -Nullmenge.
- (c) Gilt  $f > 0$   $\mu$ -fast überall, so ist jede  $\nu$ -Nullmenge auch eine  $\mu$ -Nullmenge.
- (d) Sei  $f > 0$   $\mu$ -fast überall. Dann ist eine messbare Funktion  $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  genau dann bezüglich  $\nu$  integrierbar, wenn  $gf$  bezüglich  $\mu$  integrierbar ist und in diesem Fall gilt  $\int gf \, d\mu = \int g \, d\nu$ .

*Beweis.* (a) (i) Alle  $\mu$ -messbare Mengen sind auch  $\nu$ -messbar.

Hier müssen wir nur beobachten, dass das Integral über alle  $\mu$ -messbare Mengen definiert ist, also  $\nu$  ist zumindest wohldefiniert.  $\nu(A) \geq 0$  für alle  $A \in \mathcal{A}$ , weil  $f \geq 0$  und daher ist

$$\int_A f \, d\mu \geq 0.$$

(ii)  $\sigma$ -Additivität

Sei  $(A_j), A_j \in \mathcal{A}$  eine Folge paarweise disjunkte Mengen. Dann gilt

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \nu(A_j) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \int_{A_j} f \, d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int \chi_{A_i} f \, d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int \left[ \sum_{i=1}^n \chi_{A_i} \right] f \, d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int \chi_{\bigcup_{i=1}^n A_i} f \, d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{i=1}^n A_i} f \, d\mu \\ &= \int_{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i} f \, d\mu \\ &= \nu \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right). \end{aligned}$$

Also  $\nu$  ist  $\sigma$ -additiv.

(iii) Endlich

Es gilt

$$\int_X f \, d\mu = \underbrace{\int_X f^+ \, d\mu}_{< \infty} < \infty,$$

also  $\nu(X)$  ist endlich, und  $\nu$  ist ein endlicher Maßraum.

(b) Sei  $N$  eine  $\mu$ -Nullmenge. Es gilt (mit Hilfe von 127(a))

$$\nu(N) = \int_N f \, d\mu = 0.$$

(c) Sei  $N$  eine  $\nu$ -Nullmenge, also

$$\int_N f \, d\mu = 0.$$

Jetzt nehmen wir an, dass  $\mu(N) > 0$ . Wir betrachten  $g = \chi_N f$ . In der letzten Übungsblatt haben wir schon bewiesen, dass es  $\epsilon > 0$  und eine Menge  $B \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(B) > 0$  gibt, sodass  $g(x) > 0 \, \forall x \in B$ . Es ist klar, dass  $B \subseteq N$ , weil  $g$  außerhalb  $N$  null ist. Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_N f \, d\mu &\geq \int_B f \, d\mu \\ &\geq \int_B \epsilon \, d\mu \\ &= \epsilon \mu(B) \\ &> 0 \end{aligned}$$

was ein Widerspruch zu die Annahme ist. Also wenn  $\nu(N) = 0$  ist auch  $\mu(N) = 0$ .

(d) Sei  $s$  eine einfache Funktion mit Darstellung  $s = \sum x_i A_i, A_i \in \mathcal{A}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int s \, d\nu &= \sum x_i \nu(A_i) \\ &= \sum x_i \int_{A_i} f \, d\mu \\ &= \int \sum x_i \chi_{A_i} f \, d\mu \\ &= \int s f \, d\mu \end{aligned}$$

Sei  $(g_j^+)$  eine Folge einfache Funktionen, die gegen  $g^+$  konvergiert. Es gilt

$$\begin{aligned} \int g^+ \, d\nu &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int g_j^+ \, d\nu \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int g_j^+ f \, d\mu \end{aligned}$$

Ähnlich gilt, für  $g_j^- \searrow g^-$ , dass

$$\int g^- \, d\nu = \lim_{j \rightarrow \infty} \int g_j^- f \, d\mu.$$

Also ist  $\int g^+ d\nu$  bzw.  $\int g^- d\nu$  endlich genau dann, wenn  $\int g^+ f d\mu$  bzw.  $\int g^- f d\mu$  endlich ist. Dann ist  $g$  bzgl.  $\nu$  integrierbar genau dann, wenn  $gf$  bzgl.  $\mu$  integrierbar ist und in diesem Fall ist das Integral

$$\int g d\nu = \int gf d\mu. \quad \square$$

## 4.7 Blatt 7

**Aufgabe 129.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  integrierbar. Zeigen Sie:

- (a) Für  $(E_j) \subseteq \mathcal{A}$  paarweise disjunkt mit  $E := \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$  gilt

$$\int_E f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f d\mu.$$

- (b) Sei nun  $X := \mathbb{R}$  und  $A_n := \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq n\} = (-\infty, -n] \cup [n, \infty)$ . Für alle  $\epsilon > 0$  existiert ein  $N \in \mathbb{N}$ , sodass

$$\left| \int_{A_n} f d\mu \right| < \epsilon$$

für alle  $n \geq N$  gilt.

*Beweis.* (a) Wir wissen (Satz 2.39), dass  $|f|$  integrierbar ist mit Integral  $\int |f| d\mu < \infty$ .

Wir betrachten dann die Funktionfolge

$$f_n = \sum_{j=1}^n \chi_{E_j} f.$$

$f_n$  konvergiert gegen  $f$ , und es gilt  $|f_n(x)| \leq |f(x)|$  für alle  $x$ , also die Folge ist durch  $|f(x)|$  dominiert. Es folgt:

$$\begin{aligned} \int_E f d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_E f_n d\mu \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_{E_j} \sum_{j=1}^n f d\mu \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f d\mu. \end{aligned}$$

- (b) Es gilt  $\left| \int_{A_n} f \, d\mu \right| \leq \int_{A_n} |f| \, d\mu$ , also wir müssen es nur für  $|f|$  beweisen. Wir betrachten die Funktionfolge  $g_n = \chi_{A_n} |f|$ .  $g_n$  konvergiert gegen 0 für alle  $x$ . Außerdem gilt  $|g_n| \leq f$  für alle  $n$ . Wir verwenden dann den dominierte konvergenz Satz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f| \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \int 0 \, d\mu = 0.$$

Aus dem Definition von Konvergenz einer Folge bekommen wir für jedes  $\epsilon > 0$  eine ganze Zahl  $N \in \mathbb{N}$ , so dass

$$\int_{A_n} |f| \, d\mu < \epsilon$$

für alle  $n \geq N$ . □

**Aufgabe 130.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein endlicher Maßraum,  $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge integrierbare Funktionen, die gleichmäßig gegen ein Funktion  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert.

- (a) Zeigen Sie, dass  $f$  integrierbar ist mit

$$\int f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

- (b) Zeigen Sie, dass auf Voraussetzung  $\mu(X) < \infty$  im Allgemein nicht verzichtet werden kann.

*Beweis.* (a)  $f$  ist messbar (Folgerung 2.25).

Sei  $\epsilon > 0$  beliebig. Wir bezeichnen mit  $\epsilon$  gleichzeitig eine Zahl und die konstante Funktion  $\epsilon(x) = \epsilon \, \forall x \in X$ .

$\epsilon$  ist integrierbar, weil  $\int |\epsilon| \, d\mu = |\epsilon| \mu(X) < \infty$ . Dann ist  $|f| + \epsilon := g$  integrierbar. Weil  $f_k$  gleichmäßig konvergiert, gibt es  $N \in \mathbb{N}$ , so dass  $|f(x) - f_n(x)| < \epsilon$  für alle  $n \geq N$ . Das heißt, dass

$$|f_n(x)| \leq |f(x)| + \epsilon.$$

Dann ist die Funktionfolge für alle  $n \geq N$  durch  $g$  dominiert:  $|f_n| \leq g$ . Weil nur das Verhalten für  $n$  groß wichtig für Konvergenz ist, können wir den Satz von dominierte Konvergenz verwenden, also

$$\int f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

- (b) Wir betrachten  $(1, \infty)$  mit den eingeschränkten Lebesgue  $\sigma$ -Algebra und Maß. Sei  $\epsilon_j$  eine Folge,  $\epsilon_j \in \mathbb{R}$ ,  $\epsilon_j \searrow 0$  und die Funktionfolge

$$f_j(x) = \frac{1}{x^{1+\epsilon_j}}.$$

Die Folge  $f_j$  konvergiert gegen  $f(x) = 1/x$ . Wir zeigen die Eigenschaften:



- (i) Die Funktionfolge konvergiert gleichmäßig.

Wir berechnen den Fehler für beliebiges  $\epsilon > 0$  :

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x^{1+\epsilon}} \\ &= \frac{x^\epsilon - 1}{x^{1+\epsilon}} \\ \frac{d\Delta(x)}{dx} &= -x^{-2} + (1+\epsilon)x^{-(2+\epsilon)} = 0 \\ -1 + (1+\epsilon)x^{-\epsilon} &= 0 \\ x^{-\epsilon} &= \frac{1}{1+\epsilon} \\ x^\epsilon &= 1+\epsilon \\ x &= (1+\epsilon)^{1/\epsilon} \\ \Delta(x) &\leq \frac{\epsilon}{(1+\epsilon)^{\frac{1+\epsilon}{\epsilon}}} \\ &= \frac{\epsilon}{(1+\epsilon)^{1+1/\epsilon}},\end{aligned}$$

also der Fehler ist durch eine streng monoton fallende Funktion eingeschränkt, und die Folge konvergiert gleichmäßig.

- (ii)
- $f_j$
- ist integrierbar für alle
- $j \in \mathbb{N}$
- .

Dies folgt nicht aus Satz 2.61, weil wir nicht über einem kompakten Intervall integrieren. Wir wissen nur, dass das Riemannintegral konvergent ist. Sei  $j$  fest und definiere

$$f_{j,n} = \chi_{[1,n]} f_j.$$

Dann stimmt das Lebesgue-Integral mit das Riemann-Integral für alle  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Die Funktionfolge ist auch durch  $f_j$  dominiert, also

$$\begin{aligned}\int f_j \, d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{j,n} \, d\mu && \text{dominierte Konvergenz} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} R - \int_1^n f_j(x) \, dx && \text{Satz 2.61} \\ &= R - \int_1^\infty f_j(x) \, dx && \text{Definition}\end{aligned}$$

Weil wir wissen, dass das uneigentliche Riemann-Integral existiert, ist  $f_j$  auch integrierbar für alle  $j \in \mathbb{N}$ .

- (iii) Ähnlich haben wir

$$\int \frac{1}{x} \, d\mu = R - \int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx.$$

Weil das Riemann-Integral auf der rechten Seite nicht existiert, ist  $\frac{1}{x}$  auch nicht Lebesgue-integrierbar.  $\square$

**Aufgabe 131.** (a) Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein  $\sigma$ -endlicher Maßraum mit  $\mu(X) > 0$ . Zeigen Sie, dass dann eine messbare Funktion  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  existiert mit  $f > 0$  auf  $X$  und  $0 < \int |f| d\mu < \infty$ .

(b) Geben Sie einen Maßraum an, für den  $\mathcal{L}^1(\mu) = \{0\}$  gilt.

*Beweis.* (a) Per Definition gibt es eine Folge  $(A_j), A_j \in \mathcal{A}$ , so dass alle  $A_j$  endliche Maß haben und  $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = X$ . Wir definieren  $f = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2^{-j}}{\mu(A_j)} \chi_{A_j}$ . Per Definition als eine Reihe von einfache Funktionen gilt ( $f$  ist positiv, also wir müssen kein Betrag schreiben):

$$\int f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2^{-j}}{\mu(A_j)} \mu(A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}.$$

Die Summe konvergiert und ist endlich.

(b)  $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \mu)$ , wobei

$$\mu(X) = \begin{cases} 0 & X = \emptyset \\ \infty & \text{sonst.} \end{cases}.$$

Sei  $f \neq 0$ , also es gibt ein Punkt  $x_0 \in \mathbb{R}$ , so dass  $|f(x_0)| > 0$ . Es gilt  $|f| \geq |f(x_0)| \chi_{\{x_0\}}$ . Es gilt auch

$$\int |f(x_0)| \chi_{\{x_0\}} d\mu = |f(x_0)| \mu(\{x_0\}) = \infty,$$

also  $f$  ist nicht in  $\mathcal{L}^1(\mu)$ . □

**Aufgabe 132.** (a) Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $A, B \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(A) < \infty$  und  $\mu(B) < \infty$ . Zeigen Sie, dass dann  $|\mu(A) - \mu(B)| \leq \mu(A \triangle B)$  gilt.

(b) Seien  $(X, \mathcal{A})$  und  $(Y, \mathcal{B})$  messbare Räume und  $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  sei  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -messbar. Zeigen Sie, dass dann für jedes  $x \in X$  die Funktion  $f_x(y) := f(x, y)$   $\mathcal{B}$ -messbar ist.

*Beweis.* (a) Es gilt  $\mu(A \triangle B) = \mu(A) + \mu(B) - 2\mu(A \cap B)$ . Wir nehmen oBdA an, dass  $\mu(A) \geq \mu(B)$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} |\mu(A) - \mu(B)| &\leq \mu(A) - \mu(B) \\ &= \mu(A) + \mu(B) - 2\mu(B) \\ &\leq \mu(A) + \mu(B) - 2\mu(A \cap B) \end{aligned}$$

da  $A \supseteq A \cap B \subseteq B$  und daher  $\mu(A) \geq \mu(A \cap B) \leq \mu(B)$ .

(b) Wir betrachten  $C = \{f \leq k\} \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  (weil  $f$  messbar ist). Sei  $x \in X$  beliebig. Es gilt

$$\{f_x \leq k\} = \{y | f(x, y) \leq k\} = \{y | (x, y) \in C\}.$$

Aber wir wissen aus Übungsblatt 4, Aufgabe 1(a), dass die Menge  $\{y | (x, y) \in C\}$   $\mathcal{B}$ -messbar ist, also  $f_x$  ist messbar für alle  $x \in X$ . □

## 4.8 Blatt 8

**Aufgabe 133.** Seien  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ,  $(Y, \mathcal{B}, \nu)$  und  $(Z, \mathcal{C}, \eta)$   $\sigma$ -endliche Maßräume. Definiere  $A \otimes B \otimes C := \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \boxtimes \mathcal{C})$ . Zeigen Sie:

- (a) Es gilt  $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \otimes \mathcal{C} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C} = \mathcal{C} \otimes (\mathcal{B} \otimes \mathcal{C})$ .

*Hinweis: Betrachten Sie  $\Pi_*(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C})$  mit*

$$\Pi : X \times Y \times Z \rightarrow X \times Y, \quad \Pi(x, y, z) := (x, y).$$

- (b) Es gilt  $(\mu \otimes \nu) \otimes \eta = \mu \otimes (\nu \otimes \eta)$  auf  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C}$ .

*Beweis.* (a) Per Hinweis betrachten wir  $\Pi_*(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C})$ . Sei  $P \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ .

$P \in \Pi_*(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C})$  genau dann, wenn  $P \times Z \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C}$ .

□

**Aufgabe 134.** Sei  $x_0 \in \mathbb{R}^2$ ,  $a < b \in \mathbb{R}$ ,  $r : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$  eine stetige Funktion und

$$A := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 < r(z)^2, z \in [a, b]\}.$$

- (a) Bestimmen Sie  $\lambda_2(B_R(x_0))$  für  $R > 0$  mittels dem Satz von Fubini.

- (b) Zeigen Sie:

$$\lambda_3(A) = \pi \int_a^b r(z)^2 \, dz.$$

*Beweis.* (a) Aus Bewegungsinvarianz des Lebesgue-Maßes genügt es,  $B_R(0)$  zu betrachten. Per Definition ist es definiert durch

$$x^2 + y^2 < R^2.$$

Insbesondere ist, für jedes  $x \in [-1, 1]$ ,

$$\{y \mid (x, y) \in B_R(0)\} = [-\sqrt{R^2 - x^2}, \sqrt{R^2 - x^2}].$$

Aus Satz 2.81 folgt

$$\begin{aligned} \lambda_2(B_R(0)) &= \int_{-R}^R \lambda_1([- \sqrt{R^2 - x^2}, \sqrt{R^2 - x^2}]) \, dx \\ &= \int_{-R}^R 2\sqrt{R^2 - x^2} \, dx \end{aligned}$$

Die Funktion ist Riemann-integrierbar, also wir dürfen Sätze vom Riemann-Integral verwenden. Hier integrieren wir es per Substitution. Sei  $x = R \sin \theta$ ,  $dx = R \cos \theta \, d\theta$ . Wenn  $x = -R$ , ist  $\theta = -\pi/2$  und wenn  $x = R$  ist  $\theta = \pi/2$ .

$$\lambda_2(B_R(0)) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2R\sqrt{1 - \sin^2 \theta} R \cos \theta \, d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2R^2 \cos^2 \theta \, d\theta \\
&= 2R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} \, d\theta \\
&= 2R^2 \left[ \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\theta}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\
&= 2R^2 \left[ \sin \pi - \sin 0 + \frac{\pi}{2} \right] \\
&= \pi R^2 \\
&= \lambda_2(B_R(x_0))
\end{aligned}$$

(b) Wir vorher ist  $(\mathbb{R}, \mathcal{L}(1), \lambda_1)$   $\sigma$ -endlich. Das Innere der Menge  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 < r(z)^2, z \in (a, b)\}$  ist offen und daher messbar. Da  $A$  das Innere mit eine Nullmenge hinzugefügt ist, ist  $A$  auch messbar. Wir können daher das Maß als Integral schreiben:

$$\begin{aligned}
\lambda_3(A) &= \int_{[a,b]} A_z \, d\lambda_1 \\
&= \int_{[a,b]} \pi r(z)^2 \, d\lambda_1 \\
&= \pi \int_a^b r(z)^2 \, dz. \quad \square
\end{aligned}$$

**Aufgabe 135.** Seien  $a, b, c \in \mathbb{R}$  mit  $c \geq |a| + |b|$ . Definiere

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 < 1, 0 \leq z \leq ax + by + c\}.$$

Bestimmen Sie  $\lambda_3(E)$ .

*Beweis.* Ähnlich betrachten wir  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 < 1, 0 < z < ax + by + c\}$ . Da die Menge offen ist, ist sie messbar. Weil  $E$  gleich die Menge mit eine Nullmenge hinzugefügt ist, ist  $E$  auch messbar. Wir schreiben dann das Maß als Doppel bzw. Tripelintegral. Hierbei nutzen wir, dass  $x^2 \leq 1$ , also  $x \in (-1, 1)$  aus die Gleichung  $x^2 + y^2 < 1$ . Sei  $x$  fest. Dann ist  $y^2 < 1 - x^2$ , also  $y \in (-\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - x^2})$ .

$$\begin{aligned}
\lambda_3(E) &= \int_{-1}^1 \lambda_2(E_x) \, d\lambda_1(x) && \text{Satz 2.81} \\
&= \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \lambda_1([0, ax + by + c]) \, d\lambda_1(y) \, d\lambda_1(x) && \text{Satz 2.81} \\
&= \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (ax + by + c) \, d\lambda_1(y) \, d\lambda_1(x) \\
&= \int_{-1}^1 [axy + by^2/2 + cy]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \, d\lambda_1(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^1 2ax\sqrt{1-x^2} + 2c\sqrt{1-x^2} d\lambda_1(x) \\
&= 2 \int_{-1}^1 (ax+c)\sqrt{1-x^2} d\lambda_1(x) \\
&= 2 \left[ \int_{-1}^1 (ax)\sqrt{1-x^2} dx + c \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \right] \\
&= 2c \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \qquad x\sqrt{1-x^2} \text{ ist ungerade} \\
&= c\pi. \qquad \square
\end{aligned}$$

**Aufgabe 136.** Seien  $B_1 := B_1(0, 0, 0) \subseteq \mathbb{R}^3$  und  $B_2 := B_1(0, 0, 1) \subseteq \mathbb{R}^3$  die offenen Kugeln mit Radius 1 um die Punkte  $(0, 0, 0)$  und  $(0, 0, 1)$ . Bestimmen Sie  $\lambda_3(B_1 \cap B_2)$ .

*Beweis.* Per Definition ist

$$\begin{aligned}
B_1 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 < 1\} \\
B_2 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + (z-1)^2 < 1\}
\end{aligned}$$

Weil  $\lambda_1$  bzw. das Lebesgue-Maß  $\sigma$ -endlich ist, werden wir das Maß als Integral gemäß Satz 2.81 schreiben. Daher betrachten wir  $(B_1 \cap B_2)_z$  für beliebiges  $z \in [0, 1]$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
(B_1 \cap B_2)_z &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < \min(1 - (z-1)^2, 1 - z^2)\} \\
&= B_{\min(\sqrt{1-(z-1)^2}, \sqrt{1-z^2})}(0) \subseteq \mathbb{R}^2
\end{aligned}$$

Offenbar ist

$$\min(\sqrt{1-(z-1)^2}, \sqrt{1-z^2}) = \begin{cases} \sqrt{1-z^2} & z \geq 1/2, \\ \sqrt{1-(z-1)^2} & z \leq 1/2. \end{cases}$$

Aus 134 ist  $\lambda_2(B_R(0)) = \pi R^2$ . Dann ist

$$\begin{aligned}
\lambda_3(B_1 \cap B_2) &= \int_0^1 \lambda_2(B_{\min(\sqrt{1-(z-1)^2}, \sqrt{1-z^2})}(0)) d\lambda_1(z) \\
&= \int_0^1 \pi \min(\sqrt{1-(z-1)^2}, \sqrt{1-z^2})^2 d\lambda_1(z) \\
&= 2 \int_{1/2}^1 \pi(1-z^2) d\lambda_1(z) \\
&= 2\pi(z - z^3/3)|_{1/2}^1 \\
&= \frac{5\pi}{12}. \qquad \square
\end{aligned}$$

## 4.9 Blatt 9

**Aufgabe 137.** Sei

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \rightarrow \frac{x^2}{y^2},$$

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 2, xy \geq 1\}.$$

Bestimmen Sie  $\int_A f \, d\lambda_2$ .

*Beweis.* Zuerst zeigen wir:  $f$  ist messbar. Wir betrachten dazu  $\{f < \alpha\}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha > 0$  (Wenn  $\alpha \leq 0$  ist die Menge die Leermenge, weil  $f \geq 0$  stets). Es gilt dann

$$x^2 < \alpha y^2$$

$$|x| < \sqrt{\alpha} |y|$$

Dann ist  $\{f < \alpha\}$  eine Borelmenge, also  $f$  ist messbar.

Ähnlich wie in Übungen 8.2 ist  $A$  eine Borelmenge. Die dritte Voraussetzung kann umgeformt werden:

$$y \geq 1/x$$

$$x \geq y \geq 1/x$$

was nur möglich ist, wenn  $2 \geq x \geq 1$  und in diesem Fall ist der Schnitt  $\{y \mid (x, y) \in A\}$  nichtleer. Also wir berechnen das Integral über die Teilmenge nach der Präsenzübung

$$\begin{aligned} \int_A f \, d\lambda_2 &= \int_{[1,2]} \int_{A_x} f \, d\lambda_1 \\ &= \int_1^2 \int_{1/x}^x \frac{x^2}{y^2} \, d\lambda_1(y) \, d\lambda_1(x) \\ &= \int_1^2 -x^2 y^{-1} \Big|_{1/x}^x \, d\lambda_1(x) \\ &= \int_1^2 x^2 \left( x - \frac{1}{x} \right) \, d\lambda_1(x) \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 \\ &= \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 138.** Sei


$$A := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, \frac{1}{2}(x+y)^2 + z^2 \leq 1 \right\}.$$

Bestimmen Sie  $\lambda_3(A)$ .


*Hinweis: Rotation*

*Beweis.*  $A$  ist eine Borelmenge und daher messbar. Wir schreiben  $A_z$ . Es gilt

$$\begin{aligned} 1 &\geq \frac{1}{2}(x+y)^2 + z^2 \\ 2(1-z^2) &\geq (x+y)^2 \\ |x+y| &\leq \sqrt{2}\sqrt{1-z^2} \end{aligned}$$



Wir rotieren dann das Koordinatensystem wie im Diagramm.



Das Maß der blauen Region ist

$$\frac{1}{2} \sin^{-1} |z| - \frac{1}{2} |z| \sqrt{1-z^2},$$

also das Maß von  $A_z$  ist

$$\begin{aligned}\lambda_2(A_z) &= \pi(1)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \left( \sin^{-1} |z| - |z| \sqrt{1 - z^2} \right) \\ &= \pi - 2 \left( \sin^{-1} |z| - |z| \sqrt{1 - z^2} \right)\end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned}\lambda_3(A) &= \int_{-1}^1 \pi - 2(\sin^{-1} |z| - |z| \sqrt{1 - z^2}) dz \\ &= 2 \int_0^1 \pi - 2(\sin^{-1} |z| - |z| \sqrt{1 - z^2}) dz \\ &= 2 \int_0^1 \pi - 2(\sin^{-1} z - z \sqrt{1 - z^2}) dz \\ &= 2 \left[ \int_0^1 \pi dz - 2 \int_0^1 \sin^{-1} z dz + 2 \int_0^1 z \sqrt{1 - z^2} dz \right] \\ &= 2 \left[ \pi - 2 \int_0^1 \sin^{-1} z dz + 2 \int_0^1 z \sqrt{1 - z^2} dz \right].\end{aligned}$$

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sin^{-1} z dz &= z \sin^{-1} z \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{z}{\sqrt{1 - z^2}} dz \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{z}{\sqrt{1 - z^2}} dz \\ &\quad u = 1 - z^2, \quad du = -2z dz \\ \int_0^1 \sin^{-1} z dz &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_1^0 \frac{1}{\sqrt{u}} du \\ &= \frac{\pi}{2} + \sqrt{u} \Big|_1^0 \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \\ \int_0^1 z \sqrt{1 - z^2} dz &= -\frac{1}{2} \int_1^0 \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Eingesetzt:

$$\lambda_3(A) = 2 \left[ \pi - 2 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right) + \frac{2}{3} \right]$$



$$\begin{aligned}
&= 2\pi - 4 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right) + \frac{4}{3} \\
&= 2\pi - 2\pi + 4 + \frac{4}{3} \\
&= \frac{16}{3}.
\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 139.** Sei  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ein invertierbare Matrix und  $a \in \mathbb{R}^n$ . Definiere damit die Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \rightarrow a + Sx$ . Sei außerdem  $A \in \mathcal{L}(n)$  und  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   $\mathcal{L}(n) - B^1$  messbar, sodass  $\chi_{\varphi(A)} f$   $\lambda_n$  integrierbar ist. Zeigen Sie, dass dann  $\chi_A(f \circ \varphi)$   $\lambda_n$ -integrierbar ist mit

$$\int_{\varphi(A)} f \, d\lambda_n = |\det(S)| \int_A (f \circ \varphi) \, d\lambda_n.$$

*Hinweis: Lemma 2.92*

*Beweis.* Nach Satz 1.83 und Bewegungsinvarianz ist  $\varphi(A)$  messbar mit Maß  $\lambda_n(\varphi(A)) = |\det(S)|\lambda_n(A)$ .  $\chi_{\varphi(A)}$  ist dann messbar. Weil  $\varphi$  affin ist, ist  $\varphi$  stetig und daher messbar. Dann ist  $f \circ \varphi$  messbar, und als Produkt von messbaren Funktionen ist  $\chi_A(f \circ \varphi)$   $\lambda_n$ -messbar.

Wir verwenden Lemma 2.93 und betrachten  $f^+$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\int_{\varphi(A)} f^+ \, d\mu &= \int f^+ \chi_{\varphi(A)} \, d\mu \\
&= \int_{(0, +\infty)} \mu(\{x : f^+(x) \chi_{\varphi(A)} > t\}) \, d\lambda_1(t) \\
&= \int_0^\infty \mu(\{x : x \in \varphi(A) \wedge f^+(x) > t\}) \, d\lambda_1(t) \\
&= \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(x) > t\} \cap \varphi(A)) \, d\lambda_1(t)
\end{aligned}$$

Weil  $\varphi$  bijektiv ist, gibt es für jedes Punkt  $x \in \varphi(A)$ ,  $f^+(x) > t$  auch ein Punkt  $y := \varphi^{-1}(x)$ ,  $y \in A$ ,  $f^+(\varphi(y)) > t$  und andersherum. Daher ist

$$\{x : x \in \varphi(A) \wedge f^+(x) > t\} = \varphi(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\}).$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
\int_{\varphi(A)} f^+ \, d\mu &= \int_0^\infty \mu(\varphi(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\})) \\
&= \int_0^\infty |\det(S)| \mu(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\}) \, d\lambda_1(t) \\
&\quad (\text{Satz 1.83 und Bewegungsinvarianz}) \\
&= |\det(S)| \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(\varphi(x)) > t\} \cap A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= |\det(S)| \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(\varphi(x))\chi_A(x) > t\}) d\lambda_1(t) \\
&= |\det(S)| \int (f^+ \circ \varphi)\chi_A d\lambda_n \\
&= |\det(S)| \int_A (f^+ \circ \varphi) d\lambda_n
\end{aligned}$$

Ähnlich gilt es auch für  $-f^-$  und aus

$$\int_{\varphi(A)} f d\mu = \int_{\varphi(A)} f^+ d\mu - \int_{\varphi(A)} (-f^-) d\mu$$

auch für  $f$ . □

**Aufgabe 140.** Sei  $f \in \mathcal{L}^1(\lambda_n)$ . Für  $h \in \mathbb{R}^n$  definiere die Funktion  $f_h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f_h(x) := f(x + h)$ . Definiere außerdem die Abbildung

$$T_f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}^1(\lambda_n), \quad h \rightarrow f_h.$$

Zeigen Sie:

(a)  $T_f$  ist wohldefiniert.

(b)  $T_f$  ist stetig.

*Hinweis:* Approximieren Sie die Funktion  $f$

*Beweis.* (a) Hier zeigen wir:  $f_h(x) \in \mathcal{L}^1(\lambda_n)$  für alle  $h \in \mathbb{R}^n$ . Wir brauchen zuerst:  $f_h$  ist messbar.

$$\{f_h < \alpha\} = \{f < \alpha\} + h,$$

was messbar ist, was sonst ein Widerspruch zu der Bewegungsinvarianz wäre. Weil  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(n), \lambda_n)$   $\sigma$ -endlich ist, verwenden wir Satz 2.93:

$$\begin{aligned}
\int |f| d\lambda_n &= \int_0^\infty \lambda_n(\{x : |f_h(x)| > t\}) d\lambda_1(t) \\
&= \int_0^\infty \lambda_n(\{x : |f(x)| > t\} + h) d\lambda_1(t) \\
&= \int_0^\infty \lambda_n(\{x : |f(x)| > t\}) d\lambda_1(t) && \text{Bewegungsinvarianz} \\
&= \int |f| d\lambda_n < \infty && \text{Voraussetzung}
\end{aligned}$$

also  $f_h \in \mathcal{L}^1(\lambda_n)$ .

- (b) Nach Satz 2.101 gibt es eine stetige Funktion mit kompaktem Support  $f_\epsilon$ , so dass

$$\|f - f_\epsilon\|_{\mathcal{L}^1(\mu)} < \epsilon.$$

Dann beweisen wir die Behauptung für stetige Funktionen mit kompaktem Träger, also sei  $f$  eine solche Abbildung. Weil  $f$  stetig auf einer kompakten Menge ist, ist  $f$  gleichmäßig stetig. Sei  $A$  der Träger von  $f$ . Sei  $\epsilon > 0$  gegeben. Dann gibt es ein  $\delta < 0$ , so dass  $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$ . Daraus folgt:

$$\|f - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \leq \int \epsilon \, d\lambda_n = \epsilon \lambda_n(A).$$

Weil  $A$  kompakt ist, hat  $A$  endliches Maß. Die Behauptung folgt.

Jetzt sind wir fertig, die Behauptung für beliebiges  $f$  zu beweisen. Wir definieren außerdem  $f_{\epsilon,h} = f_\epsilon(x + h)$ , was auch messbar, stetig und mit kompaktem Support ist. Aus Bewegungsinvarianz gilt

$$\|f_h - f_{\epsilon,h}\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} = \|f - f_\epsilon\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} < \epsilon.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \|f - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} &= \|f - f_\epsilon + f_\epsilon - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \\ &= \|f - f_\epsilon\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} + \|f_\epsilon - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \\ &\leq \epsilon + \|f_\epsilon - f_{\epsilon,h} + f_{\epsilon,h} - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \\ &\leq \epsilon + \|f_\epsilon - f_{\epsilon,h}\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} + \|f_{\epsilon,h} - f_h\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \\ &\leq 2\epsilon + \|f_\epsilon - f_{\epsilon,h}\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} \\ &\leq 3\epsilon \quad |h| < \delta \end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt wir die vorherigen Gezeigten benutzt haben, um  $\delta$  hinreichend klein zu wählen, damit  $\|f_\epsilon - f_{\epsilon,h}\|_{\mathcal{L}^1(\lambda_n)} < \epsilon$  für alle  $|h| < \delta$ .  $\square$

## 4.10 Blatt 10

**Aufgabe 141.** Sei  $R > 0$  und  $a < b$ . Definiere  $Z := B_R(0) \times (a, b) \subseteq \mathbb{R}^3$ , wobei  $B_R(0) \subseteq \mathbb{R}^2$  die (offene) Kreisscheibe um 0 mit Radius  $R$  ist. Definiere außerdem die Abbildung

$$\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(r, \varphi, z) := \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}$$

mit  $U := (0, R) \times (0, 2\pi) \times (a, b)$ .

- (a) Zeigen Sie, dass eine Nullmenge  $N \subseteq \mathbb{R}^3$  existiert, sodass  $\Phi(U) = Z \setminus N$ .

- (b) Zeigen Sie, dass  $\Phi : U \rightarrow Z \setminus N$  ein  $C^1$ -Diffeomorphismus ist mit  $\det(\Phi'(r, \varphi, z)) = r$ .
- (c) Sei  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $f(x, y, z) := z\sqrt{x^2 + y^2}$ . Bestimmen Sie  $\int_Z f \, d\lambda_3$ .

*Beweis.* (a) Hypothese:  $N = [0, R) \times \{0\} \times (a, b)$ .

Wir schreiben

$$\begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in Z.$$

Wir finden die  $(x, y, z)$ , für die die Gleichungen keine Lösung haben. Es ist klar, dass die dritte Gleichung trivialerweise immer erfüllt werden kann.

Jetzt betrachten wir  $(x, y, z) \in N$ . Weil  $y = 0$ , ist  $\sin \varphi = 0$  und  $\varphi = \pi$  ( $\varphi = 0$  ist keine Lösung in  $U$ ). Dann ist  $x = r \cos \varphi = -r$ . Weil  $r > 0$ , ist dann  $x < 0$ , also  $\Phi(U) \subseteq Z \setminus N$ .

Sei jetzt  $(x, y, z)^T \notin N$ . Die (eindeutige) Lösungen sind

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi &= y/x \end{aligned}$$

Man verifiziere sofort, dass  $r$  und  $\varphi$  Lösungen sind und außerdem in  $U$  liegen, insofern  $(x, y, z)^T \notin N$ . Daraus folgt:

$$\Phi(U) = Z \setminus N.$$

Jetzt zeigen wir:  $N$  ist eine Nullmenge. Da  $N \subseteq [0, R) \times (-\epsilon, \epsilon) \times (a, b)$  für alle  $\epsilon > 0$ , ist  $N$  eine Nullmenge.

- (b) Die Ableitung ist

$$\Phi' = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Da die Komponente alle stetig sind, ist  $\Phi'$  stetig, und  $\Phi$  ist stetig differenzierbar. Die Determinante ist

$$\det \Phi' = \begin{vmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r.$$

- (c)

$$\int_Z f \, d\lambda_3 = \int_{Z \setminus N} f \, d\lambda_3 \quad N \text{ Nullmenge}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_U |\det \Phi'| (f \circ \Phi) \, d\lambda_3 \\
&= \int_U r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) \, d\lambda_3 \\
&= \int_U r z \sqrt{(r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2} \\
&= \int_U r^2 z \, d\lambda_3 \\
&= \int_{U_z} \int_a^b r^2 z \, dz \, d\lambda_2 \\
&= \int_{U_z} r^2 (b-a) \, d\lambda_2 \\
&= \int_{(U_z)_\theta} \int_0^{2\pi} r^2 (b-a) \, d\lambda_2 \\
&= \int_{(U_z)_\theta} 2\pi r^2 (b-a) \, d\lambda_2 \\
&= \int_0^R 2\pi r^2 (b-a) \, d\lambda_2 \\
&= 2\pi (b-a) \frac{r^3}{3} \Big|_0^R \\
&= \frac{2}{3} \pi (b-a) R^3. \quad \square
\end{aligned}$$

**Aufgabe 142.** Sei  $R > 0$  und  $K := B_R(0) \subseteq \mathbb{R}^3$ . Definiere die Abbildung

$$\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(r, \theta, \varphi) := \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}$$

mit  $U := (0, R) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi)$ .

- (a) Zeigen Sie, dass eine Nullmenge  $N \subseteq \mathbb{R}^3$  existiert, sodass  $\Phi(U) = K \setminus N$ .
- (b) Zeigen Sie, dass  $\Phi : U \rightarrow K \setminus N$  ein  $C^1$ -Diffeomorphismus ist mit  $\det(\Phi'(r, \theta, \varphi)) = r^2 \sin \theta$ .
- (c) Sei  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $f(x, y, z) := z \sqrt{x^2 + y^2}$  und

$$H := B_R(0) \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq 0\}.$$

Bestimmen Sie  $\int_H f \, d\lambda_3$ .

*Beweis.* (a) Ähnlich ist die Nullmenge  $\{(0, 0, R), (0, 0, -R), (0, 0, 0)\}$ .  
Wir lösen die Gleichungen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}$$

für  $(x, y, z)^T \in B_R(0)$ . Ähnlich ist  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $\tan \theta = (\sqrt{x^2 + y^2})/z$  und  $\tan \varphi = y/x$  eine Lösung, solange  $z \neq \pm R$  (sonst wäre  $\theta = 0$  oder  $\pi$ , welche nicht in  $U$  sind. Das Punkt  $(0, 0, 0)$  ist auch ausgeschlossen, weil  $r$  nicht null sein darf. Als endliche Menge ist  $N$  eine Nullmenge.

(b) Es gilt

$$\Phi' = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ r \cos \theta \cos \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \\ -r \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

Weil alle Komponente stetig sind, ist auch  $\Phi'$  stetig, und  $\Phi$  ist stetig differenzierbar. Für die Determinante führen wir eine Laplaceentwicklung mit der dritten Spalte durch:

$$\begin{aligned} \det \Phi' &= \cos \theta (r^2 \cos \theta \sin \theta \cos^2 \varphi + r^2 \cos \theta \sin \theta \sin^2 \varphi) \\ &\quad + r \sin \theta (r \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + r \sin^2 \theta \sin^2 \varphi) \\ &= r^2 \cos^2 \theta \sin \theta + r^2 \sin^3 \theta \\ &= r^2 \sin \theta \end{aligned}$$

(c) Sei  $U = (0, R) \times (0, \pi/2) \times (0, 2\pi)$ . Es gilt  $\Phi(U) = H \setminus N$ .

$$\begin{aligned} \int_H f \, d\lambda_3 &= \int_{H \setminus N} f \, d\lambda_3 \\ &= \int_U |\det \Phi'| (f \circ \Phi) \, d\lambda_3 \\ &= \int_U (r^2 \sin \theta) r \cos \theta \sqrt{(r \sin \theta \cos \varphi)^2 + (r \sin \theta \sin \varphi)^2} \\ &= \int_U (r^2 \sin \theta) r \cos \theta (r \sin \theta) \\ &= \int_U r^4 \sin^2 \theta \cos \theta \, d\lambda_3 \\ &= \int_{U_\varphi} \int_0^{2\pi} r^4 \sin^2 \theta \cos \theta \, d\varphi \, d\lambda_2 \\ &= \int_{U_\varphi} 2\pi r^4 \sin^2 \theta \cos \theta \, d\lambda_2 \\ &= \int_{(U_\varphi)_\theta} \int_0^{\pi/2} 2\pi r^4 \sin^2 \theta \cos \theta \, d\theta \, d\lambda_1 \\ &= \int_0^R 2\pi r^4 (1/3) \, dr \\ &= \frac{2}{15} \pi r^5 \Big|_0^R \\ &= \frac{2\pi}{15} R^5. \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 143.** Sei  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  symmetrisch und positiv definit. Zeigen Sie, dass

$$\int_{\mathbb{R}^3} \exp(-x^T A x) d\lambda_3 = \frac{\pi^{3/2}}{\sqrt{\det(A)}}.$$

*Beweis.* Da  $A$  symmetrisch ist, ist  $A$  orthogonal diagonalisierbar, also  $A = P^{-1}DP$  bzw.  $A = P^T D P$ , wobei  $P$  orthogonal ist. Die Matrix  $D$  besitzt nur positive Einträge, weil  $A$  positiv definit ist. Dann besitzt  $A$  (mehr als) eine quadratische Würzel. Sei  $A = P^T S S P = P^T S^T S P$ , wobei  $S^2 = D$ .

Es gilt

$$\exp(-x^T A x) = \exp(-x^T P^T S^T S P x) = \exp(-(SPx)^T S P x).$$

Dann betrachten wir  $\Phi : x \rightarrow SPx$ , was offenbar ein Diffeomorphismus ist, weil es linear ist. Es gilt (Transformationsatz):

$$\begin{aligned} \int \exp(-x^T x) d\lambda_3 &= \int |\det \Phi| \exp(-(SPx)^T (SPx)) d\lambda_3 \\ &= \int |\det S| |\det P| \exp(-(SPx)^T (SPx)) d\lambda_3 \\ &= \sqrt{\det A} \int \exp(-(SPx)^T (SPx)) d\lambda_3 \end{aligned} \quad (4.1)$$

Wobei wir die folgende benutzt haben: Als orthogonale Matrix ist  $\det P = 1$ . Da  $S$  eine quadratische Würzel von  $A$  ist, ist  $(\det S)^2 = \det A \geq 0$  und  $|\det S| = \sqrt{\det A}$ . Es genügt also,  $\int \exp(-x^T x) d\lambda_3 = \int \exp(-(x^2 + y^2 + z^2)) d\lambda_3$  zu berechnen.

Wir berechnen das Integral in Kugelkoordinaten. Sei alle Definitionen wie in Aufgabe 142 mit  $R = \infty$ . Hier ist  $N = \{0\}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} &\int \exp(-(x^2 + y^2 + z^2)) d\lambda_3 \\ &= \int_{R \setminus N} \exp(-(x^2 + y^2 + z^2)) d\lambda_3 \\ &= \int_U (r^2 \sin \theta) \exp(-r^2) d\lambda_3 \\ &= \int_{U_\theta} \int_0^\pi r^2 \exp(-r^2) \sin \theta d\theta d\lambda_2 \\ &= 2 \int_{U_\theta} r^2 \exp(-r^2) d\lambda_2 \\ &= 2 \int_{(U_\theta)_\varphi} \int_0^{2\pi} r^2 \exp(-r^2) d\varphi d\lambda_1 \\ &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \exp(-r^2) dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi \left[ -\frac{r}{2} \exp(-r^2) \Big|_0^\infty + \frac{1}{2} \int_0^\infty \exp(-r^2) dr \right] \\
&= 2\pi \int_0^\infty \exp(-r^2) dr
\end{aligned} \tag{4.2}$$

Jetzt berechnen wir:

$$\begin{aligned}
\left( \int_0^\infty \exp(-r^2) dr \right)^2 &= \left( \int_0^\infty \exp(-x^2) dx \right) \left( \int_0^\infty \exp(-y^2) dy \right) \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-(x^2 + y^2)) dy dz \\
&= \int_{(0,\infty)^2} \exp(-(x^2 + y^2)) d\lambda_2 \\
&\quad \text{Satz von Fubini} \\
&= \int_{(0,\infty) \times (0,\pi/2)} r \exp(-r^2) d\lambda_2 \\
&\quad \text{Folgerung 2.121 (Polarkoordinaten)} \\
&= \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} r \exp(-r^2) d\phi dr \\
&= \frac{\pi}{2} \int_0^\infty r \exp(-r^2) dr \\
&= \frac{\pi}{4} \int_0^\infty \exp(-u) du \\
&\quad u = r^2 \text{ ist Diffeomorphismus mit Ableitung } 2r \\
&= -\frac{\pi}{4} \exp(-u) \Big|_0^\infty \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

Da  $\exp(-r^2)$  immer positiv ist, ist auch  $\int_0^\infty \exp(-r^2) dr$  positiv, also wir nehmen das positive Wurzel:

$$\int_0^\infty \exp(-r^2) dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Durch Einsetzen in alle den vorherigen Gleichungen erhalten wir

$$\int_{\mathbb{R}^3} \exp(-x^T x) d\lambda_3 = \pi^{3/2} \tag{4.2}$$

und

$$\int_{\mathbb{R}^3} \exp(-x^T A x) = \frac{\pi^{3/2}}{\sqrt{\det A}} \tag{4.1}$$

□



## 4.11 Blatt 11

**Aufgabe 144. (Hyperbelfunktion)** Sei  $d \in \{1, 2, 3\}$ ,  $R > 0$ ,  $1 \leq p < \infty$  und  $\alpha > 0$ . Definiere

$$B_R(d; 0) := \{x \in \mathbb{R}^d \mid \|x\| < R\}, \quad f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow \begin{cases} 0 & x = 0, \\ \frac{1}{\|x\|^\alpha} & x \neq 0. \end{cases}$$

- (a) Sei zunächst  $d = 1$ . Für welche  $\alpha, p$  ist die Funktion  $\chi_{B_R(1;0)} f$  in  $L^p(\lambda_1)$ ? Für welche  $\alpha, p$  ist die Funktion  $\chi_{\mathbb{R} \setminus B_R(1;0)} f$  in  $L^p(\lambda_1)$ ?
- (b) Welche Bedingungen müssen in den Fällen  $d = 2, 3$  für  $\alpha, p$  gelten, damit  $\chi_{B_R(d;0)} f \in L^p(\lambda_d)$  ist?
- (c) Sei  $1 < p < r < q < \infty$ . Geben Sie eine Funktion  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  an mit  $g \in L^r(\lambda_1)$ ,  $g \notin L^p(\lambda_1)$ ,  $g \notin L^q(\lambda_1)$ .
- (d) Geben Sie ein Beispiel für eine Funktion  $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  an, sodass  $g \in L^p(\lambda_1)$  für alle  $p \in [1, \infty)$  gilt, aber  $g \notin L^\infty(\lambda_1)$ .

*Beweis.* (a) Die Funktion  $\chi_{B_R(1;0)} f$  ist in  $L^p(\lambda_1)$  genau dann, wenn

$$\begin{aligned} \int \chi_{B_R(1;0)} |f|^p d\lambda_1 &= \int_{B_R(1;0)} |f|^p d\lambda_1 \\ &= \int_{B_R(1;0)} \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} d\lambda_1 \\ &= \int_0^R \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} d\lambda_1 + \int_{-R}^0 \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} d\lambda_1 \end{aligned}$$

Weil die Funktionen positiv sind, sind sie Lebesgue-Integrierbar genau dann, wenn sie (uneigentlich) Riemann-Integrierbar sind. Wir wissen aber auch, dass

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} d\lambda_1 &= \int_0^R \frac{1}{x^{\alpha p}} d\lambda_1 & x > 0 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^R \frac{1}{x^{\alpha p}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \left[ \frac{x^{-\alpha p + 1}}{1 - \alpha p} \right] \end{aligned}$$

was existiert genau dann, wenn  $-\alpha p + 1 \geq 0$ . Das Ergebnis stimmt nicht für  $\alpha p = 1$ . In diesem Fall ist

$$\int_a^R \frac{1}{x} dx = [\ln x]_a^R$$

und der Grenzwert existiert nicht. Aus der Symmetrie von  $x \rightarrow -x$  gilt genau die gleiche für  $\int_{-R}^0 \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} dx$ . Insgesamt ist die Funktion genau dann integrierbar, wenn  $-\alpha p + 1 > 0$ .

Ähnlich berechnen wir das Riemann-Integral für  $\chi_{\mathbb{R} \setminus B_R(1;0)}$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \int_R^\infty \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} dx &= \int_R^\infty \frac{1}{x^{\alpha p}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_R^a \frac{1}{x^{\alpha p}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^{-\alpha p + 1}}{1 - \alpha p} \right] \end{aligned}$$

was genau dann existiert, wenn  $-\alpha p + 1 \leq 0$ . Ähnlich stimmt das Ergebnis nicht für  $-\alpha p = 1$  nicht. In diesem Fall ist

$$\int_R^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln x|_R^a,$$

was nicht existiert. Also es ist genau dann integrierbar, wenn  $-\alpha p + 1 < 0$ .

- (b)  $d = 2$ : Wir berechnen das Integral in Polarkoordinaten. Da die Funktion positiv ist, ist das Integral wohldefiniert. Sie ist genau dann integrierbar, wenn die transformierte Funktion integrierbar ist. Wir wissen, dass  $\|x\| = r$ . Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \int_{B_R(2;0)} \frac{1}{\|x\|^{\alpha p}} d\lambda_2 &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^{\alpha p}} d\theta r dr \\ &= 2\pi \int_0^R \frac{1}{r^{\alpha p - 1}} dr \end{aligned}$$

Aus dem Argument in (a) existiert das Integral genau dann, wenn

$$-(\alpha p - 1) + 1 = \alpha p + 2 > 0.$$

□

**Aufgabe 145.** Sei  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  ein Maßraum und  $1 \leq p < q \leq \infty$ .

- (a) Zeigen Sie, dass  $L^p(\mu) \cap L^q(\mu) \subseteq L^r(\mu)$  für alle  $r \in (p, q)$  gilt und außerdem

$$\|f\|_{L^r(\mu)} \leq \|f\|_{L^p(\mu)}^\theta \|f\|_{L^q(\mu)}^{1-\theta}$$

für alle  $f \in L^p(\mu) \cap L^q(\mu)$  und  $\theta \in (0, 1)$  mit

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}.$$

- (b) Sei der Maßraum  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  nun endlich. Zeigen Sie, dass dann  $L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu)$  und

$$\|f\|_{L^p(\mu)} \leq \mu(X)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_{L^q(\mu)}$$

für alle  $f \in L^q(\mu)$  gilt.

*Hinweis: Betrachten Sie den Raum  $L^r(\mu)$  für  $r := \frac{q}{p}$ .*

*Beweis.* (a) Sei  $f \in L^p(\mu) \cap L^q(\mu)$ . Das Ziel ist:  $f \in L^r(\mu)$  für alle  $r \in (p, q)$ . Sei

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x \in X, |f(x)| < 1\} \\ B &= \{x \mid x \in X, |f(x)| \geq 1\} = X \setminus A \end{aligned}$$

Weil  $|f|^p$  bzw.  $|f|^q$  auf der ganzen Menge  $X$  integrierbar sind, sind  $|f|^p$  bzw.  $|f|^q$  auf  $A$  und  $B$  integrierbar. Es gilt, für alle  $x \in A$ ,

$$|f|^q \leq |f|^r \leq |f|^p$$

also  $|f|^r$  ist auf  $A$  integrierbar. Ähnlich ist für alle  $x \in B$

$$|f|^p \leq |f|^r \leq |f|^q$$

und das Integral von  $|f|^r$  auf  $B$  existiert. Da

$$\int |f|^r d\mu = \int_A |f|^r d\mu + \int_B |f|^r d\mu,$$

ist  $|f|^r$  integrierbar und  $f \in L^r(\mu)$ . Aus der Höldersche Ungleichung folgt, für  $1/p + 1/q = 1, p, q \in [1, \infty]$

$$\|f^2\|_{\mathcal{L}^1(\mu)} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(\mu)} \|f\|_{\mathcal{L}^q(\mu)}.$$

□

**Aufgabe 146.** Sei  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $f(x, y, z) := |xyz|$  und

$$A := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \frac{1}{2} \right\}.$$

Bestimmen Sie  $\int_A f d\lambda_3$ .



---

## Einführung in die Algebra

---

### 5.1 Blatt 1

**Aufgabe 147.** Sei  $G := 2\mathbb{N}^* := \{2n | n \in \mathbb{N}^*\}$  die Menge der positiven geraden Zahlen. Wir nennen  $a \in G$  *zerlegbar*, falls sich  $a$  als Produkt zweier Elemente aus  $G$  schreiben lässt. Ansonsten nennen wir  $a$  *unzerlegbar*. Beispielsweise sind 4 zerlegbar und 6 unzerlegbar. Zeigen Sie:

- (a)  $G$  ist multiplikativ abgeschlossen.
- (b) Jedes  $a \in G$  lässt sich als Produkt unzerlegbarer Elemente aus  $G$  schreiben.
- (c) Selbst wenn man die Reihenfolge der Faktoren nicht berücksichtigt, so ist die Zerlegung nach (b) im Allgemeinen nicht eindeutig.

*Beweis.* (a)  $2n \times 2n' = 4nn' = 2(nn')$

- (b) Wir beweisen es per Induktion. Nehme an, dass jede Elemente  $2n, n < k$  entweder unzerlegbar ist, oder als Produkt unzerlegbare Elemente aus  $G$  geschrieben werden kann. Für  $2(1) = 2$  ist es klar - 2 ist unzerlegbar.

Sei  $M_k \subseteq G = \{m \in G | \exists n \in G, mn = 2k\}$

Entweder ist  $M = \emptyset$ , also  $k$  ist unzerlegbar, oder es existiert  $m, n \in G, mn = 2k$ . Weil  $m$  und  $n$  ein Produkt unzerlegbarer Elemente aus  $G$  sind, ist  $2k$  auch ein Produkt unzerlegbarer Elemente.

- (c) Gegenbeispiel:

$$G \ni 1020 = 30 \times 34 = 102 \times 10.$$

□

**Aufgabe 148.** In dieser Aufgabe stellen wir den Euklidischen Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers vor. Seien hierzu zwei

natürliche Zahlen  $a, b \in \mathbb{N}$  mit  $b \neq 0$  vorgelegt. Wir setzen  $r_0 := a, r_1 := b$  und rekursiv für alle  $i \in \mathbb{N}^*$  mit  $r_i \neq 0$ .

$$r_{i+1} := \text{Rest von } r_{i-1} \text{ bei der Division durch } r_i$$

(a) Zeigen Sie, dass es ein  $n \geq 2$  mit  $r_n = 0$  gibt.

Da die Rekursionsformel für  $i = n$  nicht mehr anwendbar ist, bricht die Folge  $(r_i)$  der Reste beim Index  $n$  ab. Daher gibt es nur genau einen Index  $n \geq 2$  mit  $r_n = 0$ . Beweisen Sie nun:

(b) Für alle  $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$  gilt  $ggT(a, b) = ggT(r_{i-1}, r_i)$ .

(c) Es ist  $ggT(a, b) = r_{n-1}$ .

(d) Berechnen Sie  $ggT(210, 45)$  mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus.

*Beweis.* (a)

$$r_{i-1} = qr_i + r_{i+1} \quad 0 \leq r_{i+1} < r_i$$

per Definition. Weil  $r_{i-1} < r_i$ , ist die Folge monoton fallend. Da es endlich viele natürliche Zahlen  $k < b$  gibt, muss  $r_n = 0$ .

(b) Wir beweisen:

$$ggT(r_{i-1}, r_i) = ggT(r_i, r_{i+1}).$$

Die gewünschte Ergebnisse folgt daraus per Induktion.

Es gilt  $r_{i-1} - qr_i = r_{i+1}$ . Dann folgt:  $ggT(r_{i-1}, r_i)$  teilt  $r_{i-1}$  und  $r_i$  und daher auch  $r_{i-1} - qr_i$ . Deshalb ist  $ggT(r_{i-1}, r_i)$  auch einen Teiler von  $r_{i+1} \implies ggT(r_{i-1}, r_i) \leq ggT(r_i, r_{i+1})$ .

Weil  $r_{i-1} = qr_i + r_{i+1}$ , ist  $ggT(r_i, r_{i+1})$  einen Teiler von  $r_i$  und  $r_{i+1}$  und daher auch von  $qr_i + r_{i+1}$ . Deshalb ist es auch einen Teiler von  $r_{i-1}$ , und  $ggT(r_i, r_{i+1}) \leq ggT(r_{i-1}, r_i)$

(c) Es gilt

$$r_{n-2} = qr_{n-1} + \cancel{r_n},$$

also  $r_{n-1}$  teilt  $r_{n-2}$ . Daraus folgt

$$ggT(r_{n-1}, r_{n-2}) = r_{n-1} = ggT(a, b).$$

(d)

$$210 = 4 \times 45 + 30$$

$$45 = 1 \times 30 + 15$$

$$30 = 2 \times 15 + 0$$

$$15$$

$$0$$

$$ggT(210, 45) = 15.$$

□

**Aufgabe 149.** (Bonus Problem) Wir wissen von dem Lemma von Bezout, dass für jeder  $x, y \in \mathbb{N}$  es  $a, b \in \mathbb{Z}$  gibt, so dass

$$ax + by = \text{ggT}(x, y).$$

Zum Beispiel ist  $-210 + 5 \times 45 = 15$ . Kann man von das Euklidische Algorithmus die Zahlen  $a, b$  rechnen?

*Beweis.* Wir berechnen zuerst eine andere Beispiel

$$\begin{aligned} 427 &= 1 \times 264 + 163 \\ 264 &= 1 \times 163 + 101 \\ 163 &= 1 \times 101 + 62 \\ 101 &= 1 \times 62 + 39 \\ 62 &= 1 \times 39 + 23 \\ 39 &= 1 \times 23 + 16 \\ 23 &= 1 \times 16 + 7 \\ 16 &= 2 \times 7 + 2 \\ 7 &= 3 \times 2 + 1 \\ 2 &= 1 \times 2 + 0 \end{aligned}$$

Wir kehren zurück:

$$\begin{aligned} 7 - 1 &= 3 \times 2 \\ 3 \times 16 &= 6 \times 7 + 3 \times 2 \\ &= 6 \times 7 + (7 - 1) \\ &= 7 \times 7 - 1 \\ 6 \times 16 &= 14 \times 7 - 1 \\ 6 \times 16 + 1 &= 14 \times 7 \\ 14 \times 23 &= 14 \times 16 + 14 \times 7 \\ &= 14 \times 16 + (6 \times 16 + 1) \\ &= 20 \times 16 + 1 \end{aligned}$$

In der letzte Gleichung bleibt  $\text{ggT}(427, 264) = 1$ . Wir setzen immer wieder ein, bis zu wir eine Gleichung des Forms  $427a + 264b = 1$  haben  $\square$

**Aufgabe 150.** Sei  $k \in \mathbb{N}$  gegeben. Für welche Zahlen  $\mathbb{N} \ni a, b < k$  braucht das Euklidische Algorithmus die meiste Schritte?

*Beweis.* Wir möchten, dass die Folge  $r_n \rightarrow 0$  nicht so schnell.

$$\begin{aligned} 13 &= 1 \times 8 + 5 \\ 8 &= 1 \times 5 + 3 \\ 5 &= 1 \times 3 + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3 &= 1 \times 2 + 1 \\
2 &= 1 \times 2 + 0 \\
1 & \\
0 &
\end{aligned}$$

ist die Fibonacci Folge. □

**Aufgabe 151.** Seien  $p$  und  $q$  zwei ungerade und aufeinanderfolgende Primzahlen, so dass also zwischen  $p$  und  $q$  keine weiteren Primzahlen existieren. Zeigen Sie, dass  $p + q$  ein Produkt von mindestens drei (nicht notwendig verschiedenen) Primzahlen ist.

*Beweis.* Sei obdA  $p < q$ . Weil  $p$  und  $q$  ungerade sind, ist  $p + q$  gerade, also  $p + q = 2k, k \in \mathbb{N}$ . Nehme an, dass  $p + q$  ein Produkt von zwei Primzahlen ist, also  $k \in \mathbb{P}$ . Dann gilt

$$p < k < q, \quad k \in \mathbb{P},$$

ein Widerspruch. Deshalb ist  $k \notin \mathbb{P}$  und  $k$  ist ein Produkt von mindestens zwei Primzahlen, also  $p + q$  ist ein Produkt von mindestens drei Primzahlen. □

**Aufgabe 152.** Seien  $n \in \mathbb{N}^*$  und  $a \in \mathbb{Z}$ . Zeigen Sie, dass es genau dann ein  $x \in \mathbb{Z}$  mit  $ax \equiv 1 \pmod{n}$  gibt, wenn  $\text{ggT}(a, n) = 1$  gilt.

*Beweis.*  $ax \equiv 1 \pmod{n} \iff ax - 1 = kn, k \in \mathbb{Z}$ , also  $ax - kn = 1$ .

Weil  $\text{ggT}(a, n) = 1$ , gibt es so zwei Zahlen  $a, -k$ , so dass  $ax - kn = 1$  (Lemma von Bezout) □

## 5.2 Blatt 2

**Aufgabe 153.** Sei  $G$  eine Gruppe mit neutralem Element 1. Für jedes Element  $g \in G$  gelte  $g^2 = 1$ . Zeigen Sie, dass  $G$  dann abelsch ist.

*Beweis.*

**Lemma 5.1.** Sei  $a, b \in G$ . Dann gilt  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

*Beweis.*

$$abb^{-1}a^{-1} = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = 1. \quad \square$$

Es gilt, für jede  $g \in G$ , dass  $g = g^{-1}$ , weil  $gg = 1$  (per Definition). Deswegen gilt

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba. \quad \square$$

**Aufgabe 154.** Sei  $K$  ein endlicher Körper mit  $q \in \mathbb{N}^*$  Elementen.



- (a) Zeigen Sie, dass es genau  $\prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$  geordnete Basen des  $K$ -Vektorraums  $K^n$  gibt. Unter einer geordneten Basis des  $K$ -Vektorraums  $K^n$  verstehen wir hierbei ein  $n$ -Tupel  $(b_1, \dots, b_n)$  linear unabhängiger Vektoren  $b_1, \dots, b_n \in K^n$ .
- (b) Nutzen Sie Teilaufgabe (a), um nachzuweisen, dass die Gruppe  $GL_n(K)$  aus Beispiel 2.4 (d) die Ordnung  $\prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$  besitzt.

*Beweis.* (a) Wir versuchen, ein  $p$ -Tupel linear unabhängiger Vektoren zu finden. Ich zeige, dass es genau  $\prod_{k=0}^{p-1} (q^n - q^k)$  solche Vektoren gibt. Für  $p = n$  ist das natürlich die gewünschte Behauptung.

Für  $p = 1$  müssen wir  $n$  Elemente aus  $K$  finden. Es gibt  $q^n$  Möglichkeiten dafür. Jedoch ist  $(0, 0, \dots, 0)$  verboten. Deswegen gibt es genau  $q^n - 1$  Vektoren, die nicht  $(0, 0, \dots, 0)$  sind.

Jetzt nehmen wir an, dass es genau  $\prod_{k=0}^{p-1} (q^n - q^k)$  Tupel von  $p$  linear unabhängigen Vektoren gibt (wenn man die Reihenfolge berücksichtigt), für eine beliebige  $p < n$ . Sei  $v_1, v_2, \dots, v_p$  ein solches  $p$ -Tupel. Wir möchten einen weiteren Vektor  $v_{p+1}$  finden, der linear unabhängig von  $v_1, v_2, \dots, v_p$  ist. Das bedeutet:

$$v_{p+1} \neq a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_p v_p$$

für **alle**  $a_1, a_2, \dots, a_p \in K$ . Es gibt  $p^q$  Kombinationen für  $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ . Weil  $v_1, v_2, \dots, v_p$  linear unabhängig sind, gilt für jede  $(a_1, a_2, \dots, a_p) \neq (a'_1, a'_2, \dots, a'_p)$  auch  $a_1 v_1 + \dots + a_p v_p \neq a'_1 v_1 + \dots + a'_p v_p$ . Deswegen gibt es für jede  $v_1, v_2, \dots, v_p$  genau  $q^n - q^p$  Möglichkeiten für  $v_{p+1}$ .

Es gibt daher

$$\prod_{k=0}^{p-1} (q^n - q^k)$$

$p$ -Tupel von linear unabhängigen Vektoren. Für  $p = n$  ist die Behauptung bewiesen.

- (b) Sei  $v_1, v_2, \dots, v_n$  eine Basis von  $K^n$ , und  $T$  eine lineare Abbildung  $T : K^n \rightarrow K^n$ . Wenn man  $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$  weiß, ist  $T$  eindeutig.  $T$  ist invertierbar genau wenn  $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$  linear unabhängig sind. Es gibt dadurch eine bijektive Funktion

$$f : GL_n(K) \rightarrow \{(v_1, v_2, \dots, v_n) \in K^{n \times n} \mid v_1, \dots, v_n \text{ sind linear unabhängige}\}.$$

Aber wir wissen, dass es genau  $\prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$  solche  $(v_1, v_2, \dots, v_n) \in K^{n \times n}$  gibt. Daraus folgt:

$$|GL_n(K)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k). \quad \square$$

**Aufgabe 155.** Wir betrachten die komplexen  $(2 \times 2)$ -Matrizen

$$E := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad J := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad K := \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass die Menge  $Q_8 := \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\}$  zusammen mit der Matrixmultiplikation eine nicht-abelsche Gruppe der Ordnung 8 bildet. Man nennt  $Q_8$  auch die *Quaternionengruppe* der Ordnung 8.

**Hinweis:** Ein paar konkrete Matrixmultiplikationen werden Sie bei dieser Aufgabe ausrechnen müssen. Versuchen Sie, deren Anzahl gering zu halten und möglichst viel aus Ihren bereits durchgeführten Rechnungen zu schließen.

*Beweis.* Wir zeigen zuerst, dass  $Q_8$  unter  $\cdot$  abgeschlossen ist. Wir wissen von der Linearen Algebra, dass  $EM = M$  für alle Matrizen  $M$ . Das heißt, dass  $E$  ein neutrales Element ist. Wir wissen auch, dass  $(-E)M = -M$ . Ich betrachte einige wichtige Matrixmultiplikationen:

$$I^2 = J^2 = K^2 = -E.$$

Daraus folgt, dass  $x^{-1} = -x$ , für  $Q_8 \ni x \neq \pm E$ . Für  $x = -E$  ist  $x^{-1} = x$ . Jede  $x \in G$  ist daher invertierbar. Es gilt auch

$$\begin{aligned} IJ &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = K \\ JK &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = I \\ KI &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = J \end{aligned}$$

Von daraus folgt, dass  $Q_8$  unter Matrixmultiplikation abgeschlossen ist. Deswegen ist  $Q_8$  eine Gruppe. Es ist nicht abelsch. Sei  $a, b \in \{\pm I, \pm J, \pm K\}$ ,  $a \neq \pm b$ , und daher  $ab \in \{\pm I, \pm J, \pm K\}$

$$ab = -(ab)^{-1} = -b^{-1}a^{-1} = -(-b)(-a) = -ba. \quad \square$$

**Aufgabe 156.** Sei  $G$  eine Gruppe der Ordnung 4. Zeigen Sie, dass  $G$  abelsch ist.

*Beweis.* Sei  $G = \{1, a, b, c\}$ . Nehme an, dass  $G$  nicht abelsch ist. ObdA können wir annehmen, dass  $ab \neq ba$ . Wir betrachten dann drei Fälle:

1.  $ab = a$  oder  $ab = b$  (obdA nehme an,  $ab = a$ ).

Es gilt dann

$$(ba)b = b(ab) = ba.$$

Daraus folgt  $b = 1$ , ein Widerspruch.

2.  $ab = 1$ . Es folgt aus die Eindeutigkeit des Inverses, dass  $ba = 1$ , auch ein Widerspruch.
3.  $ab = c$ . Erinnern Sie sich daran, dass  $ba \neq 1$ , sonst gibt es ein Widerspruch wie im vorherigen Fall. Es gilt auch  $ba \neq c$ , weil  $ab \neq ba$ . Nehme obdA an, dass  $ba = a$ . Es gilt dann

$$bab = ab = bc.$$

Es gilt auch

$$bc = bab = b^2c.$$

Deswegen ist  $b = 1$ , noch ein Widerspruch.  $\square$

**Aufgabe 157.** Wie viele Gruppe der Ordnung 1/2/3/4 gibt es?

*Beweis.* Ordnung:

- (a) 1:  $G = \{1\}$
- (b) 2:  $G = \{1, a\}, a^2 = 1$
- (c) 3:  $G = \{1, a, b\}$

Jede element muss invertierbar sind, und 1 kann nicht die Inverse sein. Wir betrachten  $a^{-1}$ :

- (i)  $a^{-1} = a$ . Es gilt  $b^{-1} = b$ , sonst ist  $b^{-1} = a \implies a^{-1} = b$ . Es gilt dann entweder  $ab = a$  oder  $ab = b$ . Sei  $ab = a$ . Es gilt

$$b = (aa)b = aab = aa = 1,$$

ein Widerspruch. Das Fall ist leider unmöglich.

- (ii) Es gilt  $ab = 1$ , daher auch  $ba = 1$ . Dann muss es gelten,  $a^2 = b$ ,  $b^2 = a$ . Das Fall ist möglich.

Es gibt nur eine Gruppe der Ordnung 3.

- (d) 4: Wir haben schon bewiesen, dass es abelsch sein muss. Wir zeichnen die Tabelle

1	$a$	$b$	$c$
$a$			
$b$			
$c$			

Es muss symmetrisch sein. Weil alle Elemente in alle Zeilen und Spalten vorkommen muss, gilt entweder

$\square$

### 5.3 Blatt 3

**Aufgabe 158.** Wir ändern die Gruppendefinition aus Definition 2.3 ab, indem wir für eine Menge  $G$  mit einer zweistelligen Verknüpfung  $\cdot$  und einem Element  $e \in G$  fordern:

- (a) Es gilt  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  für alle  $a, b, c \in G$ .
- (b) Es gilt  $a \cdot e = a$  für alle  $a \in G$ .
- (c') Zu jedem  $a \in G$  gibt es ein Element  $b \in G$  mit  $b \cdot a = e$

Ist dann  $G$  stets eine Gruppe?

*Beweis.* Nein. Sei  $x \cdot y = x$ . Es ist assoziativ, weil  $x \cdot (y \cdot z) = x = (x \cdot y) \cdot z$ . Es gilt auch  $x \cdot e = x \ \forall x$ . Außerdem gilt  $e \cdot x = e \ \forall x \in G$ . Aber es gilt für alle  $e \neq x \in G$ , dass  $x \cdot y = x \neq e \ \forall y \in G$ .  $G$  ist dann keine Gruppe.  $\square$

**Aufgabe 159.** Sei  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n \geq 3$  fixiert. Wir setzen  $\alpha := \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{C}$  und definieren die folgenden zwei Abbildungen:

$$s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \rightarrow \bar{z} \quad \text{sowie} \quad r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \rightarrow \alpha z.$$

Das neutrale Element der Gruppe  $\text{Sym}(\mathbb{C})$  bezeichnen wir mit  $e$  und mit  $\cdot$  die Verkettung von Funktionen.

- (a) Zeigen Sie, dass  $s^2 = e$  und  $r \cdot s \cdot r = s$  gelten.
- (b) Zeigen Sie, dass für  $k \in \mathbb{N}$  genau dann  $r^k = e$  gilt, wenn  $n|k$  ist.
- (c) Zeigen Sie, dass  $r$  und  $s$  Elemente der symmetrischen Gruppe  $\text{Sym}(\mathbb{C})$  sind.
- (d) Zeigen Sie, dass  $s \cdot r^k = r^{-k} \cdot s$  für alle  $k \in \mathbb{N}$  gilt.
- (e) Zeigen Sie, dass zu jedem  $k \in \mathbb{N}$  ein  $t \in \mathbb{N}$  mit  $r^{-k} = r^t$  existiert.
- (f) Beschreiben Sie das Abbildungsverhalten von  $r$  und  $s$  geometrisch.
- (g) Folgern Sie aus (a)–(e), dass  $\{r^x \cdot s^y | x, y \in \mathbb{Z}\} = \{r^a \cdot s^b | 0 \leq a < n \text{ und } 0 \leq b < 2\}$  gilt.
- (h) Zeigen Sie, dass  $D_n := \{r^a \cdot s^b | 0 \leq a < n \text{ und } 0 \leq b < 2\}$  eine Gruppe ist.
- (i) Beweisen Sie, dass  $|D_n| = 2n$  gilt.
- (j) Zeigen Sie, dass  $D_n$  nicht abelsch ist.

*Beweis.* (a)  $s^2 = e$  folgt aus  $\bar{\bar{z}} = z$ . Es gilt

$$\begin{aligned}(r \cdot s \cdot r)(z) &= (r \cdot s)(\exp(2\pi i/n)z) \\ &= r(\exp(-2\pi i/n)\bar{z}) \\ &= \exp(2\pi i/n)\exp(-2\pi i/n)\bar{z} \\ &= \bar{z}\end{aligned}$$

Also  $r \cdot s \cdot r = s$ .

(b) Wir wissen,  $r^k(z) = \exp(2\pi i k/n)z$ .  $r^k = e$  genau dann, wenn  $\exp(2\pi i k/n) = 1$ , also  $n|k$ .

(c) Sie sind bijektiv. Wir schreiben einfach die Umkehrfunktion.

$$s^{-1} = s \quad (a)$$

$$\begin{aligned}f(x) &= \exp(-2\pi i/n)x \\ r \circ f &= e = f \circ r\end{aligned}$$


(d)

$$\begin{aligned}(s \cdot r^k)(z) &= s(\exp(2\pi i k/n)z) \\ &= \exp(-2\pi i k/n)\bar{z} \\ (r^{-k} \cdot s)(z) &= (r^{-k})(\bar{z}) \\ &= \exp(-2\pi i k/n)\bar{z} \\ &= (s \cdot r^k)(z)\end{aligned}$$

(e) Sei  $t = -k + pn$ ,  $p \in \mathbb{N}$ , für  $p$  hinreichend groß, damit  $t > 0$  und daher  $p \in \mathbb{N}$ . Es gilt

$$s^t = s^{-k+pn} = s^{-k}s^{pn} = s^{-k}(s^n)^p = s^{-k}.$$

(f)



(g) Sei  $y = 2n + b, b \in \mathbb{N}$ . Dann ist

$$s^y = s^{2n+b} = s^{2n} \cdot s^b = e \cdot s^b = s^b.$$

(h) (i)  $D_n$  ist abgeschlossen

$$r^a \cdot s^b \cdot r^{a'} \cdot s^{b'} = r^a \cdot r^{-a'} \cdot s^b \cdot s^{b'} \quad (\text{d})$$

$$= r^{a-a'} s^{b+b'}$$

$$\in D_n \quad (\text{g})$$

(ii)  $D_n$  ist assoziativ wegen der Assoziativität von Funktionverknüpfung.

(iii) Neutrales Element

$$a = 0, b = 0, r^0 \cdot s^0 = e \in D_n.$$

(iv) Inverses Element

$$s^{-b} \cdot r^{-a} \cdot r^a \cdot s^b = s^{-b} \cdot (r^{-a} \cdot r^a) \cdot s^b = s^{-b} \cdot s^b = e.$$

Außerdem gilt

$$s^{-b} \cdot r^{-a} = r^a \cdot s^{-b} \quad (\text{d})$$

$$= r^a \cdot s^c, \quad 0 \leq c < 2 \quad (\text{a})$$

(i) Es gibt genau  $n$  Möglichkeiten für  $a$ , und 2 Möglichkeiten für  $b$ . Daraus folgt  $|D_n| = 2n$ .

(j) Wir haben  $s \cdot r^k = r^{-k} \cdot s$  (d), und müssen nur  $k$  finden, sodass  $r^k \neq r^{-k}$ .  $k = 1$  ist ein Gegenbeispiel.  $\square$

## 5.4 Blatt 4

**Aufgabe 160.** Seien  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $T$  die Menge der positiven Teiler von  $n$  und  $G$  eine Gruppe der Ordnung  $n$ . Für  $t \in T$  definieren wir die Mengen

$$M_t := \{g \in G \mid \text{ord}(g) = t\} \subseteq G.$$

(a) Zeigen Sie, dass jedes  $g \in G$  in genau einer der Mengen  $M_t$  mit  $t \in T$  liegt.

(b) Sei nun zudem  $G$  zyklisch. Zeigen Sie, dass dann  $|M_t| = \varphi(t)$  für alle  $t \in T$  gilt.

(c) Folgern Sie: Für jedes  $n \in \mathbb{N}^*$  gilt  $n = \sum_{t \mid n, t > 0} \varphi(t)$ .

*Beweis.* (a) Sei  $g \in G$  beliebig und  $H = \langle g \rangle$ .  $H$  ist eine Untergruppe von  $G$ . Es gilt auch, dass  $|H| = \text{ord}(g)$ . Wir wissen, dass  $|H|$  teilt  $|G|$ . Daraus folgt, dass  $\text{ord}(g)$  teilt  $|G|$ , und  $g$  liegt in genau einer der Mengen  $M_t$  mit  $t \in T$ .

- (b) Weil  $G$  zyklisch ist, gibt es für jede Teiler  $t|n$  eine Untergruppe der Ordnung  $t$ .

Diese Untergruppe hat genau  $\varphi(t)$  Erzeuger. Für alle Erzeuger  $p$  gilt  $\text{ord}(t) = |\langle t \rangle| = t$ . Es gilt daher, für jedes  $t \in T$ ,  $|M_t| \geq \varphi(t)$ .

Außerdem ist die Untergruppe der Ordnung  $t$  eindeutig. Deswegen ist genau  $|M_t| = \varphi(t)$ . Wir nehmen an, dass es  $p \in G$  gibt, sodass  $\text{ord}(p) = t$ , also  $|\langle p \rangle| = t$ . Weil die zyklische Untergruppe der Ordnung  $t$  eindeutig ist, ist die erzeugte Gruppe genau die Gruppe, die wir vorher diskutiert haben, also  $p$  ist einer der vorherigen  $\varphi(t)$  Erzeuger.

Daraus folgt, dass  $|M_t| = \varphi(t)$  für alle  $t \in T$ .

- (c) Es gibt für jedes  $n$  eine zyklische Gruppe der Ordnung  $n$ , z.B.  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Alle Element sind in einer der Mengen  $M_t$ . Die Zahl der Elemente ist einfach  $\sum_{t \in T} |M_t| = \varphi(t) = n$

□

**Aufgabe 161.** Zeigen Sie, dass für eine Gruppe  $G$  der Ordnung  $n \in \mathbb{N}^*$  äquivalent sind:

- (a)  $G$  ist zyklisch.  
 (b)  $G$  besitzt zu jedem positiven Teiler  $t$  von  $n$  genau eine Untergruppe der Ordnung  $t$ .

*Beweis.* (a)  $\implies$  (b) ist schon in der Vorlesung bewiesen. (Satz 2.18). Es bleibt (b)  $\implies$  (a) zu zeigen. Wir betrachten dann ein Element  $a \in G$  und die erzeugte zyklische Gruppe  $\langle a \rangle$ . Falls  $\langle a \rangle = G$  sind wir fertig. Also nehmen wir an,  $\langle a \rangle \neq G$ . Sei  $\text{ord}(a) = k$ , und  $|\langle a \rangle| = k$ . Diese Gruppe besitzt genau  $\varphi(k)$  Erzeuger.

Dann wählen wir ein anderes  $b$  Element aus, das kein Erzeuger von  $\langle a \rangle$  ist. Wir betrachten  $\langle b \rangle$ . Es muss gelten, dass  $\text{ord}(b) = |\langle b \rangle| \neq k$ . Sonst wäre  $\langle b \rangle = \langle a \rangle$ , weil es nur *eine* Untergruppe der Ordnung  $k$  gibt. Wir nehmen noch an, dass  $\langle b \rangle \neq G$ .

Ähnlich fahren wir fort. Wir wählen ein Element aus, das kein Erzeuger von der vorherigen betrachteten zyklischen Gruppen sind. Weil es für jeder Teiler von  $n$  nur eine Untergruppe der Ordnung gibt, gilt  $|M_t| = \varphi(t)$ .

Sei  $T$  die Menge der positiven Teiler von  $n$ . Wir berechnen

$$\sum_{n \neq t \in T} \varphi(t) < n,$$

also wir haben Elemente, deren Ordnung kein positiver Teiler von  $n$ , das weniger als  $n$  ist. Weil die Ordnung ein Teiler von  $n$  sein muss, muss die Ordnung  $n$  sein, also solche Elemente sind Erzeuger der Gruppe  $G$ , und  $G$  ist zyklisch. □

- Aufgabe 162.** (a) Bestimmen Sie die Ordnungen der Elemente für jede der Diedergruppen  $D_n$  mit  $n \geq 3$ .
- (b) Zeigen Sie, dass Satz 2.23 für nicht-abelsche Gruppen im Allgemeinen falsch ist.

(Satz 2.23) Sei  $n$  die größte Elementordnung in einer abelschen Gruppe  $G$ . Dann gilt  $g^n = e$  für alle  $g \in G$ .

*Beweis.* (a) Wir betrachten zuerst Elemente mit dem Form  $r^k s^0 = r^k$ . Wir haben per die letzte Übungsblatt

Zeigen Sie, dass für  $k \in \mathbb{N}$  genau dann  $r^k = e$  gilt, wenn  $n|k$  ist.

also wir brauchen die kleinste Zahl  $\text{ord}(r^k)$ , sodass  $(r^k)^{\text{ord}(r^k)} = r^{k \cdot \text{ord}(r^k)} = r^{pn}, p \in \mathbb{N}$ . Per Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfaches ist

$$\text{ord}(r^k) = \frac{\text{kgV}(k, n)}{k} = \frac{n}{\text{ggT}(k, n)}.$$

Wir wissen auch, dass  $s^2 = e$ , also  $\text{ord}(s) = 2$ .

Jetzt betrachten wir alle Elemente mit dem Form  $r^k s$ . Es gilt

$$r^k s r^k s = r^k r^{-k} s s = e e = e,$$

also alle Elemente mit dem Form  $r^k s$  haben Ordnung 2.

- (b) Wir betrachten  $D_3$ . Die größte Elementordnung ist 3, weil  $\text{ggT}(3, 2) = 1$ , und  $\frac{3}{\text{ggT}(3, 2)} = 3$ , also  $r^2$  hat Ordnung 3.

Keine größere Elementordnung ist möglich, weil  $\frac{n}{\text{ggT}(n, k)} \leq n = 3$ , und  $2 \leq 3$ .

Es gilt aber

$$s^3 = (s^2)s = es = s,$$

also  $s^3 \neq e$ , ein Widerspruch. □

**Aufgabe 163.** Sei  $n \geq 3$ .

- (a) Zeigen Sie, dass die Menge  $R := \{r^0, r^1, \dots, r^{n-1}\}$  ein Normalteiler von  $D_n$  ist.
- (b) Zeigen Sie, dass die Gruppe  $\langle x \rangle$  für kein  $x \in D_n \setminus R$  ein Normalteiler von  $D_n$  ist.

*Beweis.* (a) Wir betrachten  $x^{-1}Rx$ :



(i)  $x = r^p$ :Es gilt  $x^{-1} = r^{-p}$ . und

$$r^{-p}r^k r^p = r^k,$$

für alle  $k \in \mathbb{Z}$ , also  $r^{-p}Rr^p = R$ , insbesondere  $r^{-p}Rr^p \subseteq R$ .(ii)  $x = s$ :Es gilt  $s^{-1} = s$ , und

$$sr^k s = r^{-k} s s = r^{-k} \in S,$$

(Die Behauptung, dass  $r^{-k} \in S$ , war im letzten Übungsblatt bewiesen).(iii)  $x = r^p s$ :Wir haben schon bewiesen, dass  $x^{-1} = r^p s$ . Es gilt

$$r^p s r^k r^p s = r^p s r^{k+p} s = r^p r^{-(k+p)} s s = r^{-k} \in R.$$

Insgesamt gilt  $x^{-1}Rx \subseteq R$  für alle  $x \in D_n$ , also  $R$  ist ein Normalteiler.

(b) Noch einmal betrachten wir die unterschiedlichen Fälle

(i)  $x = s$ , also  $\langle x \rangle = \{e, s\}$ :

Es gilt

$$r^{-1}sr = r^{-1}r^{-1}s = r^{-2}s \neq s.$$

(Es gilt  $r^{-2} \neq r^0 = e$  wenn  $n \geq 3$ ).(ii)  $x = r^p s$ , also  $\langle x \rangle = \{e, r^p s\}$ .

Es gilt

$$r^{-k}r^p s r^k = r^{-k}r^p r^{-k} s = r^{p-2k} s,$$

was nur ein Element von  $\langle x \rangle$  ist, wenn  $p - 2k \equiv p \pmod{n}$ . Sei zum Beispiel  $k = 1$ . Weil  $n \geq 3$ , gilt die Gleichung nie.**Lemma 5.2.** Für  $n \geq 3$  kann

$$p - 2 \equiv p \pmod{n}$$

nicht gelten, für alle  $p \in \mathbb{Z}$ *Beweis.* Die Gleichung  $p - 2 \equiv p \pmod{n}$  genau dann, wenn es  $k \in \mathbb{Z}$  existiert, sodass

$$p - p - 2 = kn,$$

aber das impliziert

$$-2 = kn,$$

was unmöglich ist, weil  $n \geq 3 > 2$ . □Also  $r^{-1}\langle x \rangle r \not\subseteq \langle x \rangle$

Die Gruppe  $\langle x \rangle$  ist dann keine Gruppe für  $x \in D_n \setminus R$ .  $\square$

## 5.5 Blatt 5

**Aufgabe 164.** (a) Begründen Sie, dass die Permutation  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 8 & 3 & 9 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \in S_9$  in der alternierenden Gruppe  $A_9$  liegt.

(b) Finden Sie  $i$  und  $k$ , so dass die Permutation  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & i & 5 & 6 & k & 9 \end{pmatrix} \in S_9$  gerade ist.

*Beweis.* (a) Wir schreiben zuerst  $\sigma$  als Zyklus

$$\sigma = (176)(259)(384).$$

Dann stellen wir die Zyklus als Produkte von Transpositionen dar, wie im Beweis von 2.44

$$\sigma = (17)(76)(25)(59)(38)(84).$$

Es gibt 6 Transpositionen, also  $\sigma$  ist gerade, und  $\sigma \in A_9$ .

(b) Weil jede Zahl nur einmal vorkommen darf, gibt es nur zwei Möglichkeiten

$$\begin{array}{ll} i = 3 & j = 8, \\ i = 8 & j = 3. \end{array}$$

Wir betrachten die zwei Fälle:

(i)  $i = 3, j = 8$  :

Wir schreiben es als Zyklus, und dann von Transpositionen

$$(3765) = (37)(76)(65),$$

also es ist ungerade.

(ii)  $i = 8, j = 3$  wir machen ähnlich

$$(37658) = (37)(76)(65)(58),$$

also es ist in diesem Fall gerade.  $\square$

**Aufgabe 165.** Es sei  $n \in \mathbb{N}^*$ . Die Permutationen  $\sigma, \tau \in S_n$  seien disjunkt.

(a) Beweisen Sie Lemma 2.41: Es gilt  $\sigma\tau = \tau\sigma$ .

(b) Folgern Sie: Es ist  $\text{ord}(\sigma\tau) = \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$ .

*Beweis.* (a) Kurze Erinnerung an Definition von disjunkte Permutationen:

**Definition 5.3.** Zwei Permutationen  $\sigma, \tau \in S_n$  heißen *disjunkt*, falls gilt

$$\begin{aligned}\sigma(i) \neq i &\implies \tau(i) = i, \text{ und} \\ \tau(i) \neq i &\implies \sigma(i) = i\end{aligned}$$

Wir brauchen außerdem eine Ergebnis

**Lemma 5.4.** Sei  $\sigma(i) = j \neq i$ . Es gilt dann  $\sigma(j) \neq j$ .

*Beweis.* Sonst wäre es ein Widerspruch zu die Definition, dass  $S_n$  die Gruppe alle bijektive funktionen  $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  ist. Die Permutation wäre dann nicht injektiv, weil  $\sigma(i) = \sigma(j)$ , aber per Annahme  $i \neq j$  gilt.  $\square$

**Korollar 5.5.** Sei  $\sigma, \tau \in S_n$  disjunkte Permutationen. Falls  $\sigma(i) \neq i$  gilt  $\tau\sigma(i) = \sigma(i)$ .

**Bemerkung 5.6.** Alle Aussagen here gelten natürlich noch, wenn man die Rollen von  $\sigma$  und  $\tau$  vertauschen.

Die Ergebnis folgt jetzt fast sofort. Wir betrachten drei Fälle:

(i)  $\sigma(i) \neq i$ , also  $\tau(i) = i$ .

Es gilt dann

$$\sigma\tau(i) \stackrel{5.3}{=} \sigma(i) \stackrel{5.5}{=} \tau\sigma(i).$$

(ii)  $\tau(i) \neq i$ , also  $\sigma(i) = i$ .

$$\tau\sigma(i) \stackrel{5.3}{=} \tau(i) \stackrel{5.5}{=} \sigma\tau(i).$$

(iii)  $\tau(i) = i$  und  $\sigma(i) = i$ .

$$\tau\sigma(i) = i = \sigma\tau(i).$$

Insgesamt gilt  $\tau\sigma = \sigma\tau$ .

(b) Es gilt

$$(\sigma\tau)^n = \sigma^n\tau^n$$

wegen (a), weil  $\sigma$  und  $\tau$  kommutiert, und wir können die Reihenfolge im Produkt

$$\underbrace{\sigma\tau\sigma\tau \dots \sigma\tau}_{n \text{ Mal}}$$

verändern, sodass die  $\sigma$  alle an einer Seite liegen, und die  $\tau$  an der anderen Seite. Sei  $N \ni p \leq \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$ . Sei  $p = n_1 \text{ord}(\sigma) + a = n_2 \text{ord}(\tau) + b$ ,  $a, b, n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq a < \text{ord}(\sigma)$  und  $0 \leq b < \text{ord}(\tau)$ .

$$\begin{aligned} (\sigma\tau)^p &= \sigma^p \tau^p \\ &= \sigma^{n_1 \text{ord}(\sigma) + a} \tau^{n_2 \text{ord}(\tau) + b} \\ &= \sigma^{n_1 \text{ord}(\sigma) + a} \tau^{n_2 \text{ord}(\tau) + b} \\ &= \sigma^{n_1 \text{ord}(\sigma)} \sigma^a \tau^{n_2 \text{ord}(\tau)} \tau^b \\ &= \sigma^a \tau^b \end{aligned}$$

Per Definition, wenn  $p = \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$ , ist  $a = b = 0$  und

$$(\sigma\tau)^{\text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))} = \sigma^0 \tau^0 = 1.$$

Für  $p < \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$  kann die beide nicht gleichzeitig gelten. Wir betrachten dann  $\sigma^a \tau^b$ . Per Definition können  $a$  und  $b$  nicht gleichzeitig 0 sein. Sei zum Beispiel  $a \neq 0$ . Dann haben wir nie das neutrale Element (es ist egal, was  $b$  ist). Sei  $i_k$  von  $\sigma$  bewegt (hier nehmen wir an, dass  $\sigma \neq 1$ ). Dann ist  $i_k$  nicht von  $\tau$  bewegt, weil  $\sigma$  und  $\tau$  disjunkt sind.

$$\sigma^a \tau^b i_k = \sigma^a i_k.$$

Per Definition ist  $\sigma^a i_k \neq i_k$  für alle mögliche  $i_k$ , sonst wäre  $\text{ord}(\sigma) = i_k$ . Dann ist  $(\sigma\tau)^p \neq 1$  für alle  $p < \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$ . Ähnlich für  $b \neq 0$  betrachten wir alle Elemente, die nicht von  $\sigma$  bewegt sind. Für entweder  $\sigma = 1$  oder  $\tau = 1$  ist die Behauptung klar. Sei  $\sigma = 1$ . Dann gilt  $\text{ord}(1) = 1$ , und  $\text{ord}(\sigma\tau) = \text{ord}(\tau) = \text{kgV}(1, \text{ord}(\tau))$ . Schluss:

$$\text{ord}(\sigma\tau) = \text{kgV}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau)). \quad \square$$

**Aufgabe 166.** (a) Zeigen Sie: Für jeden  $m$ -Zykel  $\sigma$  gilt  $\text{ord}(\sigma) = m$ .

(b) Bestimmen Sie das kleinste  $n \in \mathbb{N}$ , so dass  $S_n$  ein Element der Ordnung 20 enthält.

*Beweis.* (a) Sei  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_m)$ , mit die  $i_j$  paarweise unterschiedlich. Es gilt, für  $\mathbb{N} \ni x \leq m$

$$\sigma^x i_k = i_p,$$

wobei  $1 \leq p \leq m$  und  $p \equiv k + x \pmod{m}$ .  $\sigma^x = 1$  genau dann, wenn  $\sigma^x i_k = i_k$  für alle  $k$ , also  $p = k$ . Für  $x = m$  ist es dann klar,  $p = k$ , also  $\sigma^x = 1$ .

Für  $x < m$  kann das nicht sein. Das Kongruenz gilt genau dann, wenn

$$k + x - rx = k, \quad r \in \mathbb{Z}.$$

Aber per Definition, wenn  $r = 1$  ist  $k + x - \overset{1}{x} < k$ . Wenn  $r = 0$  ist  $k + x \neq k$ , weil  $x \geq 1 > 0$ . Also  $\sigma^x \neq 1$  für alle  $1 < x < m$ .

- (b) Mit Hilfe von 165 können wir einfach eine solche  $S_n$  konstruieren. Sei  $n = 9$ . Dann haben wir 2 disjunkter Zyklus

$$(12345) \quad \text{und} \quad (6789).$$

mit Ordnung 4 und 5 (a). Dann hat das Produkt  $(12345)(6789)$  der Ordnung 20, weil 4 und 5 Teilerfremd sind, und daher  $\text{kgV}(4, 5) = 4 \times 5 = 20$ .

Jetzt betrachten wir die Aufgabe im Allgemeinen. Sei  $n \in \mathbb{N}$  beliebig und  $\sigma$  ein Element von  $S_n$  mit der Ordnung 20. Wir können  $\sigma$  als Produkt von  $k$  disjunkter Zykel. Die Zyklen haben Länge  $l_i$ ,  $2 \leq l_i \leq k \forall i$  und

$$l_1 + l_2 + \dots + l_k \leq n.$$

Der Ordnung von  $\sigma$  ist

$$\text{ord}(\sigma) = l_1 l_2 \dots l_k = 20 = 2^2 \times 5.$$

Weil 5 eine Primzahl ist, muss mindestens ein  $l_i$  5 sein. Also oBdA können wir für beliebiges  $n$  so versuchen, ein solches Element so konstruieren: Wir nehmen 5 Elemente raus, und versuchen weiter, ein disjunkter Zyklus mit Länge 4 oder 2 disjunkte Zyklen mit Länge 2 zu finden. Das heißt, dass wir mindestens 9 Elemente brauchen. Dann ist 9 genau die gewünschte Zahl.  $\square$

**Aufgabe 167.** (a) Zeigen Sie, dass die Menge

$$V_4 := \{\sigma \in A_4 \mid \text{ord}(\sigma) \leq 2\}$$

eine Untergruppe der Ordnung 4 von  $A_4$  (und daher auch  $S_4$ ) ist.

- (b) Zeigen Sie, dass  $V_4$  ein Normalteiler von  $S_4$  (und daher auch  $A_4$ ) ist.

*Hinweis:  $V_4$  heißt auch Kleinsche Vierergruppe.*

*Beweis.* (a) Wir schreiben ein beliebiges Element  $\sigma \in V_4$  als Produkt von disjunkten Zykeln und nutzen die Eigenschaften:

- (i)  $\sigma \in A_4$ .

Dann kann das Produkt keine Zykeln der Ordnung 4 enthalten, weil  $\sigma$  ist dann genau das Zyklus und lässt sich als Produkt von 3 Transpositionen schreiben, also  $(i_1 i_2 i_3 i_4) = (i_1 i_4)(i_1 i_3)(i_1 i_2)$ .

- (ii)  $\text{ord}(\sigma) \leq 2$ .

Also das Produkt enthält nur Zykeln der Länge 2.

- (iii) Dann können alle  $\sigma \in V_4$  als Produkt von 0 oder 2 Zykeln der Länge 2 bzw. Transpositionen geschrieben werden. Wie viele solchen Zykeln gibt es? Wir schreiben alle Möglichkeiten

$$(12)$$

$$(23)$$

$$(34)$$

(13)

(24)

(14)

Dann können wir alle Elemente von  $V_4$  schreiben:

$$\begin{aligned} 1 &= () \\ (12)(34) \\ (13)(24) \\ (14)(23) \end{aligned}$$

(iv) Wir müssen keine Assoziativgesetz oder Existenz des Inverses beweisen, die folgen alle aus den Eigenschaften der Gruppe  $A_4$ .

(v)  $V_4$  ist abgeschlossen:

Wir schreiben die Verknüpfungstafel

$$\begin{pmatrix} () & (12)(34) & (13)(24) & (14)(23) \\ (12)(34) & () & (14)(23) & (13)(24) \\ (13)(24) & (14)(23) & () & (12)(34) \\ (14)(23) & (13)(24) & (12)(34) & () \end{pmatrix}.$$

(vi) Alle Elemente in  $V_4$  sind invertierbar, weil  $\text{ord}(\sigma)$  ist entweder 1, also  $\sigma = 1$  und  $\sigma^2 = 1$ , oder  $\text{ord}(\sigma) = 2$ , also  $\sigma^2 = 1$ . In beiden Fälle ist  $\sigma = \sigma^{-1}$ .

(b) Sei  $(v_1 v_2)(v_3 v_4) = v \in V_4$  und  $\sigma \in S_4$ . Sei  $f = \sigma^{-1}$ . Das Ziel ist

$$\sigma^{-1} v \sigma = (f(v_1) f(v_2))(f(v_3) f(v_4)).$$

Wir betrachten die Wirkung  $f v f^{-1} u$ . Weil sowohl  $\sigma$  als auch  $f$  bijektiv sind, können wir statt  $u$   $f(x)$  schreiben. Sei  $v(x) = y$ . Es gilt dann

$$f v f^{-1} f(x) = f v(x) = f(y).$$

Weil  $f$  bijektiv ist, ist  $\{f(v_1), f(v_2), f(v_3), f(v_4)\} = \{1, 2, 3, 4\}$ , also wir haben ein Produkt von 2 disjunkte Zykeln der Länge 2 bzw. Permutationen, also  $\sigma^{-1} v \sigma \in V_4$ .  $\square$

## 5.6 Blatt 6

**Aufgabe 168.** Seien  $G, H$  Gruppen und  $\Phi : G \rightarrow H$  ein Homomorphismus.

(a) Sei  $g \in G$  ein Element mit Ordnung  $n \in \mathbb{N}^*$ . Zeigen Sie, dass  $\text{ord}(\Phi(g)) | n$  gilt.

(b) Sei  $N \trianglelefteq G$ . Ist dann stets auch  $\Phi(N) \trianglelefteq H$ ?

*Beweis.* (a) Es gilt

$$\Phi(g)^n = \Phi(g^n) = \Phi(1_G) = 1_H,$$

also  $\text{ord}(\Phi(g)) \leq n$ . Wir beweisen die Aussage per Widerspruch. Sei  $\text{ord}(\Phi(g)) = p \nmid n$ . Wir schreiben

$$n = qp + r, \quad r < p$$

(Division mit Rest). Es gilt dann

$$\begin{aligned} \Phi(g)^n &= \Phi(g)^{qp+r} \\ &= \Phi(g)^{qp} \Phi(g)^r \\ &= (\Phi(g)^p)^q \Phi(g)^r \\ &= 1^q \Phi(g)^r \\ &= \Phi(g)^r \\ &\neq 1 \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir benutzt, dass  $r < p = \text{ord}(\Phi(g))$ , also  $\Phi(g)^r \neq 1$ , sonst wäre  $\text{ord}(\Phi(g)) = r$ .

(b) Nein. Wir betrachten eine "Einbettung"  $\text{em} : S_n \rightarrow S_m$ , wobei  $m > n$ . Sei  $\sigma \in S_n$ . Es gilt  $\text{em}(\sigma) = \sigma'$  genau dann, wenn

$$\sigma'(i) = \begin{cases} \sigma(i) & i \leq n \\ i & \text{sonst.} \end{cases}.$$

Es ist klar, dass  $\Phi$  ein Homomorphismus ist. Sei  $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ , mit  $\Phi(\sigma_1) = \sigma'_1$  und  $\Phi(\sigma_2) = \sigma'_2$ . Dann ist

$$\sigma'_1 \sigma'_2(i) = \sigma'_1(i) = i \quad n < i \leq m,$$

also  $\sigma'_1 \sigma'_2|_{\{1,2,\dots,n\}}$  ein Element von  $S_n$ , dessen Bild  $\sigma'_1 \sigma'_2$  ist.

Wir wissen, dass  $A_n \trianglelefteq S_n$ .

**Konkretes Gegenbeispiel:** Sei  $n = 3, m = 5$ . Wir betrachten  $\text{em} : S_3 \rightarrow S_4$ , und  $\Phi(A_3)$ , wobei  $A_3 \trianglelefteq S_3$ .

Dann ist  $\Phi(A_3)$  kein Normalteiler von  $S_4$ . Unter Zweckentfremdung der Notation stellen wir  $A_3$  und  $\Phi(A_3)$  in Zykelnnotation dar

$$A_3 = \Phi(A_3) = \{(123), (132)\}.$$

Es gilt auch  $(14) \in S_4$  und  $(14)^{-1} = (14)$ .

Es gilt aber

$$(14)(123)(14) = (14)(1234) = (234) \notin \Phi(A_3),$$

also  $\Phi(A_3) \not\trianglelefteq H$ . □

**Aufgabe 169.** Seien  $G$  eine Gruppe und  $M := \{x^2 | x \in G\}$ .

- (a) Zeigen Sie, dass  $N := \langle M \rangle$  ein Normalteiler von  $G$  ist.
- (b) Beweisen Sie, dass für jedes Element  $gN$  der Faktorgruppe  $G/N$  gilt:  $\text{ord}(gN) \leq 2$ .

*Beweis.* (a) Sei  $x, y \in G$  beliebig. Es gilt  $x^2 \in M$ . Es ist  $y^{-1}xy \in G$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} y^{-1}x^2y &= y^{-1}xxy \\ &= y^{-1}xyy^{-1}xy \\ &= (y^{-1}xy)^2 \\ &\in M, \end{aligned}$$

also  $M$  ist ein Normalteiler von  $G$ .

- (b) Wir betrachten das Quadrat eine Linksnebenklasse. Sei  $a \in G$  beliebig, also  $aN$  ist eine beliebige Linksnebenklasse.

$$aN \cdot aN = (a^2)N.$$

Wir wissen aber, dass  $a^2 \in N$  (per Definition). Weil  $N$  ein Normalteiler ist, gilt dann  $a^2N = N$ . Es folgt, dass  $\text{ord}(aN) \leq 2$ .  $\square$

**Aufgabe 170.** Geben Sie ein Beispiel für eine Gruppe mit Untergruppen  $A, B \leq G$  an, so dass

$$A \trianglelefteq B \quad \text{und} \quad B \trianglelefteq G$$

gelten, nicht jedoch  $A \trianglelefteq G$ .

**Hinweis:** Dies zeigt, dass das Normalteiler-Sein im Allgemeinen nicht transitiv ist.

*Beweis.* Wir betrachten  $G = D_4$ ,  $B = \langle r^2, s \rangle$  und  $A = \langle s \rangle$ . Wir zeigen die Eigenschaften

- (i)  $B \trianglelefteq G$ .

Es gilt  $|D_4| = 8$  und  $B = \{1, r^2, s, r^2s\}$ , also  $|B| = 4$ ,  $[G : B] = 2$ . Dann ist  $B$  stets ein Normalteiler (Bsp 2.35).

- (ii)  $A \trianglelefteq B$ .

Wir betrachten  $x^{-1}Ax$  für  $x \in B$ . Für  $x \in \{1, s\}$  ist es klar. Für  $x \in \{r^2, r^2s\}$  muss wir direkt das Produkt mit  $x^{-1}sx$  berechnen.

Es gilt

$$r^{-2}sr^2 = sr^4 = s,$$

$(r^2s)^{-1} = sr^2$  (man kann das durch direktes Multiplikation verifizieren)

$$sr^2ssr^2 = sr^4 = s.$$

Insgesamt ist  $A \trianglelefteq B$ .



(iii)  $A \not\subseteq G$ .

Es gilt  $r^{-1}sr = r^{-2}s = r^2s \neq 0$ . Wenn wir  $D_4 \subseteq S_{\mathbb{C}}$  betrachten, ist  $r^2s(1_{\mathbb{C}}) = -1$ , wobei  $1_{\mathbb{C}}$  das 1 in  $\mathbb{C}$  ist (also nicht das neutrale Element in  $\text{Sym}_{\mathbb{C}}$ ).

□

**Aufgabe 171.** Zeigen Sie, dass

$$S_n = \langle (12), (123 \dots n) \rangle$$

für jedes  $n \in \mathbb{N}^*$  gilt.

*Beweis.* Wir zeigen, dass Elemente mit bestimmte Formen Elemente von  $\langle (12), (123 \dots n) \rangle$  sind. Im Beweis begründen wir alle Schritte mit “Sonst wäre  $\langle (12), (123 \dots n) \rangle$  keine Gruppe, weil es nicht abgeschlossen wäre”.

Außerdem bedeutet hier Addition immer die Addition in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , aber durch 1 verschoben, also die mögliche Ergebnisse sind  $1, 2, \dots, n$  statt  $0, 1, \dots, n-1$ . Wir bezeichnen  $(12) = s$  und  $(123 \dots n) = T$ .

(i) Alle Transpositionen  $(i(i+1))$ . Die Proposition ist

$$T^x s T^{n-x} = ((x+1)(x+2)).$$

Es gilt

$$T^{n-x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ 1+(n-x) & 2+(n-x) & \dots & n-1+(n-x) & n+(n-x) \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$sT^{n-x} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1+x & 2+x & \dots & n \\ 1+(n-x) & \dots & 2 & 1 & \dots & 2n-x \end{pmatrix},$$

also

$$\begin{aligned} T^x s T^{n-x} &= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1+x & 2+x & \dots & n \\ 1+(n-x)+x & \dots & 2+x & 1+x & \dots & 2n-x+x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1+x & 2+x & \dots & n \\ 1+n & \dots & 2+x & 1+x & \dots & 2n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1+x & 2+x & \dots & n \\ 1 & \dots & 2+x & 1+x & \dots & n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(ii) Alle Transpositionen  $(i(i+k))$ , für alle  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  und  $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ .

Wir beweisen es per Induktion über  $k$ . Wir wissen es schon für  $k=1$ . Jetzt nehmen wir an, dass alle Transpositionen  $i(i+k') \in \langle (12)(123 \dots n) \rangle$  für alle  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  und  $k' \in \{1, 2, \dots, k-1\}$ .

Wir betrachten  $(i(i+k))$  für  $i$  beliebig. Ziel:

$$(i(i+k)) = (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i(i+k-1)). \quad (5.1)$$

Wir betrachten die Wirkung auf  $i$ ,  $i+k-1$  und  $i+k$ . Es ist klar, dass keine andere Zahlen nicht davon bewegt werden. Es gilt

$$\begin{aligned} & (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i(i+k-1))i \\ &= (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i+k-1) \\ &= (i(i+k-1))(i+k) \\ &= i+k \\ & (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i(i+k-1))(i+k) \\ &= (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i+k) \\ &= (i(i+k-1))(i+k-1) \\ &= i \\ & (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))(i(i+k-1))(i+k-1) \\ &= (i(i+k-1))((i+k-1)(i+k))i \\ &= (i(i+k-1))i \\ &= i+k-1, \end{aligned}$$

also die Gleichheit in (5.1) gilt.

(iii) Alle Elemente  $\sigma \in S_n$ .

Wir schreiben ein beliebiges Element  $\sigma \in S_n$  als Produkt von Transpositionen. Weil alle Transpositionen Elemente von  $\langle (12)(123 \dots n) \rangle$  sind, müssen dann  $\sigma \in \langle (12)(123 \dots n) \rangle$  auch.  $\square$

## 5.7 Blatt 7

**Aufgabe 172.** Sei  $G$  eine Gruppe.

- (a) Zeigen Sie, dass die Menge aller Automorphismen von  $G$  zusammen mit der Verkettung von Funktionen als Verknüpfung eine Gruppe bildet.

Man nennt diese Gruppe die *Automorphismengruppe* von  $G$  und schreibt  $\text{Aut}(G)$  für sie.

- (b) Zeigen Sie, dass für jedes  $g \in G$  durch

$$k_g : G \rightarrow G \quad x \rightarrow gxg^{-1}$$

ein Automorphismus von  $G$  gegeben ist.

Dies zeigt, dass die Konjugation mit einem beliebigen Gruppenelement  $g$  einen Automorphismus von  $G$  liefert.

*Beweis.* (a) Wir beweisen die Eigenschaften

(i) Neutrales Element:

Sei  $1 : G \rightarrow G$ ,  $1(x) = x \ \forall x \in G$ . Es ist klar, dass  $1$  bijektiv ist. Außerdem ist

$$1(xy) = xy = 1(x)1(y),$$

also  $1$  ist ein Automorphismus. Außerdem gilt für alle  $f \in \text{Aut}(G)$  :

$$f1(x) = f(x) \ \forall x \in G,$$

also  $1$  ist das neutrale Element.

(ii) Existenz des Inverses: Sei  $f \in \text{Aut}(G)$ . Weil  $f$  bijektiv ist, gibt es auch eine bijektive inverse Abbildung  $f^{-1}$ . Es bleibt zu zeigen, dass  $f^{-1}$  ein Homomorphismus ist. Sei  $x, y \in G$  beliebig. Weil  $f$  bijektiv ist, gibt es Elemente  $a, b \in G$ , so dass  $x = f(a)$  und  $y = f(b)$  gilt. Per Definition eine inverse Abbildung ist  $f^{-1}(x) = a$ ,  $f^{-1}(y) = b$ .

Es folgt:

$$\begin{aligned} f^{-1}(xy) &= f^{-1}(f(a)f(b)) \\ &= f^{-1}(f(ab)) && f \text{ ist ein Homomorphismus} \\ &= ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y) \end{aligned}$$

also  $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ .

(iii) Assoziativität

Folgt sofort aus der Assoziativität von Funktionverknüpfungen.

(iv) Abgeschlossenheit

Die Verkettung bijektive Abbildungen ist noch einmal bijektiv. Die Verkettung ist auch ein Homomorphismus (Definition 2.58), also  $\text{Aut}(G)$  ist abgeschlossen.

(b) Noch einmal zeigen wir alle Eigenschaften. Sei  $g \in G$  beliebig. Wir betrachten die Abbildung  $k_g$ .

(i) Sie ist ein Homomorphismus.

Sei  $x, y \in G$ . Es gilt  $k_g(x) = gxg^{-1}$  und  $k_g(y) = gyg^{-1}$ . Daraus folgt:

$$k_g(x)k_g(y) = gxg^{-1}gyg^{-1} = gxyg^{-1} = k_g(xy).$$

(ii) Sie ist injektiv.

Wir zeigen, dass  $\text{Ker}(k_g) = \{1\}$ . Wir nehmen an, dass es  $1 \neq x \in G$  gibt, so dass  $k_g(x) = 1$ . Dann ist

$$gxg^{-1} = 1 \implies gx = g.$$

Aus der Kurzungsregel folgt  $x = 1$ , ein Widerspruch.

(iii) Sie ist surjektiv. Sei  $y \in G$  und  $x = g^{-1}yg$ . Dann gilt

$$k_g(x) = gxg^{-1} = gg^{-1}ygg^{-1} = y,$$

also sie ist surjektiv.

Dann ist  $k_g$  ein bijektiver Homomorphismus, also ein Automorphismus.  $\square$

**Aufgabe 173.** Unter dem *Zentrum*  $Z(G)$  einer Gruppe  $G$  versteht man die Menge aller Elemente von  $G$ , die mit allen Elementen von  $G$  vertauschen, also die Menge  $Z(G) = \{g \in G \mid \text{es gilt } gxg^{-1} = x \text{ für alle } x \in G\}$ . Wir definieren die Menge der *inneren Automorphismen* von  $G$  durch

$$\text{Inn}(G) := \{k_g \mid g \in G\} \quad \text{mit } k_g \text{ wie in 172(b).}$$

Zeigen Sie, dass  $Z(G) \trianglelefteq G$ ,  $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$  und  $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$  gelten.

*Beweis.* Wir schreiben zuerst einen alternativen Definition:

$$Z(G) = \{g \in G \mid \text{es gilt } gx = xg \text{ für alle } x \in G\}.$$

Dann ist auch  $1 \in Z(G)$ , weil  $1x = x1 = x$  für alle  $x \in G$  gilt.

(a)  $Z(G) \leq G$  bzw.  $Z(G)$  ist eine Gruppe.

Sei  $g, h \in Z(G)$ . Dann gilt, für alle  $x \in G$ :

$$\begin{aligned} ghx(gh)^{-1} &= ghxh^{-1}g^{-1} \\ &= gxg^{-1} & h \in Z(G) \\ &= x & g \in Z(G), \end{aligned}$$

also  $Z(G)$  ist abgeschlossen.

Sei jetzt  $g \in Z(G)$  mit Inverse  $g^{-1}$  (momentan nicht angenommen, dass es in  $Z(G)$  ist). Das Ziel ist:

$$g^{-1}xg = x \quad \forall x \in G.$$

Weil  $G$  eine Gruppe ist, können wir  $x$  als  $y^{-1}$  schreiben für ein  $y \in G$ . Es gilt

$$\begin{aligned} g^{-1}y^{-1}g &= (g^{-1}yg)^{-1} \\ &= y^{-1} & g \in Z(G). \end{aligned}$$

Das heißt:  $g^{-1}xg = x$  für alle  $x \in G$ , und alle Elemente in  $Z(G)$  sind invertierbar.

(b)  $Z(G) \trianglelefteq G$ .

Folgt fast sofort per Definition: Wir betrachten die Nebenklassen.  
Sei  $x \in G$ . Es gilt

$$\begin{aligned} xZ(G) &= \{xg \mid g \in Z(G)\} \\ &= \{gx \mid g \in Z(G)\} \\ &= Z(G)x \end{aligned}$$

(c)  $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$

Sei  $f_1, f_2 \in \text{Inn}(G)$ , also es gibt  $g_1, g_2 \in Z(G)$ , so dass

$$\begin{aligned} f_1(x) &= g_1 x g_1^{-1} \\ f_2(x) &= g_2 x g_2^{-1} \end{aligned}$$

Dann ist  $(f_1 \circ f_2)(x) = g_1 g_2 x g_2^{-1} g_1^{-1} = g_1 g_2 x (g_1 g_2)^{-1}$ , also  $f_1 \circ f_2 \in \text{Inn}(G)$ .

Die Abbildung  $f : G \rightarrow G$ ,  $f(x) = x = 1x1^{-1}$  ist auch ein Element von  $\text{Inn}(G)$ . Es ist klar, dass es das neutrale Element ist.

Sei jetzt

$$\begin{aligned} f_1(x) &= g_1 x g_1^{-1} \\ f_1^{-1}(x) &= g_1^{-1} x g_1 \end{aligned}$$

$f_1^{-1} \in \text{Inn}(G)$ , weil  $g_1^{-1} \in G$  und  $f_1 = k_{g_1^{-1}}$ . Es gilt für alle  $x \in X$ , dass

$$(f_1 \circ f_1^{-1})(x) = g_1 g_1^{-1} x g_1 g_1^{-1} = x$$

Also  $\text{Inn}(G)$  ist eine Gruppe.

$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$ .

Per Definition ist  $\Lambda : g \rightarrow k_g$  eine surjektive Abbildung. Weiter ist  $\Lambda$  ein Homomorphismus: Sei  $g, h \in G$ . Dann ist  $\Lambda(gh) = k_{gh}$ , wobei  $k_{gh}(x) = (gh)x(gh)^{-1}$  für alle  $x \in G$ . Es gilt

$$\begin{aligned} k_{gh}(x) &= (gh)x(gh)^{-1} \\ &= (gh)xh^{-1}g^{-1} \\ &= g(hxh^{-1})g^{-1} \\ &= (k_g \circ k_h)(x) \end{aligned}$$

Was ist der Kern des Homomorphismus?  $k_g = 1$  genau dann, wenn

$$k_g(x) = gxg^{-1} = x \quad \forall x \in G.$$

Der Kern ist per Definition genau das Zentrum. Dann folgt  $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$  aus dem Homomorphiesatz.

$$\begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{g \mapsto k_g} & \text{Inn}(G) \\
 \downarrow & \nearrow \cong & \\
 G/Z(G) & & 
 \end{array}$$

□

**Aufgabe 174.** (a) Nach Beispiel 2.71 operiert  $S_n$  auf sich selbst per Konjugation. Beschreiben Sie die Bahnen dieser Operation.

(b) Wir nennen eine Transposition der  $S_3$  *schön*, wenn Sie von der Form  $(1x)$  mit  $x \in \{2, 3\}$  ist. Sei das Neutrale von  $S_3$  als Produkt schöner Transpositionen dargestellt. Kommen in diesem Produkt die einzelnen schönen Transpositionen dann stets in gerader Anzahl vor?

*Beweis.* (a) Wir brauchen hier

**Satz 2.52**

Sei  $\varphi = (a_1 a_2 \dots)(b_1 b_2 \dots) \dots \in S_n$  in Zykelnotation und  $\psi \in S_n$ . Dann

$$\psi \varphi \psi^{-1} = (\psi(a_1) \psi(a_2) \dots) (\psi(b_1) \psi(b_2) \dots) \dots$$

Per Definition sind die Bahnen definiert durch

$$\{\sigma' \sigma \sigma'^{-1} \mid \sigma' \in S_n\}.$$

Zu jedem  $\sigma \in S_n$  gehört eine (vielleicht nicht eindeutige) Bahn. Wir schreiben  $\sigma$  als Produkt disjunkter Zykeln (im Sinne von Satz 2.41)

Dann zeigen wir zwei Richtungen

(i) Wenn zwei Permutationen die gleichen Zykellänge haben, sind sie konjugiert (Satz 2.53)

Dies zeigt, dass sie in der gleichen Bahn sind.

(ii) Wenn zwei Permutationen bzw. Elemente in  $S_n$  unterschiedliche Darstellungen als Produkt disjunkter Zykeln haben, wobei unterschiedliche heißt *nicht* bis auf die Reihenfolge der Faktoren), sind die Permutation nicht konjugiert.

Dies folgt aus die Eindeutigkeit der Darstellung von  $\sigma$  als Produkt von disjunkter Zykeln.

Insgesamt gilt: Zwei Elemente liegen in der gleichen Bahn genau dann, wenn die Elemente die gleiche Darstellung als Produkt disjunkter Zykeln haben.

(b) Nein. Es gilt  $(12)(23) = (123)$ , ein Zyklus der Länge 3. Also gilt  $[(12)(23)]^3 = (123)^3 = 1$ , aber die einzelnen Transpositionen kommen in ungerade Zahlen (3) vor. □

**Aufgabe 175.** Die Gruppe  $G$  operiere auf der Menge  $M$ . Weiter sei  $U$  eine Untergruppe von  $G$ , so dass die auf  $U$  eingeschränkte Operation transitiv auf  $M$  sei.

Zeigen Sie, dass dann  $G = U \cdot G_m$  für alle  $m \in M$  gilt.

*Beweis.* Sei  $m \in M$  fest, aber beliebig. Sei  $U' \subseteq U$  eine minimale Teilmenge von  $U$ , so dass  $\{xm | x \in U'\} = M$  (möglich weil die Operation transitiv ist). Wir können eine solche Teilmenge konstruieren, indem wir das Ergebnis der Operation  $xm$  betrachten und alle andere Elemente mit dem gleichen Ergebnis wegwerfen.

- (i) Sei  $a, b \in G_m$ ,  $a \neq b$  und  $x \in U'$ . Dann gilt  $xa \neq xb$  (Kürzungsregel)
- (ii) Sei  $x, y \in U'$ ,  $x \neq y$  und  $a, b \in G_m$ . Dann gilt  $xa \neq yb$ , weil  $xam = xm$  und  $ybm = ym$ , aber  $xm \neq ym$  per Definition von  $U'$  als minimale Teilmenge.
- (iii) Dann betrachten wir alle Elemente von der Form  $xa$ ,  $x \in U'$ ,  $a \in G_m$ . Wir haben schon gezeigt, dass alle solche Elemente unterschiedlich sind. Wie viele Elemente gibt es?  $|U'| = |M|$  per Konstruktion und  $|G_m| = |G|/|M|$  (Satz 2.71). Daraus folgt, dass

$$|U \cdot G_m| \geq |M|(|G|/|M|) = |G|,$$

also  $G \subseteq U \cdot G_m$ . Weil wir offenbar per Definition keine Elemente außerhalb  $G$  erreichen können, haben wir also  $U \cdot G_m \subseteq G$  und daher Gleichheit.  $\square$

## 5.8 Blatt 8

**Aufgabe 176.** (a) Eine Gruppe  $G$  der Ordnung 21 operiere auf einer Menge  $M$  mit 11 Elementen. Zeigen Sie, dass diese Operation eine Bahn der Länge 1 besitzt.

(Ist  $\{m\} \subseteq M$  eine solche einelementige Bahn, dann gilt  $g \cdot m = m$  für alle  $g \in G$ . Jedes  $g \in G$  fixiert also  $m$ . Man nennt  $m$  daher auch einen Fixpunkt der Operation.)

- (b) Sei  $G := \text{GL}(2, \mathbb{C})$  die Gruppe der invertierbaren komplexen  $(2 \times 2)$ -Matrizen und  $M$  die Menge aller komplexen  $(2 \times 2)$ -Matrizen, die nur reelle Eigenwerte besitzen. Dann operiert  $G$  per Konjugation auf  $M$ . (Dies brauchen Sie nicht zu zeigen.) Geben Sie ein Repräsentantensystem der Bahnen der Operation an)

*Beweis.* (a) Wir schreiben die Klassengleichung

$$|M| = \sum_{i=1}^r [G : G_m].$$

Jeder Term in Summe ist eine Teiler von 21, also 1, 3, 7 oder 21. Die Operation besitzt eine Bahn der Länge 1 genau dann, wenn 1 zumindest einmal vorkommt. Wir schreiben die möglichen Summen:

$$11 = 1 \times 11$$

$$11 = 3 + 1 \times 8$$

$$11 = 3 \times 2 + 1 \times 5$$

$$11 = 3 \times 3 + 1 \times 2$$

$$11 = 7 + 1 \times 4$$

$$11 = 7 + 3 + 1$$

Weil 1 immer vorkommt, gibt es immer eine Bahn der Länge 1.

(b) Konjugation ist genau eine Ähnlichkeitstransformation. Wir brauchen:

Zwei Matrizen sind ähnlich genau dann, wenn sie die gleichen Jordan-Normalform haben.

Daraus ergibt sich ein Repräsentantensystem der Bahnen:

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\},$$

wobei die erste diagonalisierbare Matrizen darstellt und die zweite nicht diagonalisierbare Matrizen darstellt.  $\square$

**Aufgabe 177.** Von der endlichen Gruppe  $G$  sei bekannt, dass sie nicht abelsch ist und zu jedem positiven Teiler  $t$  von  $|G|$  mindestens eine Untergruppe der Ordnung  $t$  besitzt. Zeigen Sie, dass  $G$  nicht einfach ist. (Hinweis: Sei  $p$  die kleinste Primzahl, die  $|G|$  teilt, und  $U$  eine Untergruppe von  $G$  vom Index  $p$ . Lassen Sie  $G$  auf den Nebenklassen von  $U$  operieren und betrachten Sie den Kern des zugehörigen Homomorphismus.)

*Beweis.* Wie im Hinweis: Sei  $p$  die kleinste Primzahl, die  $|G|$  teilt und  $U$  eine Untergruppe von  $G$  vom Index  $p$ .  $G$  operiere auf den Linksnebenklassen von  $U$ . Die Operation ist ein Homomorphismus  $G \rightarrow S_p$ . Deren Kern  $K$  ist eine Untergruppe von  $U$ , weil  $xU \neq U$  für  $x \notin U$ . Das Ziel ist: Der Kern ist nicht trivial.

Die Faktorgruppe  $G/K$  ist isomorph zu eine Untergruppe von  $S_p$ , also es teilt  $|S_p| = p!$ . Als Faktorgruppe teilt  $|G/K|$  den Ordnung von  $G$  auch. Weil  $p \neq 1$ , ist  $U$  eine echte Untergruppe, also  $|G/K| \neq 1$ . Dann ist die einzige Zahl, die sowohl  $p!$  als auch  $|G|$  teilt,  $p$ . Daraus folgt:  $|K| = |U|$ . Weil  $K \subseteq U$ , ist  $K = U$ , also  $U$  ist ein Normalteiler.  $\square$

**Aufgabe 178.** Benutzen Sie die Beweisidee aus Korollar 2.79, um folgende Aussage zu zeigen: Seien  $p$  eine Primzahl,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $G$  eine Gruppe der Ordnung  $p^n$  und  $\{e\} < N \trianglelefteq G$  ein nicht-trivialer Normalteiler von  $G$ . Dann gilt  $|Z(G) \cap N| > 1$ .



*Beweis.* Als Normalteiler (insbesondere Untergruppe) teilt der Ordnung von  $N$  den Ordnung von  $G$ , also  $|N| = p^m$ ,  $0 < m \leq n$ .  $0$  ist ausgeschlossen, weil  $N$  nicht trivial ist. Dann ist  $p$  ein Teiler von  $|N|$ . Wir schreiben noch einmal die Klassengleichung:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$

Als Normalteiler ist  $N$  per Definition eine Vereinigung von Konjugationsklassen, sonst wäre  $N$  unter Konjugation nicht abgeschlossen. Eine solche Konjugationsklasse ist  $\{e\}$ , weil  $N$  eine Untergruppe ist. Der Ordnung von Konjugationsklassen sind Teiler von  $p^n$ , also Potenzen von  $p$ . Dann ist der Ordnung von  $N$  eine Summe

$$|N| = \sum_{m=1}^k [G : G_m] = 1 + p^{m_1} + p^{m_2} + \dots + p^{m_k}.$$

Es ist nicht möglich, dass alle  $m_1, \dots, m_k > 0$  sind, weil dann  $p$  ein Teiler von alle  $p^{m_i}$  und  $|N|$  wäre, jedoch kein Teiler von 1 und daher kein Teiler von die rechte Seite. Dann muss es für eine  $m_i$  gelten, dass  $m_i = 0$ . Dann enthält  $N$  Konjugationsklassen der grösse 1 bzw. Elemente im Zentrum, die nicht  $e$  sind, also  $N \cap Z(G) \neq \{e\}$ .  $\square$

**Aufgabe 179.** Die Gruppe  $G$  operiere auf einer Menge  $M$ . Sei  $\Phi : G \rightarrow \text{Sym}(M)$  der zugehörige Homomorphismus und  $K$  sein Kern. Zeigen Sie, dass durch die Abbildung

$$G/K \times M \rightarrow M, \quad gK.m := g.m$$

eine treue Operation von  $G/K$  auf  $M$  gegeben ist.

*Beweis.* Wir zeigen zuerst, dass es wohldefiniert ist. Sei  $k_1, k_2 \in K$  und  $m \in M$ . Es gilt

$$\begin{aligned} gk_1.m &= \Phi(gk_1)(m) \\ &= \Phi(g)(\Phi(k_1)(m)) \\ &= \Phi(g)(e(m)) \\ &= \Phi(g)(m) \\ &= g.m \end{aligned}$$

und ähnlich für  $gk_2.m = g.m$ . Sei jetzt  $g_1, g_2 \in G$ , so dass  $g_1K.m = g_2K.m$  für alle  $m \in M$ . Dann ist

$$g_2^{-1}g_1.m = m$$

für alle  $m \in M$  oder  $g_2^{-1}g_1 \in K$ . Daraus folgt:  $g_1$  und  $g_2$  liegen in der gleichen Nebenklasse.  $\square$

## 5.9 Blatt 9

**Aufgabe 180.** (a) Beweisen Sie, dass alle Gruppen der Ordnung 15 zyklisch sind.

(b) Funktioniert die Schlussweise aus Aufgabenteil (a) auch bei Gruppen der Ordnung 45?

*Beweis.* (a)  $15 = 3 \times 5$ , zwei Primzahlen, also die Teiler von 15 sind 1, 3, 5 und 15. Da 3 teilt 15,  $3^2 = 9$  aber nicht, gibt es mindestens eine 3-Sylowgruppe  $G_3$ . Für die Zahl der 3-Sylowgruppen  $n_3$  gilt:

$$\begin{aligned} n_3 &\equiv 1 \pmod{3} \\ n_3 &| [G : G_3] = 5 \end{aligned}$$

Aus den ersten Gleichung folgt:  $n_3$  ist 1 oder 4. Da  $4 \nmid 5$ , ist  $n_3 = 1$ , also es gibt genau eine Gruppe der Ordnung 3. Ähnlich gibt es genau eine Gruppe der Ordnung 5. Es gibt genau eine Gruppe der Ordnung 1, die triviale Gruppe und genau eine Gruppe der Ordnung 15, die ganze Gruppe.

Da es für jeder Teiler  $t$  von 15 genau eine Untergruppe der Ordnung  $t$  gibt, sind alle solche Gruppen zyklisch.

(b) Nein. Es kann mehr als eine Gruppe der Ordnung 5 geben, weil für die Zahl der 5-Sylowgruppen  $n_5$  gilt:

$$\begin{aligned} n_5 &\equiv 1 \pmod{5} \\ n_5 &| 9 \end{aligned}$$

Eine Möglichkeit ist  $n_5 = 6$ , also wir dürfen den Fall, in dem mehr als eine Untergruppe der Ordnung 5 gibt, nicht ausschließen.  $\square$

**Aufgabe 181.** (a) Seien  $p$  eine Primzahl,  $G$  eine Gruppe,  $P$  eine  $p$ -Sylowgruppe von  $G$  und  $n_p$  die Anzahl der  $p$ -Sylowgruppen von  $G$ . Zeigen Sie, dass  $P \trianglelefteq G$  genau dann gilt, wenn  $n_p = 1$  ist.

(b) Zeigen Sie, dass eine Gruppe der Ordnung 12 nicht einfach ist.

*Beweis.* (a) Sei  $n_p \neq 1$ , also  $n_p > 1$ . Dann gibt es eine andere  $p$ -Sylowgruppe  $U$ . Weil alle Sylowgruppen konjugiert sind, gibt es  $x \in G$ , so dass  $x^{-1}Px = U \neq P$ , also  $x^{-1}Px \neq P$  für alle  $x \in G$ , und  $P$  ist kein Normalteiler.

Sei umgekehrt  $P$  kein Normalteiler. Es gibt dann  $x \in G$ , so dass  $x^{-1}Px = U \neq P$ . Weil die Abbildung  $p \rightarrow x^{-1}px$  injektiv ist, ist  $U$  auch eine  $p$ -Sylowgruppe, also  $n_p > 1$ .

(b)  $12 = 2^2 \times 3$ . Für die Zahlen der 3 bzw. 2-Sylowgruppen gilt

$$\begin{aligned} n_2 &\equiv 1 \pmod{2} \\ n_2 &| 3 \\ n_3 &\equiv 1 \pmod{3} \\ n_3 &| 4 \end{aligned}$$

Falls irgendeine Zahl  $n_2$  oder  $n_3$  1 ist, sind wir nach (a) fertig. Also wir nehmen an, dass weder  $n_2$  noch  $n_3$  1 sind. Die einzige Lösung ist dann  $n_2 = 3$ ,  $n_3 = 4$ .

Die 3-Sylowgruppen sind außer das Neutrale disjunkt. In andere Worte: Sei  $H'$  und  $H$  3-Sylowgruppen. Dann ist  $H' \cap H = \{e\}$ . Beweis: Wir beweisen es per Widerspruch. Weil  $H = H'$  angenommen ist, ist  $|H \cap H'| = 2$ . Alle Elemente in  $H$  bzw.  $H'$  haben die Ordnung 3, weil die Ordnung ein Teiler von der Gruppenordnung (3) ist, was nicht 1 ist, wenn das Element nicht das Neutrale ist. Dann ist  $H \cap H' = \{e, p\}$ , wobei  $p$  die Ordnung 3 hat. Das ist aber ein Widerspruch, weil 3 teilt 2 nicht.

Das heißt: Aus 4 3-Sylowgruppen bekommen wir 8 unterschiedliche Elemente, die nicht  $e$  sind. Es gibt eine 2-Sylowgruppe der Ordnung 4, z.B.  $H$ . Da Sylowgruppen von unterschiedliche Ordnung einen trivialen Schnitt haben, bekommen wir daraus 3 neue Elemente. Es gibt aber mehr als eine 2-Sylowgruppe, z.B.  $H'$ . Da  $H = H'$ , bekommen wir zumindest ein neues Element. Aus dem gleichen Argument ist dies nicht in den 8 Elemente aus der 3-Sylowgruppen enthalten.

Insgesamt: Die Gruppe besitzt ein neutrales Element. Aus den 3-Sylowgruppen bekommen wir 8 nicht neutrale Elementen. Aus den 2-Sylowgruppen bekommen wir mindestens 4 Elemente. Alle diese Elemente sind unterschiedlich. Dann hat die Gruppe mindestens 13 Elemente, ein Widerspruch.  $\square$

**Aufgabe 182.** Sei  $G$  eine Gruppe der Ordnung  $392 = 2^3 \cdot 7^2$ . Zeigen Sie, dass  $G$  nicht einfach ist.

*Beweis.* Es gibt Sylow-Untergruppen der Ordnung  $7^2$  und  $2^3$ . Für die Zahl solche Untergruppen  $n_7$  und  $n_2$  gilt:

$$\begin{aligned} n_2 &\equiv 1 \pmod{2} \\ n_2 &| 49 \\ n_7 &\equiv 1 \pmod{7} \\ n_7 &| 8 \end{aligned}$$

Angenommen  $n_2 \neq 1 \neq n_7$ , sonst wären wir nach 181(a) fertig. Also es gilt  $n_7 = 8$ . Die Gruppe  $G$  operiere auf die Menge der 7-Sylowgruppen

per Konjugation. Die Operation ist ein Homomorphismus  $\varphi : G \rightarrow S_8$ , dessen Kern ein Normalteiler ist. Wir zeigen, dass der Kern nicht trivial und nicht die ganze Gruppe ist.

Wenn der Kern die ganze Gruppe wäre, gibt es eine 7-Sylowgruppe  $H$ , so dass  $gHg^{-1} = H$  für alle  $g \in G$ . Dann sind die 7-Sylowgruppen nicht konjugiert, ein Widerspruch. (Außerdem wäre  $H$  ein Normalteiler.)

Wenn der Kern trivial wäre, wäre das Bild  $\varphi(G)$  eine Untergruppe von  $S_8$ . Weil  $\varphi$  injektiv wäre, hätte diese der Ordnung 392. Die Ordnung aller Untergruppen teilt die Ordnung der ganzen Gruppe, also

$$392 \mid 8!.$$

Aber 7 kommt nur einmal in der Primfaktorzerlegung von  $8!$  vor, während es zweimal in der Primfaktorzerlegung von 392 zweimal vorkommt. Das heißt:  $392 \nmid 8!$ , ein Widerspruch.  $\square$

**Aufgabe 183.** (a) Sei  $G$  eine endliche Gruppe mit zyklischer Zentrumsfaktorgruppe  $Z/Z(G)$ . Zeigen Sie, dass dann  $G = Z(G)$  gilt.

- (b) Zeigen Sie: Sind  $p \in \mathbb{P}$  eine Primzahl und  $G$  eine Gruppe der Ordnung  $p^2$ , so ist  $G$  abelsch.
- (c) Sind auch Gruppen der Ordnung  $p^3$  (mit primem  $p \in \mathbb{P}$ ) stets abelsch?

*Beweis.* (a) Die Zentrumsfaktorgruppe ist zyklisch genau dann, wenn es ein Element  $x \in G$  gibt, so dass die Potenzen  $x^n Z(G)$  alle Elemente erreichen können. Das heißt, dass für jedes  $y \in G$  ein  $p \in Z(G)$  und ein  $n \in \mathbb{N}$  gibt, so dass  $y = x^n p$ . Sei  $y' \in G$  beliebig. Ähnlich gibt es  $p' \in Z(G)$  und  $n' \in \mathbb{N}$ , so dass  $y' = x^{n'} p'$ . Wir betrachten die Menge

$$\{p, x^n, p', x^{n'}\}.$$

Da  $p \in Z(G)$  ist, kommutiert  $p$  mit allen Elementen aus  $G$ , insbesondere  $x$  und daher  $x^n$  und  $x^{n'}$ . Das gilt auch für  $p'$ . Weil  $x^n$  und  $x^{n'}$  Potenzen von  $x$  sind, kommutieren sie miteinander. Also alle Elemente sind paarweise kommutativ und

$$yy' = x^n p x^{n'} p' = x^{n'} p' x^n p = y'y.$$

Da  $y$  und  $y'$  beliebig waren, kommutiert jedes beliebige  $y \in G$  mit allen anderen Elementen  $y' \in G$ , also  $G = Z(G)$ .

- (b) Das Zentrum ist eine Untergruppe. Weil  $Z(G)$  nicht trivial ist (Korollar 2.78), ist  $Z(G)$  entweder  $p$  oder  $p^2$ . Falls  $|Z(G)| = p^2$ , wäre  $G = Z(G)$  und wir sind dann fertig.

Falls  $|Z(G)| = p$ , hat die Faktorgruppe  $G/Z(G)$  Ordnung  $p$ . Nach dem Satz von Cauchy gibt es ein Element der Ordnung  $p$  in  $G/Z(G)$ , also das Element ist ein Erzeuger von  $G/Z(G)$ , und  $G/Z(G)$  ist zyklisch. Daraus folgt:  $G = Z(G)$ , und  $G$  ist abelsch.

- (c) Nein.  $2^3 = 8$  und es gibt eine Diedergruppe  $D_4$  der Ordnung 8. Die Diedergruppe ist aber nicht abelsch.  $\square$

## 5.10 Blatt 10

**Aufgabe 184.** Bestimmen Sie alle Isomorphietypen für Gruppen der Ordnung  $45 = 3^2 \cdot 5$ .

*Beweis.* Wir betrachten die Zahl der 3- bzw. 5-Sylowgruppen  $n_3$  bzw.  $n_5$ . Es gilt

$$\begin{aligned} n_3 &\equiv 1 \pmod{3} \\ n_3 &| 5 \\ n_5 &\equiv 1 \pmod{5} \\ n_5 &| 9 \end{aligned}$$

Die einzige Lösung ist  $n_3 = 1$  und  $n_5 = 1$ . Da die Zahlen 1 sind, sind die Untergruppen normal. Sei  $A$  die 3-Sylowgruppe und  $B$  die 5-Sylowgruppe. Die Gruppen müssen sich trivial schneiden, weil die Ordnung alle Elemente darin ein Teiler von der Gruppenordnung sein müssen.

Da  $9 \times 5 = 45$ , ist  $|AB| = 45$ , also  $AB$  ist einfach die ganze Gruppe. Da  $n_3 = n_5 = 1$ , sind die Untergruppen normal. Es folgt daraus, dass die ganze Gruppe (isomorph zu)  $A \times B$  ist.

Also ist jetzt die Frage: Wie viele Gruppen der Ordnung 5 und 9 gibt es?

Es gibt nur eine (bis auf Isomorphie) eindeutige Gruppe der Ordnung 5, weil 5 eine Primzahl ist, also es enthält ein Element der Ordnung 5, was ein Erzeuger ist. Daher ist die Gruppe  $C_5$ .

Wir wissen aus der vorherigen Übungsblatt, dass eine Gruppe der Ordnung  $3^2$  abelsch ist. Dann ist eine Gruppe der Ordnung 9 ein direktes Produkt von zyklische Gruppen von Primpotenzordnung. Die einzige Möglichkeit ist  $C_3 \times C_3$ . Natürlich ist  $C_9$  auch eine Gruppe der Ordnung 9.

Insgesamt gibt es nur zwei Gruppen der Ordnung 45:  $C_5 \times C_9$  und  $C_5 \times C_3 \times C_3$ .  $\square$

**Aufgabe 185.** Seien  $N$  und  $U$  zwei Gruppen. Zeigen Sie: Genau dann gilt  $N \rtimes_{\phi} U = N \times U$ , wenn  $\phi_u = \text{id}_N$  für alle  $u \in U$  gilt.

*Beweis.* Die beide Gruppen sind auf der Menge  $N \times U$  (kartesisches Produkt von Mengen) definiert. Jetzt die Rückrichtung: Falls  $\phi_u = \text{id}_N$  für alle  $N$  gilt, ist das Produkt

$$(n_1, u_1) \circ (n_2, u_2) = (n_1 \phi_{u_1}(n_2), u_1 u_2) = (n_1 n_2, u_1 u_2)$$

für alle  $n_1, n_2 \in N, u_1, u_2 \in U$ . Dann bekommen wir per Definition das direkte Produkt.

Sei jetzt  $N \rtimes_{\phi} U = N \times U$ . Dann stimmen alle Produkte überein. Sei  $u_1, u_2 \in U$  und  $n_1, n_2 \in N$ . Es gilt

$$(n_1 \phi_{u_1}(n_2), u_1 u_2) = (n_1 n_2, u_1 u_2)$$

insbesondere

$$n_1 \phi_{u_1}(n_2) = n_1 n_2.$$

Aus der Kurzungsregel folgt

$$\phi_{u_1}(n_2) = n_2.$$

Da  $u_1, u_2, n_1, n_2$  beliebig waren, muss dies für alle  $u_1, n_2$  gelten, also  $\phi_{u_1} = \text{id}_N$  für alle  $u_1 \in U$ .  $\square$

**Aufgabe 186.** Von einer Gruppe  $G$  seien bekannt:

- (1) Sie habe Ordnung  $p^2 \cdot q^2$  mit zwei verschiedenen Primzahlen  $p, q \in \mathbb{P}$ .
- (2) Die  $q$ -Sylowgruppe  $Q$  von  $G$  sei normal.
- (3)  $p$  Sei kein Teiler von  $|\text{Aut}(Q)|$ .

Zeigen Sie, dass  $G$  abelsch ist.

(Hinweis: Denken Sie an semidirekte Produkte. Verwenden Sie an geeigneter Stelle Übung 185.)

*Beweis.* Sei die  $p$ -Sylowgruppe bzw.  $q$ -Sylowgruppe von  $G$   $P$  bzw.  $Q$ . Es gilt  $|P||Q| = |G|$ , also  $G = PQ$ . Da  $Q$  normal ist, ist  $G \cong Q \rtimes P$ .  $\square$

**Aufgabe 187.** (a) Zeigen Sie, dass jede abelsche Gruppe der Ordnung 100 ein Element der Ordnung 10 enthält

- (b) Zeigen Sie, dass  $A_4$  keine Untergruppe der Ordnung 6 besitzt (vgl. auch Bemerkung 2.29 im Skript).

---

## Theoretische Mechanik

---

### 6.1 Blatt 1

**Aufgabe 188.** Betrachten Sie den harmonischen Oszillator in einer Dimension, d. h. das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x}{dt^2} &= F(x(t)) = -kx(t) \\ x(t_0) &= x_0 \in \mathbb{R} \\ \frac{dx}{dt} &= v_0 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

1. Zeigen Sie, daß wenn eine komplexwertige Funktion  $z : I \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $t_0 \in I \subseteq \mathbb{R}$  die Differentialgleichung (1a) löst, ihr Realteil  $x(t) = \operatorname{Re} z(t)$  zur Lösung des reellen Anfangswertproblems (1) benutzt werden kann.
2. Was ist die allgemeinste Form der rechten Seite der Differentialgleichung (1a), für die der Realteil einer komplexen Lösung selbst eine Lösung ist? Geben Sie Gegenbeispiele an.
3. Machen Sie den üblichen Exponentialansatz für lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. . .

*Beweis.* 1. Sei  $x(t) = x_r(t) + ix_i(t)$ ,  $x_r, x_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

Dann gilt

$$m \left( \frac{d^2 x_r}{dt^2} + i \frac{d^2 x_i}{dt^2} \right) = -k(x_r + ix_i).$$

Weil das eine Gleichung von zwei komplexe Zahlen ist, gilt auch

$$m \frac{d^2 x_r}{dt^2} = -kx_r.$$

2. Das passt für alle reelle lineare Kombinationen der Ableitungen von  $x(t)$ .

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i x}{dt^i} = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

### Gegenbeispiele

- (i) Irgendeine  $a_i \notin \mathbb{R}$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -ikx(t), \quad k \in \mathbb{R}.$$

Hier ist es klar, dass *keine* Abbildung  $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Lösung sein kann, weil die linke Seite reelle wird, aber die rechte Seite nicht reelle wird.

Daraus folgt: Das Realteil der Lösung ist kein Lösung.

- (ii) Nichtlineare Gleichung, z.B.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k \left( \frac{dx}{dt} \right)^2.$$

3.

$$\begin{aligned} x(t) &= \alpha e^{\lambda t} \\ \ddot{x}(t) &= \lambda^2 \alpha e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Dann

$$\begin{aligned} m \alpha \lambda^2 e^{\lambda t} &= -k \alpha e^{\lambda t} \\ \lambda^2 &= -\frac{k}{m} \\ \lambda &= \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i \omega \quad \omega := \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned}$$

Daraus folgt, für  $z_1(t)$ :

$$\begin{aligned} z_1(0) &= \alpha_{1,+} + \alpha_{1,-} = x_0 \\ z_1'(0) &= -i\omega \alpha_{1,+} + i\omega \alpha_{1,-} = v_0 \\ &\quad -\alpha_{1,+} + \alpha_{1,-} = -\frac{iv_0}{\omega} \\ 2\alpha_{1,-} &= x_0 - \frac{iv_0}{\omega} \\ 2\alpha_{1,+} &= x_0 + \frac{iv_0}{\omega} \\ z_1(t) &= \frac{1}{2} \left[ \left( x_0 + \frac{iv_0}{\omega} \right) e^{-i\omega t} + \left( x_0 - \frac{iv_0}{\omega} \right) e^{i\omega t} \right] \end{aligned}$$

Daraus folgt die andere Formen der Lösungen:



(i)  $x_2(t)$ 

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \left[ \left( x_0 + \frac{iv_0}{\omega} \right) e^{-i\omega t} + \left( x_0 - \frac{iv_0}{\omega} \right) e^{i\omega t} \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[ \left( x_0 + \frac{iv_0}{\omega} \right) e^{-i\omega t} \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[ \left( x_0 + \frac{iv_0}{\omega} \right) (\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[ x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t + i(\dots) \right] \\
&= x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t
\end{aligned}$$

(ii)  $x_3(t)$  (R-Formula)

$$\begin{aligned}
x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t &= \alpha_3 \sin(\omega t + \delta_3) \\
\alpha_3 &= \sqrt{x_0^2 + \left( \frac{v_0}{\omega} \right)^2} \\
\delta_3 &= \arctan \frac{v_0}{x_0 \omega}
\end{aligned}$$

(iii)  $x_4(t)$ 

$$\sin \left( x + \frac{\pi}{2} \right) = \cos x.$$

Daraus folgt:

$$\alpha_4 = \alpha_3 \quad \delta_4 = \delta_3 + \frac{\pi}{2}.$$

□

**Aufgabe 189.** Betrachten Sie den gedämpften und getriebenen harmonischen Oszillator in einer Dimension mit dem Anfangswertproblem

$$\begin{aligned}
m \frac{d^2 x}{dt^2} &= F(x(t), \dot{x}(t), t) = -kx(t) - 2m\gamma \frac{dx}{dt} + F_{ext}(t) \\
x(0) &= x_0 \in \mathbb{R} \\
\frac{dx}{dt} &= v_0 \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

1. Lösen Sie das Anfangswertproblem zunächst für verschwindende äußere Kraft  $F_{ext} \equiv 0$ . Machen Sie dazu wieder den üblichen Exponentialansatz

$$x(t) = \alpha e^{\lambda t}$$

und behandeln Sie auch den Fall  $\gamma^2 = k/m$ 

2. Lösen Sie das Anfangswertproblem für eine harmonische äußere Kraft  $F_{ext}(t) = F_0 \sin(\omega_0 t)$  indem Sie zur soeben gefundenen Lösung der

homogenen Differentialgleichung noch eine Partikularlösung mit dem Ansatz vom Typ der rechten Seite “ $x(t) = A\sin(\omega_0 t) + B\cos(\omega_0 t)$ ” addieren. Auch hier empfiehlt es sich, Kraft und Ansatz zu komplexifizieren:

$$\begin{aligned} F_{ext}(t) &= F_0 \sin(\omega_0 t) \rightarrow F_0 e^{-i\omega_0 t} \\ x(t) &= A \sin(\omega_0 t) \rightarrow A e^{-i\omega_0 t} \end{aligned}$$

3. Zeigen Sie anhand der Lösungen, daß die Energie

$$E(t) = \frac{m}{2} \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{k}{2} x^2(t)$$

für verschwindende Dämpfung  $\gamma = 0$  und äußere Kraft  $F_{ext} \equiv 0$  erhalten ist und diskutieren Sie die Zeitabhängigkeit von  $E(t)$  als Funktion von  $\gamma$  im allgemeinen Fall. Berücksichtigen Sie insbesondere eine harmonische äußere Kraft  $F_{ext}(t) = F_0 \sin(\omega_0 t)$ .

*Beweis.* 1.

$$\begin{aligned} x(t) &= \alpha e^{\lambda t} \\ \dot{x}(t) &= \alpha \lambda e^{\lambda t} \\ \ddot{x}(t) &= \alpha \lambda^2 e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} m\lambda^2 \alpha e^{\lambda t} &= -k\alpha e^{\lambda t} - 2m\gamma\lambda\alpha e^{\lambda t} \\ 0 &= m\lambda^2 + 2m\gamma\lambda + k \\ \lambda &= -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} \end{aligned}$$

Falls  $\gamma^2 \neq \frac{k}{m}$  :

$$x(t) = e^{-\gamma t} \left[ A e^{\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} + B e^{-\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} \right],$$

$$\begin{aligned} x'(t) &= -\gamma e^{-\gamma t} \left[ A e^{\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} + B e^{-\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} \right] \\ &+ e^{-\gamma t} \left[ A \sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} e^{\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} - B \sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} e^{-\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} t} \right] \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} x(0) &= A + B = x_0 \\ x'(0) &= \sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} (A - B) = v_0 \end{aligned}$$

$$2A = x_0 + \frac{v_0}{\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}}}$$

$$2B = x_0 - \frac{v_0}{\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}}}$$

Es ist zu beachten, dass es möglich ist, dass  $\gamma^2 < \frac{k}{m}$ . In diesem Fall ist  $\sqrt{\gamma^2 - \frac{k}{m}} = i\sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2}$ , aber der Form der Lösung bleibt.

Für  $\gamma^2 = \frac{k}{m}$  ist die Lösung

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t}.$$

Es gilt

$$x'(t) = -\gamma Ae^{-\gamma t} + Be^{-\gamma t} - Bt\gamma e^{-\gamma t}.$$

Dann

$$\begin{aligned} x(0) &= A = x_0 \\ x'(0) &= -\gamma A + B = v_0 \\ B &= v_0 + \gamma x_0 \\ x(t) &= x_0 e^{-\gamma t} + (v_0 + \gamma x_0) t e^{-\gamma t} \end{aligned}$$

2. Wir suchen eine Partikularlösung für die Gleichung

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + 2m\gamma \frac{dx}{dt} + kx = F_0 e^{-i\omega_0 t}$$

mit dem Form

$$x(t) = Ae^{-i\omega_0 t}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} x'(t) &= -i\omega_0 A e^{-i\omega_0 t} \\ x''(t) &= -\omega_0^2 A e^{-i\omega_0 t} \end{aligned}$$

Dann ist

$$-\omega_0^2 A m e^{-i\omega_0 t} - 2m\gamma i\omega_0 A e^{-i\omega_0 t} + A k e^{-i\omega_0 t} = F_0 e^{-i\omega_0 t},$$

$$A = \frac{F_0}{-m\omega_0^2 - 2m\gamma i\omega_0 + k}.$$

3. für verschwindende Dämpfung  $\gamma = 0$  und äußere Kraft  $F_{\text{ext}} \equiv 0$  ist die Lösung

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \quad \omega = \sqrt{k/m}.$$

Wir berechnen

$$\dot{x} = -x_0\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \frac{m}{2} \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 &= \frac{m}{2} (-x_0\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t)^2 \\ &= \frac{m}{2} (x_0^2\omega^2 \sin^2 \omega t - 2x_0v_0\omega \sin \omega t \cos \omega t + v_0^2 \cos^2 \omega t) \\ &= \frac{m}{2\omega^2} \overset{k/2}{\left( x_0^2 \sin^2 \omega t - \frac{2x_0v_0}{\omega} \sin \omega t \cos \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} \cos^2 \omega t \right)} \\ &= \frac{k}{2} \left( x_0^2(1 - \cos^2 \omega t) - \frac{2x_0v_0}{\omega} \sin \omega t \cos \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} (1 - \sin^2 \omega t) \right) \end{aligned}$$

Aus

$$\frac{k}{2} x(t)^2 = \frac{k}{2} \left( x_0^2 \cos^2 \omega t + \frac{2x_0v_0}{\omega} \sin \omega t \cos \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} \sin^2 \omega t \right)$$

folgt

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{k}{2} \left( x_0^2(1 - \cos^2 \omega t) - \frac{2x_0v_0}{\omega} \sin \omega t \cos \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} (1 - \sin^2 \omega t) \right) \\ &\quad + \frac{k}{2} \left( x_0^2 \cos^2 \omega t + \frac{2x_0v_0}{\omega} \sin \omega t \cos \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} \sin^2 \omega t \right) \\ &= \frac{k}{2} x_0^2 + \frac{kv_0^2}{2\omega^2}, \end{aligned}$$

was nicht abhängig von  $t$  ist.

Wir untersuchen jetzt die Energie für eine harmonische äußere Kraft.

Wenn die Dämpfung  $\neq 0$  ist, ist

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (x_h(t) + x_p(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_p(t).$$

Daher muss man nur die Energie der Partikularlösung berechnen:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{F_0}{-m\omega_0^2 - 2m\gamma i\omega_0 + k} e^{-i\omega_0 t} \\ \dot{x}(t) &= - \frac{iF_0\omega_0}{-m\omega_0^2 - 2m\gamma i\omega_0 + k} e^{-i\omega_0 t} \end{aligned}$$

Wenn  $\gamma = 0$ , kann  $x(t) \rightarrow \infty$ , wenn

$$-m\omega_0^2 + k = 0 \quad (\text{Resonanz}).$$

Das bedeutet  $E(t) \rightarrow \infty$  auch.

□

## 6.2 Blatt 2

**Aufgabe 190.** Betrachten Sie die folgenden Familien von Kraftfeldern auf geeigneten Definitionsbereichen  $D_\eta^{(n)} \subseteq \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} F_\eta^{(1)} : D_\eta^{(1)} \ni \vec{x} &\rightarrow r^\eta \cdot \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \\ F_\eta^{(2)} : D_\eta^{(2)} \ni \vec{x} &\rightarrow r_{12}^\eta \cdot (x_1 \vec{e}_1 - x_2 \vec{e}_2) \in \mathbb{R}^3 \\ F_\eta^{(3)} : D_\eta^{(3)} \ni \vec{x} &\rightarrow r_{12}^\eta \cdot (x_2 \vec{e}_1 - x_1 \vec{e}_2) \in \mathbb{R}^3 \\ F_\eta^{(4)} : D_\eta^{(3)} \ni \vec{x} &\rightarrow r_{12}^\eta \cdot (x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2) \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Eigentlich ist  $\vec{x}$  als  $\vec{x} = (x, y, z)^T$  definiert. Deswegen sind alle meine Antworten nicht die erwartete Antwort.


wobei  $r_{12} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$  und  $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ . Skizzieren Sie die Felder  $\vec{F}_\eta^{(n)}$  als Vektorpfeile in der von den Einheitsvektoren  $\vec{e}_1$  und  $\vec{e}_2$  aufgespannten Ebene (hier genügt es, zwischen den Fällen  $\eta > -1$ ,  $\eta = -1$  und  $\eta < -1$  zu unterscheiden).

Bestimmen Sie, abhängig von der Potenz  $\eta \in \mathbb{R}$ ,

1. den maximalen Definitionsbereich  $D_\eta^{(n)}$ ,
2. die maximale Bereiche  $C_\eta^{(n)} \subseteq D_\eta^{(n)}$ , auf denen  $F_\eta^{(n)}$  konservativ ist,
3. eine Potentialfunktion  $V_\eta^{(n)} : C_\eta^{(n)} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $F_\eta^{(n)} = -\nabla V_\eta^{(n)}$ , sofern sie existiert,
4. das Kurvenintegral

$$I_\eta^{(n)}(R) = \int_{\gamma_R} d\vec{\xi} \cdot \vec{F}_\eta^{(n)}(\vec{\xi})$$

über den gegen den Uhrzeigersinn umlaufenen Kreis  $\gamma_R$  mit Radius  $R$  und Mittelpunkt  $\vec{0}$  in der von  $\vec{e}_1$  und  $\vec{e}_2$  aufgespannten Ebene







*Beweis.* 1. Maximalen Definitionsbereich (für alle  $\vec{F}_\eta^{(n)}$ ): Wenn  $\eta \leq -1$ ,  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ , sonst  $\mathbb{R}^3$ .

2. maximale Bereiche, auf denen  $\vec{F}_\eta^{(n)}$  konservativ ist.  $n = \dots$

(1) Falls  $\eta = 0$ ,  $D_\eta^{(1)}$ , sonst  $z = 0$

(2) Falls  $\eta = 0$ ,  $D_\eta^{(2)}$ , sonst  $\emptyset$

Erwartete Antwort ist einfach  $D_\eta^{(1)}$ .

Figure 6.1: Vektorpfeile für  $\vec{F}_\eta^{(1)}$ Figure 6.2: Vektorpfeile für  $\vec{F}_\eta^{(2)}$ Figure 6.3: Vektorpfeile für  $\vec{F}_\eta^{(3)}$ Figure 6.4: Vektorpfeile für  $\vec{F}_\eta^{(4)}$ 

(3) Falls  $\eta = -2, D_\eta^{(3)}$ , sonst  $\emptyset$ .

(4) Falls  $\eta = 0, D_\eta^{(4)}$ , sonst  $\emptyset$ .

3. Potentialfunktion, für  $n = \dots$

(1) Auf  $z = 0$  Ebene:

$\eta = -2$ :  $V = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ , sonst  $V = -\frac{1}{\eta+2} r^{\eta+2}$

Wenn  $n = 0$  kann eine Potentialfunktion für alle  $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$  definiert werden:  $V(x, y, z) = -\frac{1}{2} (x^2 + y^2)$

(2) Nur für  $\eta = 0$ ,  $V = \frac{1}{2} (x^2 - y^2)$ .

(3) Für  $\eta = -2$ ,  $V = -\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$ .

(4) Für  $\eta = 0$ ,  $V = -xy$ .

Die erwartete Antwort ist einfach  $V = -\frac{1}{\eta+2} r^{\eta+2}$

In zylindrische Koordinaten ist es  $V = -\varphi$

4. Kurvenintegral, für  $n = \dots$

(1) Weil  $\nabla \times F_\eta^{(1)} = 0$  auf die  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  Ebene, ist das Kurvenintegral stets 0.

(2) Gleich für  $\eta = 0$ . Sonst sei  $x_1 = \cos \theta$ ,  $x_2 = \sin \theta$ ,  $dx_1 = -\sin \theta d\theta$ ,  $dx_2 = \cos \theta d\theta$

$$\begin{aligned} R^\eta \int_{\gamma_R} x_1 dx_1 - x_2 dx_2 &= R^\eta \int_0^{2\pi} (-\cos \theta \sin \theta d\theta - \cos \theta \sin \theta d\theta) \\ &= R^\eta \int_0^{2\pi} (-2 \sin \theta \cos \theta) d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

(3) Sei  $x_1 = \cos \theta$ ,  $x_2 = \sin \theta$ ,  $dx_1 = -\sin \theta d\theta$ ,  $dx_2 = \cos \theta d\theta$

$$\begin{aligned} R^\eta \int_{\gamma_R} x_2 dx_1 - x_1 dx_2 &= R^\eta \int_0^{2\pi} (-\sin^2 \theta d\theta - \cos^2 \theta d\theta) \\ &= -R^\eta \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= -2\pi R^\eta \end{aligned}$$

Beachten Sie, dass es für  $\eta = -2$  ungleich 0 ist, weil  $\nabla \times \vec{F}_\eta^{(3)}$  auf  $(0,0)$  nicht definiert ist.

(4) Für  $\eta = 0$  ist die Kurvenintegral stets 0. Sonst sei  $x_1 = \cos \theta$ ,  $x_2 = \sin \theta$ ,  $dx_1 = -\sin \theta d\theta$ ,  $dx_2 = \cos \theta d\theta$  und

$$\begin{aligned} R^\eta \int_{\gamma_R} x_2 dx_1 + x_1 dx_2 &= R^\eta \int_0^{2\pi} (-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= R^\eta \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) d\theta \\ &= 0 \end{aligned} \quad \square$$

**Aufgabe 191.** Zwischen zwei Kreisingen mit Radius  $R$ , die bei  $x = -x_0$  und  $x = x_0$  zentriert in der  $yz$ -Ebene liegen, sei eine Seifenhaut gespannt (s. Skizze). Aufgrund der Oberflächenspannung wird sich die Seifenhaut so ausbilden, dass die entsprechende Oberfläche minimal ist.

1. Das gesamte Problem ist rotationssymmetrisch um die  $x$ -Achse. Zeigen Sie, dass die Fläche der Rotationsfigur um die  $x$ -Achse für die Funktion  $y : [-x_0, x_0] \rightarrow \mathbb{R}$  zwischen den Kreisringen durch


$$F(y) = \int_{-x_0}^{x_0} 2\pi y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2} \, dx$$

mit  $y' = \frac{dy}{dx}$  gegeben ist.

2. Benutzen Sie nun die in der Vorlesung kennengelernte Methode der Variationsrechnung, um die Minimalfläche zu finden, die von der Seifenhaut gebildet wird. Gesucht ist also die Funktion  $y$ , die  $F(y)$  minimiert. (Hinweis: Zeigen Sie, dass die Euler-Lagrange-Gleichung für dieses Problem als


$$\frac{1}{y'} \frac{d}{dx} \left( \frac{y}{\sqrt{1 + y'^2}} \right) = 0$$

geschrieben werden kann.)



*Beweis.* 1.





$$dV = 2\pi y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

2.

**Satz 6.1.** Im Allgemeinen, für  $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ , gilt

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = 0.$$

*Beweis.* Erinnern Sie sich daran, dass

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q} \quad (6.1)$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) &= \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \cancel{\frac{\partial L}{\partial t}} \\ &= \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} \\ &= \left( \frac{\partial L}{\partial q} \right) \dot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} = 0 \quad \square \end{aligned}$$

Sei jetzt  $L(y(x), y'(x), x) = y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2}$ . Es folgt  $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ . Daraus folgt

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial y'} y' - L &= \left( \frac{y(x) y'(x)}{\sqrt{1 + y'(x)^2}} \right) y' - y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2} \\ &= \left( \frac{y y'^2}{\sqrt{1 + y'^2}} \right) - \frac{y(1 + y'^2)}{\sqrt{1 + y'^2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{-y}{\sqrt{1+y'^2}}$$

Es gilt dann, dass

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{y}{\sqrt{1+y'^2}} \right) = 0.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \alpha y &= \sqrt{1+y'^2} \\ \alpha^2 y^2 &= 1+y'^2 \\ y' &= \pm \sqrt{\alpha^2 y^2 - 1} && + \text{ wenn } x > 0 \\ \int dx &= \int \frac{dy}{\sqrt{\alpha^2 y^2 - 1}} \\ x &= \frac{1}{\alpha} \cosh^{-1}(\alpha y) - \beta \\ y &= \frac{1}{\alpha} \cosh(\alpha(x + \beta)) \end{aligned}$$

Die Randbedingungen ergeben:

$$\alpha R = \cosh(\alpha(x_0 + \beta)) = \cosh(\alpha(-x_0 + \beta))$$

Daraus folgt  $\beta = 0$ . Leider ist die Gleichung für  $\alpha$  unlösbar. Die Lösung zu die Gleichung ist

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{\alpha} \cosh(\alpha x) \\ \alpha R &= \cosh(\alpha x) \end{aligned}$$

□

### 6.3 Blatt 3

**Aufgabe 192.** Die Differentialgleichung für den harmonischen Oszillator in zwei Dimensionen lautet:

$$\ddot{\vec{x}}(t) + \omega^2 \vec{x} = 0 \quad \text{mit } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Entwickeln Sie den Ortsvektor  $x(t)$  und seine zeitlichen Ableitungen in der Polarkoordinatenbasis  $\{\hat{\mathbf{e}}_r, \hat{\mathbf{e}}_\phi\}$  und überzeugen Sie sich, dass die so aus (1) folgenden Differentialgleichungen den Bewegungsgleichungen entsprechen, die Sie wie in der Vorlesung mittels der Euler-Lagrange-Gleichung

$$\left( \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial}{\partial q_i} \right) L(q(t), \dot{q}(t), t) = 0$$

direkt aus der Lagrangefunktion in Polarkoordinaten  $q_i = r, \phi$  erhalten.

*Beweis.*

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \begin{pmatrix} r \cos \phi \\ r \sin \phi \end{pmatrix} \\ \dot{\vec{x}} &= \dot{r} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix} + r \dot{\phi} \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix} \\ \ddot{\vec{x}} &= \ddot{r} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix} + (2\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}) \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix} + r\dot{\phi}^2 \begin{pmatrix} -\cos \phi \\ -\sin \phi \end{pmatrix} \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix} + (2\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}) \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Weil  $(\cos \phi, \sin \phi)^T$  und  $(\sin \phi, \cos \phi)^T$  linear unabhängig (sogar orthogonal) sind, kann die Gleichung  $\ddot{\vec{x}} + \omega^2 \vec{x}(t)$  als

$$\begin{aligned}\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 + \omega^2 r &= 0 \\ 2\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi} &= 0\end{aligned}$$

Man schreibt auch direkt die Lagrangefunktion:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

Die Euler-Lagrange-Gleichungen sind

$$\begin{aligned}r : m\ddot{r} - mr\dot{\phi}^2 + m\omega^2 r &= 0 \\ \ddot{r} - r\dot{\phi}^2 + \omega^2 r &= 0 \\ \phi : \frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi}) &= 0 \\ 2r\dot{r}\dot{\phi} + r^2\ddot{\phi} &= 0 \\ 2\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi} &= 0.\end{aligned}$$

□

**Aufgabe 193.** Eine Punktmasse  $m$  rotiere reibungslos auf einer Tischplatte. Über einen gespannten Faden der Länge  $l$  ( $l = r + s$ ) sei sie durch ein Loch in der Platte mit einer anderen Masse  $M$  verbunden (s. Skizze). Wie bewegt sich  $M$  unter dem Einfluss der Schwerkraft?

1. Formulieren Sie die Zwangsbedingungen.
2. Stellen Sie die Lagrange-Funktion in den generalisierten Koordinaten  $s$  und  $\varphi$  auf und ermitteln Sie daraus die Bewegungsgleichungen. Zeigen Sie, dass  $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \text{const} \equiv C$  gilt.
3. Verwenden Sie das Ergebnis aus Teilaufgabe 2, um die  $\varphi$ -Abhängigkeit in der Differentialgleichung für  $s$  zu eliminieren. Betrachten Sie nun den Gleichgewichtsfall  $s(t) = \text{const}$  und finden Sie einen Ausdruck für die resultierende Rotationsgeschwindigkeit  $\dot{\varphi}(t) = \text{const} \equiv \omega_0$  der Masse  $m$ . Ausgehend vom Gleichgewichtsfall, unter welchen Bedingungen rutscht die Masse  $M$  nach oben, wann nach unten?

4. Diskutieren Sie das Ergebnis für die Anfangsbedingung  $\dot{\varphi}(t_0) = 0$ .

*Beweis.* 1.  $\frac{dl}{dt} = 0$ .

2.


$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + Mg(l - r).$$

Weil  $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$ , gilt aus der Euler-Lagrange-Gleichungen  $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = 0$ , also  $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{const} \equiv C$ .

3. Weil  $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} \equiv C$ , gilt

□

**Aufgabe 194.** Eine einmal gefaltete Schnur mit Gesamtlänge  $l$  und konstanter Masse pro Länge  $\rho$  bewegt sich auf der  $x$ -Achse. Die Endpunkte der Schnur seien mit  $x_1(t)$  und  $x_2(t)$  bezeichnet. Die Stelle, an der die Schnur gefaltet ist, sei mit  $y(t)$  bezeichnet.



1. Geben Sie die Zwangsbedingungen des Systems an.
2. Geben Sie eine Langrangefunktion des Systems an.

Betrachten Sie für die kinetische Energie  $T$  die Endpunkte  $x_1$  und  $x_2$ , deren "Masse" durch die integrierte Masse des Schnurstücks zwischen  $x_1$  und  $y$  bzw.  $x_2$  und  $y$  gegeben ist.

3. Die Lagrangefunktion kann in den Relativ- und Schwerpunktskoordinaten

$$\xi = x_1 - x_2 \text{ und } X = \frac{1}{2l} [(x_1 - y)(x_1 + y) + (x_2 - y)(x_2 + y)]$$

zu

$$L = \frac{M}{2}\dot{X}^2 + \frac{\mu}{2}\dot{\xi}^2$$

umgeschrieben werden, wobei  $M$  und  $\mu$  Funktionen von  $X$  und  $\xi$  sind. Bestimmen Sie  $M$  und  $\mu$  durch den Vergleich der Lagrangefunktionen in Koordinaten  $(x_1, x_2)$  und  $(X, \xi)$ .

*Beweis.* 1.  $l = x_2(t) - y(t) + x_1(t) - y(t) = x_1(t) + x_2(t) - 2y(t)$

2. Wir betrachten eine Koordinate  $0 \leq \xi \leq l$ , die ab  $x_1$  anfängt und steigt monoton, bis die andere Seite. Die Position eine kleine Masselemente ist:

$$x(\xi) = y + |\xi - (x_2 - y)|.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \dot{y} + \frac{d}{dt}|\xi - (x_2 - y)| \\ &= \dot{y} + \operatorname{sgn}(\xi - (x_2 - y)) \left( \frac{dy}{dt} - \frac{dx_2}{dt} \right)\end{aligned}$$

Wir integrieren die Geschwindigkeit, um die kinetische Energie zu bekommen:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\rho \int_0^l \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 d\xi &= \frac{1}{2}\rho \left[ \int_0^{x_2-y} (\dot{y} - (\dot{y} - \dot{x}_2))^2 d\xi + \int_{x_2-y}^l (\dot{y} + (\dot{y} - \dot{x}_2))^2 d\xi \right] \\ &= \frac{1}{2}\rho [(x_2 - y)\dot{x}_2^2 + (l - x_2 + y)(2\dot{y} - \dot{x}_2)^2]\end{aligned}$$

□