

# Vertiefung Analysis Hausaufgabenblatt Nr. 7

Jun Wei Tan\* and Lucas Wollmann

*Julius-Maximilians-Universität Würzburg*

(Dated: December 14, 2023)

## Problem 1. Sei

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \rightarrow \frac{x^2}{y^2},$$
$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 2, xy \geq 1\}.$$

Bestimmen Sie  $\int_A f \, d\lambda_2$ .

*Proof.* Zuerst zeigen wir:  $f$  ist messbar. Wir betrachten dazu  $\{f < \alpha\}, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$  (Wenn  $\alpha < 0$  ist die Menge die Leermenge, weil  $f \geq 0$  stets). Es gilt dann

$$x^2 < \alpha y^2$$
$$|x| < \sqrt{\alpha} |y|$$

Dann ist  $\{f < \alpha\}$  eine Borelmenge, also  $f$  ist messbar.

Ähnlich wie in Übungen 8.2 ist  $A$  eine Borelmenge. Die dritte Voraussetzung kann umgeformt werden:

$$y \geq 1/x$$
$$x \geq y \geq 1/x$$

was nur möglich ist, wenn  $2 \geq x \geq 1$  und in diesem Fall ist der Schnitt  $\{y \mid (x, y) \in A\}$

---

\* jun-wei.tan@stud-mail.uni-wuerzburg.de

nichtleer. Also wir berechnen das Integral über die Teilmenge nach die Präsenzübung

$$\begin{aligned}
 \int_A f \, d\lambda_2 &= \int_{[1,2]} \int_{A_x} f \, d\lambda_1 \\
 &= \int_1^2 \int_{1/x}^x \frac{x^2}{y^2} \, d\lambda_1(y) \, d\lambda_1(x) \\
 &= \int_1^2 -x^2 y^{-1} \Big|_{1/x}^x \, d\lambda_1(x) \\
 &= \int_1^2 x^2 \left( x - \frac{1}{x} \right) \, d\lambda_1(x) \\
 &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 \\
 &= \frac{9}{4}.
 \end{aligned}$$

□

**Problem 2.** Sei

$$A := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, \frac{1}{2}(x + y)^2 + z^2 \leq 1 \right\}.$$

Bestimmen Sie  $\lambda_3(A)$ .

*Hinweis: Rotation*

*Proof.*  $A$  ist eine Borelmenge und daher messbar. Wir schreiben  $A_z$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
 1 &\geq \frac{1}{2}(x + y)^2 + z^2 \\
 2(1 - z^2) &\geq (x + y)^2
 \end{aligned}$$

□

**Problem 3.** Sei  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ein invertierbare Matrix und  $a \in \mathbb{R}^n$ . Definiere damit die Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \rightarrow a + Sx$ . Sei außerdem  $A \in \mathcal{L}(n)$  und  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   $\mathcal{L}(n) - B^1$  messbar, sodass  $\chi_{\varphi(A)} f$   $\lambda_n$  integrierbar ist. Zeigen Sie, dass dann  $\chi_A(f \circ \varphi)$   $\lambda_n$ -integrierbar ist mit

$$\int_{\varphi(A)} f \, d\lambda_n = |\det(S)| \int_A (f \circ \varphi) \, d\lambda_n.$$

*Hinweis: Lemma 2.92*

*Proof.* Nach Satz 1.83 und Bewegungsinvarianz ist  $\varphi(A)$  messbar mit Maß  $\lambda_n(\varphi(A)) = |\det(S)|\lambda_n(A)$ .  $\chi_{\varphi(A)}$  ist dann messbar. Weil  $\varphi$  affin ist, ist  $\varphi$  messbar. Dann ist  $f \circ \varphi$  messbar, und als Produkt von messbare Funktionen ist  $\chi_A(f \circ \varphi)$   $\lambda_n$ -messbar.

Wir verwenden Lemma 2.93 und betrachten  $f^+$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
 \int_{\varphi(A)} f^+ d\mu &= \int f^+ \chi_{\varphi(A)} d\mu \\
 &= \int_{(0,+\infty)} \mu(\{x : f^+(x) \chi_{\varphi(A)} > t\}) d\lambda_1(t) \\
 &= \int_0^\infty \mu(\{x : x \in \varphi(A) \wedge f^+(x) > t\}) d\lambda_1(t) \\
 &= \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(x) > t\} \cap \varphi(A)) d\lambda_1(t)
 \end{aligned}$$

Weil  $\varphi$  bijektiv ist, gibt es für jedes Punkt  $x \in \varphi(A)$ ,  $f^+(x) > t$  auch ein Punkt  $y := \varphi^{-1}(x)$ ,  $y \in A$ ,  $f^+(\varphi(y)) > t$  und andersherum. Daher ist

$$\{x : x \in \varphi(A) \wedge f^+(x) > t\} = \varphi(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\}).$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_{\varphi(A)} f^+ d\mu &= \int_0^\infty \mu(\varphi(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\})) \\
 &= \int_0^\infty |\det(S)| \mu(\{x : x \in A \wedge f^+(\varphi(x)) > t\}) d\lambda_1(t) \\
 &\quad (\text{Satz 1.83 und Bewegungsinvarianz}) \\
 &= |\det(S)| \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(\varphi(x)) > t\} \cap A) \\
 &= |\det(S)| \int_0^\infty \mu(\{x : f^+(\varphi(x)) \chi_A(x) > t\}) d\lambda_1(t) \\
 &= |\det(S)| \int (f^+ \circ \varphi) \chi_A d\lambda_n \\
 &= |\det(S)| \int_A (f^+ \circ \varphi) d\lambda_n
 \end{aligned}$$

Ähnlich gilt es auch für  $f^-$  und aus

$$\int_{\varphi(A)} f d\mu = \int_{\varphi(A)} f^+ d\mu - \int_{\varphi(A)} (-f^-) d\mu$$

auch für  $f$ . □

**Problem 4.** Sei  $f \in \mathcal{L}^1(\lambda_n)$ . Für  $h \in \mathbb{R}^n$  definiere die Funktion  $f_h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f_h(x) := f(x + h)$ . Definiere außerdem die Abbildung

$$T_f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}^1(\lambda_n), \quad h \mapsto f_h.$$

Zeigen Sie:

(a)  $T_f$  ist wohldefiniert.

(b)  $T_f$  ist stetig.

*Hinweis: Approximieren Sie die Funktion  $f$*