


Klassische Physik 1 Hausaufgaben Blatt Nr. 1

Jun Wei Tan,* Saed Othman, and Mattis Liebermann

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(Dated: November 5, 2023)

Aufgabe 1.1



Man löst die Gleichungen

$$\frac{1}{2}(v_{max,1})(t_{min,1}) = d \quad (1)$$

$$v_{max,1} = a_1 t' \quad (2)$$

$$v_{max,1} = (t' - t_{min,1})a_2 \quad (3)$$

Aus (2) folgt $t' = v_{max,1}/a_1$. Wir setzen das in (3) ein. Es ergibt sich

$$v_{max,1} = \left(\frac{v_{max,1}}{a_1} - t_{min,1} \right) a_2.$$

Daraus folgt:

$$v_{max,1} \left(1 - \frac{a_2}{a_1} \right) = -t_{min,1} a_2.$$

(b) Noch einmal setzen wir das in (1) ein:

$$\frac{1}{2} \left[-t_{min,1} a_2 \left(1 - \frac{a_2}{a_1} \right)^{-1} \right] (t_{min,1}) = d.$$

Die Lösung ist

$$t_{min,1} = \left[-\frac{2d}{a_2} \left(1 - \frac{a_2}{a_1} \right) \right]^{1/2}.$$


* jun-wei.tan@stud-mail.uni-wuerzburg.de

Aus (1) folgt

$$v_{max,1} = \frac{2d}{t_{mn,1}}.$$

Also

$$v_{max,1} = \left[\frac{1 - \frac{a_2}{a_1}}{2a_2d} \right]^{-1/2}.$$



Es gilt

$$t_1 = \frac{v_{max,2}}{a_1}$$

$$t_2 = -\frac{v_{max,2}}{a_2}$$

$$s_1 = \frac{1}{2}a_1t_1^2 = \frac{v_{max,2}^2}{2a_1}$$

$$s_2 = \frac{1}{2}v_{max,2}t_2 = -\frac{v_{max,2}^2}{2a_2}$$

$$s_3 = v_{max,2}t_3 = d - s_1 - s_2$$


$$t_3 = \frac{d - s_1 - s_2}{v_{max,2}}$$

$$= \frac{d}{v_{max,2}} - \frac{v_{max,2}}{2a_1} + \frac{v_{max,2}}{2a_2}$$

$$t_{min,2} = t_1 + t_2 + t_3$$

$$= \frac{d}{v_{max,2}} + \frac{v_{max,2}}{2a_1} - \frac{v_{max,2}}{2a_2}$$

Aufgabe 1.2



$$x = v_0 t \cos \theta$$

$$y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$$


Wir brauchen $y(l) = h_1 - h_0$, oder

$$h_1 - h_0 = l \tan \theta - \frac{g l^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

Daraus folgt

$$v_0^2 = \frac{g l^2}{2 \cos^2 \theta (l \tan \theta - (h_1 - h_0))}.$$

$$l = h_1 = 1 \text{ m}, h_0 = 0 \text{ m}$$



Es folgt daraus:

$$y = x \tan \theta - (l \tan \theta - (h_1 - h_0)) \frac{x^2}{l^2}.$$

(b) Sei φ der Eintreffwinkel des Balls, und φ' der Winkel des Balls beim Überfliegen des Korbrandes. Es gilt dann $\varphi \approx \varphi'$.

Zudem gilt:

$$\tan \varphi = \frac{U}{d\pi}$$

Die Trajektorie des Balls wird beschrieben durch

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x + h_0.$$

Der Ball passiert den Korbrand an der Stelle $x_R = l - \frac{d}{2}$.

Es gilt

$$y'(x_R) = -\frac{g}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} x_R + \tan \alpha.$$

Somit lautet die Tangentenfunktion an der Stelle x_R

$$t(x_R) = \left(-\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x_R + \tan \alpha \right) (x - x_R) - \frac{g}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} x_R^2 + \tan \alpha x_R + h_0$$

mit der Steigung


$$m = -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x_R + \tan \alpha.$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned} m &= \tan \varphi = \frac{U}{2\pi} \\ -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} \left(l - \frac{d}{2} \right) + \tan \alpha &= \frac{U}{d\pi} \\ \alpha &= \arctan \left(\frac{U}{d\pi} + \frac{g}{v_{0,x}^2} \left(l - \frac{d}{2} \right) \right). \end{aligned}$$

Der Winkel α muss also mindestens $\arctan \left(\frac{U}{d\pi} + \frac{g}{v_{0,x}^2} \left(l - \frac{d}{2} \right) \right)$ betragen.

Aufgabe 1.3




Es gilt

$$x : m_1g \sin \alpha = m_3g \sin \beta$$

$$y : m_1g \cos \alpha + m_3g \cos \beta = m_2g$$

Also


$$\begin{aligned}
 m_3 &= m_1 \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \\
 m_1 \cos \alpha + m_1 \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cos \beta &= m_2 \\
 m_1 &= \frac{m_2}{\cos \alpha + \cos \beta \left(\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \right)} \\
 &= \frac{m_2 \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} \\
 m_3 &= \frac{m_2 \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \vec{\mathbf{F}} &= - \left[\begin{pmatrix} 0 \\ -m_1 g \end{pmatrix} + m_1 g \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \end{pmatrix} \right] \\
 &= m_1 g \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ 1 + \cos \alpha \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$


Aufgabe 1.4

(a)




(b) $a_y = 0$ (Zwangsbedingung), $a_x = \frac{1}{3m} (|F_2| - |F_1|)$

(c)



$$a_1 = a_2 = \frac{1}{3m} \left(|\vec{\mathbf{F}}_2| - |\vec{\mathbf{F}}_1| \right).$$

(d)



(e)

$$m_1 a = T - F_1$$

$$m_2 a = F_2 - T$$

$$(m_1 + m_2) a = T - F_1 + F_2 - T$$

$$= F_2 - F_1$$

$$= 3ma$$

$$a = \frac{1}{3m} (F_2 - F_1)$$