

Einführung in die Algebra Hausaufgaben Blatt Nr. 9

Jun Wei Tan*

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(Dated: January 21, 2024)

Problem 1. Seien p, q zwei (nicht notwendigerweise verschiedene) Primzahlen und G eine Gruppe der Ordnung pq . Zeigen Sie, dass G auflösbar ist.

Proof. Sei $p = q$. Dann ist G eine Gruppe der Ordnung p^2 . Wir wissen, dass solche Gruppen abelsch ist, also $G' = \{e\}$ und G ist auflösbar.

Sei jetzt $p \neq q$. Nach den Sylowsätze gibt es Untergruppen der Ordnung p , für deren Anzahl n_p gilt:

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

$$n_p | q$$

Da q eine Primzahl ist, muss $n_p = 1$ gelten. Ähnlich gilt auch $n_q = 1$. Sei P die Untergruppe der Ordnung p . Als Gruppe einer Primzahlordnung ist P zyklisch, insbesondere abelsch und daher auflösbar. $|G/P| = q$, also $|G/Q|$ ist zyklisch, abelsch und auflösbar.

Dann ist G auflösbar. □

Problem 2. Zeigen Sie, dass jede Gruppe G der Ordnung 12 auflösbar ist.

Proof. $12 = 3 \times 2^2$, also es gibt nach den Sylowsätze Gruppen der Ordnung 4 und 3 von Anzahl n_2 bzw. n_3 . Aus den vorherigen Übungsblätter wissen wir, dass $n_2 = 1$ oder $n_3 = 1$ gilt.

1. $n_2 = 1$. Sei H die Untergruppe der Ordnung 4. Als Gruppe der Ordnung $4 = 2^2$ ist H abelsch und auflösbar. Weil $|G/H| = 3$, ist G/H zyklisch, abelsch und auflösbar. Da sowohl H als auch G/H auflösbar sind, und H ein Normalteiler ist, ist G auflösbar.

* jun-wei.tan@stud-mail.uni-wuerzburg.de

2. $n_3 = 1$. Sei H die Untergruppe der Ordnung 3. Als Gruppe von Primordnung ist H zyklisch, abelsch und auflösbar. Da $|G/H| = 4 = 2^2$, ist G/H abelsch und daher auflösbar. Da H normal ist und sowohl H als auch G/H auflösbar sind, ist G auflösbar. \square

Problem 3. Sei R ein Ring, und seien $a, b \in R$. Es gelte $ab = 1$ und $ba \neq 1$. Ein Element $x \in R$ heißt *nilpotent*, falls es ein $s \in \mathbb{N}$ mit $x^s = 0$ gibt. Ein Element $x \in R$ heißt *idempotent*, falls $x^2 = x$ gilt.

- (a) Zeigen Sie, dass das Element $1 - ba$ idempotent ist.
- (b) Zeigen Sie, dass das Element $b^n(1 - ba)$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$ nilpotent ist.
- (c) Zeigen Sie, dass es unendlich viele nilpotente Elemente in R gibt.

Proof. (a)

$$\begin{aligned}
 (1 - ba)^2 &= (1 - ba)(1 - ba) \\
 &= 1 - ba - ba + (-ba)(-ba) && \text{Distributivgesetz} \\
 &= 1 - 2(ba) + baba && \text{Lemma 3.1} \\
 &= 1 - 2(ba) + b(ab)a \\
 &= 1 - 2ba + ba \\
 &= 1 - ba
 \end{aligned}$$

\square

Problem 4. (a) Sei R ein kommutativer Ring. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

(1) Für alle $r, s \in R$ gilt $(r + s)^4 = r^4 + s^4$.

(2) In R gilt $2 = 0$.

- (b) Geben Sie ein Beispiel für einen kommutativen Ring an, der den Bedingungen aus (a) genügt, aber kein Körper ist.

Proof. (a) Es gilt

$$\begin{aligned}
 (r+s)^2 &= (r+s)(r+s) \\
 &= r^2 + sr + rs + s^2 \\
 (r+s)^4 &= (r+s)^2(r+s)^2 \\
 &= (r^2 + sr + rs + s^2)(r^2 + sr + rs + s^2) \\
 &= r^4 + r^2sr + r^3s + r^2s^2 \\
 &\quad + sr^3 + srsr + srrs + srs^2 \\
 &\quad + rsr^2 + rssr + rsrs + rs^3 \\
 &\quad + s^2r^2 + s^3r + s^2rs + s^4 \\
 &= r^4 + r^3s + r^3s + r^2s^2 \\
 &\quad + sr^3 + s^2r^2 + s^2r^2 + s^3r \\
 &\quad + r^3s + r^2s^2 + r^2s^2 + rs^3 \\
 &\quad + s^2r^2 + s^3r + s^3r + s^4 \quad \text{Kommutativgesetz} \\
 &= r^4 + 4r^3s + 6r^2s^2 + 4rs^3 + s^4
 \end{aligned}$$

Die Behauptung $(s+r)^4 = r^4 + s^4$ ist dann äquivalent zu

$$4r^3s + 6r^2s^2 + 4rs^3 = 0 \quad \forall s, r \in R.$$

Die Rückrichtung ist jetzt klar: Falls $2 = 0$, ist

$$2r^3s + 6r^2s^2 + 4rs^2 = \overset{0}{2}(r^3s + 3r^2s^2 + 4rs^2) = 0.$$

□