จากสูตร $f(i,j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$\frac{1}{16}$

มุมทแยง 4
มุมขอบ 2
มุมฉาก 1

ค่าเฉลี่ย $\frac{2}{4}$ ← ขอบ

ค่า 0.5 ของขอบ

ค่า σ จาก

$\frac{\text{มุมฉาก}}{\text{มุมขอบ}} = \frac{\frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}}{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}$

$\frac{\text{มุมฉาก}}{\text{มุมขอบ}} = \frac{1}{e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}}$

$\frac{\text{มุมขอบ}}{\text{มุมฉาก}} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}$

$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}} = 0.5$

แก้สมการหา σ → ได้ประมาณ 0.85

แทนค่าหาน้ำหนัก (1,1) $i^2+j^2 = 1^2+1^2$

$\frac{f(1,1)}{f(0,0)} = e^{-\frac{2}{2\sigma^2}} \approx e^{-\frac{2}{1.44}} \approx 0.25$


ดังนั้น มุม : ขอบ : กลาง ได้ 0.25 : 0.5 : 1.0

ถ้าคูณ number ทั้งหมดได้ 1 : 2 : 4 ตามรูป

$\frac{1}{16}$ เกิดจาก ทุกช่อง sum รวมกันได้ 16 ดังนั้นน้ำหนักแต่ละช่อง = $\frac{1}{16}$

Made with Goodnotes

$\sigma = 1$



$$f(i,j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2(1)^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2}}$$

$$f(0,0) = e^{-\frac{0^2+0^2}{2}}$$

$$= e^0$$

$$f(0,0) = 1$$

$$f(0,1) = e^{-\frac{0^2+1^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{1}{2}}$$

$$f(0,1) = e^{-0.5} \approx 0.6065$$

$$f(1,1) = e^{-\frac{1^2+1^2}{2}}$$

$$= e^{-1}$$

$$f(1,1) \approx 0.3679$$

$$f(0,2) = e^{-\frac{0^2+2^2}{2^2}}$$

$$= e^{-2}$$

$$f(0,2) = 0.1353$$

$$f(1,2) = e^{-\frac{1^2+2^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{5}{2}}$$

$$= e^{-2.5}$$

$$f(1,2) \approx 0.0821$$

$$f(2,2) = e^{-\frac{2^2+2^2}{2^2}}$$

$$= e^{-4}$$

$$f(2,2) \approx 0.0183$$


Made with Goodnotes

ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันความเสี่ยง

โดยใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าของจุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางของการแจกแจงปกติ) เท่ากับ 0.0183

ตัวอย่าง

$$\frac{1}{273}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$



Made with Goodnotes