

## 水稻稻眼蝶

**学名** *Mycalesis gotama* Moore 属鳞翅目，眼蝶科。别名黄褐蛇目蝶、日月蝶、蛇目蝶、短角眼蝶。分布在河南、陕西以南，四川、云南以东各省。

**寄主** 稻、茭白、甘蔗、竹子等。

**为害特点** 幼虫沿叶缘为害叶片成不规则缺刻，影响水稻、茭白等生长发育。



**形态特征** 成虫体长 16.5mm，翅展 41—52mm，翅面暗褐至黑褐色，背面灰黄色；前翅正反面第 3、6 室各具 1 大 1 小的黑色蛇眼状圆斑，前小后大，后翅反面具 2 组各 3 个蛇眼圆斑。卵馒头形，大小 0.8-0.9mm，米黄色，表面有微细网纹，孵化前转为褐色。幼虫初孵时 2—3mm，浅白色，后体长 32mm，老熟幼虫草绿色，纺锤形，头部具角状突起 1 对，腹末具尾角 1 对。蛹长约 15mm，初绿色，后变灰褐色，腹背隆起呈弓状。

**生活习性** 浙江、福建年生 4—5 代，华南 5—6 代，世代重叠，以蛹或末龄幼虫在稻田、河边、沟边及山间杂草上越冬。成虫羽化多在 6—15 时，白天飞舞在花丛或竹园四周，晚间静伏在杂草丛中，经 5—10 天补充营养交尾后次日把卵散产在叶背或叶面，产卵期 30 多天，每雌可产卵 96—166 粒，初孵幼虫先吃卵壳，后取食叶缘，3 龄后食量大增。老熟幼虫经 1—3 天不食不动，便吐丝粘着叶背倒挂半空化蛹。天敌有弄蝶绒茧蜂、螟蛉绒茧蜂、广大腿蜂及步甲、猎蝽等。

**防治方法** (1) 利用幼虫假死性，震落后捕杀或放鸭啄食。(2) 在 2 龄幼虫为害高峰期喷药防治。用药种类见[菲岛毛眼水蝇](#)。