

水稻花蓟马

学名 *Frankliniella intonsa* (Trybom) 缨翅目，蓟马科。异名 *Frankliniella formosae* Moulton。别名 台湾蓟马。

寄主 稻、棉、甘蔗、瓜类、茄果类、豆类等。

为害特点 成虫和若虫为害作物花器，减少结实量，有时也为害幼苗嫩叶。



形态特征 成虫体长约 1.3mm，褐色带紫，头胸部黄褐色；触角较粗壮，第三节长为宽的 2.5 倍并在前半部有一横脊；头短于前胸，后部背面皱纹粗，颊两侧收缩明显；头顶前缘在两复眼间较平，仅中央稍突；前翅较宽短，前脉鬃 20—21 根，后脉鬃 14—16 根；第 8 腹节背面后缘梳完整，齿上有细毛；头、前胸、翅脉及腹端鬃较粗壮且黑。二龄若虫体长约 1mm，基色黄；复眼红；触角 7 节，第 3、4 节最长，第 3 节有覆瓦状环纹，第 4 节有环状排列的微鬃；胸、腹部背面体鬃尖端微圆钝；第 9 腹节后缘有一圈清楚的微齿。

生活习性 在我国南方年发生 11—14 代，以成虫越冬。成虫有趋花性，卵大部分产于花内植物组织中，如花瓣、花丝、花膜、花柄，一般产在花瓣上。每雌产卵约 180 粒。产卵历期长达 20—50 天。

防治方法 参见[稻管蓟马](#)。

