


水稻大绿蝽

学名 *Rhynchoris humeralis* (Thunberg) 半翅目，蝽科。别名角肩蝽象、角肩蝽、长吻蝽、棱蝽。分布在江苏、浙江、湖北、江西、湖南；福建、台湾、广东、广西、贵州、四川等省。

寄主 水稻、粟、高粱、玉米、甘蔗、茶、柑桔类、苹果、梨、沙果等。

为害特点 成、若虫吸食稻株汁液，秧苗受害，有如火烧状焦萎；分蘖期受害，造成枯心死苗；抽穗期受害，造成秕谷或白穗。



形态特征 成虫体长 22mm 左右，绿色，长盾形。触角丝状 5 节。前胸背板前缘两侧成角状突出，“肩”的边缘黑色，其上具许多黑色粗大刻点。小盾片长，大舌形。卵淡绿色，球形。若虫 5 龄，1—3 龄淡黄至赤黄色，具黑斑。4 龄胸部绿色，腹部黄色，翅芽显著。5 龄全体绿色。

生活习性 南方年生 1 代，以成虫在果树枝叶茂密处及建筑物等各种缝隙隐蔽处越冬。翌年 4 月开始出蛰活动，5—10 月产卵，7 月产卵最多，多产于叶面，常 14 粒聚成块，

排列整齐。8 月为若虫盛发期，1 龄群集不取食，2 龄开始取食，2、3 龄常 3—5 头群集，4、5 龄分散活动取食。11 月大部分羽化为成虫，为害至 12 月上旬开始陆续越冬。天敌有桔棘蝽、平腹小蜂、黄凉蚁、螳螂和蜘蛛。

防治方法 (1) 早晚捕杀成虫和若虫。(2) 摘除卵块和初孵若虫。(3) 药剂防治 越冬成虫出蛰后产卵前，若虫孵化至 3 龄期为防治关键时期。喷洒 50% 敌敌畏乳油 800—1000 倍液或 50% 对硫磷乳油 1500—2000 倍液、2.5% 敌杀死乳油 3000 倍液、20% 灭扫利乳油 3000 倍液、50% 马拉硫磷乳油 1000—1500 倍液。(4) 保护利用天敌。