

水稻山稻蝗

学名 *Oxya agavisa* Tsai 直翅目，蝗总科。中国特有。分布在长江流域以南至海南、广东、广西、贵州、云南，东面滨海，西达甘肃，折入四川。

寄主 主要为害水稻、小竹等。

为害特点 成、若虫食叶成缺刻，严重时吃光全叶，仅残留主脉。



形态特征 雄成虫体长 21—24mm，雌成虫 25—29mm，雄前翅长 13—16mm，雌 17—20mm，体短粗，绿色至黄绿色，有明显的宽黑褐色眼后带，延伸至前胸背板后缘。雌前翅臀脉域为绿色，雄为褐色，其它部位褐色。后足股节黄绿色或膝黑色，后足胫节绿色。触角丝状，长过前胸背板后缘。前胸背板侧缘平行，背板刻点略粗。前翅稍短，不达到或刚达后足股节膝部。雄性肛板三角状，宽大于长，基部两侧有弱侧沟，肛上板侧缘略直。尾须锥状，顶端平，中央稍凹；下生殖板顶钝、短锥形。雌性前翅前缘生弱刺，腹部 3、4 节背板后下角有锐齿，第 4 节大，产卵瓣外缘有

大小不等的钝齿，瓣基骨片内缘有 1 大齿，下生殖板端半部具粗侧隆线 2 条，端部齿状，下生殖板后缘中间三角形凸出，顶端二齿相距较近，三角突两侧各具 1 齿。

生活习性 河南年生 1 代，以卵在土中越冬。翌年 5 月上旬越冬卵开始孵化，7 月-8 月中旬进入成虫活动期，8 月下旬成虫产卵。

防治方法 参见[中华稻蝗](#)。