

ประเภท CM02 Child Health Care Process

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมวดตัวชี้วัด | Maternal and Child Health Care Process | |
| ประเภทตัวชี้วัด | Child Health Care Process | |
| รหัสตัวชี้วัด | CM0201 | |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย) | อัตราการตายปริกำเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์) | |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ) | Perinatal Mortality Rate (Gestational Age \geq 22 weeks) | |
| นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด | <p>1. การตายปริกำเนิด หมายถึง การตายของทารกในครรภ์ น้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป หรืออายุครรภ์ 22 สัปดาห์ หากไม่มีข้อมูลน้ำหนัก (still birth) และการตายของทารกแรกเกิดภายใน 7 วันหลังคลอด</p> <p>2. การเก็บข้อมูลการตายปริกำเนิด ให้นับเฉพาะการตายปริกำเนิดที่เกิดจากการคลอด(ทั้งที่คลอดมีชีวิตและไม่มีชีวิต) ขณะมา หรือขณะอยู่ในโรงพยาบาล โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีการส่งต่อทารกไปยังโรงพยาบาลอื่นและทารกตายภายใน 7 วันหลังคลอด ให้นับรวมเป็นการตายปริกำเนิดของโรงพยาบาลผู้ส่งต่อทารก (โดย รพ. ผู้ส่งต่อ ต้องติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกำหนด 7 วันหลังคลอด)</p> <p>3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด</p> | |
| วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลลัพธ์การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก (ANC) - ประเมินผลลัพธ์กระบวนการทำคลอดและการดูแลหลังคลอด - ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาแรกคลอด | |
| สูตรในการคำนวณ | $(a/b) \times 1,000$ | |
| ข้อมูลที่ต้องการ | ตัวตั้ง | a = จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (still birth) และทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตภายใน 7 วันหลังคลอด ในช่วงเวลา 1 เดือน |
| | ตัวหาร | b = จำนวนทารกเกิดทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน |
| รหัสโรค/ หัตถการที่เกี่ยวข้อง | ตัวตั้ง | |
| | ตัวหาร | |
| ความถี่ในการจัดทำข้อมูล | ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน) | |
| หน่วยวัด | ต่อ 1,000 การเกิดทั้งหมด | |
| Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) * | England : 3.3-6.8 per 1,000 total births | |
| วิธีการแปลผล | ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี  | |
| ที่มา/ Reference | THIP I / USAID and -Perinatal Mortality 2007-HIQP | |
| วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้ | 1 ตุลาคม 2557 | |
| วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 1 ตุลาคม 2559 | |
| เหตุผลของการปรับปรุง | ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแก้ไข นิยาม จาก คำว่า น้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม เป็น น้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป ตามนิยามวิชาการสากล, (2) ตัดนิยาม คำว่า “โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 ดังที่ระบุไว้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Templates รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความหลากหลายของการลงรหัสโรคของ รพ.แต่ละระดับ | |
| หมายเหตุ | | |

