| v q | | ข ส | ei n |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | ' |
| | กลุ่มยา 1 Gastro-intestin | al syste | em |
| 1.1 Antacids and other drugs for dys | • | | |
| Aluminium hydroxide | Tab 500 mg | ED ข | |
| Aluminium hydroxide+Magnesium | Chewable tab 350+200 | + ED ก | |
| hydroxide+Simeticone (Antacid) | Susp 240 ml | ED ก | |
| Asafoetida (มหาหิงคุ์) - Topical used | Tincture 60 ml | ตำรับร | W. |
| Compound Cardamom Mixture | Mixt 180 ml | ED ก | |
| (Mist Carminative) | | | |
| Simeticone (Simethicone) | Chewable tab 80 mg | ED ก | |
| Simeticone (Simethicone) | Susp 40 mg/0.6 ml, 15 | rr ED ก | |
| 1.2 Antispasmodics and other drugs | altering gut motility | | |
| Domperidone maleate | Tab 10 mg | ED ก | |
| Domperidone | Susp 5 mg/5 ml 30 ml | ED ก | |
| Hyoscine-N-butylbromide | Tab 10 mg | ED ก | |
| Hyoscine-N-butylbromide | Syr 5 mg/5 ml ,30 ml | ED ก | |
| Hyoscine-N-butylbromide | Inj 20 mg/ml | ED ก | |
| Mebeverine | Tab 135 mg | ED ข | |
| Metoclopramide | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | |
| Metoclopramide | Tab. 10 mg | ED ก | |
| Mosapride citrate | Tab 5 mg | NED | เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้ |
| 1.3 Ulcer-healing drugs and drugs us | ed in variceal bleeding | | |
| Bismusthsubsalicylate | Tab 1048 mg | ED 1 | เฉพาะ MED,SURG และสำหรับกำจัดH.pyroli |
| Esomeprazole | Tab 40 mg | NED | เฉพาะ MED,SURG และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Octreotide acetate | Inj 0.1 mg/ml | ED 1 | เฉพาะ MED,SURG,PED |
| Omeprazole | EC cap 20 mg | ED ก | |
| Omeprazole sodium | Inj 40 mg | ED ข | |
| Pantoprazole sodium | Inj 40 mg | ED ค | |
| Ranitidine hydrochloride | Tab 150 mg | ED ก | |
| Ranitidine hydrochloride | Inj 50 mg/2 ml | ED ข | |
| Rabeprazole | Tab 20 mg | NED | เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้ |
| Sucralfate | Tab 1 g | ED ค | |
| Sucralfate | susp.1 g/ซอง | ED ค | เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้ |
| 1.4 Drugs used in acute diarrhoea | | | |
| Kaopectin | Susp 60 ml | ตำรับร | TW. |
| Loperamide hydrochloride | Cap 2 mg | ED ข | |
| Oral rehydration salts (ORS) adult | Oral pwdr 15.90 g | ED ก | |
| 1 ซองผสมน้ำ 750 ml | | | |
| Oral rehydration salts (ORS) child | Oral pwdr 3.645 g | ED ก | |
| 1 ซองผสมน้ำ 120 ml (4 ounce) | | | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|------------------------|--------|---|
| 1.5 Drugs used in chronic bowel disor | ders | | |
| Sulfasalazine | Tab 500 mg | ED ค | |
| 1.6 Laxatives | | | |
| Bisacodyl | EC tab 5 mg | ED ก | |
| Bisacodyl | Rectal suppo 10 mg | ED ก | |
| Emulsion of liquid paraffin (ELP) | Emulsion 240 ml | ตำรับร | TW. |
| Ispaghula husk (Mucillin) | Powder 5 g | ED ก | |
| Lactulose | Syr 66.7% 100 ml | ED ข | |
| Magnesium hydroxide (Milk of magnesia |) Susp 60 ml | ตำรับร | 5W. |
| Macrogols (PEG 4000) with electrolytes | Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร) | ตำรับร | 5W. |
| (Colyte) | | | |
| Macrogols (PEG 4000) | Pwdr 137.155 g | ED ค | เฉพาะGI และสิทธิเบิกได้ |
| | | | ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจ |
| | | | ลำไส้ ไม่ใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่าย |
| Senna | Tab 7.5 mg | ED ก | |
| Sodium phosphates | Enema 133 ml | ED ก | |
| Sodium phosphates | Oral sol 45 ml | ED ค | |
| Sorbitol | Sol 20% | ตำรับร | รีฟ. |
| Sodium chloride | Enema 10 ml | NED | |
| 1.7 Local preparations for anal and re | ectal disorders | | |
| Hydrocortisone acetate + Zinc oxide | Rectal suppo | ED ข | |
| + Benzocaine (Proctosedyl/Doproct) | 7.5+250+40mg | | |
| 1.8 Drugs affecting intestinal secretion | ns | | |
| Colestyramine (Cholestyramine) | Oral powder 4 g | ED ข | เฉพาะ MED, PED |
| Pancreatic enzymes | Tab | ED 1 | ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic |
| (มี lipase activity 7,400 USP units/tab |)) | | insufficiency เท่านั้น |
| Ursodeoxycholic acid | Cap 250 mg | ED 1 | เฉพาะ GI, PED |

| | กลุ่มยา 2 Cardiovascular system | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|--|
| 2.1 Positive inotropic drugs | | | | |
| Digoxin | Tab 0.25 mg | ED ก | High alert drug | |
| Digoxin | Elixir 0.05 mg/ml 60 ml | ED ก | High alert drug | |
| Digoxin | Inj 0.5 mg/2 ml | ED ก | High alert drug | |
| 2.2 Diuretics | | | | |
| Amiloride HCl + Hydrochlorothiazide | Tab 5+50 mg | ED ข | | |
| Furosemide | Tab 40 mg, 500 mg | ED ก | | |
| Furosemide | Inj 20 mg/2 ml | ED ก | | |
| Furosemide | Inj 250 mg/25 ml | ED ก | | |
| | | | | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|------------------------|----------|----------------------------------|
| Furosemide | Syr 2 mg/ml 60 ml | ตำรับร | W. |
| Hydrochlorothiazide | Tab 50 mg | ED ก | |
| Hydrochlorothiazide | Syr 1 mg/ml 50 ml | ตำรับร | w. |
| Mannitol | Inj 20% 250 ml | ED ก | |
| Spironolactone | Tab 25 mg, 100 mg | ED ก | |
| Spironolactone | Syr 1 mg/ml 50 ml | ตำรับร | w. |
| 2.3 Anti-arrhythmic drugs | | | |
| Adenosine | Inj 6 mg/2 ml | ED ก | |
| Amiodarone hydrochloride | Tab 200 mg | ED ค | |
| Amiodarone hydrochloride | Inj 150 mg/3 ml | ED ค | |
| Atropine sulfate | Inj 0.6 mg/ml | ED ก | |
| Magnesium sulfate | Inj 10% 10 ml | ED ก | High alert drug |
| Magnesium sulfate | Inj 50% 2 ml | ED ก | High alert drug |
| 2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs | i | | |
| Atenolol | Tab 50 mg | ED ก | |
| Bisoprolol | Tab 5 mg | NED | เฉพาะCARDIO,และเบิกได้ |
| Carvedilol | Tab 12.5 mg | ED ค | ใช้สำหรับ systolic heart failure |
| Esmolol | Inj. 100 mg/10 ml | NED | |
| Metoprolol tartrate | Tab 100 mg | ED ก | |
| Propranolol hydrochloride | Tab 10 mg, 40 mg | ED ก | |
| 2.5 Drugs affecting the renin-angioter | nsin system and some o | other an | ntihypertensive drugs |
| 2.5.1 Vasodilator antihypertensive dru | ugs | | |
| Hydralazine hydrochloride | Tab 25 mg | ED ก | |
| Hydralazine hydrochloride | Inj 20 mg | ED ก | ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive |
| | | | emergencies ในหญิงตั้งครรภ์ |
| Sodium nitroprusside | Inj 50 mg | ED ก | High alert drug |
| Minoxidil | Tab 5 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 2.5.2 Centrally acting antihypertensiv | e drugs | | |
| Methyldopa | Tab 250 mg | ED ก | |
| 2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking dr | ugs | | |
| Doxazosin mesilate | Tab 2 mg | ED ค | |
| Doxazosin mesilate | SR tab 4 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Prazosin hydrochloride | Tab 1 mg | ED ข | |
| 2.5.4 Angiotensin-converting enzyme | inhibitors | | |
| Captopril | Tab 25 mg | ED ก | |
| Enalapril maleate | Tab 5 mg, 20 mg | ED ก | |
| 2.5.5 Angiotensin-II receptor antagoni | sts | | |
| Losartan potassium | Tab 50 mg | ED ข | |
| Irbesartan | Tab 300 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|----------------------------|-----------|--|
| | V | v | ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ |
| Valsatan + Amlodipine (Exforge) | Tab 160 + 10 mg | NED | เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง |
| | | | ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ |
| 2.6 Nitrates, calcium-channel blocke | rs and other vasodilator | S | |
| 2.6.1 Nitrates | | | |
| Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin) | Inj 50 mg/10 ml | ED ก | High alert drug |
| Isosorbide dinitrate | Sublingual tab 5 mg | ED ก | |
| Isosorbide mononitrate | Tab 20 mg | ED ก | |
| Isosorbide -5-mononitrate | SR tab 60 mg | NED | |
| 2.6.2 Calcium-channel blockers | | | |
| Amlodipine besilate | Tab 5 mg | ED ก | |
| Diltiazem hydrochloride | Tab 30 mg | ED ข | |
| Diltiazem hydrochloride | Inj 10 mg | NED | |
| Lercarnidipine | Tab 20 mg | ED ข | ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทน |
| | | | ต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้ |
| Manidipine hydrochloride | Tab 20 mg | ED ข | ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทน |
| | | | ต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ้ไม่ได้ |
| Nicardipine hydrochloride | Inj 2 mg/2 ml | ED ค | High alert drug |
| Nimodipine | Tab 30 mg | ED 1 | |
| Nifedipine | Cap 10 mg | NED | |
| Verapamil hydrochloride | SRTab 240 mg | ED ก | ใช้สำหรับischemic heart disease |
| 2.6.3 Other vasodilators | | | |
| Nicergoline | Tab 10 mg | NED | เฉพาะ NEURO, PSY, ENT และบัตรทอง |
| | | | ชำระเงินเอง |
| Sildenafil citrate | Tab 20 mg | ED 1 | เฉพาะ MED, PED ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข |
| | | | ข้างล่าง จะถือว่าเป็นยานอกบัญชียาหลัก |
| | | | แห่งชาติ และบัตรทองชำระเงินเอง |
| | | | (ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข) |
| เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary a | rterial hypertension (PAH) | ที่เกิดจา | กโรคหัวใจแต่กำเนิด (CHD) ชนิด |
| systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค ic | diopathic pulmonary arter | ial hype | rtension (IPAH) หรือ |
| PAH associated with connective tissue | disease (CNTD) และอยู่ใน V | VHO fur | nctional classification of PAH ≥ II |
| Sildenafil citrate | Tab 100 mg | NED | เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 2.7 Sympathomimetics | | | |
| 2.7.1 Inotropic sympathomimetics | | | |
| Dobutamine hydrochloride | Inj 250 mg/20 ml | ED ข | High alert drug |
| Dopamine hydrochloride | Inj 250 mg/10 ml | ED ก | High alert drug |
| Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) | Inj 0.2 mg/ml | ED ก | |
| 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomime | etics | | |
| Ephedrine hydrochloride | Inj 30 mg/ml | ED ค | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|------------------------|--------|---|
| Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate | e Inj 4 mg/4 ml | ED ก | |
| Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin) | Tab 450+50 mg | NED | ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary | resuscitation | | |
| Epinephrine (Adrenaline) | Inj 1 mg/ml | ED ก | High alert drug |
| 2.8 Anticoagulants | | | |
| Apixaban | Tab 5 mg | NED | เฉพาะ ORTHO,MEDและบัตรทองชำระเงินเอง |
| Dabigatran | Cap 150 mg | NED | เฉพาะ CARDIOและสิทธิเบิกได้ |
| Enoxaparin sodium | Inj 60 mg/0.6 ml | ED ค | |
| Fondaparinux | Inj 2.5 mg/0.5 ml | ED 1 | |
| Heparin sodium | Inj 25,000 IU/5 ml | ED ค | |
| Warfarin sodium | Tab 2 mg, 3 mg,5 mg | ED ค | High alert drug |
| 2.9 Antiplatelet drugs | | | |
| Aspirin (Acetylsalicylic acid) | EC tab 81 mg, 300 mg | ED ก | |
| Aspirin (Acetylsalicylic acid) | Tab 325 mg (ใช้ที่ ER) | ED ก | |
| Clopidogrel bisulfate | Tab 75 mg | ED 1 | เฉพาะ MED, NEURO |
| Clopidogrel +acetylsalicylic acid | Tab 75 +75 mg | NED | เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้ |
| Cilostazol | SRTab 100 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Ticagrelor | Tab 90 mg | NED | เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้ |
| 2.10 Fibrinolytic drugs | | | |
| Alteplase (Recombinant tissue-type | Inj 50 mg | ED 1 | เฉพาะ MED |
| plasminogen activator) - rTPA | | | |
| Streptokinase | Inj 1,500,000 U | ED ก | เฉพาะ MED |
| 2.11 Hemostatics | | | |
| Tranexamic acid | Inj 250 mg/5 ml | ED ก | |
| Factor VIII concentrate, dried | Inj 250 IU | ED จ(2 | โเฉพาะ MED, PED และผู้ป่วยโครงการ |
| (Antihemophilic factor) | | | ของ สปสช. |
| Pentoxyfylline (Oxpentifylline) | Tab 400 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 2.12 Lipid-regulating drugs | | | |
| Atorvastatin | Tab 40 mg | ED 1 | เฉพาะ MED |
| Colestyramine (Cholestyramine) | Oral pwdr 4 g | ED ข | เฉพาะ MED, PED |
| Ezetimibe | Tab 10 mg | NED | กรณีใช้ร่วมกับstatinให้ใช้ร่วมกับsimvastatinเท่านั้น |
| - Cl - | C 200 | ED • | เฉพาะMEDและสิทธิเบิกได้ |
| Fenofibrate | Cap 200 mg | ED A | |
| Gemfibrozil | Tab 600 mg | ED ก | |
| Nicotinic acid | Tab 100 mg | ED ก | 150 9 9 9 4 V |
| Rosuvastatin | Tab 10 mg | NED | เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้ ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ |
| Simvastatin | Tab 20 mg, 40 mg | ED ก | |

| บัญชียาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2560 | | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ | |
| 2.13 Others | • | | | |
| Trimetazidine | MR tab 35 mg | NED | เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้ | |
| Ivabradine | Tab 5 mg | NED | เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้ | |
| | | | | |
| | กลุ่มยา 3 Respiratory s | ystem | | |
| 3.1 Bronchodilators | | | | |
| 3.1.1 Adrenoceptor agonists | | | | |
| Procaterol hydrochloride | Tab 50 mcg | ED ข | เฉพาะ MED, CHEST | |
| Salbutamol sulfate | Tab 2 mg | ED ก | | |
| Salbutamol sulfate | Syr 2 mg/5 ml 60 ml | ED ก | | |
| Salbutamol sulfate | MDI 100 mcg/puff | ED ก | | |
| Salbutamol sulfate | Sol for neb 0.5% 20 ml | ED ก | | |
| Terbutaline sulfate | Inj 0.5 mg/ml | ED ก | | |
| 3.1.2 Compound antimuscarinic brond | chodilators | | | |
| Ipratropium Br + Fenoterol HBr | MDI 20+50 mcg/puff | ED ก | | |
| (Aeroduol) | | | | |
| Ipratropium Br + Fenoterol HBr | Sol 0.5+1.25mg/4ml (for | 1ED ก | | |
| (Inhalex forte) | | | | |
| Ipratropium Br + Fenoterol HBr (Inhalex) | Sol 0.25+0.5mg/ml 20m | l ED ก | | |
| Tiotropium (Spiriva) combo | Cap 18 mcg+handihaler | NED | เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้ | |
| Tiotropium +olodaterol | 5+5 mcg/puff | NED | เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้ | |
| 3.1.3 Theophylline | | | | |
| Aminophylline | Tab 100 mg | ED ก | | |
| Aminophylline | Inj 250 mg/10 ml | ED ก | | |
| Theophylline | SR cap 200 mg | ED ก | | |
| Theophylline + Glyceryl guaiacolate | Syr (50+30mg)/5ml 60 m | าED ก | | |
| (Bronchil) | | | | |
| Doxofylline | Tab 400 mg | NED | เฉพาะCHEST, MED และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| 3.2 Corticosteroids | | | | |
| Budesonide | MDI 200 mcg/puff | ED ก | | |
| Budesonide+Formoterol | pMDI 160+4.5mcg/puff | NED | เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้ | |
| Fluticasone propionate | MDI 125 mcg/puff | ED ค | | |
| Fluticasone propionate | Susp for neb 0.5mg/2 m | IED ก | | |
| Salmeterol+Fluticasone propionate | MDI 25+50 mcg/puff | ED ค | | |
| Salmeterol+Fluticasone propionate | MDI 25+250 mcg/puff | ED ค | เฉพาะ MED | |
| Salmeterol+Fluticasone propionate | DPI 50+250 mcg/puff | ED ค | | |
| (Seretide) | | | | |
| 3.3 Leukotriene receptor antagonists | | | | |
| Montelukast sodium | Tab 10 mg | ED ค | | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|---------------------------|----------|--|
| 3.4 Antihistamines | g = 00 = 5, 11 = 100 00 0 | 2.8 | ote 2007 na teorniq |
| Cetirizine hydrochloride | Tab 10 mg | ED ก | |
| Cetirizine hydrochloride | Syr 5 mg/5 ml 60 ml | ED ก | |
| Chlorpheniramine maleate | Tab 4 mg | ED ก | |
| Chlorpheniramine maleate | Syr 2 mg/5 ml 60 ml | ED ก | |
| Chlorpheniramine maleate | Inj 10 mg/ml | ED ก | |
| Hydroxyzine hydrochloride | Tab 10 mg | ED ก | |
| Hydroxyzine hydrochloride | Syr 10 mg/5 ml 50 ml | ED ก | |
| Fexofenadine | Tab 60 mg | NED | เฉพาะ MED,ENT,PED สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Levocetirizine hydrochloride | Tab 5 mg | NED | เฉพาะ MED,ENT สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 3.5 Pulmonary surfactants | | | |
| Phospholipids ชนิด Beractant (Survanta) | Inj 25 mg/ml | ED 1 | |
| 3.6 Cough preparations | | | |
| 3.6.1 Cough suppressants | | | |
| Dextromethorphan hydrobromide | Tab 15 mg | ED ก | |
| Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown mixture, M.Tussis) | Mixt 60 ml | NED | |
| 3.6.2 Expectorant and demulcent cou | gh preparations | | |
| Ammonium carbonate and senega mixture | Mixt 240 ml | ตำรับร | w. |
| Glyceryl guaiacolate | Tab 100 mg | ED ก | |
| Ambroxol | Syr 30 mg/5 ml 60 ml | NED | |
| Carbocisteine | Syr 100 mg/5 ml 60 ml | NED | |
| Acetylcysteine | Effervescent tab 600 mg | NED | เฉพาะCHESTและสิทธิเบิกได้ MEDสั่งได้ไม่เกิน 10 tab/ครั้ง |
| 3.7 Systemic nasal decongestants | | | |
| Pseudoephedrine hydrochloride | Tab 60 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 MED,ENTจ่ายไม่เกิน 1เดือนแผนกอื่นไม่เกิน 30 เม็ด |
| Pseudoephedrine hydrochloride | Syr 30 mg/5 ml 60 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 |
| 3.8 Other respiratory preparations | | | |
| Aromatic ammonia spirit | 450 ml | ED ก | |
| 4.1 Hypnotics and anxiolytics | กลุ่มยา 4 Central nervou | s syste | m |
| Alprazolam | Tab 0.5 mg | NED | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 |
| Αιριαζυία!!! | I ab o.5 mg | INLU | าทถุยยกฤทอทยงพและบระสาทบระเภท 2 บัตรทองชำระเงินเอง |
| Chloral hydrate | Syr 100 mg/ml 60 ml | ตำรับรพ. | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Clonazepam | Tab 0.5 mg, 2 mg | ED ข | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|------------------------|-------|--|
| Diazepam | Tab 2 mg, 5 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Diazepam | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Dipotassium clorazepate | Cap 5 mg | ED 11 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Hydroxyzine hydrochloride | Tab 10 mg | ED ข | 3116 GOLLE IN CHE AND CHE IN CHE AND CHE IN CHE AND CH |
| Hydroxyzine hydrochloride | Syr 10 mg/5 ml 50 ml | ED v | |
| | Tab 1 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Lorazepam 4.2 Drugs used in psychoses and rela | <u> </u> | בט וו | เทเนียกเป็นกลุกคุณและการณ์ เมการชาน 4 |
| 4.2.1 Antipsychotic drugs | ted disorders | | |
| Aripiprazole | Tab 10 mg | NED | เฉพาะPSY และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Chlorpromazine hydrochloride | Tab 50 mg, 100 mg | ED ก | PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH |
| Chlorpromazine hydrochloride | Inj 50 mg/2 ml | ED ก | |
| Clozapine | Tab 25 mg, 100 mg | ED ค | เฉพาะ PSY |
| Fluphenazine | Inj 25 mg/ml | ED ก | וכ ו שו מאל |
| Haloperidol | Tab 0.5 mg, 5 mg | ED ก | |
| Haloperidol | Oral sol 0.2% 15 ml | ED ก | เฉพาะ PSY, MED |
| Haloperidol | Inj 5 mg/ml | ED ก | SWITE IST, IVILE |
| Haloperidol decanoate | Inj 50 mg/ml | ED ก | |
| Perphenazine | Tab 2 mg, 8 mg | ED ก | |
| Risperidone | Tab 1 mg, 2 mg | ED A | เฉพาะ PSY, NEURO |
| Risperidone | Oral sol.1 mg/ml,30 ml | | เฉพาะ PSY |
| Thioridazine hydrochloride | Tab 25 mg | ED ค | |
| Flupentixol+Melitracen (Deanxit) | Tab 0.5+10 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Olanzapine | Tab 10 mg | NED | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Quetiapine fumarate | Tab 25 mg | NED | เฉพาะPSY,MED,NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ziprasidone | Cap 40 mg | NED | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 4.2.2 Antimanic drugs | -1 3 | | |
| Carbamazepine | Tab 200 mg | ED ก | |
| Lamotrigine | Tab 50 mg | ED ค | เฉพาะ PSY, NEURO |
| Lithium carbonate | Cap 300 mg | ED ก | |
| Sodium valproate | Syr 200 mg/ml 60 ml | ED ก | |
| Sodium valproate | SR tab 500 mg | ED ข | |
| Sodium valproate | Tab 200 mg | ED ก | |
| 4.3 Antidepressant drugs | | | |
| Amitriptyline hydrochloride | Tab 10 mg, 25 mg | ED ก | |
| Bupropion extended release | SR tab 150 mg | NED | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Desvenlafaxine succinate | SR tab 50 mg | NED | เฉพาะ PSY, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Duloxetine hydrochloride | Cap 30 mg | NED | เฉพาะ PSY, NEURO, ORTHO |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Fluoxetine hydrochloride | Tab 20 mg | ED ก | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|-------------------------|--------|---|
| Imipramine hydrochloride | Tab 25 mg | ED ก | · |
| Mianserin hydrochloride | Tab 10 mg | ED ข | |
| Nortriptyline hydrochloride | Tab 25 mg | ED ก | |
| Sertraline | Tab 50 mg | ED ข | เฉพาะ MED, PSY, NEURO, REHAB |
| Trazodone hydrochloride | Tab 50 mg | ED ค | |
| Vortioxetine | Tab 10 mg | NED | เฉพาะPSY, NEURO และสิทธิเบิกได้ |
| 4.4 Central nervous system stimulants | 5 | | |
| Methylphenidate | Tab 10 mg | ED A | เฉพาะ PSY วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 |
| Methylphenidate | ER tab 18 mg | NED | เฉพาะPSY และเบิกได้บัตรทองชำระเงินเอง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 |
| 4.5 Drugs used in nausea and vertigo | | | |
| 4.5.1 Drugs used in nausea and vomit | ting | | |
| Domperidone maleate | Tab 10 mg | ED ก | |
| Domperidone | Susp 5 mg/5 ml 30 ml | ED ก | |
| Metoclopramide | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | |
| | Tab 10 mg | ED ก | |
| Ondansetron | Inj 8 mg/4 ml | ED ข | |
| | Tab 8 mg | ED ข | |
| 4.5.2 Drugs used in vestibular disorder | rs | | |
| Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) | Tab 6 mg | ED ข | |
| Cinnarizine | Tab 25 mg | NED | |
| Dimenhydrinate | Tab 50 mg | ED ก | |
| Dimenhydrinate | Inj 50 mg/ml | ED ก | |
| Flunarizine hydrochloride | Cap 5 mg | NED | |
| 4.6 Analgesics and antipyretics | | | |
| Aspirin | FC tab 300 mg | ED ก | |
| Ibuprofen | Tab 200 mg, 400 mg | ED ก | |
| Ibuprofen | Susp 100 mg/5 ml 60 m | l ED ก | |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Tab 325 mg, 500 mg | ED ก | |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Drop 60mg/0.6ml 15ml | ED ก | |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Syr 120 mg/5 ml 60 ml | ED ก | |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Inj 300 mg/2 ml | NED | |
| 4.7 Analgesics | | | |
| 4.7.1 Opioid analgesics | | | |
| Codeine phosphate | Tab 15 mg | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Fentanyl citrate | Inj 100 mcg/2 ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Fentanyl | TTS patch 4.2 mg, 8.4 m | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Morphine sulfate | SR tab 10 mg, 30 mg | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|---------------------|-------|---|
| | Ü | | เฉพาะ palliative care |
| | Tab 10 mg | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Morphine sulfate | Solution 10 mg/5 ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Morphine sulfate | Inj 10 mg/ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Pethidine hydrochloride | Inj 50 mg/ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| Tramadol hydrochloride | Cap 50 mg | ED ค | จ่ายไม่เกิน 60 เม็ด/ครั้ง |
| Tramadol hydrochloride | Inj 100 mg/2 ml | ED ค | |
| 4.7.2 Drugs for neuropathic pain | | | |
| Amitriptyline hydrochloride | Tab 10 mg, 25 mg | ED ก | |
| Carbamazepine | Tab 200 mg | ED ก | |
| Gabapentin | Cap 300 mg | ED 1 | เฉพาะ MED,ORTHO, NEURO,PSY, REHAB,ทันตกรรม(maxilo),ANA! |
| Gabapentin | Tab 600 mg | ED 1 | เฉพาะ MED,ORTHO, NEURO,PSY, REHAB,ทันตกรรม(maxilo),ANA |
| Nortriptyline hydrochloride | Tab 25 mg | ED ก | |
| Pregabalin | Cap 75 mg | NED | เฉพาะ ORTHO, NEURO, REHAB ,ANAS |
| | | | และเฉพาะสิทธิเบิกได้ |
| 4.7.3 Antimigraine drugs | | | |
| 4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack | k | | |
| Aspirin | FC tab 300 mg | ED ก | |
| Ergotamine tartrate + Caffeine (Cafergot |) Tab 1+100 mg | ED ค | |
| lbuprofen | Tab 200 mg, 400 mg | ED ก | |
| Paracetamol (Acetaminophen) | Tab 325 mg, 500 mg | ED ก | |
| 4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis | of migraine | | |
| Amitriptyline hydrochloride | Tab 10 mg, 25 mg | ED ก | |
| Cyproheptadine hydrochloride | Tab 4 mg | ED ข | |
| Neuramizone (Phenobarbitone + | Tab 20+0.1+0.3 mg | NED | เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Hyoscyamine + Ergotamine) | | | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Propranolol hydrochloride | Tab 10 mg, 40 mg | ED ก | |
| Sodium valproate | SR tab 500 mg | ED 1 | |
| Sodium valproate | ECTab 200 mg | ED ก | |
| Topiramate | Tab 50 mg | ED 1 | เฉพาะ MED, PSY, PED |
| 4.8 Antiepileptics | | | |
| 4.8.1 Drugs used in the control of epi | lepsy | | |
| Carbamazepine | Tab 200 mg | ED ก | |
| Clonazepam | Tab 0.5 mg, 2 mg | ED ข | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Lamotrigine | Tab 50 mg | ED 1 | เฉพาะ PSY, NEURO |
| Levetiracetam | Tab 500 mg | ED 1 | เฉพาะ NEURO |
| Magnesium sulfate | Inj 10% 10 ml | ED ก | |
| Magnesium sulfate | Inj 50% 2 ml | ED ก | |
| Perampanel | Tab 4 mg | NED | เฉพาะNEUROและสิทธิเบิกได้ |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ | |
|---|------------------------|-------|---|--|
| Phenobarbital | Tab 60 mg | ED ก | | |
| Phenobarbital | Elixir 20 mg/5ml,60 ml | NED | | |
| Phenytoin sodium | Chewable tab 50 mg | ED ก | | |
| Phenytoin sodium | Cap 100 mg | ED ก | | |
| Phenytoin sodium | SR cap 100 mg | ED ก | เฉพาะ MED, NEURO และต้องระบุให้ชัดเจนว่า "SR" | |
| Sodium valproate | Syr 200 mg/ml 60 ml | ED ก | | |
| Sodium valproate | SR tab 500 mg | ED ข | | |
| Sodium valproate | EC Tab 200 mg | ED ก | | |
| Topiramate | Tab 50 mg | ED 1 | เฉพาะ MED, PSY, PED | |
| 4.8.2 Drugs used in status epilepticus | | | | |
| Diazepam | Inj 10 mg/2ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Levetiracetam | Inj 100 mg/5 ml | ED 1 | เฉพาะ NEURO | |
| Midazolam hydrochloride | Inj 5 mg/ml | ED 1 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | |
| Phenobarbital sodium (Phenobarbitone) | Inj 200 mg/4 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Phenytoin sodium | Inj 250 mg/5ml | ED ก | | |
| Sodium valproate | Inj 400 mg/4 ml | ED ค | | |
| 4.9 Drugs used in movement disorder | S | | | |
| Baclofen | Tab 10 mg | ED ข | | |
| Bromocriptine mesilate | Tab 2.5 mg | ED ค | | |
| Clonazepam | Tab 0.5 mg, 2 mg | ED ข | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Diazepam | Tab 2 mg, 5 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Levodopa+Benserazide hydrochloride | Tab 200+50 mg | ED ก | | |
| (Co-beneldopa) - Vopar | | | | |
| Levodopa+Benserazide hydrochloride | CR cap 100+25 mg | ED ข | | |
| (Co-beneldopa) - Madopar | | | | |
| Levodopa+Carbidopa monohydrate | Tab 100+25 mg | ED ก | | |
| (Co-careldopa) - Sinemet | | | | |
| Pramipexole | ER Tab 375 mcg | NED | เฉพาะ NEURO,MED และสิทธิเบิกได้ | |
| Propranolol hydrochloride | Tab 10 mg, 40 mg | ED ก | ใช้สำหรับ essential tremor | |
| Rasagiline mesylate | Tab 1 mg | NED | เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| Levodopa + Carbidopa + Entacapone(Stalevo |) Tab 100+25+200 mg | NED | เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| Trihexyphenidyl HCl (Benzhexol HCl) | Tab 2 mg, 5 mg | ED ก | | |
| 4.10 Drugs used in substance dependence | | | | |
| 4.10.1 Drugs used in alcohol depende | ence | | | |

| 4.10.2 Drugs used in smoking ce | ssation | | |
|---------------------------------|------------|----------|--|
| Nortriptyline hydrochloride | Tab 25 mg | ED ก | |
| Sodium nitrate (น้ำยาอดบุหรื่) | Sol 240 ml | ตำรับรพ. | |
| | | | |

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

| ed ed | | a ~ | ei v |
|--|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงือนไข/หมายเหตุ |
| Methadone hydrochloride | Oral sol | ED 1 | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 |
| 4.11 Others | | | |
| Citicoline | Inj 1000 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Donepezil hydrochloride | Tab 10 mg | NED | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Galantamine hydrobromide | SR Cap 8 mg | NED | เฉพาะ PSY, MED, NEURO |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Memantine | Sol pump 10 mg/g 50 g | | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Rivastigmine | Transdermal patch 4.6mg/24 | | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| | Transdermal patch 13.3mg/2 | ≀ NED | เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| | กลุ่มยา 5 Infectio | าร | |
| 5.1 Antibacterial drugs | · | | |
| 5.1.1 Penicillins | | | |
| Amoxicillin trihydrate | Cap 250 mg, 500 mg | ED ก | |
| Amoxicillin trihydrate | Dry syr 125mg/5ml 60m | l ED ก | |
| Amoxicillin trihydrate | Dry syr 250mg/5ml 60m | l ED ก | |
| Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate | Tab 1 g | ED ค | |
| (Co-amoxiclav) | | | |
| Amoxicillin sodium+Potassium clavulanate | lnj 1.2 g | ED ค | |
| (Co-amoxiclav) | | | |
| Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate | Dry syrup 156 mg/5 ml | NED | |
| Ampicillin sodium | Inj 1 g | ED ก | |
| Ampicillin+Salbactam | lnj.2g+1g | ED ค | |
| Benzathine benzylpenicillin | lnj 1.2 mu | ED ก | |
| (Penicillin G benzathine) | | | |
| Benzylpenicillin (Penicillin G) sodium | lnj 5 mu | ED ก | |
| Cloxacillin sodium | Inj 1 g | ED ก | |
| Dicloxacillin sodium | Cap 250 mg | ED ก | |
| Dicloxacillin sodium | Dry syr 62.5mg/5ml 60m | | |
| Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) | - | ED ก | |
| Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) | | | dy |
| Piperacillin+Tazobactam (Tazocin) | Inj 4 g + 0.5 g | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| 5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, a | | | |
| Cefalexin (Cephalexin) | Cap 500 mg | ED ก | |
| Cefalexin (Cephalexin) | Dry syr 125mg/5ml 60m | | |
| Cefazolin sodium | Inj 1 g | ED ก | |
| Cefdinir | Cap 100 mg | NED | |
| Cefdinir | Dry syr 125mg/5 ml | NED | વેં પ્રાથમ મુખ્ય મું લ |
| Cefixime | Dry syr 100mg/5ml 30m | (FD 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|
| Cefoperazone sodium + Sulbactam | Inj 1 g, 1.5 g | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| sodium (Sulperazon) | | | |
| Cefotaxime sodium | Inj 1 g | ED ค | |
| Cefoxitin sodium | Inj 1 g | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Ceftazidime | Inj 1 g | ED ค | |
| Ceftriaxone sodium | Inj 1 g | ED ค | |
| Ertapenem sodium | lnj 1 g | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| Imipenem+Cilastatin sodium (Tienam) | Inj 500+500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| Meropenem | Inj 500 mg(Meronem), 1 | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| 5.1.3 Tetracyclines | | | |
| Doxycycline hyclate | Cap 100 mg | ED ก | |
| Tetracycline hydrochloride | Cap 250 mg | ED ก | |
| 5.1.4 Aminoglycosides | | | |
| Amikacin sulfate | Inj 500 mg/2 ml | ED ข | |
| Gentamicin sulfate | Inj 20 mg/2 ml | ED ก | |
| Gentamicin sulfate | Inj 80 mg/2 ml | ED ก | |
| 5.1.5 Macrolides | | | |
| Azithromycin | Cap 250 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Azithromycin | Dry syrup 200 mg/5ml | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Clarithromycin | Tab 500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Erythromycin estolate | Dry syr 125mg/5ml 60 m | n ED ก | |
| Erythromycin stearate | Cap 250 mg | NED | |
| Roxithromycin | Tab 150 mg | ED ก | |
| 5.1.6 Quinolones | | | |
| Ciprofloxacin hydrochloride | Tab 500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Ciprofloxacin lactate | Inj 200 mg/100 ml | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Levofloxacin hemihydrate | Tab 500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Levofloxacin hemihydrate | Inj 750 mg/150 ml | ED 1 | ยาที่ต้องประเมิน DUE |
| Norfloxacin | Tab 100 mg, 400 mg | ED ก | |
| Ofloxacin | Tab 200 mg | ED ข | |
| Sitafloxacin | Tab 50 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 5.1.7 Some other antibacterials | | | |
| Clindamycin hydrochloride | Cap 300 mg | ED ข | |
| Clindamycin phosphate | Inj 600 mg/4 ml | ED ข | |
| Colistimethate sodium | Inj 150 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Colistin | Syr 1,000,000 U/g | NED | |
| Fosfomycin sodium | Inj 4 g | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Lincomycin hydrochloride | Inj 600 mg/2 ml | NED | |
| Metronidazole | Tab 400 mg | ED ก | |
| | | | |

| ชื่อยา | 59 119 19 1/2009 115 9 | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหต |
|---|------------------------|-------------|---|
| พืชยา Metronidazole | รูปแบบ/ความแรง | • | เงอนเล\มท.เอเนต์ |
| | Inj 500 mg/100 ml | ED ก NED | ยาที่ต้องประเมิน DUE และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Tigecycline | Inj 50 mg | | 1 |
| Vancomycin hydrochloride | Inj 500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| 5.1.8 Sulphonamides and trimethoprin | | FD - | |
| Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole) | _ | ED ก | |
| Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole) | | | |
| Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole) | Inj 400+80 mg/5 ml | ED ก | |
| 5.1.9 Antituberculous drugs | | | |
| Amikacin sulfate | Inj 500 mg/2 ml | ED ค | |
| Cycloserine | Cap 250 mg | ED ค | |
| Ethambutol hydrochloride | Tab 400 mg | ED ก | |
| Ethionamide | Tab 250 mg | ED ค | |
| Isoniazid | Tab 100 mg | ED ก | |
| Isoniazid + Rifampicin (2FDC) | Tab 75+150 mg | ยาสนับ | เสนุนในโครงการ |
| Isoniazid+Rifampicin + Pyrazinamide | Tab75+150+400+275 mg | ED ข | |
| +Ethambutol hydrochloride | | | |
| (Rifafour/4FDC) | | | |
| Kanamycin sulfate | lnj 1 g | ED ค | |
| Levofloxacin hemihydrate | Tab 500 mg | ED 1 | ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง |
| Ofloxacin | Tab 200 mg | ED ค | |
| Para-aminosalicylic acid (PAS) | EC tab 1 g | ED ค | |
| Pyrazinamide | Tab 500 mg | ED ก | |
| Rifampicin | Cap 300 mg, 450 mg | ED ก | |
| Streptomycin sulfate | lnj 1 g | ED ก | |
| Tuberculin Purified Protein Derivative | lnj | ED ก | |
| (Tuberculin PPD) | | | |
| 5.1.10 Antileprotic drugs | | | |
| Clofazimine | Cap 50 mg | ED ก | |
| Dapsone | Tab 100 mg | ED ก | |
| Clofazimine+Dapsone+Rifampicin | 50+100+300 mg | ยาสนับ | เสนุนในโครงการ |
| (MDT-COMBI) | | | |
| 5.2 Antifungal drugs | | FD - | |
| Amphotericin B | Inj 50 mg | ED A | |
| Liposomal amphotericin B | Inj 50 mg | ED จ(2 | 2) |
| Fluconazole | Cap 200 mg | ED ก | യെ പ |
| | Inj 200 mg/100 ml | ED A | ใช้เป็น alternative drugของamphotericinB ในการรักษาcryptococcusหรือcandidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้amphotericinBได้ |
| Griseofulvin | Tab 125 mg, 500 mg | ED ก | • |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|
| Itraconazole | Cap 100 mg | ED ค | |
| Ketoconazole | Tab 200 mg | ED ก | |
| Nystatin | Susp 100,000 u/ml 15 m | i ED ก | |
| Voriconazole | Tab. 200 mg | ED จ(2) | |
| | Inj. 200 mg | ED จ(2) | |
| 5.3 Antiviral drugs | | | |
| 5.3.1 Non-antiretrovirals | | | |
| Aciclovir (Acyclovir) | Tab 200 mg, 800 mg | ED ก | |
| Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) | Inj 250 mg | ED ค | |
| Ganciclovir | Inj.20mg/ml | EDง เฉพาะจักษุ | |
| Lamivudine (3TC) | Tab 150 mg | ED 4 | |
| Oseltamivir phosphate | Cap 75 mg | ED จ(1) | |
| Tenofovir disoproxil fumarate | Tab 300 mg | ED 4 | |
| Zanamivir | Diskhaler | NED | |
| 5.3.2 Antiretrovirals | | | |
| Abacavir(ABC) | Tab 300 mg | ED 4 | |
| Atazanavir sulfate (ATV) | Cap 300 mg | ED A | |
| Didanosine (ddl) | Tab 125 mg, 200 mg | ED 4 | |
| Efavirenz(EFV) | Cap 200 mg | ED ก | |
| Efavirenz(EFV) | Tab 600 mg | ED ก | |
| Indinavir sulfate | Cap 400 mg | NED | |
| Lamivudine (3TC) | Tab 150 mg | ED ก | |
| Lamivudine (3TC) | Syr 10 mg/ml 60 ml | ED ก | |
| Lopinavir + Ritonavir | Tab 200 mg+50 mg | ED A | |
| Lopinavir + Ritonavir | Sol 80 mg+20 mg 60 /m | IED ค | |
| Nevirapine (NVP) | Tab 200 mg | ED ก | |
| Nevirapine (NVP) | Syr 10 mg/ml 60 ml | ED ก | |
| Ritonavir | Cap 100 mg | ED A | |
| Rilpivirine | Tab 25 mg | ED 4 | |
| Stavudine (d4T) | Cap 15 mg | ED ข | |
| Stavudine (d4T) | Dry syr 5 mg/ml 60 ml | ED ข | |
| Tenofovir disoproxil fumarate | Tab 300 mg | ED 4 | |
| Tenofovir +Efavirenz+Emtricitabine(Teevir) | Tab 300+600+200 mg | ED ก | |
| Zidovudine (AZT) | Cap 100 mg, 300 mg | ED ก | |
| Zidovudine (AZT) | Syr 10 mg/ml 60 ml | ED ก | |
| Zidovudine+Lamivudine (AZT+3TC)/Zilarvir | Tab 300+150 mg | ED ก | |
| Zidovudine+Lamivudine+Nevirapine (GPO vir Z250) | Tab 250+150+200mg | ED ก | |
| 5.3.3 Viral hepatitis | | | |
| Peginterferon alfa-2a (Pegasys®) | Inj 180 mcg 0.5 ml | ED จ(2 เฉพาะ GI | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| Ribavirin (Copegus) | Tab 200 mg | ED จ(2]เฉพาะ GI | , |
| 5.4 Antiprotozoal drugs | , | | |
| 5.4.1 Antimalarials | | | |
| Artesunate | Tab 50 mg | ED A | |
| Artesunate | Inj 60 mg | ED A | |
| Chloroquine phosphate | Tab 250 mg | ED ก | |
| Mefloquine hydrochloride | Tab 250 mg | ED A | |
| Primaquine phosphate | Tab 15 mg | ED ก | |
| Quinine dihydrochloride | Inj 600 mg/2 ml | ED ก | |
| Quinine sulfate | Tab 300 mg | ED ก | |
| 5.4.2 Other antiprotozoal drugs | | | |
| Metronidazole | Tab 400 mg | ED ก | |
| Metronidazole | Inj 500 mg/100 ml | ED ก | |
| Pyrimethamine | Tab 25 mg | ED ก | |
| Sulfadiazine | Tab 500 mg | ED ก | |
| 5.5 Anthelmintics | | | |
| Albendazole | Tab 200 mg | ED ก | |
| Diethylcarbamazine citrate | Tab 300 mg | EDก จ่ายที่ห้องช | วันสูตร |
| Mebendazole | Susp 100 mg/5 ml 30 ml | ED ก | |
| Praziquantel | Tab 600 mg | ED ก | |
| 5.6 Antiseptics | | | |
| Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub) | Sol 4% in water 60 ml | ตำรับรพ. | |
| Chlorhexidine gluconate (Hibisol) | Sol 0.5% in 70% alcohol | ตำรับรพ. | |
| Chlorhexidine gluconate | Sol 2% in 70% alcohol | ตำรับรพ. | |
| Chlorhexidine gluconate (Hibitane) | Sol 0.05% 1:100 | ตำรับรพ. | |
| Chlorhexidine gluconate 1.5% | Sol 1:100(ชำระช่องคลอด) | ตำรับรพ. | |
| +Cetrimide 15% (Savlon) in water | 240 ml | | |
| Ethyl alcohol | Sol 50% 1 L | ตำรับรพ. | |
| Ethyl alcohol | Sol 70% 60 ml,120 ml,11 | ตำรับรพ. | |
| Ethyl alcohol | Sol 95% 240 ml, 1L | ตำรับรพ. | |
| Gentian violet | Sol 1% 10 ml | ตำรับรพ. | |
| Hydrogen peroxide | Sol 5-7% 450 ml | ED ก | |
| Potassium permanganate (ด่างทับทิม) | Pwdr | ตำรับรพ. | |
| Povidone iodine | Sol 7.5% (Scrub) 120 ml | ตำรับรพ. | |
| Povidone iodine | Sol 10% 15 ml, 120 ml | ตำรับรพ. | |
| Benzoin | Tincture | NED | |
| Chlorhexidine acetate 10x10cm(Bactigras) | Gauze dressing 0.5% | NED | |
| Chlorhexidine acetate 15x20cm(Bactigras) | Gauze dressing 0.5% | NED | |
| Formaldehyde | Sol 34-38% 450 ml | NED | |

| 0.00 00 1834 MO 10 1818 A 1M 300 103 103 103 113 | N.11.2300 | | |
|--|---------------------------|--------|--|
| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
| | | | |
| | กลุ่มยา 6 Endocrine sy | /stem | |
| 6.1 Drugs used in diabetes | | | |
| 6.1.1 Insulins | | | |
| Biphasic Isophane insulin (Soluble insulin | Inj 100 IU/ml 10 ml | ED ก | |
| +Isophane insulin)/Mixed 30/70 | Inj Penfill 100 IU/ml 3 m | i ED ก | ควบคุมการสั่งใช้ (ใช้ในสิทธิ์เบิกคลัง) |
| Isophane insulin (NPH)/Insulatard | Inj 100 IU/ml 10 ml | ED ก | |
| Soluble insulin (Regular)/(Insugen R) | Inj 100 IU/ml 10 ml | ED ก | |
| 6.1.2 Oral antidiabetic drugs | | | |
| Alogliptin+pioglitazone | Tab 25+30 mg | NED | เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้ |
| Empagliflozin | Tab 10 mg | NED | เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้ |
| Glipizide | Tab 5 mg | ED ก | |
| Linagliptin | Tab 5 mg | NED | เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้ |
| Metformin hydrochloride | Tab 500 mg | ED ก | |
| Pioglitazone hydrochloride | Tab 30 mg | ED 1 | เฉพาะ MED |
| Voglibose | Tab 0.2 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 6.2 Thyroid and antithyroid drugs | | | |
| 6.2.1 Thyroid hormones | | | |
| Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) | Tab 100 mcg | ED ก | |
| Thyroid extract | Tab 60 mg | NED | |
| 6.2.2 Antithyroid drugs | | | |
| Lugol's solution (Iodine+Potassium iodide) | Sol 60 ml | ตำรับร | W. |
| Propylthiouracil | Tab 50 mg | ED ก | |
| Thiamazole (Methimazole) | Tab 5 mg | ED ก | |
| 6.3 Corticosteroids | | | |
| Dexamethasone sodium phosphate | Inj 5 mg/ml | ED ก | |
| Hydrocortisone sodium succinate | Inj 100 mg | ED ก | |
| Methylprednisolone | lnj 2 g | ED ค | |
| Prednisolone | Tab 5 mg | ED ก | |
| Triamcinolone acetonide | Inj 10 mg/ml, 40 mg/ml | ED A | ชำระเงินเองทุกสิทธิ์ (กรณีที่ใช้เกี่ยวกับ ความสวยงาม) |
| 6.4 Sex hormones | | | |
| 6.4.1 Female sex hormones | | | |
| Conjugated estrogens | Tab 0.625 mg | ED ข | |
| Dienogest | Tab 2 mg | NED | เฉพาะสูติกรรมและสิทธิเบิกได้ |
| Dydrogesterone | Tab 10 mg | NED | เฉพาะ GYNE ต้องระบุเหตุผลการสั่งใช้ |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Estradiol valerate | Tab 1 mg | ED ข | |
| Estradiol+Drospirenone (Angeliq) | Tab (1 mg+2 mg) | NED | เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ | |
|---|-------------------|-------|----------------------------------|--|
| Estradiol+Norgestrel (Cycloprogynova) | Tab (2 mg+0.5 mg) | NED | เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| Hydroxyprogesterone caproate | Inj 250 mg/ml | ED ข | | |
| Medroxyprogesterone acetate | Tab 2.5 mg | ED ก | | |
| Norethisterone | Tab 5 mg | ED ก | | |
| Progesterone | Cap 100 mg | NED | เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| Progesterone | vag.suppo 400 mg | NED | ชำระเงินเองทุกสิทธิและเบิกไม่ได้ | |
| Tibolone | Tab 2.5 mg | NED | เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| 6.4.2 Male sex hormones and antagonists | | | | |

_

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

-

| 6.5.2 Posterior pituitary hormones and | d antagonists | | |
|--|---------------------|------|--|
| Desmopressin acetate (DDAVP) | Inj 4 mcg | ED 1 | |
| 6.6 Drugs affecting bone metabolism | | | |
| Alendronate sodium | Tab 70 mg | NED | เฉพาะ ORT,GYN,REHAB สำหรับผู้ป่วยบัตรทอง |
| | | | และประกันสังคม จ่ายแทน Fosamax plus® |
| Alendronate+Vitamin D3 (Fosamax plus) | Tab70mg+5600 IU | NED | เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Calcitonin | Nasal spray 200 IU | NED | เฉพาะ ORTHO จ่ายเดือนละไม่เกิน 2 ขวด |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Calcitonin-salmon | Inj 100 IU/ml | ED 1 | |
| Denosumab | Inj.60 mg | NED | เฉพาะ ORTHO ,GYNEและบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ibandronate sodium | Inj 3 mg/3ml | NED | เฉพาะGYNE,REHAB,ORTHOและบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ossein-hydroxyapatite (Ossopan) | Tab 200 mg | NED | เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้ |
| Pamidronate disodium | Inj 30 mg/10 ml | ED 1 | |
| Risedronate | Tab 150 mg | NED | เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 6.7. Other endocrine drugs | | | |
| 6.7.1 Bromocriptine and other dopam | inergic drugs | | |
| Bromocriptine mesilate | Tab 2.5 mg | ED ค | |
| 6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins | | | |
| Clomiphene citrate | Tab 50 mg | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |
| Chroriogonadotropin alfa | Inj.250 mcg | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |
| Folliitropin alfa | Inj.300 iu | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |
| Ganirelix | Inj. 0.25 mg/0.5 ml | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |
| Human Chorionic Gonadotropin-HCG | Inj. 5000 iu | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|--------------------------|------------|---|
| Leuprorelin acetate | Inj 3.75 mg | ED9(2 |) เฉพาะ GYNE ใช้ใน OPD เท่านั้น |
| Raloxifene hydrochloride | Tab 60 mg | NED | เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง |
| | | | |
| กลุ่มยา 7 Obst | etrics, gynaecology, and | urinar | y-tract disorders |
| 7.1 Drugs used in obstetrics | | | |
| 7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins a | ntagonists and oxytocic | S | |
| Alprostadil | Inj 0.5 mg/ml | ED 1 | |
| Carbetocin(Duratocin) | Inj.100 mcg | NED | เฉพาะGYNE |
| Iloprost trometamol | Inj 20 mcg | NED | |
| Methylergometrine maleate | Inj 0.2 mg/ml | ED ก | |
| Misoprostol | Tab 200 mcg | NED | ใช้เฉพาะผู้ป่วยในที่นอนรักษาในโรงพยาบาล |
| | | | High alert drug |
| Oxytocin | Inj 10 IU/ml | ED ก | |
| Sulprostone | Inj 500 mcg | ED 1 | |
| 7.1.2 Myometrial relaxants | | | |
| Terbutaline sulfate | Inj 0.5 mg/ml | ED ก | |
| 7.2 Treatment of vaginal and vulval o | conditions | | |
| Clotrimazole | Vaginal tab 100 mg | ED ก | |
| Gynoflor (Estriol+Lactobacillus) | Vaginal tab 0.03 mg | NED | เฉพาะ GYNE บัตรทองชำระเงินเอง |
| Nystatin | Vaginal tab 100,000 IU | ED ก | |
| 7.3 Contraceptives | | | |
| Ethinylestradiol + Levonorgestrel | Tab 30+150 mcg | ED ก | |
| (Oral contraceptive low dose) | | | |
| Desogestrel | Tab 75 mcg | NED | เฉพาะ GYNE จ่ายเงินเองทุกสิทธิ์ |
| Ethinylestradiol+ Norgestrel | Tab 50+500 mcg | NED | |
| (Oral contraceptive high dose) | | | |
| Etonogestrel(Implanon) | Implant 68 mg | ED ก | |
| Medroxyprogesterone acetate | Inj 150 mg/3 ml | ED ก | |
| 7.4 Drugs for genito-urinary disorders | | | |
| 7.4.1 Drugs for benign prostatic hyper | plasia | | |
| Alfuzosin hydrochloride | SR tab 10 mg | ED ค | เฉพาะ URO |
| Doxazosin mesilate | Tab 2 mg | ED ค | |
| Doxazosin mesilate | SR tab 4 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Dutasteride | Cap 0.5 mg | NED | เฉพาะ URO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 7.4.2 Drugs for urinary frequency, enu | uresis, and incontinence | | |
| Oxybutynin hydrochloride | Tab 5 mg | ED ค | เฉพาะ NEURO, REHAB, GYNE |
| Tolterodine tartrate | | | |
| | SR cap 2 mg | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Trospium chloride | SR cap 2 mg Tab 30 mg | NED NED | บัตรทองชำระเงินเอง เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|----------------|----------|-------------------|
| Potassium citrate + Citric acid | Sol 240 ml | ตำรับรพ. | |
| (Potcit sol)1 ml:K ⁺ 1 mEq, HCO ₃ 2 mEq | | | |
| Sodium citrate + Citric acid | Sol 240 ml | ตำรับรพ. | |
| (Shohl sol) (1 ml:Na ⁺ 1 mEq, HCO ₃ 2 mEq |) | | |

| กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression | | | | |
|---|------------------|------|---|--|
| 8.1 Cytotoxic drugs | | | | |
| 8.1.1 Alkylating drugs | | | | |
| Cyclophosphamide | Tab 50 mg | ED ค | | |
| Cyclophosphamide | Inj 200 mg | ED ค | | |
| 8.1.2 Cytotoxic antibiotics | | | | |
| Dactinomycin | Inj 0.5 mg/3 ml | ED ค | | |
| Doxorubicin | Inj. 50 mg/25 ml | ED A | ไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ ผู้ป่วยที่มีcardiomyopathyที่มีleft ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50% | |
| Mitomycin | Inj. 2 mg | ED 1 | | |
| 8.1.3 Antimetabolites | | | | |
| Methotrexate | Tab 2.5 mg | ED ค | High alert drug | |
| Methotrexate | Inj.50 mg/2ml | ED ค | High alert drug | |
| Fluorouracil | Inj 250 mg/5 ml | ED ค | | |
| 8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide | | | | |

8.1.5 Other antineoplastic drugs Hydroxycarbamide (Hydroxyurea) Cap 500 mg ED ค เฉพาะ MED **Imatinib** Tab 100 mg ED $\mathfrak{q}(2)$ 8.2 Drugs affecting the immune response ED ค Azathioprine Tab 50 mg เฉพาะ URO มี case จึงจะจัดซื้อ Bacillus Calmette-Guérin (BCG) freeze-dried pwdr for ED 1 bladder instillation Ciclosporin(Cyclosporin) Cap 25 mg ED ค เฉพาะ MED Dexamethasone sodium phosphate Inj 5 mg/ml ED ก EDจ(2) เฉพาะ NEURO, PED ต้องได้รับการอนุมัติ Human normal immunoglobulin, Inj 5 g 100 ml intravenous (IVIG) จากกองทุนบัญชี จ2 Methylprednisolone sodium succinate Inj 2 g ED ค Mycophenolate mofetil Cap 250 mg ED 1 เฉพาะ NEPHRO Prednisolone Tab 5 mg ED ก

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 8.3.1 Progestogens, anti-estrog | ens and enzyme inhibitors | | |
| Tamoxifen | Tab 20 mg | ED ค | ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม |
| Letrozole | Tab 2.5 mg | NED | ขอใช้สำหรับovulation |
| 8.3.2 Prostate cancer | | | |

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

-

| Darbepoetin alpha | Inj. 40 mg | NED | เฉพาะ NEPHRO และสิทธิเบิกได้ |
|---|------------------------|---------|--|
| Deferiprone (GPO-L-One) | Tab 500 mg | ED 1 | |
| Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex | Inj 3000 IU | EDจ(2) | เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิ์เบิกได้) |
| Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hemax | Inj 4000 IU | EDจ(2) | เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และ ผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิ์ประกันสังคม) |
| Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hypercrit | Inj 4000 IU | ED9(2) | เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (ใช้ได้กับ ทุกสิทธิ์ ยกเว้นสิทธิ์ประกันสังคม) |
| Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex | Inj 5000 IU | EDจ(2) | เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD(สิทธิ์เบิกได้) |
| Folic acid | Tab 5 mg | ED ก | |
| Iron sucrose complex (Fe-back) | Inj 100 mg/5 ml | ED ค | เฉพาะ MED |
| 9.1.3 Drugs used in bone marrow tran | splantation | | |
| Filgrastim | Inj 300 mcg | ED 1 | เฉพาะ MED |
| 9.2 Fluids and electrolytes | | | |
| Calcium polystyrene sulfonate | Oral pwdr 5 g | ED ข | |
| D-5-W | Inj 100ml, 500ml, 1000 |)m ED ก | |
| D-5-W | Inj 200 ml | ตำรับรเ | N. |
| D-7.5-W | Inj 100 ml | ตำรับรเ | N. |
| D-10-W | Inj 100 ml | ตำรับรเ | N. |
| D-12.5-W | Inj 100 ml | ตำรับรเ | N. |
| D-50-W (Glucose) | Inj 50% 50 ml | ED n | |
| D-50-W | Inj 500 ml | ED ก | |
| D-5-S | Inj 1000 ml | ED ก | |
| D-5-S/2 | Inj 500 ml, 1000 ml | ED ก | |
| D-5-S/3 | Inj 500 ml | ตำรับรเ | N. |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---|
| D-5-S/3 | Inj 1000 ml | ED ก | |
| D-5-S/4 | Inj 500 ml | ตำรับร | W. |
| D-5-S/5 | Inj 100 ml, 500 ml | ตำรับร | w. |
| D-7.5-S/5 | Inj 100 ml | ตำรับร | w. |
| D-10-S | Inj 1000 ml | ED ก | |
| D-10-S/2 | Inj 1000 ml | ตำรับร | w. |
| D-10-S/3 | Inj 500 ml | ตำรับร | w. |
| D-10-S/4 | Inj 500 ml | ตำรับร | w. |
| D-10-S/5 | Inj 100 ml, 500 ml | ตำรับร | w. |
| D-12.5-S/5 | Inj 100 ml | ตำรับร | w. |
| Haemodialysis A K2 Calcium 3.5 g | Sol 5 L | ED ก | |
| Haemodialysis A K3 Calcium 3.5 g | Sol 5 L | ED ก | |
| Haemodialysis A Low Calcium 2.5 g | Sol 5 L | ED ก | |
| Haemodialysis B | Sol 5 L | ED ก | |
| Magnesium chloride solution | Sol 10% 30 ml, 120 ml | ตำรับร | w. |
| Magnesium chloride solution | Sol 45% 60 ml | ตำรับร | w. |
| Icodextrin(Extraneal HCL) | 7.5%,5 L | ED ค | น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD |
| Peritoneal dialysis + Dextrose | 1.5% 2 L | ED ค | น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD |
| Peritoneal dialysis + Dextrose | 4.25% 2 L | ED ค | น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD |
| Peritoneal dialysis + Dextrose | 1.5% 5 L | ED ค | น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD |
| Peritoneal dialysis + Dextrose | 2.5% 5 L | ED ค | น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD |
| Potassium chloride (KCl) | Tab 500 mg (6.7mEq) | ED ก | |
| Potassium chloride (KCl) | Elixir 20mEq/15ml | ตำรับรพ | . High alert drug |
| | 30ml, 240 ml | | |
| Potassium chloride (KCl) | Inj 1.5 g/10 ml (20 mEq) | ED ก | High alert drug |
| Sodium acetate (ใช้เตรียม TPN) | Inj 24.6% 50 ml | ตำรับร | W. |
| Sodium bicarbonate | Tab 300 mg | ED ก | |
| Sodium bicarbonate | Inj 7.5% 10 ml, 50 ml | ED ก | |
| Sodium chloride | Tab 300 mg | ED ก | |
| Sodium chloride solution (NSS) | Inj 0.9% 5 ml (หยอดจมูก) |) ED ก | เฉพาะ PED และจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 4 หลอด |
| Sodium chloride solution (NSS) | Inj 0.9% 100 ml, 500ml, | 1ED ก | |
| Sodium chloride solution (NSS) | Irrigation 100 ml (ขวดแก้ว |) ตำรับร | W. |
| Sodium chloride solution (NSS) | Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก) | ED ก | |
| Sodium chloride solution (NSS/2) | Inj 0.45% 1000ml | ตำรับร | W. |
| Sodium chloride solution (3%NaCl) | Inj 3% 500 ml | ตำรับร | W. |
| Sodium lactate intravenous infusion | Inj 1000 ml | ED ก | |
| compound (Ringer's lactate) | | | |
| Sterile water for injection | Inj 10 ml, 100 ml, 1000 i | r ED ก | |
| Sterile water for irrigation | Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก) | ED ก | |

| Sterile water for irrigation Irrigation500ml,1L(ขวดแก้ว) ต่ำรับรพ. Dextran 40 in Sodium chloride with dextrose Inj 10%+0.9% 500 ml NED Human albumin Inj 20% 50 ml NED บัตรทองชำระเงินเอง Hydroxyethyl starch (130/0.4) 6% 500 ml NED Ringer's acetate solution Inj 1000 ml NED 9.3 Vitamins Calcitriol Cap 0.25 mcg ED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
|--|
| Human albuminInj 20% 50 mlNEDบัตรทองชำระเงินเองHydroxyethyl starch(130/0.4) 6% 500 mlNEDRinger's acetate solutionInj 1000 mlNED9.3 VitaminsCalcitriolCap 0.25 mcgED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Hydroxyethyl starch (130/0.4) 6% 500 ml NED Ringer's acetate solution Inj 1000 ml NED 9.3 Vitamins Calcitriol Cap 0.25 mcg ED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ringer's acetate solution Inj 1000 ml NED 9.3 Vitamins Calcitriol Cap 0.25 mcg ED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 9.3 VitaminsCalcitriolCap 0.25 mcgED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Calcitriol Cap 0.25 mcg ED ค เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKD, parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| parathyroidism และบัตรทองชำระเงินเอง |
| |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Calfermin-C Tab NED สิทธิ์เบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| Folic acid Tab 5 mg ED ก |
| Multivitamins Tab ED ก |
| Multivitamins Syr 60 ml ED ก |
| Multivitamins Drop 15 ml ED ก |
| Vitamin A Cap 25,000 IU ED ก |
| Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) Tab 100 mg ED ก |
| Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) Inj 100 mg/ml ED ก |
| Vitamin B2 Tab 25 mg ED ก |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) Tab 50 mg ED ก |
| Vitamin B complex Tab ED ก |
| Vitamin B complex Inj 1 ml ED ข |
| Vitamin C Tab 100 mg ED ก |
| Vitamin C Inj 500 mg/2 ml ED ข |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) Cap 20000 U ED ก |
| Vitamin E Oral sol 50 IU/ml 15 ml ED ค |
| Vitamin E Cap 100 U NED สิทธิ์เบิกคลังและบัตรทอง ต้องชำระเงินเอง |
| ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| Vitamin K1 (Phytomenadione) Inj 1 mg/0.5 ml ED ก |
| Vitamin K1 (Phytomenadione) Inj 10 mg/1 ml ED ก |
| Vitamin B1-6-12 Tab NED สิทธิ์เบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| 9.4 Intravenous nutrition |
| Amino acid solution for infant |
| Amino acid solution Inj 10% 500 ml ED ค |
| Amino acid solution ชนิด high branched Inj 200 ml ED ค |
| chain amino acid (Kidmin) |
| Complete water-soluble and fat-soluble _{Inj} ED ค |
| vitamins preparation (OMVI) |
| Fat emulsion (Lipid emulsion) Emulsion 20% 250 ml ED ค |
| Fat emulsion20% (SMOFlipid) Inj.250 ml ED ค เฉพาะNICU |
| Multiple trace minerals solution Inj 10 ml ED ค |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|
| (เด็ก - Peditrace) | | | |
| Multiple trace minerals solution | Inj 10 ml | ED ค | |
| (ผู้ใหญ่ - Addamel N) | | | |
| Glucose+amino acid+nitrogen+lipid | Infusion,1440 ml | ED 1 | |
| (Kabiven 1000 KCAL) | | | |
| 9.5 Minerals | | | |
| Aluminium hydroxide | Tab 500 mg | ED ข | |
| Calcium carbonate | Tab 1.5 g (600 mg Ca) | ED ก | |
| Calcium gluconate | Inj 10% 100 mg/ml 10 m | าED ก | High alert drug |
| Dipotassium hydrogen phosphate | Inj 20 ml | ED ค | |
| Ferrous sulfate | Tab 200 mg (60 mg Fe) | ED ก | |
| Ferrous sulfate | Drop15mgFe/0.6ml 15m | IED ก | |
| Ferrous fumarate | oral sol.76mg/5ml,60ml | ED ข | |
| Magnesium hydroxide (Milk of magnesia) | Susp 60 ml | ตำรับร | W. |
| Magnesium sulfate | Inj 10% 10 ml | ED ก | High alert drug |
| Magnesium sulfate | Inj 50% 2 ml | ED ก | High alert drug |
| Sodium fluoride | Tab 0.55 mg | ED ก | |
| Zinc sulfate (Zinc sulphate heptahydrate) | tab25 mg | ED ค | |
| 9.6 Vitamins and minerals for pregnan | ncy and lactating mothe | rs | |
| Ferrous sulfate | Tab 200 mg (60 mg Fe) | ED ก | |
| Folic acid | Tab 5 mg | ED ก | |
| Ferrous salt + Folic acid + potassium | 60 mg Iron + 400 mg | ED ก | |
| iodide (Triferdine) | + 150 mcg iodine | | |
| Sevelamer carbonate | Tab 800 mg | NED | เฉพาะ NEPHRO, MED และผู้ป่วยเบิกได้ |
| 9.7 Metabolic disorders | | | |
| Penicillamine (D-penicillamine) | Cap 250 mg | ED A | |

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases 10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout 10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC Tab 300 mg ED ก เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง Celecoxib Cap 200 mg NED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ Diclofenac sodium ED ก EC Tab 25 mg Diclofenac sodium Inj 75 mg/3 ml ED ก Etoricoxib Tab 90 mg เฉพาะ ORTHO,GYNE ,ANAS NED และบัตรทองชำระเงินเอง (ไม่เกิน30เม็ด/ครั้ง) ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---------|--|
| Ibuprofen | Tab 200 mg, 400 mg | ED ก | |
| Ibuprofen | Susp 100 mg/5 ml 60 n | าl ED ก | |
| Indomethacin | Cap 25 mg | ED ก | |
| Indomethacin | Spray 50 ml | NED | เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 ขวด/เดือน |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ketoprofen | Gel 2.5% 30 g | NED | เฉพาะ ORTHO และบัตรทองชำระเงินเอง |
| Ketololac | Inj.30 mg | NED | เฉพาะ ศัลยกรรม ,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, |
| | | | ORTHO,ANAS และเฉพาะสิทธิเบิกได้ |
| Mefenamic acid | Cap 250 mg | NED | |
| Meloxicam | Tab 7.5 mg, 15 mg | NED | เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง |
| Naproxen | Tab 250 mg | ED ก | |
| Parecoxib | Inj 40 mg/2 ml | NED | เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้ |
| 10.1.2 Disease-modifying antirheumat | cic drugs (DMARDs) | | |
| Azathioprine | Tab 50 mg | ED ค | |
| Chloroquine phosphate | Tab 250 mg | ED ข | |
| Ciclosporin(Cyclosporin) | Cap 25 mg | ED 1 | เฉพาะ MED |
| Hydroxychloroquine sulfate | Tab 200 mg | ED ข | เฉพาะ MED,ORTHO |
| Methotrexate | Tab 2.5 mg | ED ค | High alert drug |
| | Inj.50 mg/2ml | ED ค | High alert drug |
| Penicillamine (D-penicillamine) | Cap 250 mg | ED ค | |
| Sulfasalazine | Tab 500 mg | ED ค | |
| 10.1.3 Drugs for treatment of gout an | d hyperuricaemia | | |
| Allopurinol | Tab 100 mg | ED ก | |
| Colchicine | Tab 0.6 mg | ED ก | |
| Potassium sodium hydrogen citrate (Uralyt-U |) Powder 280 g | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Sulfinpyrazone | Tab 100 mg | NED | เฉพาะกรณีแพ้ยา allopurinol |
| | | | และบัตรทองชำระเงินเอง |
| 10.2 Drugs used in neuromuscular dis | orders | | |
| 10.2.1 Drugs which enhance neuromu | scular transmission | | |
| Neostigmine methylsulfate | Inj 12.5 mg/5 ml | ED ข | |
| Pyridostigmine bromide | Tab 60 mg | ED ก | |
| 10.2.2 Skeletal muscle relaxants | | | |
| Baclofen | Tab 10 mg | ED ข | |
| Eperisone | Tab 50 mg | NED | เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้ |
| Diazepam | Tab 2 mg, 5 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Diazepam | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) | Tab 450+35 mg | NED | สั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 30 เม็ด |
| Tolperisone hydrochloride | Tab 50 mg | NED | |
| 10.3 Drugs for relief of soft-tissue infl | ammation | | |

| ٠ ظ | | ୍ଧ ପ୍ | d . y |
|--|---|-------------|--------------------------------|
| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
| - | | | |
| 10.4 Miscellaneous | C 50 | NED | ODT 10 3. 3. 3 4 2 |
| Diacerein | Cap 50 mg | NED | เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้ |
| Sodium hyaluronate | Inj. 20 mg/2 ml | NED | เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้ |
| | . J 44 = | | |
| | กลุ่มยา 11 Eye | | |
| 11.1 Anti-infective eye preparations | | | |
| 11.1.1 Antibacterials and eye wash so | | NED | .w |
| Azithromycin | Eye drop 15% | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Cefazolin | Forte eye drop 50mg/ml 10ml | | W. |
| Chloramphenicol | Eye ointment 1% 5 g | ED ก | |
| Ciclosporin(Cyclosporin) | Eye drop 5 mg/ml 5 ml | | W. |
| Fusidic acid | Viscous eye drop 1% 5 g | g ED 1 | |
| Gentamicin sulfate | Forte eye drop 14mg/ml 10ml | ตำรับร | W. |
| Moxifloxacin | Eye drop 0.5% 5 ml | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Oxytetracycline hydrochloride | Eye ointment 3.5 g | NED | |
| +polymyxin B sulfate (Terramycin) | | | |
| Polymyxin B sulfate+Neomycin sulfate | Eye drop 5 ml | ED ค | |
| +Gramicidin (Poly oph) | | | |
| Vancomycin | Eye drop 50mg/ml 5 ml | ตำรับร | W. |
| 11.1.2 Antibacterials with corticostero | oids | | |
| Dexamethasone sodium phosphate | Eye drop 4 ml | ED ค | |
| +Neomycin sulfate (Dex-oph) | | | |
| Dexamethasone+Neomycin sulfate | Eye ointment 3.5 g | ED ค | |
| +polymyxin B sulfate (Maxitrol) | | | |
| 11.1.3 Antifungals | | | |
| Amphotericin B | Eye drop 10 mg | ตำรับร | w. |
| Fluconazole | Eye drop 2 mg/ml 3 ml | ตำรับรพ. | เฉพาะEYE |
| Natamycin | Eye drop 5% 15 ml | ED 1 | เฉพาะ EYE มี case จึงจะจัดซื้อ |
| 11.1.4 Antivirals | | | |
| Aciclovir (Acyclovir) | Eye ointment 3% 4.5 g | ED ค | |
| 11.2 Corticosteroids and other anti-in | flammatory preparation | S | |
| Antazoline HCl+Tetrahydrozoline HCl | Eye drop 10 ml | ED ก | |
| (Hista-oph) | | | |
| | | | v 0 6 |
| Epinastine hydrochloride | Eye drop 0.05% 5 ml | NED | เฉพาะEYE ,บัตรทองชำระเงินเอง |
| Epinastine hydrochloride Fluorometholone | Eye drop 0.05% 5 ml Eye susp 0.1% 5 ml | NED ED ค | เฉพาะEYE ,บัตรทองชาระเง่นเอง |
| • | • | ED ค | |
| Fluorometholone | Eye susp 0.1% 5 ml | ED ค | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|---------------------------|--------|---|
| Atropine sulfate | Eye drop 1% 5 ml | ED ค | |
| Phenylephrine hydrochloride | Eye drop 10% 5 ml | ED ค | |
| Tropicamide | Eye drop 1% 15 ml | ED ค | ใช้เฉพาะใน รพ. ไม่จ่ายให้ผู้ป่วยกลับบ้าน |
| 11.4 Drugs for treatment of glaucoma | | | |
| Acetazolamide | Tab 250 mg | ED ก | |
| Betaxolol hydrochloride | Eye drop 2.5 mg/ml 5 m | ED ค | |
| Bimatoprost | Eye drop 0.01% | NED | |
| Brimonidine tartrate | Eye drop 0.15% 5 ml | NED | |
| Brinzolamide | Eye drop 1% 5 ml | ED ค | |
| Dorzolamide + Timolol (Cosopt) | Eye drop 2%+0.5% 5 ml | NED | เฉพาะ EYE, บัตรทองชำระเงินเอง |
| Glycerol | Oral sol 50% | ตำรับร | W. |
| Pilocarpine hydrochloride | Eye drop 2% 15 ml | ED ก | |
| Timolol maleate | Eye drop 0.5% 5 ml | ED ก | |
| Tafluprost | Eye drop 0.0015% | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 11.5 Local anaesthetics | | | |
| Tetracaine hydrochloride | Eye drop 0.5% 15 ml | ED ก | ใช้เฉพาะห้องผ่าตัด |
| 11.6 Tear deficiency, ocular lubricants | and astringents | | |
| Carbomer with preservative (Vidisic) | Eye gel 10 g | ED ข | |
| Hydroxypropyl methylcellulose | Eye drop 0.5% 10 ml | ED ก | |
| with preservative (Lac-oph) | | | |
| Hydroxypropyl methylcellulose+Dextran70 | Eye drop 0.3%+0.1% 0.8 ml | ED 1 | |
| preservative free (Tear naturale free) | | | |
| Hypromellose with preservative (Natear) | Eye drop 0.3% 10 ml | ED ก | |
| Sodium hyaluronate (Vislube) | Eye drop 0.18% 0.3 ml | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| 11.7 Ocular diagnostic and peri-operat | tive preparations and pl | notody | ynamic treatment |
| Balance salt | Sol for eye irrigate 500m | ED ค | |
| Bevacizumab | Inj.25 mg/ml | ED จ(2 | 2 1.ใช้สำหรับage-related macular degeneration |
| | | | 2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema |
| Carbachol | Intraocular use 0.01% | ED ค | ใช้ใน OR เท่านั้น |
| Ketorolac | Eye drop0.5% | NED | บัตรทองชำระเงินเอง |
| Ranibizumab | Inj 10 mg/0.23 ml | NED | เฉพาะสิทธิเบิกได้ |
| 11.8 Other | | | |
| Sodium chloride | Eye drop 3% 10 ml | ตำรับร | w. |
| Sterile Trypan blue in BSS | Sol 0.1% 1 ml | ตำรับร | W. |
| | (Cataract surgery) | | |
| | | | |

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Dexamethasone + Framycetin sulfate | Ear drop 8 ml | ED ค | | |
| + Gramicidin (Sofradex) | | | | |
| 12.1.2 Drugs used in otomycosis | | | | |
| Boric acid | Ear drop 3% in alcohol | ตำรับร | W. | |
| 12.1.3 Other drugs acting on the ear | | | | |
| Borax in glycerin (Glycerin borax) | Sol 10 ml | ตำรับร | W. | |
| Ofloxacin | Ear drop 3% 5 ml | ED ค | | |
| 12.2 Drugs acting on the nose | | | | |
| 12.2.1 Drugs used in nasal allergy | | | | |
| Budesonide | Nasal spray 64 mcg/dose | e ED ข | | |
| Fluticasone furoate | Nasal spray 27.5 mcg/do | ٤ED ٩ | เฉพาะ MED, PED, ENT | |
| Dexpanthenol in seawater (Mar plus) | Nasal spray 140 puff | NED | เฉพาะ PED, ENT และบัตรทองชำระเงินเอง | |
| 12.2.2 Topical nasal decongestants | | | | |
| Ephedrine hydrochloride | Nasal drop 0.25%, 1% | ตำรับรพ. | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | |
| Sodium chloride | Sterile sol for irrigation 0.9% | ED ก | | |
| 12.3 Drugs acting on the oropharynx a | nd oral cavity | | | |
| 12.3.1 Drugs used in treatment of oral | ulcer | | | |
| Borax in glycerin (Glycerin borax) | Sol 10 ml | ตำรับร | W. | |
| Chlorhexidine gluconate | Mouthwash 0.2% 240 m | IED ก | | |
| Triamcinolone acetonide | Oral paste 1 g | EDก | | |
| 12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs | | | | |
| Nystatin | Susp 100,000 U/ml 12 m | าED ก | | |
| 12.3.3 Antiseptics for root canal treatr | nent | | | |
| Chlorhexidine gluconate (ทันตกรรม) | Sol 2% 240 ml | ตำรับร | w. | |
| EDTA | Sol 17% 200 ml | ED ก | | |
| Sodium hypochlorite (ทันตกรรม) | Sol 2.5% 240 ml | ตำรับร | W. | |
| 12.3.4 Drugs used in prevention and to | reatment of dental plac | que an | d caries | |
| Chlorhexidine gluconate | Mouthwash 0.2% 240 m | l ตำรับร _ั | W. | |
| Sodium fluoride | Tab 0.55 mg | ED ก | | |
| Sodium fluoride | Mouthwash 240 ml | ตำรับร | W. | |
| 12.3.5 Other dental preparations | | | | |
| Epinephrine (Adrenaline) | Inj 1 mg/ml | ED ก | High alert drug | |
| Special mouthwash (Chloroxylenol) | Mouthwash 240 ml | ตำรับร | W. | |
| | | | | |
| | กลุ่มยา 13 Skin | | | |
| 13.1 Anti-infective skin preparations | | | | |
| 13.1.1 Antibacterial preparations | | | | |
| Mupirocin | Ointment 2% 5 g | ED ข | | |

Cream 1% 25 g, 500 g

ED ก

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี เงื่อนไข/หมายเหตุ | | |
|---|--|---|--|--|
| 13.1.2 Antifungal preparations | | | | |
| Clotrimazole | Cream 1% | ED ก | | |
| Ketoconazole | Cream 2% 5 g | ED ก | | |
| Sodium thiosulfate | Sol 20% (12 g/60 ml) | ตำรับรพ. | | |
| 13.1.3 Parasiticidal preparations | | | | |
| Benzyl benzoate | Emulsion 25% 60 ml | ED ก | | |
| 13.2 Emollient and barrier preparation | ns | | | |
| Aluminium acetate (Burrow's solution) | Sol 60 ml | ตำรับรพ. | | |
| Cold cream | Cream | ตำรับรพ. | | |
| Olive oil | Oil | ED ก | | |
| Urea | Cream 10% | ตำรับรพ. | | |
| Urea in Triamcinolone acetonide | Cream 10% in 0.1% | ตำรับรพ. | | |
| Vaseline | Paste | ตำรับรพ. | | |
| Zinc oxide | 7.5%Paste | ตำรับรพ. | | |
| 13.3 Topical antipruritics | | | | |
| Calamine | Lotion 60 ml | ตำรับรพ. | | |
| 13.4 Topical corticosteroids | | | | |
| Betamethasone valerate | Cream 0.1% | ED ก | | |
| Clobetasol propionate | Cream 0.05% | ED ก | | |
| Hydrocortisone acetate | Cream 1% 5 g | ED ก | | |
| Mometasone furoate | Cream 0.1% 5 g | ED 1 | | |
| Salicylic acid in Triamcinolone acetonide | e Cream 5%, 20% in 0.04 | % ตำรับรพ. | | |
| Triamcinolone acetonide | Cream 0.02%, 0.1% | ED ก | | |
| Triamcinolone acetonide | Lotion 0.1% 120 ml | ตำรับรพ. | | |
| Urea in Triamcinolone acetonide | Cream 10% in 0.1% | ตำรับรพ. | | |
| 13.5 Other preparations for psoriasis | (excluding topical cortic | osteroids) | | |
| Liquid Coal tar (LCD) | Cream 5% | ตำรับรพ. | | |
| Methotrexate | Tab 2.5 mg | ED ข High alert drug | | |
| Ciclosporin(Cyclosporin) | Cap 25 mg | EDง เฉพาะ MED | | |
| | | 1.ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่ | | |
| | | ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามใช้methotrexate | | |
| | | 2.ใช้สำหรับatopic dermatitisชนิดรุนแรง | | |
| 13.6 Preparations for warts and callu | ses | | | |
| Podophyllin (Podophyllum resin) | Paint 25% 5 ml | ตำรับรพ. | | |
| Salicylic acid | Cream 5%, 10%, 20% | ตำรับรพ. | | |
| Salicylic acid in Triamcinolone acetonide | cetonide Cream 5%, 20% in 0.04% ตำรับรพ. | | | |
| Trichloroacetic acid | Sol 10%, 30% 60 ml | ตำรับรพ. | | |
| 13.7 Other dermatologic drugs | | | | |
| Tar shampoo | Shampoo 120 ml | ตำรับรพ. ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|---|--------------------|-------|---------------------------------|
| Neomycin+Nystatin+Gramicidin+TA(Kenacomb) | Cream 15 g | NED | |
| Selenium sulfide | Shampoo 2.5% 60 ml | NED | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ |

| กลุ่มยา 1 | 4 Immunological produ | cts and | d vaccines |
|---|-------------------------|---------|--|
| Anti-D immunoglobulin, (human) | Inj 300 mcg/2 ml (Igama | (ED ก | |
| BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin) | Inj 0.5 mg/ml | ED ก | |
| Diphtheria antitoxin (DAT) | Inj 10000 IU/10 ml | ED ก | |
| Diphtheria-Tetanus vaccine ชนิด dT | Inj 0.5 ml, 5 ml | ED ก | |
| (adult type) | | | |
| Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine | lnj | ED ก | |
| (whole cell) (DTPw) | | | |
| Diphtheria-Tetanus-Pertussis+Hepatitis B | lnj | ED ก | |
| vaccine (DTP-HB) | | | |
| Hepatitis B vaccine (HB) | lnj | ED ก | ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby |
| Hepatitis B immunoglobulin,human(HBIG) | Inj 400 IU/2 ml | ED ค | |
| Inactivated polio vaccine (IPV) | lnj | ED จ(1 | .) |
| Poliomyelitis vaccine,live attenuated(OPV) | Oral sol | ED ก | |
| ชนิด bivalent | | | |
| Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ | lnj | ED ก | เงื่อนไข อายุ > 65 ปี, โรคเรื้อรัง 7 โรค, |
| | | | บุคลากรที่มีความเสี่ยง |
| Japanese encephalitis vaccine (JE) | lnj | ED ก | ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby |
| (Live Attenuated JE vaccine) | | | |
| | lnj | ED ก | ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby |
| Rabies vaccine ชนิด Vero cell/ชนิด PCEC | Inj 1 dose | ED ก | |
| Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) | Inj 1000 IU/5 ml | ED ก | |
| Rabies immunoglobulin, human (HRIG) | Inj 300 IU/2 ml | ED ข | |
| Tetanus antitoxin, horse | Inj 1500 IU/ml | ED ก | |
| Tetanus antitoxin, human | Inj 250 IU | ED ข | |
| (Anti-tetanus immunoglobulin, huma | n) | | |

| กลุ่มยา 15 Anesthesia | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|--|
| 15.1 General anesthesia | | | | |
| 15.1.1 Intravenous anesthetics | | | | |
| Etomidate in Lipofundin | Inj 20 mg/10 ml | ED ค | | |
| Ketamine hydrochloride | Inj 50 mg/ml 10 ml | ED 1 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | |
| Propofol | Inj 200 mg/20 ml | ED ค | | |
| Thiopental sodium (Thiopentone sodium |) Inj 1 g | ED ค | | |
| 15.1.2 Inhalational anesthetics | | | | |
| Isoflurane | Volatile liquid 250 ml | ED ค | | |

15.2 Local anesthesia

Lidocaine + Prilocaine

Bupivacaine hydrochloride

Bupivacaine hydrochloride

Bupivacaine hydrochloride

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ | |
|--|------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| Sevoflurane | Volatile liquid 250 ml | ED ค | | |
| 15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscu | lar blocking drugs) | | | |
| Cisatracurium besilate | Inj 10 mg/5 ml | ED ค | | |
| Rocuronium bromide | Inj 50 mg/5 ml | ED ค | | |
| Suxamethonium chloride (Succinylcholine Cl |) Inj 500 mg/5 ml | ED ค | | |
| 15.1.4 Sedative and analgesic peri-op | erative drugs | | | |
| Diazepam | Tab 2 mg, 5 mg | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Diazepam | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | |
| Fentanyl citrate | Inj 100 mcg/2 ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | |
| Midazolam hydrochloride | Inj 5 mg/ml | ED 1 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | |
| Midazolam maleate | Tab 15 mg | ED 1 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | |
| Morphine sulfate | Inj 10 mg/ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | |
| Pethidine hydrochloride | Inj 50 mg/ml | ED ค | ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | |
| 15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia | | | | |
| Atropine sulfate | Inj 0.6 mg/ml | ED ก | | |
| Neostigmine methylsulfate | Inj 12.5 mg/5 ml | ED ก | | |
| 15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia | | | | |

| Lidocaine hydrochloride | Inj 1% 20 ml | ED ก |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| Lidocaine hydrochloride | Inj 1% 50 ml | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride | Inj 2% 20 ml | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride | Inj 2% 50 ml | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride | Jelly 2% 30 g | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride | Spray 10% 50 ml | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride | Viscous sol 1% | ตำรับรพ. |
| Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | Dental catridge 2% 1:100,000 | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | Inj 1% 1:100,000 50 ml | ED ก |
| Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | Inj 2% 1:80,000 50 ml | ED ก |

Cream 25+25 mg 30 g ED ก

Inj 0.5% spinal heavy 4m ED ค

Inj 0.5% spinal isobaric 4ml ED ค

ED ข

Inj 0.5% 20 ml

| กลุ่มยา 16 Antidotes | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------|--|
| Acetylcysteine (N-acetylcysteine) | Inj 300 mg/3 ml | ED ก | ใช้แก้พิษที่เกิดจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด |
| Antivenom sera เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ | Pwdr for Inj | ED ก | |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|---|-----------------|---|
| เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ | Pwdr for Inj | ED ก | |
| เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา | Pwdr for Inj | ED ก | |
| เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา | Pwdr for Inj | ED ก | |
| เซรุ่มแก้พิษงูเห่า | Pwdr for Inj | ED ก | |
| Polyvalent antivenom for hematotoxin | | | |
| เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต | Pwdr for Inj | ED ก | ใช้แก้พิษต่อระบบเลือด |
| (งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา) | | | ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด |
| Polyvalent antivenom for neurotoxin | | | |
| เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท | Pwdr for Inj | ED ก | |
| (งูจงอาง งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม งูเ | ห่า) | | ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด |
| Atropine sulfate | Inj 0.6 mg/ml | ED ก | |
| ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เข | ช่น organophosphates, ca | rbamate | es) และภาวะ cholinergic crisis |
| Benzatropine mesilate(Benztropine mesylate) ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา |) Inj 2 mg/2 ml | ED ก | เฉพาะ MED, PSY, PED |
| Calcium gluconate ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก hydrofluoric acid <u>หมายเหตุ</u> ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ การ | | ckers | High alert drug |
| Charcoal, activated | Pwdr 50 g | ตำรับร | ง ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป |
| Cyclophosphamide ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การ | Inj 200 mg กำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา | ED A | |
| Diazepam ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยาหรือสารพิษ | Inj 10 mg/2 ml | ED ก | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| Fuller's earth ใช้ดูดซับสาร paraquat | Susp 15% | ตำรับร | W. |
| Methylene blue (Methylthioninium Cl) ใช้บำบัด methemoglobinaemia คำเตือนและข้อควรระวัง ควรใช้อย่างระมัด | - | ED ง นของไตเ | บกพร่องขั้นรุนแรง และในผู้ป่วยขาดเอนไซม์ G6PC |
| | | | |
| Macrogols (PEG 4000) with electrolytes (Colyte) | Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร) | ตำรับร | W. |

| ชื่อยา | รูปแบบ/ความแรง | บัญชี | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
|--|--|-------------|---|
| Naloxone hydrochloride | Inj 400 mcg/ml | ED ก | |
| 1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids | และ clonidine | | |
| 2. ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสา | เหตุ | | |
| Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate | Inj 4 mg/4 ml | ED 1 | |
| ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เ | ช่น ยากลุ่ม beta-blockers | , calcium | า channel blockers และ theophylline เป็นต้น |
| · | Cap 250 mg | ED ค | |
| 1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ | - · | | |
| <u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> ระวังการใช้กับหถุ | ู้งตั้งครรภ์เพราะเป็นสารก่อ ^ว | วิรูป terat | togen |
| Phenobarbital sodium (Phenobarbitone Na) | Inj 200 mg/4 ml | ED 4 | วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 |
| ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา | | | |
| Pralidoxime chloride (2-PAM) | Inj 1 g | ED ก | |
| ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphate | S | | |
| Protamine sulfate | Inj 50 mg/5 ml | ED ค | |
| ใช้ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติจากการ | ได้รับ heparin เกินขนาด | | |
| Sodium bicarbonate | Inj 7.5% 50 ml (44.6mE | Eq ED ก | |
| 1. ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษท์ | ี่เกิดจากสาร tricyclic anti | depressa | nts, antiarrhythmics type I |
| 2. ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นด่าง เพื่อเร่งการกำ | าจัดสารพิษ เช่น salicylate: | s, metfor | min, phenformin เป็นต้น |
| Sodium nitrite | Inj 30 mg/ml 10 ml | ED ค | |
| ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัล | ไฟด์ | | |
| <u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> การใช้ยาปริมาณม | มากเกินไป อาจทำให้เกิดภา | ລະ cardio | vascular collapse, methaemoglobinaemia |
| และอาจถึงตายได้ | | | |
| Sodium thiosulfate | Inj 250 mg/ml 18 ml | ED ค | |
| ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์ | | | |
| Vitamin K1 (Phytomenadione) | Inj 10 mg/ml | ED ก | |
| ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants (cour | marin derivatives) | | |
| | | | |

กลุ่มยา 17 Contrast media and radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast media, iodinated

17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

17.1.2 Drugs used in angiography

ชื่อยา รูปแบบ/ความแรง บัญชี เงื่อนไข/หมายเหตุ

17.1.3 Drugs used in myelography

-

17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization

Iobitridol (Xenetix)

Inj 300 mgl/ml 50 ml

NED

17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Urethrography, Voiding cysto-urethrography

_

17.2 X-ray contrast media, non-iodinated

Barium sulfate

Pwdr

ED ก

Acetylcysteine

Effervescent tab600 mg NED

เฉพาะCHEST, MED จ่ายครั้งละไม่เกิน 6เม็ด

เฉพาะก่อน-หลังทำ CT

17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)

-

17.4 Radiopharmaceuticals

-

| กลุ่ม 18 อาหารทางการแพทย์ | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| Complete balanced nutrition peptide | Powder 430 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| formula (Peptamen) | | | | |
| Enfalac premature formula | Powder 400 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Enfalac A+ prosobee | Powder 366 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Hi-Q LACTOSE Free | Powder 400 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Hi-Q soy PrebioProteq | Powder 400 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Medium chain triglyceride oil | 60 ml | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Nutramigen | Powder 400 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| Nutritionally complete enteral formula | Powder 850 g | ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้ | | |
| (Isocal) | | | | |
| นมผงเด็กแรกเกิด (Dulac) | Powder 320 g | ใช้เฉพาะใน รพ. ไม่จ่ายให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน | | |

| ที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สรรพคุณ | วิธีใช้ |
|-----|--|---|--|
| 1 | ยาการ์ซิดีน 30 มิลลิลิตร | ช่วยสมานแผล | ใช้เช็ดแผลหลังทำความสะอาดแผลวันละ 2-3 ครั้ง |
| 2 | ยาแก้ไอมะขามป้อม (ขวด 120 มิลลิลิตร) | บรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ และช่วยให้ชุ่มคอ | จิบบ่อยๆ เมื่อมีอาการไอหรือมีเสมหะ |
| 3 | | บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ | ใช้อม ครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง |
| 4 | ยาน้ำขับลมโหระพา 60 มิลลิลิตร | ขับลม แก้ท้องอืด | รับประทานวันละ 3 ครั้ง |
| 5 | ยาแคปซูลขมิ้นชั้น ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม | บรรเทาอาการแน่น จุก เสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ | รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน |
| 6 | ยาแคปซูลขิง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม | บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ขับลม จุกเสียด | รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน |
| 7 | ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 280 มิลลิกรัม | บรรเทาอาการปวด ลดอักเสบ | รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 8 | ยาแคปซูลบอระเพ็ด ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม | แก้ไข้ แก้ร้อนใน | รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร |
| 9 | ยาแคปซูลบัวบก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม | แก้ไข้ แก้ร้อนใน | รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 10 | ยาแคปซูลเพกา ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม | บำรุงธาตุ ขับลม | รับประทานครั้งละ 3-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร |
| 11 | ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม | | รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 12 | 5 | | รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน รับประทานครั้งละ 2-5 แคปซูลวันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน |
| 13 | ยาแคปซูลมะระขึ้นก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม | | รับประทานครั้งละ 1 - 2แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร |
| 14 | ยาแคปซูลยอ ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม | บำรุงร่างกาย | รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 15 | ยาแคปซูลหญ้าปักกิ่ง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม | | รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร |
| 16 | ยาหม่องพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) | แก้แมลงกัดต่อย | (ยาใช้ภายนอก) ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อย |

| | OPD 10 1814 MO 10 1818 1 1 1 1 2 0 1 0 | aluajauria M.H.Z.200 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|---|---|---|
| ที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สรรพคุณ | วิธีใช้ |
| | (ขวด 10 กรัม) | | |
| 17 | กลีเซอรีนพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) (ขวด 10 มิลลิลิตร) | รักษาแผลร้อนในและเริ่มในปาก | (ยาใช้เฉพาะที่) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง |
| 18 | ครีมพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) (หลอด 10 กรัม) | มีฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคเริม งูสวัด | (ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่เป็น วันละ 3-5 ครั้ง |
| 19 | คาลาไมน์พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) (ขวด 60 มิลลิลิตร) | แก้ผดผื่นคัน ตุ่มคัน | (ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง เขย่าขวดก่อนใช้ |
| 20 | ครีมพริก(0.025%capsaicin) (หลอด 30 กรัม) | บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย | ใช้ทาบางๆ วันละ 3-4 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มีแผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| 21 | ครีมไพล (หลอด 25 กรัม) | บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย | ใช้ทาถูนวด วันละ 2-3 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มีแผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| 22 | ยาชงสมุนไพรชุมเห็ดเทศ (แพ็ค 10 ซองชา) | ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก | าใส่ยา 2 ซอง สำหรับชงลงในแก้ว เติมน้ำเดือด ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที ดื่มขณะอุ่นๆ ครั้งละ 1 แก้ว วันละครั้งก่อนนอนหรือเมื่อจำเป็น |
| 23 | ยาชงสมุนไพรหญ้าหนวดแมว (แพ็ค 10 ซองชา) | ขับปัสสาวะ (คำเตือน : ผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่คว รับประทาน ไม่ควรใช้วิธีต้มดื่ม) | ใส่ยา 1 ซอง ลงในแก้ว เติมน้ำเดือดตั้งทิ้งไว้ให้ตัวยาละลายออกมา รดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น |
| 24 | ยาชงสมุนไพรกระเจี๊ยบ (แพ็ค 10 ซองชา) | ขับปัสสาวะ | 1 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 25 | ยาชงสมุนไพรช้าพลู (แพ็ค 10 ซองชา) | ขับลม | 1 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร |
| 26 | ยาชงสมุนไพรรางจืด (แพ็ค 10 ซองชา) | ถอนพิษเบื่อเมา แก้ไข้ ร้อนใน | 1-2 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร |
| 27 | น้ำมันไพล (ขวด 100 มิลลิลิตร) | คลายความอ่อนล้าของร่างกาย | ใช้ทาถูนวดบริเวณร่างกาย สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| 28 | น้ำมันไพล กลิ่นขมิ้น (ขวด 100 มิลลิลิตร) | คลายความอ่อนล้าของร่างกาย | ใช้ทาถูนวดบริเวณร่างกาย สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ |
| | น้ำมันไพล กลิ่นมะกรูด (ขวด 100 มิลลิลิตร) ยาระบายฝักคูณ | คลายความอ่อนล้าของร่างกาย ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก | ใช้ทาถูนวดบริเวณร่างกาย สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน |

| ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ | สรรพคุณ | วิธีใช้ |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| (ขวด 120 มิลลิลิตร) | | |
| 31 ชาชงหญ้าดอกขาว | ลดความอยากบุหรื่ | 1 ซอง ชงน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้ง |
| (แพ็ค 10 ซองชา) | | |
| 32 สเปรย์หญ้าดอกขาว | ลดความอยากบุหรื่ | สเปรย์ 3-4 ครั้ง ในช่องปากเมื่อมีความอยากบุหรี่, จ่ายไม่เกิน2ขวด/เดือน |
| 33 ประสระไพล | บรรเทาอาการปวดประจำเดือน | รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวลา |
| | | จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS |
| 34 สหัสธารา | แก้ปวด ลดอักเสบ แก้เหน็บชา | รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวลา |
| | | จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS |
| 35 สเปรย์รางจืด | แก้ผื่นแพ้ ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ | ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ 3 ครั้งหรือตามต้องการ |
| | | จ่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด |
| 36 สเปรย์กระดูกไก่ดำ-ขัดมอน | แก้อาการฟกซ้ำ ปวดเมื่อย | ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ2- 3ครั้งหรือตามต้องการ |
| | | จ่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด |
| | | ไม่ให้ใช้ร่วมกับยาใช้ภายนอกแก้ปวดอื่น |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|---------|--|------------|
| Α | | Aminophylline | 6 |
| 2-PAM | 33 | Amiodarone hydrochloride | 3 |
| 2FDC | 14 | Amitriptyline hydrochloride | 8,10 |
| 3%NaCl | 22 | Amlodipine besilate | 4 |
| 3TC | 15 | Ammonium carbonate and senega mixture | 7 |
| 4FDC | 14 | Amoxicillin trihydrate | 12 |
| Abacavir | 14 | Amoxicillin sodium+Potassium clavulanate | 12 |
| Acetaminophen | 9,10 | Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate | 12 |
| Acetazolamide | 27 | Amphotericin B | 14,26 |
| Acetylcysteine (N-acetylcysteine) | 7,31,34 | Ampicillin sodium | 12 |
| Acetylsalicylic acid | 5,25 | Ampicillin + Sulbactam | 12 |
| Aciclovir (Acyclovir) | 15,26 | Angeliq | 17 |
| Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) | 15,26 | Antacid | 1 |
| Addamel N | 24 | Antazoline + Tetrahydrozoline (Hista-oph) | 26 |
| Adenosine | 3 | Anti-D immunoglobulin, (human) | 30 |
| Adrenaline | 5,30 | Antihemophilic factor | 5 |
| Aeroduol | 6 | Anti-tetanus immunoglobulin, human | 30 |
| Albendazole | 16 | Antivenom sera | 31 |
| Alendronate sodium | 18 | Apixaban | 5 |
| Alendronate+Vitamin D3 (Fosamax plus) | 18 | Aripiprazole | 8 |
| Alfuzosin hydrochloride | 19 | Aromatic ammonia spirit | 7 |
| Allopurinol | 25 | Artesunate | 16 |
| Alogliptine + Pioglitazone | 17 | Asafoetida (มหาหิงคุ์) - Topical used | 1 |
| Alprazolam | 8 | Aspirin (Acetylsalicylic acid) | 5,9,10,24 |
| Alprostadil | 19 | Atazanavir | 15 |
| Alteplase (Recombinant tissue-type | 5 | Atenolol | 3 |
| plasminogen activator) - rTPA | | Atorvastatin | 5 |
| Aluminium acetate (Burrow's solution) | 29 | Atropine sulfate | 3,27,31,32 |
| Aluminium hydroxide | 1,24 | Azathioprine | 20,25 |
| Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide | 1 | Azithromycin | 13,26 |
| Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide | 1 | AZT | 14 |
| +Simeticone (Antacid) | | В | |
| Ambroxol | 7 | Bacillus Calmette-Guérin (BCG) | 20 |
| Amikacin sulfate | 13,14 | Baclofen | 11,25 |
| Amiloride HCl + Hydrochlorothiazide | 2 | Bactigras | 16 |
| Amino acid solution | 23 | Balance salt | 27 |
| Amino acid solution for infant | 23 | Barium sulfate | 34 |
| Amino acid solution ชนิด high | 23 | BCG (Bacillus Calmette-Guerin) | 30 |
| branched chain amino acid (Kidmin) | | Benzathine benzylpenicillin | 12 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|-------|--|----------|
| Benzatropine mesilate(Benztropine mesylate) | 32 | Carbomer with preservative (Vidisic) | 27 |
| Benzhexol HCl | 11 | Carvedilol | 3 |
| Benzoin | 16 | Cefalexin (Cephalexin) | 13 |
| Benzyl benzoate | 29 | Cefazolin | 12,26 |
| Benzylpenicillin (Penicillin G) sodium | 12 | Cefdinir | 12 |
| Beractant | 7 | Cefixime | 12 |
| Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) | 9 | Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium | 13 |
| Betamethasone valerate | 29 | Cefotaxime sodium | 13 |
| Betaxolol hydrochloride | 27 | Cefoxitin sodium | 13 |
| Bevacitumab | 27 | Ceftazidime | 13 |
| Bimatoprost | 27 | Ceftriaxone sodium | 13 |
| Biphasic Isophane insulin (Soluble insulin | 17 | Celecoxib | 24 |
| +Isophane insulin)/Mixed 30/70 | | Cephalexin | 12 |
| Bismuth subsalicylate | 1 | Cetirizine hydrochloride | 7 |
| Bisacodyl | 2 | Charcoal, activated | 32 |
| Bisoprolol | 3 | Chloral hydrate | 7 |
| Borax in glycerin (Glycerin borax) | 28 | Chloramphenicol | 26 |
| Boric acid | 28 | Chlorhexidine acetate (Bactigras) | 16 |
| Brimonidine tartrate | 27 | Chlorhexidine gluconate | 16,28 |
| Brinzolamide | 27 | Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub) | 16 |
| Bromocriptine mesilate | 11,18 | Chlorhexidine gluconate (Hibisol) | 16 |
| Bronchil | 6 | Chlorhexidine gluconate (Hibitane) | 16 |
| Brown mixture | 7 | Chlorhexidine gluconate (ทันตกรรม) | 28 |
| Budesonide | 6,28 | Chlorhexidine gluconate 1.5% | 16 |
| Budesonide + Formoterol | 6 | +Cetrimide 15% (Savlon) in water | |
| Bupivacaine hydrochloride | 31 | Chloroquine phosphate | 16,25 |
| Bupropion | 8 | Chloroxylenol | 28 |
| Burrow's solution | 29 | Chlorpheniramine maleate | 7 |
| С | | Chlorpromazine hydrochloride | 8 |
| Cafergot | 10 | Ciclosporin | 20,25,29 |
| Calamine | 29 | Cilostazol | 5 |
| Calcitonin | 18 | Cinnarizine | 9 |
| Calcitonin-salmon | 18 | Ciprofloxacin hydrochloride | 14 |
| Calcitriol | 23 | Carbachol | 28 |
| Calcium carbonate | 24 | Carbamazepine | 8,10 |
| Calcium gluconate | 24,32 | Carbetocin | 19 |
| Calcium polystyrene sulfonate | 21 | Carbocisteine | 7 |
| Calfermin-C | 23 | Clarithromycin | 13 |
| Captopril | 3 | Clindamycin hydrochloride | 13 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|--|-------|---|-------|
| Clindamycin phosphate | 13 | D-10-W | 21 |
| Clobetasol propionate | 29 | D-12.5-S/5 | 22 |
| Clofazimine | 14 | D-12.5-W | 21 |
| Clofazimine+Dapsone+Rifampicin (MDT-COMBI) | 14 | d4T | 15 |
| Clomiphene citrate | 18 | D-50-W | 21 |
| Clonazepam | 7,11 | D-50-W (Glucose) | 21 |
| Clopidogrel bisulfate | 5 | D-5-S | 21 |
| Clopidogrel bisulfate + Acetylsalicylic acid | 5 | D-5-S/2 | 21 |
| Clotrimazole | 19,29 | D-5-S/3 | 22 |
| Cloxacillin sodium | 12 | D-5-S/4 | 22 |
| Clozapine | 8 | D-5-S/5 | 22 |
| Co-amoxiclav | 12 | D-5-W | 21 |
| Co-beneldopa | 11 | D-7.5-S/5 | 22 |
| Co-careldopa | 11 | D-7.5-W | 21 |
| Codeine phosphate | 9 | Dabigatran | 5 |
| Colchicine | 25 | Darbepoetin alfa | 21 |
| Cold cream | 29 | Dactinomycin | 20 |
| Colestyramine (Cholestyramine) | 2,5 | Daflon/Dafomin | 5 |
| Colistimethate sodium | 13 | Dapsone | 14 |
| Colistin | 13 | DAT | 30 |
| Colyte | 2,32 | DDAVP | 18 |
| Complete balanced nutrition peptid | 36 | ddl | 15 |
| formula (Peptamen) | | Deanxit | 8 |
| Complete water-soluble and fat-soluble | 24 | Deferiprone (GPO-L-One) | 21 |
| vitamins preparation (OMVI) | | Denosumab | 18 |
| Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative) | 1 | Desmopressin acetate (DDAVP) | 18 |
| Conjugated estrogens | 18,20 | Desogestrel | 19 |
| Copegus | 16 | Desvenlafaxine succinate | 8 |
| Cosopt | 28 | Cyclophosphamide | 21,34 |
| Co-trimoxazole | 14 | Cycloprogynova | 18 |
| Ciprofloxacin lactate | 14 | Cycloserine | 14 |
| Cisatracurium besilate | 31 | Cyclosporin | 18 |
| Citicoline | 12 | Cyproheptadine hydrochloride | 10 |
| D | | Dexamethasone+Neomycin sulfate | 26 |
| D-10-S | 22 | + polymyxin B sulfate (Maxitrol) | |
| D-10-S/2 | 22 | Dex-oph | 26 |
| D-10-S/3 | 22 | Dexpanthenol in seawater (Mar plus) | 28 |
| D-10-S/4 | 22 | Dextran 40 in Sodium chloride with dextrose | 23 |
| D-10-S/5 | 22 | Dextromethorphan hydrobromide | 7 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|---------------|---|------|
| Diacerein | 26 | Dulac | 34 |
| Diazepam | 8,11,25,31,32 | Duloxetine hydrochloride | 8 |
| Diclofenac sodium | 24 | Duratocin | 17 |
| Dicloxacillin sodium | 12 | Dutasteride | 19 |
| Didanosine (ddl) | 15 | Dydrogesterone | 17 |
| Dienogest | 17 | E | |
| Diethylcarbamazine citrate | 16 | EDTA | 28 |
| Digoxin | 2 | Efavirenz | 15 |
| Diltiazem hydrochloride | 4 | Empagliflozin | 17 |
| Dimenhydrinate | 9 | Emulsion of liquid paraffin (ELP) | 2 |
| Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin |) 5 | Enalapril maleate | 3 |
| Diphtheria antitoxin (DAT) | 30 | Enfalac A+ prosobee | 34 |
| Diphtheria-Tetanus vaccine ชนิด dT (adu | lt type) 30 | Enfalac premature formula | 34 |
| Diphtheria-Tetanus-Pertussis | 30 | Enoxaparin sodium | 5 |
| vaccine (whole cell) (DTPw) | | Eperisone | 25 |
| Diphtheria-Tetanus-Pertussis | 30 | Ephedrine hydrochloride | 4,28 |
| +Hepatitis B vaccine (DTP-HB) | | Epinastine hydrochloride | 26 |
| Dipotassium clorazepate | 8 | Epinephrine (Adrenaline) | 5,28 |
| Dipotassium hydrogen phosphate | 24 | Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex | 21 |
| Dobutamine hydrochloride | 4 | Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hemax | 21 |
| Domperidone | 1,9 | Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hypercrit | 21 |
| Domperidone maleate | 1,9 | Eprex | 21 |
| Dexamethasone + Framycetin sulfate | 28 | Ergocalciferol | 23 |
| + Gramicidin (Sofradex) | | Ergotamine tartrate + Caffeine (Cafergot) | 10 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 17,20 | ERIG | 30 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 26 | Ertapenem sodium | 13 |
| + Neomycin sulfate (Dex-oph) | | Erythromycin estolate | 13 |
| Donepezil hydrochloride | 12 | Erythromycin stearate | 13 |
| Dopamine hydrochloride | 4 | Erythropoietin | 21 |
| Doproct | 2 | Esmolol | 3 |
| Dorzolamide + Timolol (Cosopt) | 27 | Esomeprazole | 1 |
| Doxazosin mesilate | 3,19 | Estradiol valerate | 17 |
| Doxofylline | 6 | Estradiol+Drospirenone (Angeliq) | 17 |
| Doxorubicin | 20 | Estradiol+Norgestrel (Cycloprogynova) | 18 |
| Doxycycline hyclate | 13 | Estriol+Lactobacillus | 19 |
| D-penicillamine | 24,25,33 | Ethambutol hydrochloride | 14 |
| dT vaccine | 30 | Ethinylestradiol + Levonorgestrel | 19 |
| DTP-HB vaccine | 30 | (Oral contraceptive low dose) | |
| DTPw | 30 | Ethinylestradiol+ Norgestrel | 19 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|----------|--|-------|
| (Oral contraceptive high dose) | | G | |
| Ethionamide | 14 | Gabapentin | 10 |
| Ethyl alcohol | 16 | Galantamine hydrobromide | 12 |
| Etomidate in Lipofundin | 30 | Gemfibrozil | 5 |
| Etonogrestrel | 19 | Ganciclovir | 15 |
| Etoricoxib | 24 | Ganirelix | 18 |
| Exforge | 4 | Gentamicin sulfate | 13,26 |
| Extraneal | 19 | Gentian violet | 16 |
| Ezetimibe | 5 | Glipizide | 17 |
| F | | Glucose | 21 |
| Factor VIII concentrate, (Antihemophilic factor) | 5 | Glycerin borax | 28 |
| Fat emulsion (Lipid emulsion) | 23 | Glycerol | 27 |
| Fe-back | 21 | Glyceryl guaiacolate | 7 |
| Fenofibrate | 5 | Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin) | 4 |
| Fentanyl | 9,31 | GPO vir Z250 | 15 |
| Ferrous salt + Folic acid + potassium iodide (Triferdine) | 24 | GPO-L-One | 21 |
| Ferrous sulfate | 24 | Griseofulvin | 14 |
| Ferrous Fumarate | 24 | Gynoflor (Estriol+Lactobacillus) | 19 |
| Fexofenadine | 7 | Н | |
| Filgrastim | 21 | Haemodialysis A K2 Calcium 3.5 g | 22 |
| Fluconazole | 14,26 | Haemodialysis A K3 Calcium 3.5 g | 22 |
| Flunarizine hydrochloride | 9 | Haemodialysis A Low Calcium 2.5 g | 22 |
| Fluorometholone | 26 | Haemodialysis B | 22 |
| Fluorouracil | 20 | Haloperidol | 8 |
| Fluoxetine hydrochloride | 8 | HB vaccine | 30 |
| Flupentixol+Melitracen (Deanxit) | 8 | HBIG | 30 |
| Fluphenazine | 8 | HCG | 18 |
| Fluticasone furoate | 29 | Hemax | 21 |
| Fluticasone propionate | 6 | Heparin sodium | 5 |
| Folic acid | 21,23,24 | Hepatitis B immunoglobulin,human(HBIG) | 30 |
| Follitropin | 18 | Hepatitis B vaccine (HB) | 30 |
| Fondaparinux | 5 | Hibiscrub | 16 |
| Formaldehyde | 16 | Hibisol | 16 |
| Fosamax plus | 18 | Hibitane | 16 |
| Fosfomycin sodium | 13 | Hista-oph | 26 |
| Fuller's earth | 32 | Hi-Q lactose free | 34 |
| Furosemide | 2,3 | Hi-Q soy PrebioProteq | 34 |
| Fusidic acid | 26 | HRIG | 30 |
| | | Human albumin | 23 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|---------|--|-------|
| Human chorionic Gonadotropin | 18 | lodine+Potassium iodide | 17 |
| Human normal immunoglobulin, | 20 | Ipratropium Br + Fenoterol HBr | 6 |
| intravenous (IVIG) | | Irbesartan | 3 |
| Hydralazine hydrochloride | 3 | Iron sucrose complex (Fe-back) | 21 |
| Hydrochlorothiazide | 3 | Isocal | 34 |
| Hydrocortisone acetate | 29 | Isoflurane | 30 |
| Hydrocortisone acetate + Zinc oxide | 2 | Isoniazid | 14 |
| + Benzocaine (Proctosedyl/Doproct) | | Isoniazid + Rifampicin (2FDC) | 14 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 17 | Isoniazid+Rifampicin + Pyrazinamide | 14 |
| Hydrogen peroxide | 16 | +Ethambutol hydrochloride(Rifafour/4FDC) | |
| Hydroxycarbamide (Hydroxyurea) | 20 | Isophane insulin (NPH)/Insulatard | 17 |
| Hydroxychloroquine sulfate | 25 | Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) | 4 |
| Hydroxyethyl starch | 23 | Isoproterenol HCl | 4 |
| Hydroxyprogesterone caproate | 18 | Isosorbide dinitrate | 4 |
| Hydroxypropyl methylcellulose | 27 | Isosorbide mononitrate | 4 |
| with preservative (Lac-oph) | | Ispaghula husk (Mucillin) | 2 |
| Hydroxypropyl methylcellulose+Dextran70 | 27 | Itraconazole | 15 |
| preservative free (Tear naturale free) | | Ivabidine | 6 |
| Hydroxyurea | 20 | IVIG | 20 |
| Hydroxyzine hydrochloride | 7,8 | J | |
| Hyoscine-N-butylbromide | 1 | Japanese encephalitis vaccine (JE) | 30 |
| Hypercrit | 21 | (inactivated JE vaccine) | |
| Hypromellose with preservative (Natear) | 27 | К | |
| I | | Kabiven | 24 |
| Ibandronate sodium | 18 | Kanamycin sulfate | 14 |
| Ibuprofen | 9,10,25 | Kaopectin | 1 |
| Iloprost trometamol | 19 | KCl | 22 |
| Icodextrin | 22 | Kenacomb | 30 |
| Imatinib | 20 | Ketamine hydrochloride | 30 |
| Imipenem+Cilastatin sodium (Tienam) | 13 | Ketoconazole | 15,29 |
| Imipramine hydrochloride | 9 | Ketoprofen | 25 |
| Inactivated Polio vaccine | 30 | Ketorolac | 25,27 |
| Indinavir sulfate | 15 | Kidmin | 23 |
| Indomethacin | 25 | L | |
| Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ | 30 | Lac-oph | 27 |
| Inhalex | 6 | Lactulose | 2 |
| Inhalex forte | 6 | Lamivudine (3TC) | 15 |
| Insulin | 17 | Lamivudine + Stavudune | 15 |
| lobitridol (Xenetix) | 34 | + Nevirapine (GPO vir S30) | |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|-------|--------------------------------------|----------|
| Lamotrigine | 8,10 | Magnesium sulfate | 3,24 |
| LCD | 29 | Manidipine hydrochloride | 4 |
| Lercarnidipine | 4 | Mannitol | 3 |
| Letrozole | 21 | Mar plus | 29 |
| Leuprorelin acetate | 19 | Maxitrol | 27 |
| Levetiracetam | 10,11 | MCT oil | 34 |
| Levocetirizine hydrochloride | 7 | MDT-COMBI | 14 |
| Levodopa + Carbidopa | 11 | Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR) | 30 |
| + Entacapone (Stalevo) | | Mebendazole | 16 |
| Levodopa+Benserazide hydrochloride | 11 | Mebeverine | 1 |
| (Co-beneldopa) - Madopar | | Medium chain triglyceride oil | 34 |
| Levodopa+Benserazide hydrochloride | 11 | Medroxyprogesterone acetate | 18,19 |
| (Co-beneldopa) - Vopar | | Mefenamic acid | 25 |
| Levodopa+Carbidopa monohydrate | 11 | Mefloquine hydrochloride | 16 |
| (Co-careldopa) - Sinemet | | Meloxicam | 25 |
| Levofloxacin hemihydrate | 13,14 | Memantine | 12 |
| Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) | 17 | Meropenem | 13 |
| Lidocaine + Prilocaine | 31 | Metformin hydrochloride | 17 |
| Lidocaine hydrochloride | 31 | Methadone hydrochloride | 12 |
| Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | 31 | Methimazole | 17 |
| Linagliptin | 17 | Methotrexate | 20,25,29 |
| Lincomycin hydrochloride | 13 | Methyldopa | 3 |
| Lipid emulsion | 23 | Methylene blue (Methylthioninium Cl) | 32 |
| Liposomal Amphotericin B | 14 | Methylergometrine maleate | 19 |
| Liquid Coal tar (LCD) | 29 | Methylphenidate | 9 |
| Lithium carbonate | 8 | Methylprednisolone | 17,20,26 |
| Loperamide hydrochloride | 1 | Methylthioninium Cl | 32 |
| Lopinavir + Ritonavir | 15,16 | Metoclopramide | 1,9 |
| Lorazepam | 8 | Metoprolol tartrate | 3 |
| Losartan potassium | 3 | Metronidazole | 13,14,16 |
| L-thyroxine sodium | 17 | Mianserin hydrochloride | 9 |
| Lugol's solution (Iodine+Potassium iodide) | 17 | Midazolam | 11,31 |
| М | | Milk of magnesia | 2,24 |
| M.Tussis | 7 | Minoxidil | 3 |
| Macrogol | 2 | Misoprostol | 19 |
| Macrogols (PEG 4000) with electrolytes (Colyte) | 2,32 | Mist Carminative | 1 |
| Madopar | 11 | Mitomycin | 20 |
| Magnesium chloride solution | 22 | MMR vaccine | 30 |
| Magnesium hydroxide (Milk of magnesia) | 2,24 | Moduretic | 2 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|---|--|--|---|
| Mometasone furoate | 29 | Ofloxacin | 13,14,28 |
| Montelukast sodium | 6 | Olanzapine | 8 |
| Morphine sulfate | 9,10,31 | Olive oil | 29 |
| Mosapride citrate | 1 | Omeprazole | 1 |
| Moxifloxacin | 26 | OMVI | 23 |
| Mucillin | 2 | Ondansetron | 9 |
| Multiple trace minerals solution (เด็ก-Peditrace) | 23 | Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound | 7 |
| Multiple trace minerals solution (ผู้ใหญ่-Addamel N) | 24 | OPV | 30 |
| Multivitamins | 23 | Oral contraceptive high dose | 19 |
| Mupirocin | 28 | Oral contraceptive low dose | 19 |
| Mycophenolate mofetil | 20 | Oral rehydration salts (ORS) adult | 1 |
| N | | Oral rehydration salts (ORS) child | 1 |
| N-acetylcysteine | 31 | Oseltamivir phosphate | 15 |
| Naloxone hydrochloride | 33 | Ossein-hydroxyapatite (Ossium) | 18 |
| Naproxen | 25 | Oxpentifylline | 5 |
| Natamycin | 26 | Oxybutynin hydrochloride | 19 |
| Natear | 27 | Oxytetracycline hydrochloride | 26 |
| Neomycin+Nystatin+Gramicidin+TA (Kenacomb) | 30 | + polymyxin B sulfate (Terramycin) | |
| Neostigmine methylsulfate | 25,31 | Oxytocin | 19 |
| | | | |
| Neuramizone (Phenobarbitone | 10 | Р | |
| Neuramizone (Phenobarbitone + Hyoscyamine + Ergotamine) | 10 | Pamidronate disodium | 18 |
| | 10 15 | | 18 2 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) | | Pamidronate disodium | |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine | 15 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes | 2 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride | 15 4 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium | 2 1 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline | 15 4 4 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) | 2 1 14 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid | 15 4 4 5 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) | 2 1 14 9,10 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine | 15 4 4 5 4 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) | 2 1 14 9,10 25 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine | 15 4 4 5 4 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel | 2 1 14 9,10 25 10 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin | 15 4 4 5 4 4 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib | 2 1 14 9,10 25 10 25 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate | 15 4 4 5 4 4 4 5,33 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone | 15 4 4 5 4 4 4 5,33 18 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin | 15 4 4 5 4 4 5,33 18 13 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin Norgesic | 15 4 4 5 4 4 5,33 18 13 25 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace Peginterferon alfa-2a (Pegasys®) | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin Norgesic Nortriptyline hydrochloride | 15 4 4 5 4 4 4 5,33 18 13 25 9,10,11 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace Peginterferon alfa-2a (Pegasys*) Penicillamine (D-penicillamine) | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 15 24,25,33 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin Norgesic Nortriptyline hydrochloride NSS | 15 4 4 5 4 4 4 5,33 18 13 25 9,10,11 22 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace Peginterferon alfa-2a (Pegasys*) Penicillamine (D-penicillamine) Penicillin G | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 15 24,25,33 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin Norgesic Nortriptyline hydrochloride NSS Nutramigen | 15 4 4 5 4 4 5,33 18 13 25 9,10,11 22 34 34 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace Peginterferon alfa-2a (Pegasys®) Penicillamine (D-penicillamine) Penicillin G Penicillin V | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 15 24,25,33 12 12 |
| + Hyoscyamine + Ergotamine) Nevirapine Nicardipine hydrochloride Nicergoline Nicotinic acid Nifedipine Nimodipine Nitroglycerin Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Norethisterone Norfloxacin Norgesic Nortriptyline hydrochloride NSS Nutramigen Nutritionally complete enteral formula (Isocal) | 15 4 4 5 4 4 5,33 18 13 25 9,10,11 22 34 34 | Pamidronate disodium Pancreatic enzymes Pantoprazole sodium Para-aminosalicylic acid (PAS) Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic) Parempanel Parecoxib PAS PCEC rabies vaccine Peditrace Peginterferon alfa-2a (Pegasys®) Penicillamine (D-penicillamine) Penicillin G Penicillin V Pentoxyfylline (Oxpentifylline) | 2 1 14 9,10 25 10 25 14 30 23 15 24,25,33 12 12 5 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|--|----------|---|------|
| Perphenazine | 8 | Pseudoephedrine hydrochloride | 7 |
| Pethidine hydrochloride | 10,31 | Pyrazinamide | 14 |
| Phenobarbital (Phenobarbitone) | 11,33 | Pyridostigmine bromide | 25 |
| Phenobarbitone+Hyoscyamine+Ergotamine | 10 | Pyridoxine hydrochloride | 23 |
| Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) | 12 | Pyrimethamine | 16 |
| Phenylephrine hydrochloride | 27 | Q | |
| Phenytoin sodium | 11 | Quetiapine fumarate | 8 |
| Phospholipids ชนิด Beractant (Survanta) | 7 | Quinine dihydrochloride | 16 |
| Phytomenadione | 23,33 | Quinine sulfate | 16 |
| Pilocarpine hydrochloride | 27 | R | |
| Pioglitazone hydrochloride | 17 | Rabeprazole | 1 |
| Piperacillin+Tazobactam (Tazocin) | 12 | Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) | 30 |
| Podophyllin (Podophyllum resin) | 29 | Rabies immunoglobulin, human (HRIG) | 30 |
| Poliomyelitis vaccine,live attenuated (OPV) | 30 | Rabies vaccine ชนิด Vero cell/ชนิด PCEC | 30 |
| Poly oph | 26 | Raloxifene hydrochloride | 19 |
| Polymyxin B sulfate+Neomycin sulfate | 26 | Ranibizumab | 27 |
| + Gramicidin (Poly oph) | | Ranitidine hydrochloride | 1 |
| Polyvalent antivenom for hematotoxin | 32 | Rasagiline mesylate | 11 |
| Polyvalent antivenom for neurotoxin | 32 | Recombinant tissue-type plasminogen activator | 5 |
| Potassium chloride (KCl) | 23 | Regular insulin | 17 |
| Potassium citrate + Citric acid (Potcit sol) | 20 | Ribavirin (Copegus ®) | 16 |
| Potassium permanganate (ด่างทับทิม) | 16 | Rifafour | 14 |
| Potassium sodium hydrogen citrate (Uralyt-U) | 25 | Rifampicin | 14 |
| Potcit solution | 20 | Rilpivirine | 15 |
| Povidone iodine | 16 | Ringer's acetate solution | 23 |
| Pralidoxime chloride (2-PAM) | 33 | Ringer's lactate | 23 |
| Pramipexole | 11 | Risedronate | 18 |
| Praziquantel | 16 | Risperidone | 8 |
| Prazosin hydrochloride | 3 | Ritonavir | 15 |
| Prednisolone | 17,20,26 | Rivastigmine | 12 |
| Pregabalin | 10 | Rocuronium bromide | 31 |
| Primaquine phosphate | 16 | Rosuvastatin | 5 |
| Procaterol hydrochloride | 6 | Roxithromycin | 13 |
| Proctosedyl | 2 | rTPA | 5 |
| Progesterone | 18 | S | |
| Propofol | 30 | Salbutamol sulfate | 6 |
| Propranolol hydrochloride | 3,10,11 | Salicylic acid | 29 |
| Propylthiouracil | 17 | Salicylic acid in Triamcinolone acetonide | 29 |
| Protamine sulfate | 33 | Salmeterol+Fluticasone propionate (Seretide) | 6 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|--|------------|--|------|
| Savlon | 16 | Stavudine (d4T) | 15 |
| Selenium sulfide | 30 | Sterile Trypan blue in BSS | 27 |
| Senna | 2 | Sterile water for injection | 22 |
| Seretide | 6 | Sterile water for irrigation | 22 |
| Sertraline | 9 | Streptokinase | 5 |
| Sevelamer carbonate | 24 | Streptomycin sulfate | 14 |
| Sevoflurane | 31 | Succinylcholine Cl | 31 |
| Shohl solution | 20 | Sucralfate | 1 |
| Sildenafil citrate | 4 | Sulfadiazine | 16 |
| Silver sulfadiazine | 28 | Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine) | 28 |
| Simeticone (Simethicone) | 1 | Sulfamethoxazole + Trimethoprim | 14 |
| Simvastatin | 5 | (Co-trimoxazole) | |
| Sinemet | 11 | Sulfasalazine | 2,25 |
| Sitafloxacin | 13 | Sulfinpyrazone | 25 |
| Sodium acetate (ใช้เตรียม TPN) | 22 | Sulperazon | 13 |
| Sodium bicarbonate | 22,33 | Sulprostone | 19 |
| Sodium chloride | 2,22,27,28 | 8 Survanta | 7 |
| Sodium chloride solution | 22 | Suxamethonium chloride (Succinylcholine Cl) | 31 |
| Sodium citrate + Citric acid (Shohl sol) | 20 | Т | |
| Sodium fluoride | 24,28 | Tafluprost | 27 |
| Sodium hyaluronate | 26 | Tamoxifen | 21 |
| Sodium hyaluronate (Vislube) | 17 | Tar shampoo | 29 |
| Sodium hypochlorite (ทันตกรรม) | 28 | Tazocin | 12 |
| Sodium lactate intravenous infusion | 22 | Tear naturale free | 27 |
| compound (Ringer's lactate) | | Tenofovir + Efavirenz + Emtricitabine | 15 |
| Sodium nitrate (น้ำยาอดบุหรี่) | 11 | Tenofovir disoproxil fumarate | 15 |
| Sodium nitrite | 33 | Terbutaline sulfate | 6,19 |
| Sodium nitroprusside | 3 | Teriparatide | 19 |
| Sodium phosphates | 2 | Terramycin | 26 |
| Sodium thiosulfate | 29,33 | Tetanus antitoxin, horse | 30 |
| Sodium valproate | 8,10,11 | Tetanus antitoxin, human | 30 |
| Sofradex | 28 | (Anti-tetanus immunoglobulin, human) | |
| Soluble insulin (Regular)/(Insugen R) | 17 | Tetracaine hydrochloride | 27 |
| Soluble insulin+Isophane insulin | 17 | Tetracycline hydrochloride | 13 |
| Sorbitol | 2 | Theophylline | 6 |
| Special mouthwash (Chloroxylenol) | 28 | Theophylline+Glyceryl guaiacolate (Bronchil) | 6 |
| Spiriva | 6 | Thiamazole (Methimazole) | 18 |
| Spironolactone | 3 | Thiamine hydrochloride | 22 |
| Stalevo | 11 | Thiamine mononitrate | 22 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|--|----------|---|-------|
| Thiopental sodium (Thiopentone sodium) | 30 | Vitamin B complex | 23 |
| Thioridazine hydrochloride | 8 | Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) | 23 |
| Thyroid extract | 17 | Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) | 23 |
| Tibolone | 18 | Vitamin B1-6-12 | 23 |
| Ticaglelor | 5 | Vitamin B2 | 23 |
| Tienam | 13 | Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 23 |
| Tigecycline | 14 | Vitamin C | 23 |
| Timolol maleate | 27 | Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 23 |
| Tiotropium (Spiriva) combo | 6 | Vitamin E | 23 |
| Tiotropium + Olodaterol | 6 | Vitamin K1 (Phytomenadione) | 23,33 |
| Tolperisone hydrochloride | 25 | Voglibose | 17 |
| Tolterodine tartrate | 19 | Vopar | 11 |
| Topiramate | 10,11 | Voriconazole | 15 |
| Tramadol hydrochloride | 10 | Votioxetine | 9 |
| Tranexamic acid | 5 | W | |
| Trazodone hydrochloride | 9 | Warfarin sodium | 5 |
| Triamcinolone acetonide | 17,28,29 | X | |
| Trichloroacetic acid | 29 | Xenetix | 34 |
| Triferdine | 24 | Z | |
| Trihexyphenidyl HCl (Benzhexol HCl) | 11 | Zanamivir | 15 |
| Trimetazidine | 6 | Zidovudine (AZT) | 15 |
| Tropicamide | 27 | Zidovudine+Lamivudine (AZT+3TC)/Zilarvir | 15 |
| Trospium chloride | 19 | Zidovudine+Lamivudine+Nevirapine (GPO vir Z250) | 15 |
| Tuberculin Purified Protein Derivative | 14 | Zilarvir | 15 |
| (Tuberculin PPD) | | Zinc oxide | 29 |
| U | | Zinc sulfate (Zinc sulphate heptahydrate) | 24 |
| Uralyt-U | 26 | Ziprasidone | 8 |
| Urea | 29 | ก | |
| Urea in Triamcinolone acetonide | 29 | กลีเซอรีนพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) | 36 |
| Ursodeoxycholic acid | 2 | P | |
| V | | ครีมพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) | 36 |
| Valsatan + Amlodipine (Exforge) | 4 | ครีมพริก | 36 |
| Vancomycin | 14,26 | ครีมไพล | 36 |
| Vaseline | 29 | คาลาไมน์พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) | 36 |
| Verapamil hydrochloride | 4 | ช | |
| Vero rabies vaccine | 30 | ชาชงหญ้าดอกขาว | 37 |
| Vidisic | 27 | ଷ | |
| Vislube | 27 | เซรุ่มแก้พิษาูกะปะ | 31 |
| Vitamin A | 23 | เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ | 32 |

| รายการยา | หน้า | ชื่อยา | หน้า |
|--|-----------------|----------------------------------|-------|
| เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา | 32 | ยาระบายน้ำฝักคูณ | 36 |
| เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา | 32 | ยาน้ำขับลมโหระพา 60 มิลลิลิตร | 35 |
| เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท | 32 | ยาหม่องพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย) | 35 |
| (งูจงอาง งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม งู | เห่า) | ยาอมแก้ไอมะขามป้อม | 35 |
| เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (งูกะปะ งูเขียวหางไห | ม้ งูแมวเซา) 32 | ส | |
| เซรุ่มแก้พิษงูเห่า | 32 | สหัสธารา | 37 |
| ମ | | สเปรย์กระดูกไก่ดำ-ขัดมอญ | 37 |
| ด่างทับทิม | 16 | สเปรย์รางจืด | 37 |
| น | | สเปรย์หญ้าดอกขาว | 37 |
| นมผงเด็กแรกเกิด (Dulac) | 34 | เสลดพังพอนตัวเมีย | 35,36 |
| น้ำมันไพล | 36 | | |
| น้ำมันไพล กลิ่นขมิ้น | 36 | | |
| น้ำมันไพล กลิ่นมะกรูด | 36 | | |
| น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD | 22 | | |
| น้ำยาอดบุหรื่ | 11 | | |
| ป | | | |
| ประสระไพล | 37 | | |
| ม | | | |
| มหาหิงคุ์ | 1 | | |
| ម | | | |
| ยาการ์ซิดีน 30 มิลลิลิตร | 35 | | |
| ยาแก้ไอมะขามป้อม | 35 | | |
| ยาแคปซูลขมิ้นชั้น | 35 | | |
| ยาแคปซูลขิง | 35 | | |
| ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง | 35 | | |
| ยาแคปซูลบอระเพ็ด | 35 | | |
| ยาแคปซูลบัวบก | 35 | | |
| ยาแคปซูลเพกา | 35 | | |
| ยาแคปซูลเพชรสังฆาต | 35 | | |
| ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร | 35 | | |
| ยาแคปซูลมะระขึ้นก | 35 | | |
| ยาแคปซูลยอ | 35 | | |
| ยาแคปซูลหญ้าปักกิ่ง | 35 | | |
| ยาชงสมุนไพรกระเจี้ยบ | 36 | | |
| ยาชงสมุนไพรซ้าพลู | 36 | | |
| ยาชงสมุนไพรชุมเห็ดเทศ | 36 | | |
| ยาชงสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง | 36 | | |
| ยาชงสมุนไพรรางจืด | 36 | | |
| ยาชงสมุนไพรหญ้าหนวดแมว | 36 | | |