

| หมวดตัวชี้วัด | | Respiratory Disease |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | COPD |
| รหัสตัวชี้วัด | | DR0404 |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย) | | ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรื่ |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ) | | COPD: Percentage of COPD Patients with Ongoing Smoking |
| นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ | | 1) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้น |
| ตัวชี้วัด | | เรื้อรังที่ยังสูบบุหรื่อยู่ หรือ เลิกบุหรี่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน |
| | | 2) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึงผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับ |
| | | การรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล |
| วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด | | ประเมินประสิทธิภาพ ของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง |
| สูตรในการคำนวณ | | (a/b) x 100 |
| ข้อมูลที่ต้องการ | ตัวตั้ง | a = จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ที่ยัง |
| | | สูบบุหรื่อยู่ หรือ เลิกบุหรี่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (คน) |
| | ตัวหาร | b = จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล |
| | | ทั้งหมด (คน) |
| รหัสโรค/ หัตถการ | ตัวตั้ง | Pdx = J44 |
| ที่เกี่ยวข้อง | ตัวหาร | Pdx = J44 |
| ความถี่ในการจัดทำข้อมูล | | ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส) |
| หน่วยวัด | | ร้อยละ |
| Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) * | | |
| วิธีการแปลผล | | ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี ַ 🤊 |
| ที่มา/ Reference | | กรมการแพทย์/ แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประเทศไทย |
| | | ปี 2558 |
| วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้ | | 1 ตุลาคม 2559 |
| วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | | |
| เหตุผลของการปรับปรุง | | |
| หมายเหตุ | | |