

1. Gastrointestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

n (1) aluminium hydroxide +magnesium hydroxide

susp. 240 mL

n (2) mist carminative (capsicum +cardamom +ginger)

mixture 180 mL

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

n (1) hyoscine-N-butyl bromide

tab. ๑๕ Dicyclomine HCLn tab แพน

hyoscine-N-butyl bromide syr. 1 mg/mL

hyoscine-N-butyl bromide inj. 20 mg/mL

n (2) domperidone

susp. 5 mg / 5mL

tab. 10 mg

n (3) metoclopramide hydrochloride

tab. 10 mg.

inj. 10 mg/ mL

n (4) dicyclomine hydrochloride

tab. 10 mg.

1.3 Ulcer healing drug and drugs used in variceal bleeding

n (1) ranitidine hydrochloride

tab 150 mg.

inj. 50 mg/ 2 mL

n (2) omeprazole

EC cap 20 mg

inj. 20 mg

1.4 Drugs used in acute diarrhea

n (1) oral rehydration salts (ORS)

oral powder 5 g

1.5 Laxatives and enema

n (1) bisacodyl

tab. 5 mg.

n (2) magnesium hydroxide (milk of magnesia)

susp. 60 ml

n (3) enema (sodium biphosphate + sodium phosphate)

133 mL

n (4) glycerin suppository

each 100 mg contains : Glycerine 91 g+sodium stearate 9 g

1.6 Antihaemorrhoidal preparations

ข (1) proctosedyl (hydrocortisone+cinchocaine HCL+framycetin+aesculin)

suppo. 5 mg+5mg+10mg+10mg

2. Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

ก (1) digoxin

tab. 0.25 mg.

inj. 250 mcg / mL , 2 mL

2.2 Diuretics

ก (1) furosemide

tab. 40 mg.

inj. 20 mg/ 2 mL

ก (2) hydrochlorothiazide (HCTZ)

tab. 50 mg., 25 mg

ข (3) Moduretic [amiloride + hydrochlorothiazide]

tab. 5 mg. + 50 mg.

ก (4) Spironolactone

tab. 25, 100 mg

2.3 Antiarrhythmic drugs

ก (1) atropine sulfate (ใช้สำหรับ sinus bradycardia)

inj. 0.6 mg/mL

ก (2) lidocaine hydrochloride (Xylocard) (ใช้สำหรับ ventricular arrhythmia)

inj. 2 %

ก (3) adenosine (ใช้สำหรับ supraventricular arrhythmia)

inj. 3 mg/mL , 2 mL

ค (4) amiodarone (ใช้สำหรับ supraventricular,ventricular and atrial arrhythmia)

inj. 150 mg/3 ml

ค (5) magnesium sulfate (ใช้สำหรับ ventricular tachycardia, refractory supraventricular tachyarrhythmia)

inj. 10 % 10 ml, 50 % 2 ml

2.4 Beta-blocking agents

ก (1) propranolol hydrochloride

tab. 10 mg. ,40 mg.

ก (2) atenolol

tab 50 mg

2.5 drugs affecting the renin-angiotensin system and other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

ก (1) hydralazine hydrochloride (ใช้สำหรับ hypertensive emergencies)

inj. 25 mg/2 ml

2.5.2 Alpha- adrenoceptor blocking drugs

ค (1) doxazosin

tab 2 mg

2.5.3 Angiotensin converting enzyme inhibitors

ก (1) enalapril

tab. 5 mg. , 20 mg.

ก (2) captopril (ใช้เฉพาะที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเท่านั้น-stat dose)

tab. 25 mg.

2.5.4 Angiotensin-II receptor antagonist

ค (1) losartan potassium (ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา ACE inhibitors ไม่ได้ เพราะเกิดอาการไม่พึงประสงค์)

tab 50 mg

2.6 Nitrates, Calcium - channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

ก (1) isosorbide mononitrate

tab. 20 mg.

ก (2) isosorbide dinitrate

sublingual tab. 5 mg.

2.6.2 Calcium-channel blockers

ก (1) amlodipine

tab 5 mg

NED (2) nifedipine (ใช้เฉพาะห้องคลอดเท่านั้น)

cap. 5 mg

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

ก (1) dopamine HCL

inj. 250 mg / 10 mL

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

ก (1) norepinephrine bitartrate

inj. 4 mg / 4 mL

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

ก (1) epinephrine (adrenaline)

inj. 1 mg / mL

2.8 Antiplatelet drugs

ก (1) aspirin

EC tab. 81, 300 mg.

2.9 Lipid regulating drugs

ก (1) Gemfibrozil

cap 300 mg

	และ (UP) Gemfibrozil
	600 mg เฉพาะผู้ป่วย HIV
ก	(2) Simvastatin
	tab 10 mg ,20 mg
	และ (UP) Simvastatin
	10 mg เฉพาะผู้ป่วย HIV
3. Respiratory systems	
3.1 Bronchodilators	
3.1.1 Adrenoceptor agonists	
ก	(1) salbutamol sulfate
	tab. 2 mg.
	syr. 2 mg / 5 mL
	inh. 200 mcg/puff
	resp. sol. 5 mg / mL
ก	(2) terbutaline sulfate
	inj 0.5 mg / mL
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators	
ก	(1) Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide
	MDI 200 dose
	Sol. 0.25 mg +0.5 mg/ mL, 20 ml
3.1.3 Theophylline	
ก	(1) Theophylline
	sustaine release tab 200 mg
3.2 Corticosteroids	
ก	(1) Budesonide
	MDI 200 mcg/dose inh.
ค	(2) Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg (Seretide)
	MDI 120 dose inh.
3.3. Antihistamines	
ก	(1) chlorpheniramine maleate
	tab. 4 mg.
	syr. 2 mg / 5 mL
	inj. 10 mg / mL
ก	(2) hydroxyzine hydrochloride
	tab. 10 mg.
ก	(3) cetirizine
	tab. 10 mg
3.4 Cough preparation	

3.4.1 Cough suppressants

ก (1) dextromethorphan hydrochloride

tab. 15 mg.

3.4.2 Expectorant and demulcent cough preparations

ก (1) glyceryl guaiacolate

syr. 100 mg / 5 mL

tab. 100 mg.

3.5 Systemic nasal decongestants

ก (1) pseudoephedrine HCL วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

tab 60 mg

4. Central nervous systems

4.1 Hypnotics and anxiolytics

ง (1) alprazolam วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

tab 0.5 mg

ข (2) clonazepam วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab 0.5 mg, 2 mg

ข (3) clorazepate Dipotassium วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab 5 mg

ก (4) diazepam วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab. 2 mg. , 5 mg.

inj. 10 mg / 2 mL

ก (5) lorazepam วัดฤออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab. 0.5 mg.

ข (6) hydroxyzine hydrochloride

tab 10 mg (ใช้ในผู้ป่วยเด็กได้)

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

ก (1) chlorpromazine hydrochloride

tab. 100 mg , 50 mg.

ค (2) Clozapine

tab 25mg, 100 mg

ก (3) Fluphenazine, sterile sol (as decanoate)

inj 25 mg/ml

ก (4) Haloperidol

tab. 0.5 mg, 5 mg.

inj. 5 mg / mL

ก (5) Haloperidol decanoate

inj 50 mg/ml

ก	(6) Perphenazine	
	tab 2 mg, 8 mg	
ค	(7) Risperidone	
	tab 1 mg, 2 mg	
ค	(8) Thioridazine hydrochloride	
	tab 25 mg	
4.2.2 Antimanic drugs		
ก	(1) Carbamazepine	
	tab 200 mg	
ก	(2) Lithium carbonate	
	cap 300 mg	
ข	(3) Sodium valproate CHRONO	
	tab SR 500 mg	
4.3 Antidepressant drugs		
ก	(1) Amitriptyline hydrochloride	
	tab. 10 mg. , 25 mg.	
ก	(2) Fluoxetine hydrochloride	
	tab. 20 mg	
ก	(3) Imipramine hydrochloride	
	tab. 25 mg	
ข	(4) Mianserin hydrochloride	
	tab 10 mg	
ค	(5) Sertraline	
	tab 50 mg	
ค	(6) Trazodone hydrochloride	
	tab 50 mg	
4.4 Central nervous system stimulants		
ค	(1) Methylphenidate	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
	tab 10 mg	
4.5 Drugs used in nausea and vomiting		
ก	(1) domperidone	
	susp. 5 mg / 5mL	
	tab. 10 mg	
ก	(2) metoclopramide hydrochloride	
	tab. 10 mg.	
	inj. 10 mg/ mL	
4.6 Drug use in vestibular disorders		
ก	(1) dimenhydrinate	

tab. 50 mg.

inj. 50 mg/ mL

4.7 Analgesics and antipyretics

ก (1) Paracetamol (ใช้เป็น first line drug สำหรับ osteoarthritis)

tab. 325 mg. , 500 mg.

syr. 120 mg / 5mL

inj. 300 mg / 2mL

ก (2) aspirin (ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สำหรับลดไข้เพื่อลดความเสี่ยงต่อ Reye' s syndrome)

film coated tab. 300 mg.

ก (3) Ibuprofen

tab. 200 mg. ,400 mg.

susp. 100 mg / 5 mL

4.8 Analgesic

4.8.1 Opioid analgesic

ค (1) Tramadol HCl

sterile sol 50 mg/ml , cap 50 mg

ค (2) Morphine sulfate

tab ชนิด IR 10 mg

inj. 10 mg /mL

ค (3) Pethidine hydrochloride

inj. 50 mg / mL

4.8.2 Drugs for neuropathic pain

ก (1) Amitriptyline hydrochloride

tab.10 ,25 mg

4.8.3.Antimigraine drugs

4.8.3.1 Drugs for acute migraine attack

ก (1) Paracetamol

tab. 325 mg. , 500 mg.

ก (2) Aspirin

tab. 300 mg.

ก (3) Ibuprofen

tab. 200 mg. ,400 mg.

ข (4) Ergotamine tartrate + caffeine

tab. 1 mg. + 100 mg.

4.8.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine

ก	(1) Amitriptyline hydrochloride
	tab.10 ,25 mg
ก	(2) Propranolol hydrochloride
	tab. 10 mg. ,40 mg.
ท	(3) Cyproheptadine
	tab. 4 mg.
4.9. Antiepileptics	
4.9.1 Drugs used in the control of epilepsy	
ก	(1) Phenobarbital
	tab. 30 mg. , 60 mg.
ก	(2) Phenytoin sodium
	cap. 100 mg. prom release
4.9.2 Drugs used in status epilepticus	
ก	(1) Diazepam
	inj. 10 mg /2 mL
ก	(2) Phenytoin sodium
	inj. 50 mg / mL, 5 ml
	cap 100 mg promp release
ง	(3) Midazolam HCL
	tab. 15 mg
4.10 Drugs used in movement disorders	
ก	(1) Diazepam
	tab. 2 mg. ,5 mg.
ก	(2) Propranolol hydrochloride (ใช้สำหรับ essential tremor)
	tab. 10 mg. ,40 mg.
ก	(3) Atenolol (ใช้สำหรับ essential tremor)
	tab. 50 mg.
ก	(4) Trihexyphenidyl hydrochloride
	tab 2 mg, 5 mg.
4.11 Drugs used in substance dependence	
เภสัชตำรับ รพ.	(1) นํ้ายาอดนิ่ว (sodium nitrate)
	sol 240 ml
5. Infections	
5.1 Antibacterial drugs	
5.1.1 Penicillins	
ก	(1) penicillin V potassium
	tab.250 mg.
	syr. ตัดออกจากบัญชี่แล้ว

ก	(2) penicillin G
	inj. 1 mu , 5 mu
ก	(3) dicloxacillin sodium
	cap. 250 mg. , 500mg.
	syr. 62.5 mg / 5 mL
ก	(4) amoxicillin
	cap. 250 mg. , 500 mg.
	syr. 125 mg / 5 mL
ก	(5) ampicillin sodium
	inj. 1 g. , 500 mg.
ค	(6) Amoxycillin trihydrate+ Potassium clavulanate (Co-amoxiclave)
	tab 500/125 mg
ใช้สำหรับการติดเชื้อ H.influenzae , M catarrhalis และ melioidosis ที่ดื้อยา Ampicillin หรือการติดเชื้อผสมบางชนิด	
ก	(7) Cloxacillin
	inj. 500 mg.
5.1.2. Cephalosporins	
ก	(1) cefalexin (Cephalexin)
	cap. 250 mg , 500 mg
	syr. 125 mg/5 mL
ก	(2) cefazolin sodium
	inj. 1 g.
ค	(3) ceftriaxone sodium
	inj. 1 g.
5.1.3.Tetracyclines	
ก	(1) doxycycline hydrochloride
	cap. 100 mg.
5.1.4.Aminoglycosides	
ก	(1) gentamicin sulfate
	inj. 80 mg/ 2 mL
5.1.5 Macrolides	
ก	(1) erythromycin estolate
	syr. 125 mg / 5ml
ก	(2) roxithromycin
	tab. 150 mg.
5.1.6. Quinolones	
ก	(1) Norfloxacin
	tab. 100 , 400 mg.
ข	(2) Ofloxacin

tab. 200 mg

ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ และจัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้เป็น second line drug ในการรักษาวัณโรค

5.1.7 Some other antibacterials

ก (1) metronidazole

tab. 200 mg.

inj. 0.5%,100 mL

ข (3) lincomycin hydrochloride

inj. 300 mg/mL

ข (4) clindamycin

cap. 300 mg

5.1.8 Sulphonamide and trimethoprim

ก (1) Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole)

tab. 400 mg/80 mg of TMP

5.1.9 . Antituberculous drugs

ก (1) ethambutol hydrochloride

tab. 400 mg, 500 mg

สำหรับ MDR-TB โดยเป็น second-line drug หรือกรณีแพ้ยา

ก (2) isoniazid

tab. 100 mg

ก (3) pyrazinamide

tab. 500 mg

ก (4) rifampicin

cap. 300 mg , 450 mg

ค (5) ofloxacin

tab. 200 mg

ก (6) streptomycin

inj. 1 g

5.2. Antifungal drugs

ก (1) griseofulvin

tab. 500 mg.

ก (2) ketoconazole

tab. 200 mg.

ก (3) nystatin

susp. 100,000 u/mL, 12 ml

ก (4) fluconazole

cap 200 mg

ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcosis หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้

5.3. Antivirals drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

๑ (1) oseltamivir phosphate

cap 75, 45, 30 mg

ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหา

โรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ของประเทศ

5.3.2 Antiretrovirals

๑ (1) Lamivudine+ Stavudine+ Nevirapine (GPO-vir)

tab GPO-vir S30 (150 mg + 30 mg+ 200 mg)

๑ (2) Stavudine

cap 30 mg

๑ (3) Lamivudine

tab 150 mg

syr. 10 mg/ml

๑ (4) Zidovudine (AZT)

cap 100 mg,300 mg

syr. 10 mg/ml

๑ (5) Efavirenz

tab 200 mg, 600 mg

๑ (6) Nevirapine

tab 200 mg + 50 mg

syr. 10 mg/ml

๑ (7) Didanosine

chewable tab 125 mg , 200 mg

๑ (8) Lopinavir + Ritonavir

tab 200 mg + 50 mg

๑ (9) Tenofovir disoproxil fumarate

tab 300 mg

๑ (10) Zidovudine + Lamivudine (Zilarvir)

tab 300 mg + 150 mg

๑ (11) Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine

tab GPO virZ (250 mg + 150 mg + 200 mg)

๑ (12) didanosine (ddl)

tab 125 mg , 200 mg

๑ (13) lopinavir+ritonavir (Kaletra)

tab 200/50 mg

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1. Antimalarials

ก	(1) chloroquine phosphate
	tab. 250 mg.
ก	(2) primaquine diphosphate
	tab. 15 mg.
ก	(3) quinine dihydrochloride
	inj. 600 mg/ 2 mL
ก	(4) quinine sulfate
	tab. 300 mg.

5.4.2. Other antiprotozoal drugs

ก	(1) metronidazole
	tab. 200 mg.
	ใช้สำหรับ amoebiasis , giardiasis และ urogenital trichomoniasis

5.5. Anthelmintics

ก	(1) albendazole
	tab. 200 mg.
	susp. 100 mg/ 5 mL
ก	(2) diethylcarbamazine citrate
	tab. 300 mg.

5.6 Antiseptics

ก	(1) ethyl alcohol
	solution 70 % , 450 ml
ก	(2) formaldehyde
	solution 450 mL
ก	(3) hydrogen peroxide 450 ml
ก	(4) chlorhexidine Gluconate 40 mg 500 ml (Hibiscrub)
ก	(5) povidone iodine
	solution 10 % scrub 7.5 %

6. Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

ก	(1) regular insulin (RI)
	inj. 100 u/mL, 10 mL
ก	(2) isophane insulin (NPH)
	inj. 100 u/mL, 10 mL
ก	(3) mIX 70/30
	inj. 100 u/mL, 10 mL

6.1.2. Oral antidiabetic drugs

ก	(1) glibenclamide
ตัดออกจากบัญชีแล้ว	
ก	(2) metformin
tab. 500 mg.	
ก	(3) glipizide
tab 5 mg	
ง	(4) pioglitazone HCL
tab 15 mg	
6.2 Thyroid and antithyroid drugs	
6.2.1 Thyroid hormones	
ก	(1) thyroxine sodium (L- form)
tab. 100 mcg.	
6.2.2. Antithyroid drugs	
ก	(1) propylthiouracil
tab. 50 mg.	
6.3 Corticosteroids	
ก	(1) dexamethasone
inj. 4 mg/mL	
ก	(2) prednisolone
tab. 5 mg.	
6.4. Sex hormones	
6.4.1 Female sex hormones	
ก	(1) medroxyprogesterone acetate
inj. 150 mg/ 3 mL	
ก	(2) norethisterone
tab. 5 mg.	
ก	(3) conjugated estrogen
tab. 0.625 mg.	
7. Obstetrics , gynaecology, and urinary-tract disorders	
7.1 Drugs used in obstetrics	
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	
ก	(1) methylergometrine maleate
inj. 0.200 mg/ml , 1ml	
ก	(2) oxytocin
inj. 10 unit/mL, 1 ml	
7.1.2. Myometrial relaxants	
ก	(1) salbutamol sulfate
tab. 2 mg.	

n	(2) terbutaline sulfate
	inj. 0.5 mg / mL
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions	
n	(1) clotrimazole
	vag. Tab. 100 mg.
¶	(3) conjugated estrogen
	vaginal cream 0.625 mg estrogen , 14 g.
7.3 Contraceptives	
n	(1) ethinylestradiol + levonorgestrel
	tab. 0.03 mg. + 0.15 mg.
n	(2) medroxyprogesterone acetate
	sterile susp. 150 mg/3ml
n	(3) Etonogestrel : Implant 1 rod 68 mg/rod
7.4 Drugs for genito-urinary disorders	
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia	
♠	(1) doxazosin
	tab. 2 mg
8. Nutrition and blood	
8.1 Whole blood and blood product and drugs used in some blood disorders	
8.1.1 Drugs used in hypoplasia,hemolytic and renal anemias	
n	(1) Folic acid
	tab. 5 mg
8.2 Fluids and electrolytes	
n	(1) Potassium chloride
	Elixir 1.3 mEq/ml
	inj. 1.5 g / 10 mL (20 mEq)
n	(2) sodium bicarbonate
	inj. 7.5 % 50 mL
	tab 300 mg
n	(3) glucose 50 %
	inj. 20 mL , 50 mL
n	(4) 5% D/NSS
	inj. 500mL , 1,000 mL
n	(5) 5% D/N/2
	inj. 500 mL , 1,000 mL
n	(6) 5% D/W
	inj. 100 mL , 500 mL
n	(7) NSS

	inj. 100 mL , 1,000 mL
n	(8) 5% D/N/3
	inj. 500 mL
n	(9) 5% D/N/5
	inj. 500 mL
n	(10) Ringer's lactate solution
	inj. 1,000 mL
n	(11) water for injection
	inj. 5 mL , 10 mL, 1000 ml
NED	(12) sodium chloride
	cap 300 mg
၅	(13) calcium polystyrene sulfonate
	oral powder 5 g
8.3 Vitamins	
n	(1) multivitamin (100 mg+0.5 mg+1 mg+100 mg)
	tab. A + D + B1 + B2 + C + nicotinamide
	(2,500 iu. + 300 iu. + 1.0 mg. + 0.5 mg. + 15.0 mg. + 7.5 mg.)
	dry syr. 60 ml (A+D+C+B1+B2+B6+B12+calcium folic nicotinamide+E)
	(1990 iu+150 iu+35 mg+1 mg+1 mg+1 mg+2.5 mcg+5 mg+0.1 mg+10 mg+7.5 mg)
n	(2) vitamin B complex (B ₁ +B ₂ +B ₆ +nicotinamide)
	tab 5 mg+2 mg+2 mg+20 mg
	inj. 1 mL
n	(3) vitamin B ₆ (pyridoxine)
	tab. 50 mg.
n	(4) vitamin C
	tab. 100 mg.
n	(5) vitamin K ₁ (phytomenadione)
	Inj. 1 mg/0.5 ml
n	(6) folic acid
	tab. 5 mg
n	(7) ferrous salt+folic acid+potassium iodine (Triferdine 150)
	tab (၆၃၇၁၁ 60 mg as iron+400 mcg+150 mcg as iodine)
n	(8) potassium iodide (Iodine GPO 150)
	tab (၆၃၇၁၁ 150 mcg as iodine)
8.4 Minerals	
n	(1) calcium carbonate
	tab. 1000 mg.
n	(2) ferrous fumarate

ก	(1) Chloramphenical
	eye drop
ค	(2) Polymycin B+ Neomycin + Gramicidine (Poly-oph)
	eye drop
NED	(9) Oxytetracycline hydrochloride+polymyxin B Sulfate
	eye oint ใช้เฉพาะห้องฉุกเฉิน ไม่จ่ายกลับบ้าน
10.1.2 Antibacterials with corticosteroids	
ค	(1) Dexamethasone + Neomycin
	eye drop
10.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	
ก	(1) Antazoline hydrochloride+ tetrahydrozoline hydrochloride (Hista- oph)
	eye drop
10.3 Local anesthetics	
ก	(1) tetracaine hydrochloride
	eye drop
10.4 Tear deficiency	
ก	(1) atificial tears
	eye drop
11. Ear, Nose, Oropharynx and oral carvity	
11.1 Drugs acting on the ear	
ก	(1) Chloramphenical
	ear drop
ก	(2) Sodium bicarbonate
	ear drop
11.2 Drugs acting on the nose	
11.2.1 Drugs used in nasal allergy	
NED	(1) triamcinolone acetonide
	inj. Susp 10 mg/ml, 5 ml
11.2.2 Topical nasal decongestants	
ข	(1) oxymetazoline hydrochloride
	nasal drop
11.2.3 Antiseptics for root canal treatment	
ก	(1) sodium hypochlorite
	0.5 % sol
12. Skin	
12.1 Anti-infective skin preparation	
12.1.1 antibacterial preparation	

ก	(1) Sulfadiazine silver
	cream
12.2 antifungal preparation	
ก	(1) Clotrimazole
	cream 10 g
12.3 Parasiticial preparation	
ก	(1) bebzyl benzoate
	lotion 25%
12.3 Emollient and barrier preparation	
ก	(1) Olive oil
	oil 450 ml
ก	(2) Urea
	cream 5 g เภสัชตำรับ รพ.
12.4 Toppical anti pruritics	
ก	(1) Calamine
	lotion 60 mL
12.5 Toppical corticosteroids	
ก	(2) Clobetasol propionate
	cream 0.05% 5 g ,15 g
ก	(3) Bethamethsone valerate
	cream 0.5 % 5 g
ก	(4) triamcinolone acetoneide
	lotion 0.1 % 30 ml
	cream 0.02 % 5 g
12.6 Other preparations for psoriasis	
ก	(1) tar shampoo
	120 ml เภสัชตำรับ รพ.
12.7 preparation for warts and calluuses	
ข	(1) Salicylic acid + Lactic acid (Collomak)
	solution
13. Immunological products and vaccines	
ก	(4) BCG (Bacillus Calmette - Gue'rin)
	inj.
ก	(5) diphtheria - tetanus - pertussis vaccine (DTP)
	inj.
ก	(6) hepatitis B vaccine (HB)
	inj.
ก	(7) japanese encephalitis vaccine (JE)

	inj.	
ก	(8) measles -mump-rubella vaccine (MMR)	
	inj.	
ก	(9) poliomyelitis vaccine (OPV)	
	(live attenuated)	
	oral solution	
ก	(10) Inactivate poliomyelitis vaccine (IPV)	
	inj.	
ก	(11) rabies vaccine	
	inj.	
ก	(12) tetanus vaccine	
	inj.0.5 ml,5 ml	
ก	(13) diphteria+tetanus+pertussis+hepatitis B (DHB)	
	inj.	
ก	(14) diphteria+tetanus (dT)	
	inj.	
ก	(15) influenza vaccine	
	inj.	
14. Anesthesia		
14.1 General anesthesia		
14.1.2 Intravenous anesthetics		
ง	(1) ketamine hydrochloride	
	inj.50 mg/ml	
14.1.3 Sedative and analgesic peri-operative drugs		
ก	(1) diazepam	
	tab. 2 mg. , 5 mg.	
	inj. 10 mg / 2 mL	
ค	(2) morphine sulfate	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 10 mg /mL	
ค	(3) pethidine hydrochloride	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 50 mg / mL	
ง	(4) midazolam maleate	
	tab. 15 mg	
14.1.4 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia		
ก	(1) atropine sulfate	ใช้แก้ฤทธิ์ยาหยอนกล้ามเนื้อ
	inj.	
14.2 Local anesthesia		
ก	(1) lidocaine hydrochloride	

	inj. 2% spray 10 %
ก	(2) lidocaine +adrenaline (ทันตกรรม)
	dental catridge 2% + 1:100,000
	inj. 1% + 1: 100,000
15. Antidotes	
ก	(1) acetylcysteine (แก้พิษ paracetamol เกินขนาด)
	inj. 300 mg / 3 mL
ก	(2) atropine sulfate (แก้พิษ insecticides , organophosphate, cholinesterase , และ cholinergic agent เช่น เห็ดพิษ neostigmine, pilocapin)
	inj. 0.6 mg/mL
ก	(3) charcoal, activated (ใช้ดูดซับสารพิษ)
	powder 50 g.
ก	(4) calcium Gluconate (แก้พิษ ที่เกิดจากยา calcium channel blocker)
	inj 10 %
ก	(5) diazepam (บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา หรือสารพิษ)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(6) naloxone hydrochloride (บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(7) sodium bicarbonate (บำบัดภาวะ hyperkalemia)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(8) vitamin K ₁ (บำบัดพิษจากยา anticoagulants)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(9) vitamin B ₆ (บำบัดพิษจากยา isoniazid และ เห็ดสมองวัว)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(10) Anti - snake venom - Cobra
	inj.
ก	(11) Anti - snake venom - Russell 's viper
	inj.
ก	(12) Anti - snake venom - Malayan pit viper
	inj.
16. Miscellaneous (ยาสมุนไพร)	
1. ยามมะแว้ง	
2. เสดดพังพอน ครีม	
และรายการดังต่อไปนี้ส่งจ่ายได้เฉพาะแพทย์แผนไทยเท่านั้น โดยจะออกตรวจเฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08:30-09:30 น.	
1. ขมิ้นชัน แคปซูล	
2. ฟ้าทะลายโจร แคปซูล	
3. ยาหอมเทพจิตร (ชง)	
4. เพชรสังฆาต แคปซูล	

5. ประสะไพล (แคปซูล)
6. ชาขงชุมเห็ดเทศ
7. เถาวัลย์เปรียง แคปซูล
8. มะขามแขก (แคปซูล)
9. ยาบัวบก (ชาขง)
10. แก้วไอมะขามป้อม (ยาน้ำ)
11. ยาประคบ
12. ยาหญ้ำดอกขาว (ชาขง)
13. ยาหอมนวโกฐ (ยาผง)
14. ยาธรณีสังฆฆาต (ยาแคปซูล)
15. ยาขิง (แคปซูล)
16. ยาเล็อดงาม (แคปซูล)
17. ยาเช็ยวหอม (แคปซูล)
18. ยาจันทน์ลีลา (แคปซูล)
19. ยาปราบชมพู่ทวี่ป (แคปซูล)
20. ยาบำรุงโลหิต (แคปซูล)
21. ยาสหัสธรรวา (แคปซูล)
22. ยาเปล็อกม้งคุด (การซี่ด้น) ยาน้ำไล 30 ml
23. กลีเซอรินพญาอย 10 ml
24. ยาหญ้ำหนดแมว (ชาขง)
25. ยามะระขี้นก (แคปซูล)
26. กระเจ็ยบแดง (ชาขง)
27. ซ่อย (ยาอม)
28. บอระเพ็ด (แคปซูล)
29. ไพล ซั้งฝ้ง
30. ไพล ครีม
31. ไพล น้ำมัน
32. ยาหอมบำรุงหัวใจ (ยาขง)
33. ยารวงจี้ด (ยาขง)
34. ยาอบสมุนไพร