หมวดตัวชี้วัด		Chronic Disease
ประเภทตัวชี้วัด		HIV
รหัสตัวชี้วัด		DC0307
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		HIV: Percentage of People Living with HIV Newly Registered who were Tested
		for Syphilis
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ		1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
ตัวชี้วัด		Principal Diagnosis (Pdx) เป็นผู้ป่วย/ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
		ยืนยันแล้วว่า HIV Positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
		2. การตรวจคัดกรองซิฟิลิส มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาโรคซิฟิลิสโดยการตรวจเลือด
		สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด (Syphilis Serologist Screening Tests) ประกอบด้วย
		การตรวจ 2 ชนิด คือ
		2.1 Non-treponemal Test : VDRL, RPR
		2.2 Treponemal Test : TPHA, TPPA, FTA-ABS
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ HIV
สูตรในการคำนวณ		(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทีรายใหม่ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส ในรอบปี
		รายงาน
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั้งหมด ในรอบปีรายงาน
รหัสโรค/ หัตถการ	ตัวตั้ง	Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21, A51
ที่เกี่ยวข้อง	ตัวหาร	Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด		ร้อยละ
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *		(ระดับประเทศ ปี 2553-2556 เฉลี่ย 92.71%)
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference		HIVQUAL-T
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้		1 ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		1 ตุลาคม 2560
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		