


| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| หมวดตัวชี้วัด | Cardiovascular Disease (Heart disease) | |
| ประเภทตัวชี้วัด | Acute Myocardial Infarction (AMI) | |
| รหัสตัวชี้วัด | DH0105 | |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย) | อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะนำให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล | |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ) | AMI: Smoking Cessation Advice Given | |
| นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด | <p>1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี Principal Diagnosis (Pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้</p> <p>2. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับการแนะนำให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่มีประวัติสูบบุหรี่ภายใน 1 ปีก่อนได้รับการตรวจรักษาและรับไว้ในโรงพยาบาล ได้รับการคำแนะนำ/Counseling ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อภาวะของโรคที่เป็น เพื่อให้ผู้ป่วยงดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล และแนะนำให้ลดหรือเลิกบุหรี่ต่อไป</p> | |
| วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด | ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI | |
| สูตรในการคำนวณ | $(a/b) \times 100$ | |
| ข้อมูลที่ต้องการ | ตัวตั้ง | a = จำนวนผู้ป่วย AMI ที่สูบบุหรี่ที่ได้รับการแนะนำให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล ในเดือนนั้น |
| | ตัวหาร | b = จำนวนผู้ป่วย AMI ที่สูบบุหรี่ทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาล ในเดือนเดียวกันนั้น |
| รหัสโรค/ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวตั้ง | Pdx = I21 - I22 |
| | ตัวหาร | Pdx = I21 - I22 |
| ความถี่ในการจัดทำข้อมูล | ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน) | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |
| Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) * | U.S.A. 2005 = 92.1 | |
| วิธีการแปลผล | ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี  | |
| ที่มา/ Reference | THIP I | |
| วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้ | 1 ตุลาคม 2557 | |
| วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | | |
| เหตุผลของการปรับปรุง | | |
| หมายเหตุ | | |