## ประเภท DN03 Head Injury

| หมวดตัวชี้วัด                       |         | Neurovascular disease  |
|-------------------------------------|---------|--|
| ประเภทตัวชี้วัด                     |         | Head injury  |
| รหัสตัวชี้วัด                       |         | DN0301   |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)             |         | อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Craniotomy โดยมีสาเหตุจากการบาดเจ็บที่            |
|                                     |         | ศรีษะ ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน   |
| ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)          |         | Head injury: Unplanned Re-admission Rate of Craniotomy from Head Injury                  |
|                                     |         | within 28 Days after Last Discharge  |
| นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ          |         | 1. ผู้ป่วยที่ทำ Craniotomy หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล     |
| ตัวชี้วัด                           |         | (admit) ≥4 ชั่วโมง) ที่มี Principal Diagnosis (Pdx) เป็นโรคบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งจำเป็นต้อง |
|                                     |         | ได้รับการทำ Craniotomy โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้         |
|                                     |         | 2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ทำ Craniotomy ภายใน 28 วัน หมายถึง ผู้ป่วย        |
|                                     |         | ที่ทำ Craniotomy ที่รับกลับเข้าโรงพยาบาลหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลภายใน 28 วัน              |
|                                     |         | โดยไม่ได้วางแผน  |
|                                     |         | 3. การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผู้ป่วยที่ทำ Craniotomy ที่จำหน่ายมีชีวิต           |
|                                     |         | ออกจากโรงพยาบาล ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve) ยกเว้น                  |
|                                     |         | ผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน                         |
| วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด            |         | ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ที่ทำ Craniotomy                 |
| สูตรในการคำนวณ                      |         | (a/b) x 100  |
| ข้อมูลที่ต้องการ                    | ตัวตั้ง | a = จำนวนผู้ป่วยที่ทำ Craniotomy ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน              |
|                                     |         | ภายใน 28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล   |
|                                     | ตัวหาร  | b = จำนวนผู้ป่วยที่ทำ Craniotomy ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในเดือนก่อนหน้านั้น           |
| รหัสโรค/ หัตถการ                    | ตัวตั้ง | Procedure = 01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53,           |
| ที่เกี่ยวข้อง<br>-                  |         | 01.59, 02.01, 02.03-02.06, 02.11-02.12, 02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53,          |
|                                     |         | 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53                       |
|                                     | ตัวหาร  | Procedure = 01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53,           |
|                                     |         | 01.59, 02.01, 02.03-02.06, 02.11-02.12, 02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53,          |
|                                     |         | 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53                       |
| ความถี่ในการจัดทำข้อมูล             |         | ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)   |
| หน่วยวัด                            |         | ร้อยละ   |
| Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *      |         |  |
| วิธีการแปลผล                        |         | ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี 🥒   |
| ที่มา/ Reference                    |         | THIP I   |
| วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้            |         | 1 ตุลาคม 2557  |
| วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด |         |  |
| เหตุผลของการปรับปรุง                |         |  |
| หมายเหตุ                            |         |  |

