



Faiblesse musculaire

Par **Mark Freedman**, MD, MSc, University of Ottawa

Reviewed By **Michael C. Levin**, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan

Vérifié/Révisé août 2025

La faiblesse musculaire est une des raisons les plus fréquentes de consultation chez le médecin généraliste. Une faiblesse musculaire est un déficit moteur, mais de nombreux patients utilisent aussi le terme de faiblesse pour désigner une fatigue générale ou lorsqu'ils ont une impotence fonctionnelle d'autre origine (p. ex., due à la douleur ou à une limitation du mouvement des articulations) alors que leur force musculaire est normale.

Le déficit peut affecter un plus ou moins grand nombre de muscles et se développer brutalement ou progressivement. D'autres symptômes peuvent être présents en fonction de la cause. La faiblesse de groupes musculaires spécifiques peut causer des troubles de la motricité oculaire, une dysarthrie, une dysphagie ou une défaillance respiratoire.

Physiopathologie de la faiblesse

Le mouvement volontaire est initié dans le cortex moteur, à la limite postérieure du lobe frontal. Les neurones impliqués (motoneurones centraux ou neurones de la voie corticospinale ou voie pyramidale) font synapse avec des neurones de la moelle épinière (motoneurones inférieurs). Les motoneurones inférieurs transmettent l'influx nerveux à la jonction neuromusculaire pour déclencher la contraction musculaire.

Les principaux mécanismes d'un déficit moteur sont donc un dysfonctionnement des:

- Motoneurones centraux (lésions des voies corticospinale et corticobulbaire)
- Motoneurones inférieurs (p. ex., au cours d'une polynévrite périphérique ou par atteinte des cellules de la corne antérieure de la moelle)
- Jonction neuromusculaire
- Musculaire (p. ex., dues à des myopathies)

Certains signes cliniques permettent de situer le niveau des lésions:

- **L'atteinte de la voie pyramidale** désinhibe les motoneurones inférieurs, entraînant une augmentation du tonus musculaire (spasticité) et une exagération des réflexes d'étirement (hyperréflexie). Un réflexe cutané plantaire en extension (signe de Babinski) est spécifique d'une atteinte de la voie corticospinale. Cependant, une dysfonction du motoneurone

supérieur peut réduire le tonus et les réflexes si la paralysie motrice est soudaine et sévère (p. ex., en cas de transection de la moelle, dans laquelle le tonus diminue d'abord, puis augmente progressivement au cours des jours à quelques semaines suivantes) ou en cas de lésions du cortex moteur du gyrus précentral et non des régions d'association motrices situées à proximité. La distribution de la faiblesse tend à suivre une distribution de type motoneurone supérieur, affectant principalement les extenseurs des membres supérieurs et les fléchisseurs des membres inférieurs.

- **L'atteinte du motoneurone inférieur** interrompt l'arc réflexe du réflexe myotatique, provoquant une hyporéflexie et une diminution du tonus musculaire (flaccidité), peut provoquer des fasciculations; et, avec le temps, une atrophie musculaire (amyotrophie).
- Les **polyneuropathies périphériques** tendent à affecter principalement les nerfs les plus longs (c'est-à-dire, que la faiblesse est plus prononcée dans la partie distale que proximale du membre et plus prononcée au niveau des jambes que des bras) et produisent des signes de dysfonctionnement des motoneurones inférieurs (p. ex., une diminution des réflexes et du tonus musculaire).
- La cause la plus fréquente **d'atteinte de la jonction neuromusculaire**, la [myasthénie](#), provoque typiquement un déficit fluctuant qui s'aggrave à l'effort et s'atténue au repos.
- Les **déficits musculaires diffus** (p. ex., en cas de myopathies) tendent à prédominer sur les groupes musculaires les plus gros (muscles proximaux).

Étiologie de la faiblesse

Les nombreuses causes de déficit moteur sont classées selon la localisation de la lésion (voir tableau [Certaines causes de faiblesse musculaire](#)). Habituellement, chaque localisation lésionnelle se manifeste par des signes caractéristiques. Cependant, dans certaines maladies, les lésions sont plurifocales. Par exemple, la [sclérose latérale amyotrophique](#) (SLA) peut donner des signes à la fois des motoneurones centraux et périphériques. Les lésions de la moelle épinière peuvent affecter la voie pyramidale et/ou les motoneurones spinaux (les cellules de la corne antérieure).

Les causes fréquentes de **déficit moteur focal** comprennent les suivantes:

- [Accident vasculaire cérébral](#) (cause la plus fréquente d'hémiplégie)
- [Neuropathies](#), y compris celles d'origine traumatique ou compressive (p. ex., [syndrome du canal carpien](#)) ou à médiation immunitaire (p. ex., [paralysie de Bell](#))
- Compressions radiculaires (p. ex., [hernie discale](#))
- [Compression de la moelle épinière](#) (p. ex., spondylose cervicale, métastase épidurale, traumatisme)
- [Sclérose en plaques](#)

Une **faiblesse focale temporaire** peut être due à une paralysie post-critique (paralysie de Todd), qui disparaît habituellement en plusieurs heures, ou bien elle peut être provoquée par un [accident](#)

ischémique transitoire (AIT). Une cause rare de faiblesse temporaire est la paralysie périodique, souvent causée par des changements dans les concentrations de potassium.

Les causes les plus fréquentes de **déficit musculaire diffus** sont les suivantes:

- Déconditionnement dû à l'inactivité (amyotrophie de non-utilisation) résultant de la maladie ou de la fragilité, en particulier chez la personne âgée
- Fonte musculaire généralisée due à une immobilisation prolongée en unité de soins intensifs (USI) (appelée myopathie des maladies critiques)
- Neuromyopathie de réanimation (neuropathie d'USI)
- Myopathies fréquentes (p. ex., myopathie alcoolique, hypokaliémie, myopathie induite par les glucocorticoïdes)

TABLEAU		
Certaines causes de faiblesse musculaire		
Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*,†
Lésions des motoneurones cérébraux		
<u>Tumeurs cérébrales</u> <u>Sclérose en plaques</u> <u>Accident vasculaire cérébral</u>	Augmentation du tonus musculaire, hyperréflexie, réflexe cutané plantaire en extension (signe de Babinski) Hypertonie et difficulté aux mouvements fins (dextérité manuelle) parfois plus marqués que le déficit moteur (serrage de la main)	Imagerie cérébrale par TDM ou IRM Pour la sclérose en plaques: IRM du cerveau et de la moelle épinière cervicale et thoracique (pas de TC); parfois ponction lombaire
Myélopathies (atteignant la voie pyramidale et/ou les motoneurones spinaux)		
Maladies auto-immunes (p. ex., sclérose en plaques, <u>neuromyélite optique</u> , trouble associé à la glycoprotéine de la myéline-oligodendrocyte (MOGAD), <u>vascularite</u>) Syndrome de la queue-de-cheval	Dysfonctionnement des motoneurones supérieurs et/ou inférieurs Généralement, dysfonction érectile, incontinence ou rétention intestinale et vésicale, absence de réflexes sphinctériens (p. ex.,	IRM médullaire et/ou myélo-TDM Potentiels évoqués somesthésiques D'autres examens sont nécessaires pour identifier la cause: ils peuvent comprendre une analyse du liquide

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*,†
<u>Carence en cuivre</u> Infections (p. ex., <u>HTLV-1</u>, <u>infection par le VIH</u>, <u>syphilis</u>, <u>virus herpes simplex humain 6</u>, <u>infection par l'EBV</u>, <u>varicelle-zona</u>) <u>Compression de la moelle épinière</u> (p. ex., due à une arthrose, une tumeur épidurale, un hématome ou un abcès) <u>Ischémie ou infarctus de la moelle épinière</u> Ataxies spinocérébelleuses Dégénérescence subaiguë combinée <u>Myélite transverse</u>	réflexe anal, bulbocaverneux) Apparition progressive d'un déficit moteur, d'une fatigabilité, d'une maladresse et d'une spasticité des membres (atteignant d'abord les membres inférieurs puis les membres supérieurs en cas de compression médullaire lente) Classiquement, le niveau du dermatome sensoriel	céphalorachidien (p. ex., protéines, VDRL, indice d'IgG, bandes oligoclonales, titres viraux, PCR), le taux de vitamine B12, le test du VIH, AAN, RPR, MOG-IgG autoantibody et auto-anticorps NMO-IgG (anti-aquaporine-4 antibody), HTLV-1 ou VDRL, tests génétiques, cuivre sérique, et céruléoplasmine
Maladies du motoneurone (supérieur et/ou inférieur)		
<u>Sclérose latérale amyotrophique</u> <u>Maladies héréditaires du motoneurone</u> (p. ex., amyotrophies spinales dont le syndrome de Kennedy, atrophies spinocérébelleuses) <u>Syndrome post-poliomyélitique</u> <u>Paralysie bulbaire progressive</u> Troubles viraux de type polio	Déficit moteur, fatigabilité, maladresse et spasticité d'apparition progressive (motoneurones supérieurs) Hyporéflexie ou hypotonie (motoneurones inférieurs) Amyotrophie (motoneurone inférieur) Fasciculations (motoneurone inférieur) Gynécomastie, diabète et atrophie testiculaire (syndrome de Kennedy)	Électromyographie, IRM cérébrale et de la moelle épinière, et/ou myélo-TDM D'autres examens sont nécessaires pour identifier la cause: dosage des métaux lourds dans les urines de 24 heures pour éliminer une neuropathie due au plomb, dosage des anticorps anti-GM1 (pour détecter une neuropathie motrice multifocale) et des tests génétiques (p. ex., pour identifier un syndrome de Kennedy)

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*,†
<u>Polynévrites</u> (principalement des polynévrites périphériques)†,‡		
Neuropathie alcoolique Neuromyopathie de réanimation Neuropathies démyélinisantes (p. ex., <u>polynévrite démyélinisante inflammatoire chronique</u>, <u>syndrome de Guillain-Barré</u>) <u>Neuropathie diabétique</u> Neuropathies induites par les médicaments (p. ex., par la vincristine, la cisplatine ou les statines) <u>Neuropathies héréditaires</u> Neuropathies infectieuses (p. ex., <u>diphtérie</u>, <u>hépatite C</u>, <u>VIH</u>, <u>maladie de Lyme</u>, <u>syphilis</u>) Neuropathie motrice multifocale <u>Sarcoïdose</u> Neuropathies toxiques (p. ex., métaux lourds) Carences vitaminiques (p. ex., <u>thiamine</u>, <u>vitamine B6</u>, <u>vitamine B12</u>)	Hyporéflexie, parfois fasciculations Si chronique, atrophie musculaire Dans les polynévrites périphériques, on observe souvent un déficit moteur à prédominance distale et un déficit sensitif de même topographie (en chaussette ou en gant) (parmi les exceptions à cette règle il faut citer la polynévrite démyélinisante inflammatoire chronique qui affecte au même degré les extrémités et les racines)	Examens visant à confirmer le diagnostic de neuropathie: examens électrophysiologiques D'autres examens sont nécessaires pour identifier la cause: dont glycémie, test d'hyperglycémie provoquée par voie orale de 2 heures, hémoglobine A1C, RPR, sérologie VIH, folates, vitamine B12, électrophorèse et immunofixation des protéines sériques, TDM du thorax et taux sérique d'ECA (pour la sarcoïdose), recherche de métaux lourds dans les urines de 24 heures, anticorps anti-MAG (présents dans certaines neuropathies démyélinisantes), anticorps anti-GM1 (pour détecter une neuropathie motrice multifocale) et des tests génétiques (pour les neuropathies héréditaires) Parfois, analyse du liquide céphalorachidien
<u>Atteintes de la jonction neuromusculaire</u>		
<u>Botulisme</u> <u>Syndrome de Lambert-Eaton</u>	Déficit d'intensité fluctuante (p. ex., dans la myasthénie ou le	Examens visant à confirmer le mécanisme: examens électrophysiologiques

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*,†
<u>Myasthénie</u> Paralysie due aux tiques	syndrome de Lambert-Eaton) Signes bulbaires souvent marqués (p. ex., dans la myasthénie, le botulisme ou l'intoxication par les organophosphorés) Parfois, hyporéflexie (p. ex., dans le syndrome de Lambert-Eaton ou la paralysie par morsure de tique)	D'autres tests sont nécessaires pour identifier la cause: y compris éventuellement des tests de recherche de toxines et des anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine et un test du sac de glace (pour la myasthénie)
<u>Intoxication par les organophosphorés ou les carbamates</u>	Lacrimation, vision trouble, augmentation de la salivation, sudation, toux, vomissements, selles et mictions fréquentes, fasciculations Parfois hyporéflexie	Souvent l'anamnèse et l'examen clinique seuls Parfois, des examens sanguins pour identifier la toxine
Myopathies		
Myopathie alcoolique Canalopathies Myopathie cortisonique <u>Syndrome de Cushing</u> <u>Maladies musculaires héréditaires</u> (p. ex., dystrophies musculaires) <u>Hypocalcémie</u> <u>Hypokaliémie</u> <u>Hypomagnésémie</u> <u>Hypophosphatémie</u> Myopathie hypothyroïdienne	Déficit musculaire à prédominance proximale (de manière égale) Si chronique, fonte musculaire Dans certains types de myopathie, sensibilité musculaire à la pression	Tests pour confirmer le mécanisme: examens électrophysiologiques, enzymes musculaires (p. ex., CK, aldolase) et parfois IRM pour confirmer une atrophie, une hypertrophie ou une pseudo-hypertrophie musculaire D'autres tests sont nécessaires pour identifier la cause: dont éventuellement une biopsie musculaire avec des colorations spéciales et des tests génétiques

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*,†
Myopathies métaboliques <u>Polymyosite ou dermatomyosite</u> <u>Rhabdomyolyse</u> Myopathie induite par les statines Myopathie thyrotoxique Myosite virale		pour certains troubles héréditaires, les électrolytes sériques (en particulier le calcium, le potassium, le magnésium et le phosphate), la TSH sérique et les titres d'herpes zoster (zona)
Fonte musculaire généralisée due à la maladie et à l'immobilisation (atrophie de non-utilisation)		
<u>Brûlures</u> <u>Cancer</u> Alitement prolongé <u>Sepsis</u> Dénutrition, cachexie	Atrophie musculaire diffuse, conservation de la sensibilité et des réflexes, pas de fasciculations Facteurs de risque cliniquement évidents	L'anamnèse et l'examen clinique seuls
* L'examen clinique est toujours effectué mais n'est mentionné dans cette colonne que lorsqu'il peut être le seul moyen de diagnostic. † Les tests sont variables; des examens complémentaires peuvent être indiqués selon les hypothèses diagnostiques. ‡ Une multinévrite (mononévrite multiple), si elle est très étendue, peut provoquer un déficit impossible à distinguer cliniquement de celui d'une polynévrite diffuse. ECA = enzyme de conversion de l'angiotensine; AAN = anticorps antinucléaires; anti-GM1 = anti-ganglioside monosialique; anti-MAG = glycoprotéine associée à la myéline; CIDP = polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique; CK = créatine kinase; LCR = liquide céphalorachidien; EBV = virus d'Epstein-Barr; HTLV = virus T-lymphotrope humain; MOG = glycoprotéine myéline-oligodendrocyte, NMO-IgG = anticorps anti-neuromyérite optique; RPR = réagine plasmatique rapide; TSH = hormone thyroïdienne; VDRL = Venereal Disease Research Laboratory.		

Fatigue

Il ne faut pas prendre pour un déficit moteur la sensation de faiblesse ressentie par des patients qui sont en réalité fatigués. La fatigue peut gêner le testing musculaire en empêchant le patient de produire une contraction maximale.

Les causes fréquentes de fatigue comprennent pratiquement toutes les maladies aiguës, les cancers, les infections chroniques (p. ex., infection par le VIH, hépatite, endocardite, mononucléose), les troubles endocriniens, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque et l'anémie. La sclérose en plaques peut être cause d'une fatigue quotidienne qui augmente avec l'exposition à la chaleur et à l'humidité.

Les patients atteints de fibromyalgie, de dépression ou d'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique peuvent signaler une faiblesse ou de la fatigue, mais ne présentent pas d'anomalies objectives définies.

Évaluation d'une faiblesse

L'évaluation de la faiblesse doit distinguer la réelle faiblesse musculaire de la fatigue, puis elle doit rechercher les signes qui permettent de déterminer son site et son mécanisme (p. ex., déterminer si elle est provoquée par un dysfonctionnement cérébral, de la moelle épinière, des plexus, des nerfs périphériques, de la jonction neuromusculaire ou des muscles) et, lorsque cela est possible, la cause.

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit commencer par des questions ouvertes, demandant au patient de décrire exactement ce qu'il entend par "faiblesse musculaire". On posera ensuite des questions plus précises, afin de déterminer la nature des tâches que le patient a du mal à accomplir, dont le brossage des dents ou des cheveux, avaler, se lever d'une chaise, monter les escaliers ou marcher.

Les cliniciens doivent également s'enquérir du mode d'apparition de la faiblesse (soudain ou progressif), si elle varie au cours de la journée (variation diurne comme dans la myasthénie grave) et de la progression (p. ex., constante, aggravante, intermittente) des symptômes. Il faut parfois un interrogatoire précis pour savoir si les symptômes sont apparus subitement ou si c'est le patient qui en a pris subitement conscience; même quand le déficit se constitue progressivement, il arrive que le patient ne s'en rende compte que lorsqu'une tâche usuelle devient impossible (p. ex., marcher, attacher les lacets).

Il faut penser à rechercher des symptômes associés importants comme des troubles sensitifs, une diplopie, des pertes de mémoire, des troubles du langage, des convulsions et des céphalées. On recherchera des facteurs aggravant le déficit, tels que la chaleur (suggérant une sclérose en plaques) ou la répétition des efforts (suggérant une myasthénie).

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes évoquant une cause possible dont:

- Fatigue quotidienne et faiblesse augmentant avec la chaleur et l'humidité: [sclérose en plaques](#)
- Variation diurne de la fatigue et de la faiblesse: [myasthénie](#)
- Éruption cutanée: [dermatomyosite](#), [maladie de Lyme](#) ou [syphilis](#)
- Fièvres: infection chronique
- Douleurs musculaires: myosite
- Douleur du cou: [myélopathie cervicale](#)
- Vomissements ou diarrhée: [botulisme](#)
- Essoufflement: [insuffisance cardiaque](#), trouble pulmonaire ou [anémie](#)
- Anorexie et perte de poids: cancer ou autre maladie chronique
- Changement de couleur de l'urine: [porphyrie](#) ou troubles hépatiques ou rénaux
- Intolérance à la chaleur ou au froid: trouble thyroïdien
- Humeur dépressive, manque de concentration, anxiété et perte d'intérêt pour les activités habituelles: [troubles de l'humeur](#)

L'**anamnèse** doit identifier les troubles connus pouvant causer une faiblesse ou une fatigue, dont les suivants:

- Troubles thyroïdiens, hépatiques, rénaux ou surrénaliens
- Cancer ou facteurs de risque de cancer ([syndromes paranéoplasiques](#), p. ex., syndrome d'Eaton-Lambert) tels que tabagisme important
- Arthrose (myélopathie cervicale)
- Infections

Il faut rechercher les facteurs de risque exposant aux infections (p. ex., rapports sexuels non protégés, transfusions sanguines, contagé tuberculeux) ou aux accidents vasculaires cérébraux (p. ex., HTA, fibrillation auriculaire, athérosclérose).

L'anamnèse médicamenteuse doit être vérifiée.

Dans les antécédents familiaux on notera les maladies héréditaires connues (p. ex., les [myopathies héréditaires](#), les [canalopathies](#), les myopathies métaboliques, les [neuropathies héréditaires](#)) et la présence de symptômes similaires chez d'autres membres de la famille (suggérant une possible affection héréditaire méconnue). Les neuropathies motrices héréditaires passent souvent inaperçues dans certaines familles en raison d'une expression phénotypique variable ou incomplète. Des orteils en marteau, des pieds creux et des résultats sportifs médiocres peuvent orienter vers une neuropathie motrice héréditaire méconnue.

L'**anamnèse sociale** doit noter les points suivants:

- La consommation d'alcool: fait évoquer une myopathie alcoolique
- La consommation de drogues illicites: fait évoquer un risque accru de VIH, d'infections bactériennes, de tuberculose, ou d'accident vasculaire cérébral dû à la consommation de

cocaïne

- Une exposition professionnelle ou autre à des toxines (p. ex., insecticides organophosphorés, métaux lourds, solvants industriels)
- Un voyage récent suggère la [maladie de Lyme](#), la [paralysie due aux tiques](#), la [diphtérie](#) ou une infection parasitaire
- Des facteurs de stress sociaux suggèrent une dépression

Examen clinique

Un examen neurologique et musculaire complet va rechercher des signes de localisation et des éléments d'orientation diagnostique. Les signes clés touchent habituellement:

- Les nerfs crâniens
- La fonction motrice
- La coordination
- La marche
- La sensibilité
- Les réflexes

L'examen des nerfs crâniens comprend l'inspection du visage à la recherche d'une asymétrie ou d'un ptôsis; une asymétrie faciale modérée peut être normale. Les mouvements oculaires et les muscles du visage, y compris les masséters (leur force), sont testés. Une voix nasonnée suggère une faiblesse du voile du palais; le réflexe nauséeux et l'inspection directe du voile sont moins utiles. Un déficit lingual se manifeste par l'impossibilité d'articuler clairement certaines consonnes (p. ex., ta-ta-ta) et une dysarthrie (une dysarthrie linguale). La protrusion de la langue peut se faire de façon légèrement asymétrique chez le sujet normal. Des fasciculations de la langue peuvent être observées chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) avancée. On teste les sternocléidomastoïdiens et les trapèzes en faisant tourner la tête et hausser les épaules au patient contre résistance. On lui fait faire des clignements répétés à la recherche d'une fatigabilité anormale des orbiculaires des paupières.

L'examen moteur comporte l'inspection, l'évaluation de tonus et le testing musculaire. On examine le tronc à la recherche d'une cyphoscoliose (qui peut indiquer un déficit chronique des muscles paravertébraux) et de cicatrices traumatiques ou chirurgicales. Une posture dystonique (p. ex., torticollis) peut perturber le mouvement et simuler un déficit. On inspecte les muscles pour rechercher des fasciculations et une atrophie; toutes deux peuvent débuter de manière focale ou asymétrique dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Une atrophie diffuse peut être plus apparente sur les mains, la face et la ceinture scapulaire. En cas de suspicion de myasthénie, on demande aux patients de regarder vers le haut pendant une période prolongée (quelques minutes), et l'on note si les paupières commencent à tomber.

Le tonus musculaire est évalué par la mobilisation passive. La percussion d'un muscle (p. ex., l'éminence hypothénar) peut induire des fasciculations en cas de neuropathie, ou un phénomène myotonique en cas de dystrophie myotonique.

Le **testing musculaire** doit explorer les muscles proximaux et distaux, les muscles extenseurs et fléchisseurs. Pour évaluer certains gros muscles proximaux, on demandera au patient de se lever d'un siège; ou de la position accroupie; et de tourner, de fléchir ou étendre la tête contre résistance.

La force motrice est habituellement étalonnée sur une échelle de 0 à 5:

- 0: pas de contraction musculaire visible
- 1: contraction musculaire visible sans mouvement des membres
- 2: mouvement des membres mais pas contre la pesanteur
- 3: mouvement possible contre la pesanteur mais pas contre résistance
- 4: faiblesse contre résistance
- 5: force normale

Bien que ces chiffres semblent objectifs, coter les déficits entre 3 et 5 (qui sont les niveaux habituels de début, lorsque le diagnostic est posé) est plutôt subjectif; si les symptômes sont unilatéraux, la comparaison avec le côté sain facilite la discrimination. Il est souvent plus utile de décrire le handicap fonctionnel du patient plutôt que de chercher à faire une cotation chiffrée du déficit, surtout pour apprécier l'évolution. Un déficit cognitif peut être responsable d'une impersistance motrice (incapacité à se concentrer pour accomplir une tâche motrice), de persévérations, d'une apraxie ou d'un effort incomplet. La simulation et autres déficits moteurs fonctionnels sont souvent caractérisés par un brusque relâchement de la contraction au cours du testing.

Les **tests de coordination** comprennent les manœuvres doigt-nez et talon-genou, ainsi que la marche talon-pointe en tandem, pour rechercher un dysfonctionnement cérébelleux, qui peut accompagner un accident vasculaire cérébral cérébelleux, une atrophie vermineuse (p. ex., due à une consommation excessive d'alcool), certaines [ataxies spinocérébelleuses héréditaires](#), la [sclérose en plaques](#) et la variante Miller Fisher du [syndrome de Guillain-Barré](#).

La **marche** est observée à la recherche des signes suivants:

- Démarrage raté (le sujet reste temporairement comme gelé sur place lorsqu'il commence à marcher, suivie d'une accélération involontaire de la démarche [festination]): [maladie de Parkinson](#)
- Apraxie, comme si les pieds étaient collés au sol: [hydrocéphalie à pression normale](#) ou autres troubles du lobe frontal
- Festination: maladie de Parkinson
- Asymétrie des membres, comme lorsque les patients traînent une jambe et/ou diminution du balancement des bras: accident vasculaire cérébral hémisphérique
- Ataxie: maladie cérébelleuse de la ligne médiane
- Instabilité lorsque le sujet se retourne: [parkinsonisme](#)

On fait marcher le sujet sur les talons et les pointes de pied; une faiblesse musculaire distale rend ces manœuvres difficiles. La marche sur les talons est particulièrement difficile en cas de syndrome pyramidal. La démarche spastique peut se faire en ciseaux (les membres inférieurs sont légèrement fléchis aux hanches et aux genoux, comme pour s'accroupir, les genoux et les cuisses se croisant à

chaque pas) ou sur les orteils (marche digitigrade). Une steppage (pied levé haut pour éviter de gratter l'orteil) et un pied tombant peuvent survenir en cas de paralysie du nerf péronier (fibulaire).

La **sensibilité** est testée; la topographie des déficits sensitifs indique le siège des lésions (p. ex., un niveau sensitif localise la lésion sur la moelle épinière) ou oriente vers certains diagnostics (p. ex., un trouble sensitif distal est compatible avec un syndrome de Guillain-Barré).

Des paresthésies et une sensation de pression en forme de bande sur le tronc, suivant la distribution d'un dermatome, sont un signe médullaire qui se produit avec des lésions intrinsèques (au sein de la moelle épinière, comme dans la sclérose en plaques) et extrinsèques. Les lésions extrinsèques peuvent provenir d'une tumeur, de sang, d'un abcès ou d'un disque vertébral séquestré.

Examen des réflexes. Si les réflexes tendineux profonds semblent absents, ils peuvent être déclenchés par augmentation avec la manœuvre de Jendrassik (p. ex., en demandant au patient d'essayer de séparer ses mains alors qu'elles sont jointes ensemble). L'hyporéflexie peut être normale pendant toute la vie et survenir chez le sujet âgé, mais dans ce cas, elle doit être symétrique et tous les réflexes doivent pouvoir être obtenus par les manœuvres de facilitation. Le réflexe plantaire (Babinski) est testé. Les réponses suivantes suggèrent certains troubles ou sites de lésions:

- Le classique signe de Babinski (extension lente et majestueuse du gros orteil avec écartement en éventail des autres orteils) est très spécifique d'une lésion de la voie pyramidale (sauf chez les nourrissons, où le réflexe est physiologique parce que le faisceau corticospinal est immature).
- Une hyperréflexie des 4 membres sans exagération du réflexe massétéren évoque une lésion de la moelle cervicale, habituellement une sténose cervicale.
- Le réflexe et/ou le tonus anal sont réduits ou absents en cas de lésion médullaire mais sont conservés en cas de paralysie ascendante due à un syndrome de Guillain-Barré.
- Les réflexes cutanés abdominaux sont abolis au-dessous du niveau d'une lésion de la moelle épinière (sauf dans la sclérose latérale amyotrophique où ils sont inexplicablement conservés).
- La conservation du réflexe crémastérien permet d'affirmer chez l'homme l'intégrité de la moelle lombaire haute et des racines correspondantes.

Le bilan comprend aussi:

- Une recherche de douleur à la percussion des épineuses (qui peut se voir en cas de lésions vertébrales inflammatoires ou de certaines tumeurs vertébrales ou d'abcès épidural)
- Une élévation de la jambe tendue (douloureuse en cas de sciatique)
- Le test d'un décollement scapulaire (indiquant une faiblesse des muscles de la ceinture scapulaire)

Examen général

L'examen général prend toute son importance chez les patients qui se plaignent de fatigue mais n'ont pas de déficit moteur évident; chez ces patients, des troubles non neuromusculaires doivent être recherchés.

On notera les signes d'insuffisance respiratoire (p. ex., tachypnée, respiration superficielle). La peau est examinée à la recherche d'un ictère, d'une pâleur, d'éruptions et de stries cutanées. On notera aussi le faciès lunaire du syndrome de Cushing, l'hypertrophie parotidienne, une peau lisse glabre, une ascite et des angiomes stellaires caractéristiques de l'alcoolisme chronique.

On palpe le cou, les aisselles et la région inguinale pour rechercher des adénopathies; toute thyroïdomégalie est notée.

L'auscultation du cœur et des poumons permet de détecter des râles crépitants ou sibilants, une bradypnée expiratoire, des souffles cardiaques ou un galop.

L'abdomen est palpé à la recherche de masses, dont une hypertrophie de la vessie si un dysfonctionnement de la moelle épinière est possible.

L'amplitude des mouvements est évaluée.

En cas de suspicion de [paralysie par morsure de tique](#), la peau et en particulier le cuir chevelu, doivent être inspectés soigneusement pour rechercher des tiques.

Signes d'alarme

En cas de faiblesse, les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Un déficit moteur qui s'aggrave en quelques jours ou moins
- Dyspnée
- Une incapacité à soulever la tête contre la pesanteur
- Des symptômes bulbaires (p. ex., difficulté de mastication, d'élocution et de déglutition)
- Perte de la marche
- Rétention ou incontinence urinaire ou incontinence fécale

Interprétation des signes

L'anamnèse aide à différencier une authentique faiblesse musculaire d'une fatigue, définit l'évolution de la maladie et oriente sur la localisation du déficit. Une faiblesse musculaire ne donne pas les mêmes symptômes qu'une asthénie:

- **Faiblesse musculaire:** l'impotence fonctionnelle porte généralement sur des tâches spécifiques. Les patients peuvent également rapporter une lourdeur des membres ou une rigidité. Un déficit moteur a généralement une topographie anatomique et/ou un déroulement temporel particulier. Des difficultés à travailler avec les bras au-dessus de la tête, à se brosser ou peigner les cheveux, à monter des escaliers ou à se lever d'un siège de toilette impliquent une faiblesse musculaire proximale.
- **Fatigue:** la fatigue décrite comme "faiblesse" n'évolue généralement pas dans le temps (p. ex., "fatigué tout le temps") et n'est pas localisée (p. ex., "asthénie globale"); les plaintes sont plus concentrées sur le fait d'être fatigué que d'être incapable d'exécuter des tâches spécifiques.

Il est important de connaître le **mode évolutif** des troubles.

- Un déficit moteur constitué en quelques minutes ou moins est généralement dû à un accident vasculaire ou à un traumatisme; en cas d'accident vasculaire cérébral, le déficit est habituellement unilatéral et est modéré ou sévère. L'apparition brutale d'un déficit moteur avec engourdissement et douleur au niveau d'un membre est caractéristique d'une ischémie aiguë locale, qui peut être confirmée par un bilan vasculaire (p. ex., pouls, couleur, température, temps de recoloration capillaire, différences de pression artérielle mesurée par doppler). La [compression de la moelle épinière](#) peut également provoquer une paralysie qui évolue en quelques minutes (mais habituellement en plusieurs heures ou jours) et se caractérise par une incontinence et l'existence d'un niveau sensitif et moteur métamérique précis.
- Un déficit rapidement progressif sur quelques heures ou quelques jours correspond à un processus pathologique aigu ou subaigu (p. ex., [compression médullaire](#), [myélite transverse](#), ischémie ou hémorragie de la moelle épinière, [syndrome de Guillain-Barré](#), parfois une myopathie de réanimation, une [rhabdomyolyse](#), un [botulisme](#), ou une [intoxication par les organophosphorés](#)).
- Un déficit évoluant sur des semaines ou des mois correspond à un processus subaigu ou chronique (p. ex., [myélopathie cervicale](#), la plupart des [polynévrites](#) héréditaires et acquises, la [myasthénie](#), les [maladies du motoneurone](#), les myopathies acquises, la plupart des tumeurs).
- Un déficit qui fluctue d'un jour à l'autre peut être dû à une sclérose en plaques et parfois à une myopathie métabolique.
- Un déficit fluctuant dans la journée peut être provoqué par une myasthénie, un [syndrome de Lambert-Eaton](#) ou une [paralysie périodique](#).

La **topographie** du déficit se caractérise par une difficulté à effectuer des tâches motrices spécifiques. Les informations anatomiques fournissent également une orientation étiologique:

- Un déficit proximal empêche de lever les bras (p. ex., pour se peigner, soulever des objets au-dessus la tête), de monter les escaliers ou de se lever d'un siège; cet aspect est typique des [myopathies inflammatoires](#).
- Un déficit distal va se manifester quand il s'agit de monter un trottoir, de tenir une tasse, d'écrire, de boutonner ou d'utiliser une clé; cet aspect s'observe dans les polynévrites et la dystrophie myotonique. De nombreuses maladies (p. ex., les [polynévrites démyélinisantes inflammatoires chroniques](#), le [syndrome de Guillain-Barré](#), la [myasthénie](#), des [radiculopathies](#), le [syndrome de Lambert-Eaton](#)) entraînent un déficit à la fois proximal et distal, mais un des aspects peut prédominer au début.
- La faiblesse bulbaire peut entraîner une faiblesse faciale, une dysarthrie et une dysphagie, avec ou sans altération des mouvements oculaires; ces manifestations sont typiques de certains troubles neuromusculaires, tels que la myasthénie grave, le syndrome de Lambert-Eaton ou le botulisme, mais aussi de certains troubles des motoneurones, tels que la [sclérose latérale amyotrophique](#) ou la [paralysie bulbaire supranucléaire progressive](#).

L'**examen clinique** apporte des éléments complémentaires au diagnostic de localisation. Il faut d'abord se faire une idée générale de la répartition du déficit:

- La faiblesse qui affecte plus les extenseurs que les fléchisseurs des membres supérieurs ou les fléchisseurs plus que les extenseurs des membres inférieurs est un motif qui suggère des causes au niveau du système nerveux central.
- Un déficit à prédominance proximale suggère une myopathie.
- Un déficit associé à une hyperréflexie et à une hypertonie suggère une atteinte centrale (voie pyramidale [motoneurone] et autres voies motrices) en particulier s'il existe un signe de Babinski (réflexe cutané plantaire en extension).
- Une altération prédominante de la dextérité fine (p. ex., mouvements fins de préhension, jouer du piano) avec une force de préhension relativement préservée indique une atteinte de la voie corticospinale (pyramidale).
- Une paralysie complète avec hypotonie et abolition des réflexes (paralysie flasque) survient lors de lésions de la moelle épinière soudaines et graves (choc spinal).
- Un déficit associé à une hyporéflexie, à une diminution du tonus musculaire (avec ou sans fasciculations) et à une atrophie musculaire chronique suggère une atteinte des motoneurones.
- Une faiblesse qui est plus évidente au niveau des muscles innervés par les nerfs les plus longs (c'est-à-dire, plus distale que proximale, plus importante au niveau des jambes que des bras), en particulier avec perte de sensibilité distale, évoque un dysfonctionnement des motoneurones inférieurs dû à une polynévrite périphérique.
- Un examen neurologique normal (c'est-à-dire, réflexes normaux, absence d'atrophie et de fasciculations musculaires, force normale ou absence de coopération au testing) ou une faible capacité d'effort en cas de fatigue sans profil topographique ou temporel précis suggèrent une fatigue plutôt qu'une véritable faiblesse musculaire. Cependant, un déficit intermittent peut être méconnu s'il est absent au moment de l'examen.

Des symptômes supplémentaires peuvent permettre de localiser la lésion plus précisément. Par exemple:

- Un déficit moteur de type central associé à d'autres signes tels qu'une aphasie, des troubles cognitifs ou d'autres signes troubles corticaux: une lésion cérébrale
- Signes unilatéraux du motoneurone supérieur (spasticité, hyperréflexie, réponse plantaire en extension) et faiblesse touchant un bras et une jambe du même côté du corps: une lésion hémisphérique controlatérale, le plus souvent un AVC
- Un trouble moteur (du motoneurone) central et/ou périphérique (supérieur ou inférieur) avec un niveau sensitif et une incontinence urinaire et/ou fécale: une lésion médullaire
- Faiblesse musculaire selon un schéma de neurone moteur inférieur au niveau des mains (fléchisseurs et extenseurs tous deux impliqués, avec atrophie des mains et hyporéflexie) avec une répartition de la faiblesse de type neurone moteur supérieur au niveau des jambes (fléchisseurs plus faibles que les extenseurs, hyperréflexie, signe de Babinski positif et spasticité): maladie structurelle de la moelle épinière cervicale (spondylose cervicale),

syringomyélie (souvent associée à une perte de la sensibilité thermique et douloureuse en forme de cape épargnant distalement la sensibilité vibratoire et la proprioception), ou maladie du neurone moteur (p. ex., SLA)

Un déficit moteur de type neurogène (atteinte du motoneurone inférieur) peut affecter le territoire d'un ou de plusieurs nerfs périphériques; le tableau clinique en pareil cas est souvent très caractéristique (p. ex., main tombante en cas de lésion du nerf radial). En cas de lésion du plexus lombosacré ou brachial, les troubles sensitifs, moteurs et réflexes sont souvent mal systématisés.

Diagnostic étiologique

Certaines associations syndromiques sont parfois caractéristiques d'une étiologie (voir tableau [Signes liés à la faiblesse évoquant une cause spécifique](#)).

TABLEAU

Signes liés à la faiblesse évoquant une cause spécifique

Signes	Maladies à envisager
Déficit généralisé rapidement progressif; ophtalmoplégie, dysarthrie et dysphagie, en particulier si celle-ci est précédée d'une gastro-entérite	Botulisme
Symptomatologie suggérant la dissémination de lésions dans le temps et l'espace, des antécédents de rechutes et de rémissions, une perte visuelle monoculaire due à une névrite optique, une diplopie due à une ophtalmoplégie internucléaire	Sclérose en plaques
Déficit aigu ou chronique, dysarthrie, dysphagie, hyporéflexie, symptômes cholinergiques excessifs (p. ex., salivation, larmolement, miction, myosis, crampes abdominales, diarrhée, bradycardie)	Intoxication par les organophosphorés
Déficit unilatéral de type central (motoneurone supérieur)	Lésion cérébrale unique, telle qu'un accident vasculaire (ischémique ou hémorragique), une tumeur ou un abcès
Tétraparésie progressive chronique de type central (motoneurone supérieur), nerfs crâniens préservés, réflexe massétérin normal	Myélopathie cervicarthrosique

Signes	Maladies à envisager
Ophtalmoplégie externe (parfois seulement une diplopie au regard extrême)	Myasthénie , botulisme, variante de Miller Fisher du syndrome de Guillain-Barré
Fatigabilité à la contraction répétée (p. ex., clignement des yeux)	Myasthénie
Déficit asymétrique des membres, dysarthrie, dysphagie, fasciculations de la langue	Sclérose latérale amyotrophique

En **l'absence de déficit moteur vrai** (p. ex., ayant un profil temporel ou une topographie précise) et si le patient ne se plaint que de fatigue générale, d'asthénie ou de manque d'énergie, il faut envisager une cause extra-neurologique. Cependant, chez un sujet âgé qui se sent trop faible pour marcher, il peut être difficile de déterminer la part exacte du déficit moteur car les troubles de la marche sont souvent d'origine multifactorielle (voir [Bases de gériatrie: faiblesse](#)).

En cas de polypathologie il peut y avoir une impotence fonctionnelle importante sans véritable perte de la force musculaire. Par exemple, une insuffisance cardiorespiratoire ou une anémie peuvent provoquer une fatigabilité due à la dyspnée ou une intolérance à l'effort. Un dysfonctionnement articulaire (p. ex., en cas d'arthrite) ou des douleurs musculaires (p. ex., dans la pseudo-polyarthrite rhizomélisque ou la fibromyalgie) peuvent rendre les exercices physiques difficiles. Ces maladies, ainsi que d'autres causes habituelles de fatigue (p. ex., la grippe, la mononucléose infectieuse, l'insuffisance rénale) sont généralement déjà diagnostiquées ou sont suggérées par les résultats lors de l'anamnèse et/ou l'examen clinique.

En général, si l'anamnèse et l'examen physique ne révèlent pas d'anomalies suggérant des troubles physiques, ces troubles sont peu probables ; les troubles qui provoquent une fatigue constante et généralisée, sans schéma temporel ou anatomique physiologique (p. ex., dépression ; syndrome de fatigue chronique ; maladie systémique non encore découverte telle qu'une anémie sévère, une hypothyroïdie ou une maladie d'Addison ; effet indésirable d'un médicament) doivent être envisagés.

Examens complémentaires

Chez les patients souffrant de [fatigue](#) plutôt que de faiblesse, l'anamnèse et l'examen clinique se concentrent sur l'identification de manifestations subtiles de maladies sous-jacentes (en particulier des infections, des troubles endocriniens et rhumatologiques, une anémie et une dépression) qui peuvent guider les examens mais les examens peuvent être inutiles.

Bien que de nombreux examens puissent être effectués en cas d'authentique faiblesse musculaire, ils n'ont souvent qu'un rôle secondaire.

En l'absence de véritable faiblesse, les autres données cliniques éventuelles (p. ex., dyspnée, pâleur, ictère, souffle cardiaque) sont utilisées pour orienter les examens.

Si l'examen clinique est normal, les examens complémentaires ont peu de chances d'être anormaux. En pareil cas, les avis sont partagés sur la conduite à tenir. Les tests initiaux incluent généralement une combinaison de numération formule sanguine (NFS), électrolytes (dont calcium et magnésium), glycémie, tests de la fonction rénale et hépatique, hormone thyroïdienne (TSH), vitesse de sédimentation (VS), et sérologie de l'hépatite C.

En cas de faiblesse générale vraie brutale ou sévère ou de symptômes respiratoires, la capacité vitale forcée et la force de l'inspiration maximale doivent être testées pour évaluer le risque de défaillance respiratoire aiguë. Les patients qui ont une capacité vitale < 15 mL/kg ou une force inspiratoire < 20 cm H₂O sont particulièrement à risque.

En cas de **véritable déficit musculaire** (et habituellement après avoir évalué le risque de défaillance respiratoire aiguë), le bilan initial se concentre habituellement sur la recherche du mécanisme du déficit. À moins que la cause soit évidente, des examens biologiques systématiques sont habituellement effectués (NFS, électrolytes [dont calcium et magnésium], glycémie, tests de la fonction rénale et hépatique, TSH, VS, sérologie de l'hépatite C).

Les tests sont effectués pour déterminer la localisation et le mécanisme de la faiblesse en fonction des signes cliniques.

Si un **dysfonctionnement des motoneurones supérieurs est suspecté**, l'examen clé est l'IRM. La TDM est utilisée lorsque l'IRM n'est pas possible (p. ex., chez les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ancien et non compatible avec l'IRM).

Si une **myélopathie** est suspectée, l'IRM peut permettre de détecter les lésions de la moelle épinière. Elle peut également mettre en évidence d'autres causes de paralysie pouvant simuler une myélopathie, dont les lésions de la queue-de-cheval, des racines rachidiennes et des plexus lombosacré et brachial. La myélo-TDM peut être utilisée lorsque l'IRM est impossible. D'autres examens sont effectués (voir tableau [Certaines causes de faiblesse musculaire](#)). L'analyse du liquide céphalorachidien est inutile pour certains diagnostics faits par l'imagerie (p. ex., tumeur épidurale) et est contre-indiquée si un blocage du liquide céphalorachidien (p. ex., dû à la compression épidurale du cordon médullaire) est suspecté. L'analyse du LCR est utile en cas de syndrome de Guillain-Barré; la dissociation albuminocytologique (taux élevé de protéines avec un nombre normal de globules blancs) est presque pathognomonique.

En cas de suspicion de **polynévrites, de myopathies ou de troubles de la jonction neuromusculaire**, les examens de choix qui permettent de différencier ces mécanismes de faiblesse sont les examens électrodiagnostics (électromyographie et mesure de conduction nerveuse).

Après une lésion nerveuse, les altérations de la conduction nerveuse et la dénervation des muscles peuvent prendre jusqu'à plusieurs semaines pour se manifester, rendant l'examen électrophysiologique inutile si le trouble est aigu. Cet examen peut cependant permettre de distinguer certains troubles aigus comme les neuropathies démyélinisantes aiguës (p. ex., syndrome de Guillain-Barré), le botulisme aigu et autres troubles de la jonction neuromusculaire.

Si une **myopathie** est suspectée (suggérée par une faiblesse musculaire, des crampes musculaires et une douleur), les enzymes musculaires (p. ex., CK [creatine kinase], aldolase, LDH [lactique

dehydrogenase]) peuvent être dosées. Des taux élevés sont compatibles avec une myopathie mais peuvent également se voir en cas de neuropathies (reflétant une atrophie musculaire) et des taux très élevés s'observent en cas de rhabdomyolyse ischémique. En outre, les taux ne sont pas élevés dans toutes les myopathies. Une utilisation régulière de crack (cocaïne) peut également provoquer une élévation chronique modérée des CK (valeur moyenne, 400 UI/L).

On peut utiliser l'IRM pour visualiser l'inflammation musculaire, comme dans les myopathies inflammatoires. La biopsie musculaire peut être nécessaire pour diagnostiquer une myopathie ou une myosite. L'IRM ou l'électromyographie peuvent permettre de déterminer le site le plus approprié pour effectuer une biopsie musculaire. Cependant, il faut éviter les points d'injection de l'aiguille d'électromyographie qui peuvent donner lieu à des artefacts; ainsi, la biopsie ne doit jamais être effectuée dans le même muscle que l'électromyographie.

Les tests génétiques peuvent permettre de confirmer certaines myopathies héréditaires.

Si une **atteinte du motoneurone** (p. ex., sclérose latérale amyotrophique) est suspectée, l'électromyographie et l'étude des conductions nerveuses permettent de confirmer le diagnostic et de ne pas méconnaître éventuellement des maladies curables qui peuvent simuler une atteinte du motoneurone (p. ex., une polynévrite démyélinisante inflammatoire chronique ou une neuropathie motrice multifocale à blocs de conduction). L'IRM cérébrale peut mettre en évidence une dégénérescence de la voie corticospinale dans la sclérose latérale amyotrophique à un stade avancé. Une IRM de la moelle épinière (ou une myélo-TDM) est pratiquée pour écarter une compression de la moelle épinière ou d'autres myélopathies (voir tableau [Certaines causes de faiblesse musculaire](#)).

Des **examens complémentaires pour identifier des troubles spécifiques** peuvent être nécessaires:

- En cas de suspicion de myasthénie, un test du glaçon et un test sérique (p. ex., dosage des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, parfois des anticorps anti-tyrosine kinase spécifique du muscle) doivent être pratiqués
- Si les symptômes évoquent une vascularite, on recherche des auto-anticorps
- Si les antécédents familiaux suggèrent un trouble héréditaire, on fait passer des tests génétiques
- Si les résultats suggèrent une polynévrite, d'autres examens sont pratiqués (voir tableau [Certaines causes de faiblesse musculaire](#))
- Si la myopathie n'est pas expliquée par les médicaments, des troubles métaboliques ou endocriniens, on peut pratiquer une biopsie musculaire

Traitement de la faiblesse

Les causes de faiblesse musculaire sont traitées. En cas de déficit moteur aigu menaçant le pronostic vital, une assistance respiratoire peut être nécessaire.

La kinésithérapie et l'ergothérapie peuvent aider le sujet à s'adapter à un déficit moteur chronique et minimiser la perte de fonction, quelle que soit la cause.

Bases de gériatrie: faiblesse

Une certaine diminution des réflexes ostéotendineux est fréquente avec l'âge, mais une asymétrie ou une absence de ces réflexes lors des manœuvres de renforcement est anormale.

Les sujets âgés étant davantage susceptibles de présenter une sarcopénie préexistante, tout alitement prolongé peut rapidement provoquer une atrophie musculaire invalidante, parfois seulement après quelques jours.

Les personnes âgées prennent plus de médicaments et ont de ce fait un risque accru de myopathie, de neuropathie ou de fatigue iatrogène; les médicaments sont donc une cause fréquente de faiblesse musculaire chez les personnes âgées.

Le sentiment de se sentir trop faible pour marcher a souvent des causes multiples. Les facteurs peuvent inclure les suivants:

- Faiblesse musculaire (p. ex., causée par un accident vasculaire cérébral, utilisation de certains médicaments ou substances, myélopathie due à une spondylose cervicale, ou atrophie musculaire)
- Hydrocéphalie
- Syndrome parkinsonien
- Arthrite douloureuse
- Altération liée à l'âge de certains circuits neuronaux nécessaires à la stabilité posturale (système vestibulaire, voies proprioceptives), de la coordination (cervelet, noyaux gris centraux), de la vision et des praxies (lobe frontal)

L'évaluation doit se concentrer sur les causes potentiellement réversibles.

La kinésithérapie et la rééducation sont généralement utiles, quelle que soit l'étiologie de la faiblesse.

Points clés

- Distinguer la perte de force musculaire d'une sensation de fatigue.
- Si la fatigue ne présente pas de schéma anatomique ou temporel de faiblesse chez les patients dont l'examen physique est normal, il faut suspecter une encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique, une maladie systémique non encore découverte (p. ex., anémie sévère, hypothyroïdie, maladie d'Addison), un problème psychologique (p. ex., dépression) ou un effet indésirable d'un médicament.
- En cas de réelle faiblesse musculaire, il faut commencer par déterminer si elle est provoquée par un dysfonctionnement cérébral, de la moelle épinière, des plexus, des nerfs périphériques, de la jonction neuromusculaire ou des muscles.

- En cas d'hyperréflexie et d'hypertonie (spasticité), en particulier en présence d'un signe de Babinski, suspecter une lésion des motoneurones supérieurs (p. ex., voie corticospinale) du cerveau ou de la moelle épinière; l'IRM est habituellement nécessaire.
- En cas d'hyporéflexie, une diminution du tonus musculaire, une atrophie et des fasciculations musculaires suggèrent une lésion des motoneurones inférieurs.
- En cas d'hyporéflexie et de faiblesse musculaire principalement distale, en particulier en cas d'hypoesthésie et de paresthésie distales, suspecter une polynévrite.
- En cas de difficulté à monter les escaliers, à se coiffer et à se lever d'un siège associée à un déficit moteur proximal et sans troubles sensitifs, suspecter une myopathie.
- La kinésithérapie est souvent utile pour améliorer la force.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.