



Syncope

Par Andrea D. Thompson, MD, PhD, University of Michigan;

Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan

Reviewed By Jonathan G. Howlett, MD, Cumming School of Medicine, University of Calgary

Vérifié/Révisé août 2024

La **syncope** est une perte de connaissance brutale et brève avec disparition du tonus postural suivie d'une récupération spontanée. Le patient est immobile et hypotonique et a habituellement des extrémités froides, un pouls faible et une polypnée superficielle. Parfois de brèves secousses musculaires involontaires se produisent, ressemblant à une convulsion.

La **quasi-syncope** est une lipothymie et un sentiment d'imminence d'un évanouissement en l'absence de perte de connaissance brutale. Elle est habituellement classée et décrite avec la syncope car les causes sont les mêmes.

Les **convulsions** peuvent provoquer une soudaine perte de connaissance mais ne sont pas considérées comme étant des syncopes. Cependant, les convulsions doivent être évoquées en cas de syncope apparente car l'anamnèse peut être peu claire ou non disponible et certaines crises convulsives ne provoquent pas de convulsions tonico-cloniques. En outre, une crise brève (< 5 s) survient parfois en même temps qu'une vraie syncope.

Le diagnostic repose sur une anamnèse attentive, le récit d'un témoin oculaire ou sur un examen fortuit effectué au cours de l'événement.

Physiopathologie de la syncope

La plupart des syncopes résultent d'une insuffisance du flux sanguin cérébral. Dans certains cas le débit sanguin est adéquat, mais avec un apport de substrat cérébral insuffisant (oxygène, et/ou glucose).

Insuffisance du flux sanguin cérébral

La plupart des déficits de flux sanguin cérébral proviennent d'une diminution du débit cardiaque.

Une **diminution du débit cardiaque** peut être provoquée par

- Des troubles cardiaques obstructifs
- Des troubles cardiaques avec dysfonctionnement systolique
- Des troubles cardiaques avec dysfonctionnement diastolique

- Des troubles du rythme (trop rapide ou trop lent)
- Des pathologies qui réduisent le retour veineux

L'obstruction peut être aggravée par l'effort, la vasodilatation et l'hypovolémie (en particulier en cas de [rétrécissement aortique](#) et de [cardiomyopathie hypertrophique](#)), qui peuvent déclencher une syncope.

Les [troubles du rythme](#) provoquent une syncope si la fréquence cardiaque est trop rapide et ne permet pas un remplissage ventriculaire adéquat (p. ex., > 150 à 180 battements/minute) ou trop lente pour permettre un débit efficace (p. ex., < 30 à 35 battements/minute).

Le retour veineux peut être diminué par des hémorragies, une augmentation de la pression intrathoracique, une augmentation du tonus vagal (qui peut également diminuer la fréquence cardiaque) et par la perte du tonus sympathique (p. ex., par effet de médicaments, du fait d'un massage/pression sinocarotidien ou d'un dysfonctionnement neurovégétatif). Les syncopes impliquant ces mécanismes (sauf dans le cas des hémorragies) sont souvent appelées **vasovagales** ou neurocardiogéniques et sont fréquentes et bénignes.

[L'hypotension orthostatique](#), une cause fréquente de syncopes bénignes, résulte de l'incapacité des mécanismes normaux (p. ex., tachycardie sinusale et/ou vasoconstriction) à compenser la diminution temporaire du retour veineux qui se produit lors du passage en position debout.

Les **troubles cérébrovasculaires** (p. ex., [accidents vasculaires cérébraux](#), [accidents ischémiques transitoires](#)) provoquent rarement des syncopes parce que la plupart n'ont pas d'effet sur les structures centrencéphaliques qui doivent être impliquées pour qu'une perte de connaissance se produise. Cependant, l'ischémie du territoire de l'artère basilaire, due à un accident ischémique transitoire, à un accident vasculaire cérébral ou à une [migraine](#), peut provoquer une syncope. Rarement, les patients qui présentent une arthrose ou une spondylose cervicale sévère peuvent développer une insuffisance vertébrobasilaire à l'origine de syncopes lorsque la tête est déplacée dans certaines positions.

Apports insuffisants de substrats cérébraux

Le système nerveux central a besoin d'oxygène et de glucose pour fonctionner. Même si le flux sanguin cérébral est normal, un important déficit de l'un de ces deux substrats peut provoquer une perte de connaissance brutale. En pratique, l'hypoglycémie est la cause principale parce qu'il est rare qu'une hypoxie se développe de manière à provoquer une perte de connaissance brutale (en dehors des accidents de plongée sous-marine ou de vol aérien). La perte de connaissance due à l'hypoglycémie est rarement aussi brutale que la syncope ou les convulsions parce qu'il y a des prodromes (sauf chez les patients qui prennent des bêta-bloqueurs); cependant, son déroulement peut être peu évident pour l'examineur sauf si un témoin de l'épisode est présent.

Étiologie de la syncope

Les causes sont habituellement classées par mécanisme (voir tableau [Certaines causes de syncope](#)).

Les **causes les plus fréquentes** sont les suivantes

- Vasovagal (neurocardiogénique)

- Idiopathiques

De nombreux cas de syncope ne sont pas diagnostiqués de manière certaine mais n'ont pas de conséquence négative évidente. Un plus petit nombre de cas ont une cause grave, habituellement cardiaque.

TABLEAU

Certaines causes de syncope

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
Obstruction au remplissage ou à l'éjection cardiaque		
Valvulopathies cardiaques: <u>sténose aortique</u> , <u>sténose mitrale</u> , <u>tétralogie de Fallot</u> , lâchage ou thrombose de prothèse valvulaire	Patient jeune ou âgé Syncope souvent à l'effort, récupération rapide Souffle cardiaque	<u>Échocardiographie</u>
<u>Cardiomyopathie hypertrophique</u> , <u>cardiomyopathie restrictive</u>	Patient jeune ou âgé Syncope souvent à l'effort, récupération rapide Souffles cardiaques (dans la cardiomyopathie hypertrophique) B4 (dans la cardiomyopathie restrictive)	Échocardiographie
<u>Tumeurs ou thrombi cardiaques</u>	La syncope peut être positionnelle Habituellement, un souffle (peut être variable) Phénomènes emboliques périphériques	Échocardiographie
<u>Embolie pulmonaire</u> , embolie amniotique ou rarement embolie gazeuse	Habituellement de gros emboles, accompagnés d'une dyspnée, d'une tachycardie, ou d'une tachypnée	Parfois dosage du D-dimère Parfois, échographie au lit du malade ou échocardiographie

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	Souvent facteurs de risque d'embolie pulmonaire	Angio-TDM ou scintigraphie
Troubles du rythme cardiaque		
Bradyarythmies (p. ex., dues à une maladie du nœud sinusal , à un bloc auriculoventriculaire de haut grade, médicaments†)	La syncope survient sans prodrome, récupération immédiate au réveil Peut survenir dans n'importe quelle position Bradyarythmie plus fréquente chez les personnes âgées Patients qui prennent des médicaments, en particulier des antiarythmiques ou d'autres médicaments qui bloquent la conduction nodale auriculoventriculaire chez les patients sensibles Maladie cardiaque structurale	Si l'ECG n'est pas évident, envisager un Holter, un enregistreur d'événements ou parfois un enregistreur en boucle implantable (la durée de la surveillance est déterminée par la fréquence des symptômes) Examens électrophysiologiques si des anomalies sont détectées ou en cas de forte suspicion Ionogramme sanguin si justifié par des anomalies cliniques (p. ex., prise de diurétiques, vomissements, diarrhée)
Tachyarythmies supraventriculaires ou ventriculaires (p. ex., dues à une ischémie, à une insuffisance cardiaque , une maladie myocardique, des médicaments†, des anomalies électrolytiques, une cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit , un syndrome du QT long , un syndrome de Brugada , une préexcitation)	La syncope survient sans prodrome, récupération immédiate au réveil Peut survenir dans n'importe quelle position Patient prenant des médicaments, en particulier des antiarythmiques ou d'autres médicaments qui prolongent l'intervalle QT Maladie cardiaque structurale	Si l'ECG n'est pas clair, envisager un holter ou un enregistreur d'événements, ou parfois un enregistreur en boucle implantable (la durée de la surveillance est déterminée par la fréquence des symptômes) Examens électrophysiologiques si des anomalies sont

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
		détectées ou en cas de forte suspicion Ionogramme sanguin si justifié par des anomalies cliniques (p. ex., prise de diurétiques, vomissements, diarrhée)
Dysfonction ventriculaire		
<u>Infarctus du myocarde aigu, myocardite,</u> dysfonctionnement systolique ou diastolique, cardiomyopathie	La syncope est rarement un symptôme initial d'infarctus du myocarde (le plus souvent il s'agit de personnes âgées), avec des troubles du rythme ou un choc	Troponine sérique ECG Échocardiographie (traditionnelle, ou échographie au lit du malade) Parfois, IRM cardiaque
Tamponnade ou constriction péricardique	Turgescence des jugulaires; pouls paradoxal > 10	Échocardiographie (traditionnelle, ou échographie au lit du malade) Parfois, TDM
Vasovagal (neurocardiogénique)		
Augmentation de la pression intrathoracique (p. ex., <u>pneumothorax compressif</u>, toux, difficulté à uriner ou à déféquer, manœuvre de Valsalva)	Signes d'alarme (p. ex., vertige, nausées, sueurs); récupération habituellement rapide mais non immédiate (5 à 15 min) bien qu'elle puisse être prolongée dans de rares cas Déclencheurs habituellement évidents	Bilan clinique
Une forte émotion (p. ex., une douleur, une peur, la vue du sang)	Prodromes (p. ex., vertige, nausées, sueurs); récupération rapide mais non immédiate (5 à 15	Bilan clinique

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	min, mais parfois jusqu'à plusieurs heures) Déclencheurs habituellement évidents	
Massage/pression sinocarotidien	Prodromes (p. ex., vertige, nausées, sueurs); récupération rapide mais non immédiate (5 à 15 min, mais parfois jusqu'à plusieurs heures) Déclencheur habituellement apparent (p. ex., tourner la tête, col boutonné, rasage)	Bilan clinique
Avaler (rare)	Prodromes (p. ex., vertige, nausées, sueurs); récupération rapide mais non immédiate (5 à 15 min, mais parfois jusqu'à plusieurs heures) Déclencheurs habituellement évidents	Bilan clinique
<u>Anaphylaxie</u>	Administration de médicaments, morsure d'insecte, allergie, d'autres signes d'anaphylaxie (p. ex., éruption cutanée, wheezing, hypotension)	Tests allergologiques
<u>L'hypotension orthostatique</u>		
Médicaments†	Les symptômes se développent dans les quelques minutes du passage en position verticale Chute de la pression artérielle lors du passage	Bilan clinique Parfois, test de la table basculante

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	en position debout à l'examen	
Dysfonctionnement neurovégétatif	Les symptômes se développent dans les quelques minutes du passage en position verticale Chute de la pression artérielle lors du passage en position debout à l'examen	Bilan clinique Parfois, test de la table basculante
Déconditionnement causé par un alitement prolongé	Les symptômes se développent dans les quelques minutes du passage en position verticale Chute de la pression artérielle lors du passage en position debout à l'examen	Bilan clinique Parfois, test de la table basculante
Anémie	Fatigue chronique, parfois selles sombres, menstruations abondantes	Numération formule sanguine complète ou hématocrite
Troubles endocriniens (p. ex., insuffisance surrénalienne , hypothyroïdie)	Les symptômes se développent dans les quelques minutes du passage en position verticale Souvent symptômes associés d'un trouble endocrinien sous-jacent	Panel métabolique de base Mesure matinale du cortisol TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)
Cérébrovasculaire		
Accident ischémique transitoire de l'artère basilaire ou AVC	Parfois, déficits des nerfs crâniens et ataxie	IRM ou TDM

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
<u>Migraine</u>	Aura avec symptômes visuels, photophobie; souvent unilatérale, mais peut être bilatérale	Bilan clinique
Autres		
Position debout prolongée	Apparente par l'anamnèse, aucun autre symptôme	Bilan clinique
Grossesse	Femme en bonne santé en âge de procréer; pas d'autres symptômes Habituellement, grossesse initiale ou non diagnostiquée	Test urinaire de grossesse
Hyperventilation	Souvent fourmillements autour de la bouche ou des doigts avant une syncope Habituellement dans un contexte émotionnel	Bilan clinique
<u>Hypoglycémie</u>	Altération de l'état mental jusqu'au traitement, début souvent brutal, sueurs, piloérection Habituellement, antécédents de diabète ou d'insulinome	Glycémie au doigt Réponse à la perfusion de glucose
Troubles psychiatriques	Pas une vraie syncope (le patient peut répondre partiellement ou de manière inconstante pendant les événements) Examen normal Souvent antécédent de troubles psychiatriques	Bilan clinique

*L'ECG et l'oxymétrie de pouls sont effectués dans tous les cas.

†Voir tableau [Certains médicaments causes de syncopes](#).

TABLEAU

Certains médicaments causes de syncopes

Mécanisme	Exemple
Bradyarythmie	Amiodarone, autres médicaments bradycardisants Bêta-Bloqueurs Inhibiteurs calciques (non dihydropyridines) La digoxine
Tachyarythmie	Tout médicament qui prolonge la repolarisation* (p. ex., certains antiarythmiques, certains antipsychotiques, certains antidépresseurs, certains antihistaminiques et certaines fluoroquinolones)
L'hypotension orthostatique	La plupart des antihypertenseurs (rarement bêta-bloqueurs) Antipsychotiques (principalement phénothiazines) Doxorubicine Lévodopa Diurétiques (p. ex., diurétiques de l'anse, tels que le furosémide, diurétiques thiazidiques tels que l'hydrochlorothiazide) Dérivés nitrés (avec ou sans inhibiteur de la phosphodiesterase pour des troubles de l'érection)

Mécanisme	Exemple
	Quinidine
	Antidépresseurs tricycliques
	Vincristine
For more information, see Porta L, Lee MG, Hsu WT, Hsu TC, Tsai TY, Lee CC: Fluoroquinolone use and serious arrhythmias: A nationwide case-crossover study. <i>Resuscitation</i> 139:262–268, 2019. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.04.030	

Évaluation d'une syncope

Le bilan doit être effectué aussitôt que possible après l'événement. Plus l'événement syncopal est lointain, plus le diagnostic est difficile. Les informations obtenues auprès des témoins sont particulièrement utiles et au mieux obtenues dès que possible. Des lignes directrices pour l'évaluation et la prise en charge sont disponibles auprès de la Canadian Cardiovascular Society ([1](#)) et de l'American College of Cardiology ([2](#)).

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit rechercher des événements menant à la syncope y compris l'activité du patient (p. ex., en train de pratiquer un sport, de participer à un débat, dans une situation potentiellement émotionnelle), la position (p. ex., couchée ou debout), et, si debout, depuis quand. D'importants symptômes associés immédiatement avant ou après l'événement comprennent le fait qu'il y ait eu ou non un sentiment d'imminence de la perte de connaissance, des nausées, des sueurs, un flou ou un tunnel visuel, des fourmillements des lèvres ou des doigts, une douleur thoracique ou des palpitations. La durée de la récupération doit également être établie. Les témoins, s'ils existent, doivent être recherchés et interrogés pour décrire les événements, en particulier la présence et la durée de toute activité convulsive.

La **revue des systèmes** doit comprendre des questions sur d'éventuelles zones douloureuses ou de blessure, sur des épisodes de vertige ou de quasi-syncope lors du passage en position debout et sur des épisodes de palpitations ou de douleur thoracique à l'effort. Il faut interroger les patients sur les symptômes évoquant des causes possibles, dont des selles sanglantes ou goudroneuses, des menstruations importantes ([anémie](#)); des vomissements, une diarrhée ou un excès de miction (déshydratation ou troubles hydro-électrolytiques); et des facteurs de risque d'[embolie pulmonaire](#) (chirurgie ou immobilisation récente, cancer connu, antécédents de thrombose ou d'état d'hypercoagulabilité).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur des antécédents de syncope, de maladies cardiovasculaires et de troubles convulsifs connus. On doit faire l'inventaire des médicaments utilisés (en particulier les antihypertenseurs, les diurétiques, les vasodilatateurs et les antiarythmiques, voir

tableau [Certains médicaments causes de syncopes](#)). L'anamnèse familiale doit rechercher une cardiopathie ou une mort subite chez un autre membre de la famille survenues en bas âge.

Examen clinique

Les signes vitaux sont essentiels. La fréquence cardiaque et la pression artérielle sont mesurées en position couchée et après 3 min de station debout. Le pouls est palpé à la recherche d'une irrégularité.

L'examen général note l'état mental du patient, dont toute confusion ou difficulté évoquant une phase post-critique, et tout signe de blessure (p. ex., ecchymoses, tuméfaction, sensibilité, morsure de la langue).

Le cœur est ausculté à la recherche de souffles; si existence d'un souffle, toute modification du souffle à la manœuvre de Valsalva, debout ou accroupie est notée.

Une évaluation prudente des ondes veineuses jugulaires (voir figure [Ondes veineuses jugulaires normales](#)) par la palpation de la carotide ou l'auscultation du cœur peut permettre le diagnostic d'un trouble du rythme lorsque l'ECG n'est pas disponible. Par exemple, les ondes canon "a" se produisent lorsque la contraction des oreillettes a lieu contre une valvule tricuspide fermée et elles indiquent une dissociation auriculoventriculaire.

L'abdomen est palpé à la recherche d'une sensibilité et un toucher rectal est effectué pour s'assurer de l'absence de sang macroscopique ou occulte.

Un examen neurologique est effectué pour identifier toute anomalie focale qui évoquerait une cause du système nerveux central (p. ex., des crises convulsives).

Signes d'alarme

Certains signes font évoquer une étiologie plus grave:

- Syncope à l'effort
- Récidives multiples en peu de temps
- Souffle cardiaque ou autres signes en faveur d'une cardiopathie structurale (p. ex., une douleur thoracique)
- Grand âge
- Blessures importantes au cours des syncopes
- Antécédents familiaux de mort subite inattendue, de syncope à l'effort, de syncope inexpliquée ou récurrente ou de convulsions

Interprétation des signes

Bien que la cause soit souvent bénigne, il est important d'identifier une cause potentiellement mortelle occasionnelle (p. ex., tachyarythmie, bloc cardiaque) car il existe un risque de mort subite. Les signes cliniques (voir tableau [Certaines causes de syncope](#)) permettent d'évoquer une cause dans de nombreux cas. Quelques généralisations sont utiles.

Des **causes bénignes** induisent souvent une syncope.

- La syncope déclenchée par des stimuli physiques ou émotionnels désagréables (p. ex., douleur, angoisse), se produit habituellement en position debout, est souvent précédée de prodromes à mécanisme vagal (p. ex., nausées, asthénie, bâillement, appréhension, vision trouble et transpiration), et évoque une cause vasovagale.
- La syncope qui se produit le plus souvent lors du passage en position debout (en particulier chez le patient âgé après un alitement prolongé ou chez le patient qui prend certaines catégories de médicaments) évoque une syncope orthostatique.
- La syncope qui se produit après une station debout prolongée sans bouger est habituellement due à une stase veineuse.

Des **causes dangereuses** sont indiquées par des signes d'alarme.

- La syncope à l'effort évoque un obstacle à l'éjection ventriculaire ou un trouble du rythme cardiaque induit par l'effort. Parfois, ces patients ont également une [douleur thoracique](#) et/ou des [palpitations](#). Les signes cardiaques peuvent être utiles pour identifier une cause. Un souffle rude, à maximum tardif, basal, irradiant vers les carotides suggère un [rétrécissement aortique](#); un souffle systolique qui augmente à la manœuvre de Valsalva et disparaît en position accroupie suggère une [cardiomyopathie hypertrophique](#).
- La syncope à début et fin spontanés brusques est habituellement d'origine cardiaque, et le plus souvent le fait d'un [trouble du rythme](#).
- La syncope alors que le sujet est en position couchée indique également une arythmie car les mécanismes vasovagaux et orthostatiques ne provoquent pas de syncope en position couchée.
- La syncope accompagnée d'une blessure lors d'un épisode augmente la probabilité d'une cause cardiaque ou de convulsions et l'événement est donc plus inquiétant. Les signes d'alarme et la perte de connaissance plus lente qui accompagne la syncope vasovagale bénigne réduisent quelque peu la probabilité de blessure.

Une perte de connaissance pendant une crise ou une confusion post-critique peut parfois être confondue avec une syncope, mais des secousses musculaires ou des convulsions qui durent plus de quelques secondes, une incontinence, un bavement ou une morsure de la langue indiquent généralement une crise.

Examens complémentaires

Des examens sont généralement effectués:

- ECG
- Oxymétrie de pouls
- Parfois, échocardiographie
- Parfois, test de la table basculante
- Analyses de sang uniquement si cliniquement indiquées
- Imagerie du système nerveux central rarement indiquée

En général, si la syncope provoque une blessure ou est récidivante (en particulier sur une brève période), un bilan plus approfondi est nécessaire. L'imagerie cardiaque et cérébrale n'est pas effectuée à moins d'indications cliniques (suspicion d'étiologie cardiaque ou de déficit neurologique).

En cas de suspicion de troubles du rythme, de myocardite ou d'ischémie, le bilan doit être effectué en milieu hospitalier. Dans les autres cas, le bilan peut être effectué en ambulatoire.

Un **ECG** est effectué chez tous les patients. L'ECG peut mettre en évidence un trouble du rythme, un trouble de la conduction, une hypertrophie ventriculaire, une pré-excitation, un allongement de QT, un syndrome de Brugada, le dysfonctionnement d'un pacemaker, une ischémie ou un infarctus du myocarde (3). Si le diagnostic est discutable après cette évaluation de base, le dosage des biomarqueurs cardiaques et les ECG en série pour éliminer un infarctus du myocarde chez les patients âgés, plus une surveillance ECG pendant au moins 24 heures, sont une mesure prudente.

Tout trouble du rythme décelé, pour être considéré comme une cause, doit être en rapport temporel avec le trouble de la conscience, mais la plupart des patients ne font pas de syncope pendant la période de surveillance. D'autre part, la survenue de symptômes en l'absence de troubles du rythme permet d'exclure une cause cardiaque. Un enregistreur d'événements (qui peut enregistrer le rythme cardiaque sur des périodes plus longues) peut être utilisé si des prodromes précèdent la syncope. Le signal ECG moyenné peut identifier une prédisposition aux troubles du rythme ventriculaires en cas de cardiopathie ischémique, de suspicion de cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite, ou pendant la période post-infarctus du myocarde. Si les épisodes de syncope sont rares (p. ex., < 1/mois), un enregistreur en boucle implantable peut être utilisé pour un enregistrement à plus long terme. Cet appareil enregistre en permanence le rythme sinusal et peut être interrogé par une machine externe qui permet d'imprimer le tracé du rythme cardiaque.

Si possible, une oxymétrie de pouls doit être effectuée pendant ou immédiatement après un épisode pour identifier une éventuelle hypoxémie (qui peut indiquer une [embolie pulmonaire](#)). En cas d'hypoxémie, une angio-TDM est indiquée pour éliminer une embolie pulmonaire.

Les **examens complémentaires** sont effectués en fonction des suspicions cliniques; les examens complémentaires systématiques sont peu utiles. Cependant, toutes les femmes en âge de procréer doivent subir un test de grossesse. L'hématocrite est mesurée si on suspecte une anémie. L'ionogramme n'est vérifié que si une anomalie est cliniquement suspectée (p. ex., du fait de symptômes ou d'un traitement médicamenteux). La troponine sérique est mesurée lorsqu'un infarctus du myocarde est suspecté.

L'**échocardiographie** (échographie au lit du malade ou traditionnelle) est indiquée en cas de syncope cliniquement inexplicée, de syncope à l'effort, de souffles cardiaques ou de suspicion de tumeurs intracardiaques (p. ex., en cas de syncope positionnelle).

Un **test d'effort** (physique ou pharmacologique) est effectué en cas de suspicion d'ischémie myocardique intermittente. Il est souvent effectué en cas de symptômes induits par l'effort. Les tests d'effort sont moins utiles sauf si l'activité physique déclenche la syncope.

Le **test de la table basculante** est effectué si l'histoire et l'examen clinique indiquent une syncope vasodépressive ou d'autres syncopes réflexes. Il est également utilisé pour évaluer la syncope d'effort si l'échocardiographie ou le test d'effort sont négatifs.

L'**examen complémentaire électrophysiologique invasif** sera envisagé si les tests non invasifs ne permettent pas de conclure à un trouble du rythme avec ce qui suit:

- Syncope récente inexpliquée
- Signes d'alarme inexpliqués
- Cardiomyopathie ischémique, cardiomyopathie non ischémique et maladie congénitale de l'adulte ou syncope inexpliquée qui ne répond pas par ailleurs aux critères d'implantation d'un cardiovertteur-défibrillateur implantable utilisé en prévention primaire

Une étude électrophysiologique négative pour un rythme anormal inducible définit un sous-groupe à faible risque avec un taux élevé de rémission de la syncope. L'intérêt des tests électrophysiologiques est controversé chez d'autres patients.

Un **EEG** est recommandé si on suspecte une crise épileptique.

La **TDM** et l'**IRM** cérébrales ne sont indiquées qu'en cas de symptomatologie évoquant un processus focal du système nerveux central.

Références pour l'évaluation

1. [Primary Writing Committee, Sandhu RK, Raj SR, et al](#): Canadian Cardiovascular Society Clinical Practice Update on the Assessment and Management of Syncope. *Can J Cardiol* 36(8):1167–1177, 2020. doi: 10.1016/j.cjca.2019.12.023
2. [Writing Committee Members, Shen WK, Sheldon RS, et al](#): 2017 ACC/AHA/HRS guideline for the evaluation and management of patients with syncope: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *Heart Rhythm* 14(8):e155–e217, 2017. doi:10.1016/j.hrthm.2017.03.004
3. [Dovgalyuk J, Holstege C, Mattu A, Brady WJ](#): The electrocardiogram in the patient with syncope. *Am J Emerg Med* 25(6):688–701, 2007. doi:10.1016/j.ajem.2006.12.016

Traitement de la syncope

En cas de syncope survenant devant un témoin, les pouls sont immédiatement vérifiés. En l'absence de pouls, une réanimation cardiorespiratoire est commencée. Si les pouls sont présents, une bradycardie sévère est traitée par l'atropine ou une électrostimulation externe transthoracique. De l'isoprotérénol peut être administré pour maintenir une fréquence cardiaque adéquate tout en posant un pacemaker temporaire.

Les tachyarythmies sont traitées; un **choc en courant continu synchronisé** est plus rapide et plus sûr que les médicaments chez les patients instables. Un retour veineux insuffisant est traité en laissant le patient en position couchée, en surélevant les jambes et en administrant du sérum physiologique IV.

Une tamponnade est soulagée par une péricardiocentèse. Le pneumothorax compressif nécessite la pose d'une canule et un drainage pleural.

L'anaphylaxie est traitée par l'adrénaline parentérale.

Placer le patient en position horizontale, les jambes élevées, arrête classiquement l'épisode syncopal si les troubles engageant le pronostic vital sont exclus. Si le patient est assis en position verticale trop rapidement, la syncope peut se reproduire; en maintenant le patient en position debout ou en le transportant dans la même position, on prolonge l'hypoperfusion cérébrale et on empêche la récupération.

Le traitement spécifique dépend de la cause et de sa physiopathologie. La conduite et l'utilisation de machines doivent être interdites jusqu'à ce que la cause soit déterminée et traitée.

Bases de gériatrie: syncope

La cause la plus fréquente de syncope chez les personnes âgées est l'hypotension posturale due à une association de facteurs. Ces facteurs comprennent des artères rigides, non compliantes, une réduction du pompage par le muscle squelettique du retour veineux lié à l'inactivité physique et à la dégénérescence du nœud sino-auriculaire et du système de conduction du fait de cardiopathies structurelles évolutives.

Chez les personnes âgées, la syncope a souvent plus d'une seule cause. Par exemple, la prise de nombreux médicaments cardiaques et antihypertenseurs, se tenir debout dans une église chauffée pendant une cérémonie longue ou émotionnellement éprouvante peut provoquer une syncope même si aucun de ces facteurs pris isolément ne provoquera de syncope.

Points clés

- La syncope résulte d'un dysfonctionnement global du système nerveux central, habituellement lié à une insuffisance du flux sanguin cérébral.
- La plupart des syncopes ont des causes bénignes.
- Certaines causes moins fréquentes impliquent des troubles du rythme ou une obstruction cardiaque et sont graves ou potentiellement mortelles.
- La syncope vasovagale a généralement un déclencheur évident, des symptômes avant-coureurs, et quelques minutes ou plus de symptômes post-récupération.
- La syncope liée à des troubles du rythme cardiaque est typiquement brutale et de récupération rapide.
- Le traitement est celui du trouble sous-jacent.
- En cas d'incertitude sur la bénignité de l'étiologie, conduire des automobiles et des machines doit être interdit jusqu'à ce que la cause soit déterminée et traitée, la

manifestation suivante d'une cause cardiaque méconnue peut être fatale.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.