

**Инструкция по применению
Раствор для полоскания ротовой полости Октенидол
(Octenidol)**



Состав Октенидол: Вода, ПЭГ-40 гидрогенное касторовое масло, глицерин, ароматизатор, глюконат натрия, сукралоза, октенидин HCL, лимонная кислота, ВНТ.

Форма выпуска: выпускается во флаконах по 60мл, 250 мл.

Свойства: предотвращает размножение болезнетворных бактерий и грибов в полости рта, защищает чувствительные зубы от пришеечного кариеса, снижает чувствительность эмали к горячему/холодному, сладкому/кислому, укрепляет десны и предотвращает их воспаление и кровоточивость.

Показания к применению препарата:

- Профилактика пародонтита и гингивита
- Восстановление слизистой после воспалительных процессов в полости рта
- При ограниченных возможностях гигиены полости рта
- Поддерживающая и гигиеническая санация при наличии у пациентов в ротовой полости колоний MRSA, в детской онкологии, процессе лучевой терапии
- До и после периодонтального и ротового хирургических вмешательств,
- При заболеваниях, которые ведут к разрастанию грибов в полости рта (например у пациентов с иммунодефицитом или онкологических больных)

Метод применения: полоскать рот 2 – 3 раза в день 15 мл раствора в течение 30 секунд, при MRSA в течение 15 секунд. При лечении грибковых поражений полости рта время действия 2 минуты. Гигиеническое полоскание ротовой полости непосредственно после еды и питья в течение 10-15 секунд. При необходимости можно прополоскать полость рта чистой водой

Побочные явления: Аллергические реакции.

Противопоказания к применению препарата: Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

Беременность и лактация: Противопоказаний нет.

Взаимодействие с лекарственными средствами: Не использовать при лечении PVP-йодом.

Особые указания: Не глотать, не использовать после окончания срока годности

Условия хранения: Хранить при температуре не более 25 °С, защищать от замерзания. Срок годности препарата — 2 года.

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства

Компания «Schülke & Mayr GmbH»

Роберт-Кох Штрассе 2,

22851 Нордерштедт, Германия

Телефон: +49 (0) 40 521 00-0

Телефакс: +49 (0) 40 521 00-318

Эксклюзивный дистрибьютор/организация, принимающая претензии в Республике Казахстан

Компания «Международный Медицинский Торговый Дом»

050000 г.Алматы, Республика Казахстан

ул.Мауленова 61, офис 47

Телефон/Телефакс: +7 (727) 279-35-60

E-mail: mmtd@mail.ru; Website: www.mmtd.kz

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Ауыз шаюға арналған Октенидол (Octenidol)
ерітіндісі



Октенидолдың құрамы: Су, ПЭГ-40 гидрогенді үпілмәлік майы, глицерин, хош иістендіргіш, натрий глюконаты, сукралоза, HCL октенидині, лимон қышқылы, ВНТ.

Шығарылу түрі: 60 мл, 250 мл ыдыстарда шығарылады.

Қасиеттері: ауыз қуысында ауру тудыратын бактериялар мен зеңдердің көбейіп кетуін болдырмайды, сезімтал тістерді тіс түбі тіс жегісінен қорғайды, эмальдің ыстық/суыққа, тәтті/ащыға сезімталдығын төмендетеді, қызыл иектерді бекітіп, олардың қабынып кетуін және қанауға бейімділігін болдырмайды.

Препаратты қолдануға көрсетілімдер:

- Пародонтит пен гингивиттің алдын алу;
- Ауыз қуысындағы қабыну процестерінен кейін шырышты қабатты қайта қалпына келтіру;
- Ауыз қуысы гигиенасының мүмкіндіктерінің шектеулі болуы;
- Пациенттердің ауыз қуысында MRSA колониясы болғанда, балалар онкологиясында, сәулелік терапия процесінде ұстап тұратын және гигиеналық тазарту;
- Периодонтальді және ауызда хирургиялық жолмен емдеу қолдануға дейін және одан кейін;
- Ауыз қуысында зеңдердің ұлғаюына әкелетін аурулар барысында (мысалы, иммунитет тапшылығы немесе онкологиялық ауруы бар пациенттерде).

Қолдану әдісі: ауызды күніне 2-3 рет 30 секунд бойы, MRSA болғанда 15 секунд бойы 15 мл ерітіндімен шаю қажет. Ауыз қуысының зеңдік зақымдануын емдеу барысында әсер ету уақыты 2 минут. Ауыз қуысын гигиеналық шаю тамақ және сұйықтық ішкеннен кейін 10-15 секунд бойы. Қажет болған жағдайда ауыз қуысын таза сумен шаюға болады.

Жанама құбылыстар: Аллергиялық реакциялар.

Препаратты қолдануға қарсы көрсетілімдер: Препараттың жеке құрамдас бөліктеріне жеке төзімсіздік.

Жүктілік және емізу: Қарсы көрсетілімдер жоқ.

Дәрілік құралдармен өзара әрекеттесуі: PVP-йодпен емдеу барысында қолдануға болмайды.

Ерекше көрсетілімдер: Жұтпаңыз, жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін қолданбаңыз.

Сақтау шарттары: 25 °C аспайтын температурада сақтаңыз, қатып қалудан қорғаңыз. Препараттың жарамдылық мерзімі — 2 жыл.

Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы

«Schülke & Mayr GmbH» компаниясы

Роберт-Кох Штрассе 2,

22851 Нордерштедт, Германия

Телефон: +49 (0) 40 521 00-0

Телефакс: +49 (0) 40 521 00-318

Қазақстан Республикасында шағымдарды қабылдайтын эксклюзивті дистрибьютор/ұйым

«Халықаралық Медициналық Сауда үйі» Компаниясы

050000 Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы

Мәуленов к-сі 61, 47 кеңсе

Телефон/Телефакс: +7 (727) 279-35-60

E-mail: mmtd@mail.ru; Website: www.mmtd.kz