

```
In [4]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [27]: def dis(x1,y1,x2,y2):
          a=np.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
          return a


xx=[2.0,2.0,5.0,6.0,5.0,2.5]
yy=[4.0,3.0,2.0,2.0,2.5,3.5]
x=np.array(x1)
y=np.array(y1)

c1=np.array([2.0,4.0])
c2=np.array([5.0,2.0])

c1xx=[2.0]
c1yy=[4.0]

c2xx=[5.0]
c2yy=[2.0]

plt.scatter(x, y, c='black', s=7)
plt.show()
```



```

In [51]: ite=int(len(x))

for i in range(0,ite):
    a=dis(c1[0],c1[1],x[i],y[i])
    b=dis(c2[0],c2[1],x[i],y[i])

    if(a<b):
        c1xx.append(x[i])
        c1yy.append(y[i])

        c1x=np.array(c1xx)
        c1y=np.array(c1yy)

        c1[0]=(c1x.sum())/len(c1x)
        c1[1]=(c1y.sum())/len(c1y)
    else:
        c2xx.append(x[i])
        c2yy.append(y[i])

        c2x=np.array(c2xx)
        c2y=np.array(c2yy)

        c2[0]=(c2x.sum())/len(c2x)
        c2[1]=(c2y.sum())/len(c2y)

    print(c1[0],"",c1[1])
    print(c2[0],"",c2[1])
    print()

xx.append(c1[0])
xx.append(c2[0])

yy.append(c1[1])
yy.append(c2[1])

fx=[c1[0],c2[0]]
fy=[c1[1],c2[1]]

ffx=np.array(fx)
ffy=np.array(fy)

plt.scatter(x,y,c='b',s=50)
plt.scatter(ffx,ffy,marker='>',c='g',s=300)
plt.show()

```

```

2.16129032258  3.51612903226
5.32786885246  2.16393442623

```

```

2.15873015873  3.50793650794
5.32786885246  2.16393442623

```

```

2.15873015873  3.50793650794
5.32258064516  2.16129032258

```


```

2.15873015873  3.50793650794
5.33333333333  2.15873015873

```

```
2.15873015873  3.50793650794  
5.328125  2.1640625
```

```
2.1640625  3.5078125  
5.328125  2.1640625
```



In []: