

Carteirinha: 784.283	Idade: 11a1d	Protocolo: 1.079.882
Nome: Sofia	Sexo: F	Data Requisição: 20/05/2026
Espécie: Felino / SRD		Data Emissão: 22/05/2026
Responsável: Tawan		Fone responsável: -
M.V. - Dr(a).: Luise Hassui Penteado de Santi		CRMV: 24.829
Clínica: Hemolaborvet		Fone clínica: (13) 99609-7489

Página 1 de 2

Bilirrubina e Frações

Material: Soro Método: Colorimétrico

	Resultado	Valor de Referência
Total	1,16 mg/dl	0,1 a 0,7 mg/dl
Direta	0,53 mg/dl	0,1 a 0,3 mg/dl
Indireta	0,63 mg/dl	0,0 a 0,5 mg/dl

Observações:

- Soro Ictérico +
- Bioquímica Repetida e Confirmada



Dra. Vanessa Benoni
CRMV-PR 5401

Diretora e Responsável Técnica

Os resultados referem-se somente às amostras enviadas. A interpretação deve considerar as observações dos exames e a clínica do paciente.



Carteirinha: 784.283		Protocolo: 1.079.882
Nome: Sofia	Idade: 11a1d	Data Requisição: 20/05/2026
Espécie: Felino / SRD	Sexo: F	Data Emissão: 22/05/2026
Responsável: Tawan		Fone responsável: -
M.V. - Dr(a).: Luise Hassui Penteado de Santi		CRMV: 24.829
Clínica: Hemolaborvet		Fone clínica: (13) 99609-7489

Página 2 de 2

FELV - DNA Proviral - PCR Qualitativo

Material: Sangue total em EDTA ou Medula óssea em EDTA Método: Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction)

	Resultado	Valor de Referência
Amostra::	Sangue em EDTA	
Resultado:	Não detectado	Não detectado

Interpretação:

Resultados DETECTADOS (positivos) confirmam a presença de material genético do patógeno pesquisado na amostra

Resultados NÃO DETECTADOS (negativos), devem ser avaliados com cautela, pois há fatores que podem contribuir para a não detecção do patógeno, como o momento da infecção/ estágio da doença, tipo e qualidade da amostra coletada e nível da infecção abaixo da sensibilidade do teste. Por isto é sempre necessário avaliar e correlacionar este resultado com outros exames específicos, exames diferenciais de outras patologias, exames complementares, além da clínica do paciente.

Nota Técnica:

O método utilizado foi desenvolvido SOMENTE PARA DETECÇÃO in vitro de DNA proviral do Vírus da leucemia Felina (FeLV). Os iniciadores e as sequências de sondas utilizadas tem 100% de homologia com uma ampla variedade de sequências de referência relevante (análise de bioinformática abrangente). A técnica possui especificidade e sensibilidade superiores a 95% na amostra adequada(há detecção até mesmo em amostras com baixa carga do agente).

Sabe-se que em determinadas fases infecciosas de retrovírus felinos pode ser que apenas o DNA proviral seja detectável. Fato esse que ocorre muito em pacientes assintomáticos. A pesquisa por ambas as formas de apresentação (DNA proviral e RNA) de retrovírus também é interessante para determinar fase infecciosa.

Importante: casos negativos com persistência da suspeita clínica devem ser novamente avaliados a partir de amostragem representativa da patogenia do microrganismo investigado, correlacionada com o quadro clínico apresentado no momento da coleta. Certifique-se de avaliar os diagnósticos diferenciais aplicáveis ao caso clínico e a eventual necessidade de exames complementares.

A detecção do DNA proviral (genoma viral integrado no genoma do felino infectado) pode indicar animal com infecção ativa (progressiva) ou assintomático persistentemente infectado (regressiva). Devido à possibilidade de coinfeção com FIV, é importante também investigar a presença desse outro agente viral.

A vacinação não produz proteção absoluta contra infecção por FeLV. Dessa forma, gato cronicamente doente deve ser testado para FeLV mesmo que vacinado. Vacina FeLV não interfere no exame Real Time PCR



Dra. Vanessa Benoni
CRMV-PR 5401

Diretora e Responsável Técnica

Os resultados referem-se somente às amostras enviadas. A interpretação deve considerar as observações dos exames e a clínica do paciente.

