

야호농장 종합 리포트

발행일시: 2026. 6. 25.

📄 분석 요약

야호농장의 배나무는 현재 유묘기 단계로 위험 점수 5/100으로 안정적인 상태입니다. 하지만 유묘기는 생육 초기로 섬세한 관리가 필요하며, 특히 치명적인 과수화상병과 꼬마배나무이 발생에 대한 지속적인 예찰이 중요합니다.

🛡️ 주요 위험 요인

🔥 과수화상병

원인/근거: 배나무에 치명적인 세균병으로, 어린 유목은 병원균 침입에 더욱 취약합니다. 현재 기온 25.2°C는 병원균 활동에 유리하며, 비록 강수량이 없더라도 미세한 상처를 통한 감염 위험이 항상 존재합니다.

- ❗ 육안으로 가지, 잎, 꽃에 검게 변하는 증상이 있는지 매일 철저히 예찰하고, 의심 증상 발견 시 즉시 농업기술센터에 신고하여 확산 방지를 위한 조치를 취해야 합니다. 감염 의심 부위는 즉시 제거하고 소독해야 합니다.

🐛 꼬마배나무이 및 배나무이

원인/근거: 현재 기온 25.2°C는 꼬마배나무이와 배나무이의 활동 및 증식에 적합한 환경입니다. 유묘기 배나무의 어린 잎과 신초를 흡즙하여 생육 부진, 잎 변형을 유발하고 끈적한 감로를 분비해 그을음병을 유발할 수 있습니다.

- ❗ 신초와 잎 뒷면을 주기적으로 확인하여 성충, 약충, 알의 유무를 확인하고, 발생 초기에 유묘기에 사용 가능한 방제 약제를 선정하여 살포해야 합니다. 현재 50종의 살포 가능 약제가 있습니다.

✅ 행동 지침 및 권장 작업

📅 즉시 및 주 2회

과수화상병 및 해충 예찰 강화

배나무 신초, 어린 잎, 줄기 등 모든 부위를 세심하게 관찰하여 과수화상병의 검게 마르는 증상이나 꼬마배나무이 등 흡즙 해충 발생 여부를 확인하십시오. 특히 비가 온 후에는 병원균 침입 가능성이 높아지므로 더욱 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

📅 필요 시

잡초 관리 및 토양 수분 유지

유묘기 배나무의 양분 경쟁을 줄이고 건강한 생육을 돕기 위해 주변 잡초를 제거하십시오.
현재 강수량이 0mm이므로, 토양이 건조할 경우 적절한 관수로 수분을 공급하되, 과습하지 않도록 관리합니다. 장성군농업기술센터농기계임대사업소 북부분소에서 경운기 및 작업기를 대여하여 잡초 제거 작업에 활용할 수 있습니다.

☞ 생육 상태를 고려하여 주기적으로

어린 나무 수형 관리 및 생육 촉진

건강한 초기 생육과 미래의 안정적인 수확을 위해 유묘기 가지 유인 및 불필요한 도장지 제거 등 기본적인 수형 관리를 시작하십시오. 이는 나무의 통풍과 일조량 확보에 도움이 되며, 병해충 발생을 억제하는 효과도 있습니다.

⚠ 주의사항

- 등록농약 사용 시에는 제품 라벨의 희석 배수, 살포 시기, 안전 사용 기준(수확 전 최종 살포일)을 반드시 확인하고 준수해야 합니다. 현재 유묘기에는 50종의 약제 살포가 가능하지만, 정확한 제품 정보 확인이 필수입니다.
- 농작업 중에는 안전 장비(마스크, 장갑 등)를 착용하고, 특히 약제 살포 시에는 바람의 방향을 고려하여 인체 노출을 최소화해야 합니다.
- KAMIS 가격 정보는 중도매 및 소매 가격이므로, 농가 실제 수취 가격과 다를 수 있음을 인지하고 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

기상청 단기에보

실 API 응답

농업기상 관측정보 (2026-06-23 관측·0.9km)

실 API 응답

기상청-농업기상 결합데이터 (비교 검증용 결합데이터)

실 API 응답

NCPMS 병해충 정보

실 API 응답

농약등록현황(PERS)

실 API 응답

KAMIS 일별 도·소매 가격정보

실 API 응답

전국농기계임대정보표준데이터

실 API 응답

KREI/ODCloud 임대농기계 상세정보

실 API 응답