



FİNAL SINAV KAĞIDI

Ad Soyadı:	Bölümü: Matematik	NOTU
Numarası:	Dersin Adı: Kısmi Türevli Denklemler	
İmza:	Sınav Tarihi: 24 Ocak 2025	

Süre 75dk. Formüller:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-k(n\pi/L)^2 t}, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

1. (20 puan)

$$u_{tt} - u_{xx} = 6x + 4e^{2t}$$

$$u(x, 0) = x - x^3 \quad u_t(x, 0) = 1$$

başlangıç değer probleminin çözümünü $(x, t) = (1, 1)$ 'de hesaplayın.

$$u(1, 1) =$$

Çözüm: Özel çözüm. $v = F(t) + G(x)$, $F_{tt} = 4e^{2t}$ ve, $-G_{xx} = 6x$ şeklinde bir çözüm ararsak $F = e^{2t}$, $G = -x^3$ ve

$$v = e^{2t} - x^3$$

buluruz. Yani $v_{tt} - v_{xx} = 6x + 4e^{2t}$ olur.

Şimdi $w = u - v$ yazalım.

$$w_{tt} - w_{xx} = u_{tt} - u_{xx} - (v_{tt} - v_{xx}) = 0$$

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = x - x^3 - (1 - x^3) = x - 1 = f(x)$$

$$w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = 1 - 2 = -1 = g(x)$$

d'Alambert çözümüne göre ($c = 1$)

$$\begin{aligned} w(x, t) &= \frac{1}{2} ((x + t - 1) + (x - t - 1)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} -1 d\xi \\ &= x - 1 - \frac{1}{2} ((x + t) - (x - t)) \\ &= x - 1 - t \end{aligned}$$

Buradan

$$u = w + v = x - 1 - t + e^{2t} - x^3 \implies u(1, 1) = e^2 - 2$$

2. (30 puan) $z_{xx} + z_{yy} + z_x = xy + 12e^{x+2y}$ denkleminin özel bir çözümünü ters görüntü yöntemiyle elde edin.

$$z(x, y) =$$

Çözüm: $L = D_x^2 + D_y^2 + D_x$,

$$Lz_1 = xy,$$

$$Lz_2 = 3e^{x+2y}.$$

$$z_2 = Ae^{x+2y},$$

$$Lz_2 = (1 + 4 + 1)Ae^{x+2y} = 12e^{x+2y}. \text{ Buradan } A = 2 \text{ olur}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{1}{D_x} \frac{1}{1 + \frac{D_y^2}{D_x} + D_x} (xy) = \frac{1}{D_x} \left(I - \left(\frac{D_y^2}{D_x} + D_x \right) + \left(\frac{D_y^2}{D_x} + D_x \right)^2 - \dots \right) (xy) \\ &= \frac{1}{D_x} \left(I - \left(\frac{D_y^2}{D_x} + D_x \right) + \left(\frac{D_y^4}{D_x^2} + 2D_y^2 + D_x^2 \right) - \dots \right) (xy) = \frac{1}{D_x} ((xy) - (y) + 0) \\ &= \frac{x^2 y}{2} - xy \end{aligned}$$

$$z = z_1 + z_2 = \frac{x^2 y}{2} - xy + 2e^{x+2y}$$

3. (20 puan)

$$u_t = 3u_{xx}$$

$$u(x, 0) = 1$$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0$$

denklemini için

$$h(t) = \int_0^\pi u(x, t) \sin(3x) dx$$

integralini bulun.

İpucu: Her $n, m \in \mathbb{N}$ için $\int_0^\pi \sin(nx) \sin(mx) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \end{cases}$

$$h(t) =$$

Çözüm: Çözüm

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-3n^2 t} \sin(nx)$$

olarak yazılır.

$$\int_0^\pi u(x, t) \sin(3x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-3n^2 t} \int_0^\pi \sin(nx) \sin(3x) dx = A_3 e^{-27t} \frac{\pi}{2}$$

Burada

$$A_3 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin(3x) \cdot 1 dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1 - \cos(3\pi)}{3} \right) = \frac{4}{3\pi}$$

$$\text{Cevap} = \frac{2}{3} e^{-27t}.$$

4. (30 puan) $u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2u_{yy} = 0$, $x > 0$ denklemini

(a) Diskriminantını hesaplayarak sınıflandırın.

(b) Uygun ξ, η dönüşümleri belirleyip, $\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)}$ Jakobyenini hesaplayın.

(c) Kanonik forma dönüştürün.

Kanonik Form:

Çözüm: (a)

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0$$

$$A = 1, \quad B = x, \quad C = x^2$$

$$\Delta = B^2 - AC = x^2 - (1)(x^2) = x^2 - x^2 = 0$$

Diskriminant $\Delta = 0$ olduğu için, bu bir **parabolik** diferansiyel denklemdir.

(b)

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-B}{A} = -x$$

$$\frac{dy}{dx} + \lambda_1 = 0 \implies \xi = y - \frac{1}{2}x^2$$

$\eta = x$ seçelim.

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = -1 \neq 0$$

(c)

$$u_x = -xu_\xi + u_\eta,$$

$$u_{xx} = -u_\xi - x(-xu_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}) - xu_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}$$

$$u_y = u_\xi,$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi},$$

$$u_{xy} = -xu_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}.$$

$$0 = (x^2 u_{\xi\xi} - 2xu_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - u_\xi) + 2x(-xu_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}) + x^2 u_{\xi\xi}$$

Kanonik form:

$$u_{\eta\eta} - u_\xi = 0$$