


Qualificação - Tauanna

Como a EBO está distribuída por faixas etárias?

A idade média dos esqueletos da amostra é 62.6 anos. A mediana é 64 anos de idade. As idades mínima e máxima são 13 e 109 anos, respectivamente.

A maioria dos esqueletos tem entre 55 e 75 anos




Como a EBO está distribuída pelos sexos masculino e feminino?

O gráfico abaixo considera todas as amostras, com e sem EBO.


Há mais homens do que mulheres na amostra

No total, são 204 homens e 171 mulheres




O gráfico abaixo considera apenas amostras com EBO.

Há mais homens do que mulheres acometidos pela EBO, na amostra
No total, são 81 homens e 52 mulheres



Qual a ocorrência de EBO na amostra?

“Mostrar a distribuição da EBO na amostra.”




133 esqueletos tem EBO. Esqueletos sem EBO são 242.

Quais os seguimentos (vértebras) mais acometidas pela EBO?

Observação: Nos dados, existe uma única vértebra de nome “C”. Por ser inconclusiva, eu retirei essa observação da amostra para gerar as tabelas presentes nesse documento.

Vértebra	Número de Casos de EBO	Proporção do Número Total de Casos
S1	45	25.57%
S4	41	23.30%
S4-S5	31	17.61%
C1	16	9.09%
S3-S5	15	8.52%
S1-S2	7	3.98%
S1-S5	4	2.27%
S2	4	2.27%
S2-S5	3	1.70%
L5	2	1.14%
C2	1	0.57%
C4-C5	1	0.57%
S1-S3	1	0.57%
T1	1	0.57%
T10	1	0.57%
T11-T12	1	0.57%
T5	1	0.57%

Cinco seguimentos apresentam um número de casos acima da média



A linha pontilhada representa o número médio (9.77) de casos de EBO por seguimento, na amostra.

Dos seguimentos mais acometidos, quantos são bilaterais e quantas são unilaterais?

93% dos acometimentos são bilaterais, dentre os cinco seguimentos mais acometidos

