

Les équations

 Théorie pages 147 à 151

1. Introduction

1.1. Casse-tête carré (1^{re} rencontre)

	6	2	← 13
			← 21
		9	← 11

Le but de ce casse-tête est de trouver les valeurs cachées sous les symboles pour que la somme de chaque ligne corresponde au nombre indiqué à côté de celles-ci.

- a) Observe la première ligne du carré : si x désigne le symbole , écris une égalité traduisant la situation. Réduis ensuite les termes semblables.

- b) La première balance à l'équilibre ci-dessous peut représenter cette égalité. Complète le plateau de droite dans la deuxième balance pour conserver l'égalité.



- c) Quelle manipulation a-t-on effectuée pour conserver l'équilibre de la balance en passant de la première à la seconde ?

.....

.....

1. Les équations

d) En t'inspirant de cette manipulation, écris la résolution de l'équation.

Exercice 1. Sur base de l'exemple ci-dessus, résous les équations suivantes de type $a + x = b$. Laisse ta démarche visible et n'oublie pas d'aligner les égalités.

a) $x + 7 = 13$

e) $5 + x = 2$

b) $20 = x - 8$

f) $3 + x = 20$

c) $x - 15 = 0$

g) $-2 + x = 3$

d) $\frac{1}{2} + x = 5$

h) $x - \frac{3}{4} = -\frac{6}{5}$


1.2. Casse-tête carré (2^e rencontre)

Reprenons notre casse-tête du début, et intéressons-nous à la deuxième ligne cette fois.

	6	2	← 13
			← 21
		9	← 11

- a) Si x désigne le symbole $\triangle$, écris une égalité traduisant la situation. Réduis ensuite les termes semblables.

- b) La première balance à l'équilibre ci-dessous peut représenter cette égalité. Complète le plateau de droite dans la deuxième balance pour conserver l'égalité.




- c) Quelle manipulation a-t-on effectuée pour conserver l'équilibre de la balance en passant de la première à la seconde ?

.....

.....

- d) En t'inspirant de cette manipulation, écris la résolution de l'équation.

- e) Situation similaire ? Complète la deuxième balance pour conserver l'équilibre.



- f) Quelle manipulation a-t-on effectuée pour conserver l'équilibre de la balance ?

.....

.....

1. Les équations

g) En t'inspirant de cette manipulation, complète la résolution de l'équation.

Exercice 2. Résous les équations suivantes de type $ax = b$ en laissant visibles tes étapes.

a) $7x = 42$

e) $\frac{x}{15} = -25$

b) $891 = 3x$

f) $-3x = 9$

c) $48 = \frac{x}{2}$

g) $10x = 0$

d) $-6x = 702$

h) $12x = 1$

1.3. Casse-tête carré (3^e rencontre)

Il nous reste maintenant la dernière ligne de notre casse-tête à analyser.

	6	2	← 13
			← 21
		9	← 11

- a) Traduis l'égalité suggérée par la dernière ligne en une égalité où x représente la valeur du symbole $\bigcirc$ et réduis les termes semblables.
- b) Pour résoudre cette équation, tu vas devoir combiner les méthodes que tu viens d'apprendre. Peux-tu y arriver ?

Exercice 3. Résous les équations suivantes de type $ax + b = c$. Laisse ta démarche visible.

a) $3x + 7 = 37$

d) $6x - 15 = -2$

b) $-12 = 9x - 3$

e) $125 = 3x + 17$

c) $2x + 7 - 6x = -33$

f) $41 = 6x - 1$

1. Les équations

2. Vocabulaire

Une équation est

.....

.....

Exemple :

Résoudre une équation, c'est

.....

.....

Exercice 4. Associe chaque équation avec sa solution.

$-3x = 21$	•	•	4
$x + 8 = 12$	•	•	7
$2x - 9 = -17$	•	•	5
$10 + 3x = 31$	•	•	-7
$17 - x = 3x - 3$	•	•	-4

Exercice 5. Pour chaque énoncé, détermine si le nombre proposé est solution de l'équation.

a) -3 est-il solution de l'équation $5x + 9 = -x + 12$?

b) 7 est-il solution de l'équation $5x - 3 = (x - 3) \cdot 8$?

c) 2 est-il solution de l'équation $3x^2 + 12 = 9x - x^3 + 14$?

Voici quelques observations.

- $x + 2 = 3$ est une équation du premier degré à une inconnue.
- $x + y = 4$ est une équation du premier degré en x et en y à deux inconnues.
- $x^2 = 4$ est une équation du second degré à une inconnue.
- $x^2 + 3 = x$ est une équation du second degré à une inconnue.

Peux-tu donner un exemple d'une équation du troisième degré à une inconnue ?

Le degré d'une équation à une inconnue est

.....

.....

i Dans le cadre du cours, nous ne travaillerons qu'avec des équations du premier degré à une inconnue.

3. Méthode de résolution

Pour résoudre une équation, nous devons isoler l'inconnue (conventionnellement désignée par la lettre x) dans un des membres de l'équation. À cette fin, nous avons découvert que nous pouvons effectuer des opérations sur les deux membres de l'égalité sans en changer la solution.

Les principes d'équivalences

Si on ajoute (retire) un même nombre aux deux membres de l'égalité, alors on obtient une nouvelle égalité qui a la même solution (équivalente).

$$\begin{array}{c} x - 2 = 3 \\ -2 \swarrow \quad \searrow -2 \\ x = 5 \end{array}$$

Si on multiplie (divise) par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité, alors on obtient une nouvelle égalité qui a la même solution (équivalente).

$$\begin{array}{c} 2x = 10 \\ : 2 \swarrow \quad \searrow : 2 \\ x = 5 \end{array}$$

Lorsque la résolution d'une équation demande plusieurs étapes, on respecte l'ordre de la priorité des opérations, mais « à l'envers ». On neutralise donc d'abord *les additions et les soustractions* avant de s'attaquer *aux multiplications et aux divisions*. Plus généralement, on commence par s'occuper de l'opération principale, c'est-à-dire la dernière opération effectuée en suivant la priorité des opérations.

Exemples :

a) $3x + 7 = 64$

b) $-12 = -27x + 45$

i Le résultat d'une équation peut être une fraction. Veille cependant à toujours la simplifier au maximum !

Équations avec une inconnue dans les deux membres

Lorsque nous avons une *inconnue dans chacun des membres*, nous allons dans un premier temps éliminer les inconnues dans l'un des deux membres (on dit qu'on isole l'inconnue). Ensuite, nous utiliserons les principes d'équivalences pour déterminer la valeur de cette inconnue.

$$2x + 5 = x - 3$$

On peut décider d'isoler x dans le membre de gauche ou de droite. Ici on choisit le membre de gauche en retirant x dans les deux membres

$$x + 5 = -3$$

$$x = -8$$

Exemples :

a) $3x + 17 = 5x - 25$

b) $5x + 7 = 9x + 17$

Exercice 6. Résous les équations suivantes.

a) $16x + 9 = 19x + 2$

b) $13x + 9 = 11x + 4$

1. Les équations

c) $2(x + 3) - 9x = 12x + 2$

d) $10x + 5 = 17x + 3$

Équations avec des fractions dans les deux membres

Les principes d'équivalences, nous permettent de facilement transformer une équation contenant des fractions en une équation équivalente qui n'en contient plus. Pour cela, nous allons mettre les deux membres sur le même dénominateur puis les multiplier par ce même dénominateur simplifiant ainsi les fractions.

$$\frac{3}{2} + \frac{x}{7} = \frac{15}{14}$$

Mettons toutes ces fractions au même dénominateurs

$$\frac{21}{14} + \frac{2x}{14} = \frac{15}{14}$$

Multiplions les deux membres par 14 pour simplifier toutes les fractions

$$21 + 2x = 15$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

Exercice 7. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{5}{8} = \frac{9}{x}$

d) $\frac{x-9}{8} + 3 = \frac{7}{2}$

b) $9 - \frac{3}{9} = x - 12x$

e) $\frac{-3-x}{4x} = \frac{7}{9}$

c) $\frac{8}{x} = -16$

f) $\frac{14x}{5} = 15$

4. Mise en équation et résolution de problèmes

Les équations sont un outil très puissant pour trouver des solutions dans des situations concrètes. La difficulté est essentiellement de convertir notre problématique en une équation. Pour t'aider, tu trouveras à la page 151 du manuel de théorie 5 étapes pour résoudre un problème à l'aide d'équations.

Exercice 8. Associe chaque énoncé avec l'équation correspondante.

$$(x + 2) \cdot 4 = 50 \quad 50 + 2 = 4x \quad (x - 2) \cdot 4 = 50 \quad 50 - 20 = 4x \quad 2x + 50 = 4x$$

- a) Dimitri pense à un nombre, lui retranche 2. Puis, il multiplie le résultat par 4. Il obtient 50. Quel est ce nombre ?
- b) Mathilde réserve des places pour se rendre avec trois amies à un concert. Sur son billet de 50 €, on lui rend 20 €. Quel est le prix d'une place ?
- c) On a augmenté de 2 cm chacun des côtés d'un carré. Le périmètre du carré agrandi vaut 50 cm. Que mesurait le carré avant l'agrandissement ?
- d) Un éleveur de chiens a disposé 50 m de clôture pour entourer un enclos carré. Il a laissé une ouverture de 2 m sans clôture sur un des côtés pour la porte. Quelle est la mesure d'un côté de l'enclos ?
- e) Théo choisit un nombre, le multiplie par 2, puis ajoute 50. Tom multiplie par 4 le nombre choisi par Théo et obtient le même résultat. Quel était ce nombre ?

Exercice 9. Si x représente le prix d'une place au tarif « ado », entoure l'équation qui correspond au problème posé. Résous ensuite l'équation choisie.

Un groupe de 8 ados part au théâtre avec 3 adultes. Une place « ado » est 3 € moins cher qu'une place « adulte ». Les 11 personnes ont payé 86 € au total. Détermine le prix d'une place au tarif « ado ».

- a) $8x + 3(x + 3) = 86$
- b) $8x + 3(x - 3) = 86$
- c) $8x - 3(x + 3) = 86$
- d) $8x - 3(x - 3) = 86$

Résolution :


Exercice 10. Résous les problèmes suivants en utilisant les 5 étapes de la page 151 du manuel de théorie.

- a) Jean et sa sœur perçoivent leur rétribution pour un travail de vacances. La sœur de Jean perçoit 100 € de plus que Jean ; ensemble, ils ont 1 000 €. Combien ont-ils chacun gagné ?
- b) Victor, Maxence et Zoé ont cueilli 152 pommes. Maxence en a cueilli deux fois plus que Victor et Zoé en a cueilli douze de plus que Maxence. Combien de pommes ont-ils chacun cueillies ?

1. Les équations

c) La somme de 3 nombres consécutifs vaut 129. Quels sont ces nombres ?


d) Détermine la mesure de b dans la figure suivante si tu sais que son périmètre vaut 56.



4. Mise en équation et résolution de problèmes

e) Les $\frac{2}{3}$ d'un nombre augmentés ensuite de 10 valent 60. Quel est ce nombre ?

f) Le périmètre du petit magasin de bricolage de ta ville (qui est représentée par le plan ci-contre) est égal à 62 m.



5. Exercices mélangés

Exercice 11. Vérifie si les valeurs de x sont des solutions des équations suivantes.

- a) 5 est-il une solution de l'équation $3x + 7 = 24 - 2$
- b) 17 est-il solution de l'équation $15 + 2(x - 6) = 32 + x$
- c) $\frac{3}{2}$ est-il solution de l'équation $6x - 10 = \frac{15}{30} - x$
- d) 3 est-il solution de l'équation $x^2 + 2x - 10 = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right)$

Exercice 12. Résous les équations suivantes.

- a) $x + 3 = 6$
- b) $x - 4 = 2$
- c) $x + 5 = -6$
- d) $x - 8 = 10$
- e) $x + 3 = -8$
- f) $x - 1 = -4$

Exercice 13. Résous les équations suivantes.

- a) $3x = 6$
- b) $-x = 8$
- c) $\frac{x}{3} = 5$
- d) $\frac{2x}{7} = 4$
- e) $-4x = -5$
- f) $\frac{3x}{8} = 21$

Exercice 14. Résous les équations suivantes.

- a) $4 + 2x = 10 - 4x$
- b) $9x - 7 = 3 - 3x + 8$
- c) $4 + 2x = 20 - 8x$
- d) $2(3x - 1) - 2x = 7x + 3$
- e) $5x + 2 = 2x + 6$
- f) $2(3x + 3) = -2(x - 7)$
- g) $-3(4x + 3) = 2x + 6$
- h) $\frac{x + 3}{3} = \frac{2x + 1}{4}$
- i) $\frac{2x - 3}{3} = -5x + 1$
- j) $\frac{3 - 4x}{5} = \frac{2x + 1}{4}$
- k) $(9x - 3)^2 + 12 = 17 + 81x^2$

Exercice 15. Résous ces équations. Attention à la présentation de ton développement !

a) $x + 9 = 13$

i) $(3 + 2x)^2 = 5x + 4x^2$

b) $2 + x = 2$

j) $3(x + 3) = 3x + 9$

c) $\frac{x}{4} = 3$

k) $\frac{12}{x} + 3 = 6$

d) $3x - 7 + 2x = 8$

l) $4(5 - 2x) + 5 = 45$

e) $2x - 6 = 5 + x$

m) $-7x = \frac{5}{6}$

f) $20 = 8x + 2x$

n) $(x - 9)(1 + x) - 7 = x^2$

g) $5x = \frac{6}{3}$

o) $-(5 - x) + 2x = 5x$

h) $-x + 5 = -1$

Exercice 16. Résous les problèmes suivants.

- a) Squeezie, McFly et Carlito font une vidéo où ils déballent 33 objets bizarres. McFly en a déballé 3 de plus que Carlito et Squeezie en a déballé en double de McFly. Combien chacun des youtubeurs a-t-il déballé d'objets ?
- b) Les $\frac{7}{8}$ d'un nombre valent 6. Quel est ce nombre ?
- c) Le père de Mirdel a 36 ans. Si Mirdel était deux fois plus âgé, il aurait 10 ans de moins que son père. Quel est l'âge de Mirdel ?
- d) Pour le projet « La VF fait son tour du monde », les élèves de 2^e H ont comptabilisé leurs kilomètres pendant 2 semaines. Isis annonce : « Margaux a fait 3 km de plus que Alexis, qui en a fait le tiers seulement de Mehmet. Moi, j'en ai fait autant que Mehmet. Au total, à nous quatre, nous avons marché 35 km ». Combien chacun du groupe a-t-il marché de kilomètres ?
- e) Donovan fait un tour de magie. Il dit à Joyca de choisir un nombre, de le multiplier par 3. Ensuite, il lui demande d'ajouter 5 à son produit et de multiplier le tout par 2. Joyca dit alors qu'il est arrivé à 88 comme résultat. Aide Donovan à trouver le nombre de départ de Joyca.