

TP 2 – SY02

Probabilités

1 Étude de peintres

Roger de Piles est un peintre et critique d'art français du 18ème siècle. Pour évaluer un peintre, de Piles a considéré quatre critères : composition, dessin, couleur, expression. Chacune de ces caractéristiques est notée sur 20. Plusieurs écoles artistiques ont été étudiés par de Piles : (A) renaissance, (B) maniériste, (C) italienne du 17ème siècle, (D) vénitienne, (E) lombarde, (F) 16ème siècle, (G) 17ème siècle, (H) française. Dans le logiciel R, on peut accéder aux notes de 54 peintres évalués par de Piles en chargeant tout d'abord la librairie MASS :

```
| > library(MASS)
```

Les données sont alors accessibles à travers le `data.frame` `painters` :

```
| > head(painters)
```

	Composition	Drawing	Colour	Expression	School
Da Udine	10	8	16	3	A
Da Vinci	15	16	4	14	A
Del Piombo	8	13	16	7	A
Del Sarto	12	16	9	8	A
Fr. Penni	0	15	8	0	A
Guilio Romano	15	16	4	14	A

- ① En utilisant des histogrammes, visualiser la distribution des notes pour chaque critère.
- ② Calculer dans une variable `moyenne` la moyenne des quatre notes pour chaque peintre.
- ③ Calculer la moyenne empirique, les variances et écarts types empiriques corrigés et non-corrigés des notes moyennes en n'utilisant que la fonction `sum`.
- ④ Retrouver les valeurs précédentes à l'aide des fonctions `mean`, `var` et `sd`.
- ⑤ Tracer l'histogramme des notes moyennes et commenter le résultat.

2 Calcul de probabilités

Plusieurs lois de probabilités sont incluses par défaut dans R. Parmi les plus communes, on peut citer :

- la loi uniforme : `unif`;
- la loi de Poisson : `pois`;
- la loi exponentielle : `exp`;
- la loi binomiale : `binom`;
- la loi normale : `norm`;
- la loi de Student : `t`;
- la loi du χ^2 : `chisq`;
- la loi de Fisher : `f`.

Pour chacune de ces lois, il est possible d'accéder à la fonction de densité en ajoutant le suffixe `d`, à la fonction de répartition avec `p`, aux fractiles avec `q` et à un générateur de nombre aléatoire en utilisant le suffixe `r`. À titre d'exemple, étudions la loi uniforme sur l'intervalle $[2, 5]$ notée $\mathcal{U}_{[2,5]}$. La valeur de sa fonction de densité $f(x)$ en un point x peut être calculée à l'aide de la fonction `dunif`.

```
> dunif(1, min=2, max=5)
[1] 0
> dunif(2, min=2, max=5)
[1] 0.3333333
> dunif(4, min=2, max=5)
[1] 0.3333333
> dunif(6, min=2, max=5)
[1] 0
```

Les arguments `min` et `max` permettent de spécifier l'intervalle $[2, 5]$. Ces paramètres sont propres à la loi uniforme. Pour chaque loi disponible dans R, tous les paramètres associés sont listés et expliqués dans l'aide.

Soit $X \sim \mathcal{U}_{[2,5]}$, la probabilité $\mathbb{P}(X \leq 4) = F_X(4)$ peut être obtenue avec la commande suivante :

```
> punif(4, min=2, max=5)
[1] 0.6666667
```

Le fractile d'ordre α est retourné par la fonction `qunif`.

```
> qunif(0.25, min=2, max=5)      # fractile d'ordre 0.25, premier quartile
[1] 2.75
```

Enfin, la commande `runif` permet d'obtenir la réalisation d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme.

```

> runif(1, min=2, max=5)
[1] 3.924845
> runif(1, min=2, max=5)
[1] 4.67119
> runif(10, min=2, max=5)           # permet d'obtenir la réalisation d'un
  ↪ échantillon de taille 10
[1] 4.930591 4.869090 2.516348 3.591710 3.248439 4.370218 3.331027
[8] 3.303137 2.443843 3.564882

```

⑥ À l'aide des fonctions introduites précédemment, calculer avec R les probabilités des événements suivants :

1. une variable normale centrée-réduite est supérieure à 3 ;
2. une variable normale d'espérance 35 et d'écart-type 6 est inférieure à 42 ;
3. une variable normale d'espérance 35 et d'écart-type 6 est comprise entre 40 et 50 ;
4. obtenir $n - 1$ faces sur n lancers d'une pièce de monnaie équilibrée, avec $n = 5, 10, 30$;
5. obtenir strictement plus de 14 faces sur 20 lancers d'une pièce de monnaie équilibrée ;
6. obtenir entre 10 et 15 faces sur 20 lancers d'une pièce de monnaie équilibrée.

⑦ Calculer avec R les fractiles d'ordre $\alpha = 0.05, 0.1, 0.9$ pour les lois suivantes et retrouver les dans les tables statistiques du cours :

1. loi normale centrée réduite ;
2. loi du χ^2 à 10 degrés de liberté ;
3. loi de Student à 5 degrés de liberté ;
4. loi de Fisher à 2 et 5 degrés de liberté.

3 Implémentation d'une loi de probabilité

On souhaite maintenant ajouter à R la loi de probabilité du premier exercice du TD n°2 définie par la densité de probabilité suivante :

$$f(x) = \begin{cases} ax & \text{si } 0 \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases},$$

avec $b > 0$ et $a = 2/b^2$. On notera cette loi $\mathcal{L}(b)$.

Sous R, il est possible de définir des fonctions avec la commande **function**. Par exemple, on peut définir la fonction **carre** qui à tout nombre x associe son carré x^2 de la manière suivante :

```

carre <- function(x) {
  y <- x*x
  return(y)
}

```

La fonction `carre` peut maintenant être utilisée comme une fonction de \mathbb{R} .

```
> carre(2)
[1] 4
> carre(9)
[1] 81
```

Il est également possible de créer une fonction prenant plusieurs arguments. On peut construire la fonction `puissance` qui à deux nombres a et b associe a^b de la façon suivante :

```
puissance <- function(a, b) {
  return(a^b)
}
```

On obtient ainsi :

```
> puissance(2,3)
[1] 8
> puissance(16,1/2)
[1] 4
```

On peut remarquer qu'il est également possible de passer des vecteurs comme arguments des fonctions `carre` et `puissance`.

```
> carre(c(1,3,5))
[1] 1 9 25
> puissance(2:5, 3)
[1] 8 27 64 125
```

⑧ Écrire la fonction `dloi(x,b)` qui pour tout $x \in \mathbb{R}$ donne la valeur de la fonction de densité $f(x)$ de la loi $\mathcal{L}(b)$. On vérifiera que la fonction peut également prendre un vecteur en argument.

⑨ On choisit $b = 3$, calculer la valeur de $f(x)$ pour $x = -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Il est possible de visualiser facilement la fonction `dloi` avec la commande suivante :

```
| curve( dloi(x,3), from=-5, to=5 )
```

où les arguments `from` et `to` correspondent aux bornes entre lesquelles tracer la courbe.

⑩ Écrire la fonction `ploi(x,b)` qui donne la fonction de répartition F de la loi $\mathcal{L}(b)$.

⑪ Tracer la fonction de répartition F entre -5 et 5 avec $b = 3$.

⑫ Écrire la fonction `qlloi(alpha,b)` qui retourne les fractiles $f_\alpha = F^{-1}(\alpha)$ de la loi $\mathcal{L}(b)$. On admettra que $F^{-1}(0) = 0$ et $F^{-1}(1) = b$.

Soit $X \sim \mathcal{L}(b)$, on souhaite maintenant générer une réalisation aléatoire de X . Pour cela, nous allons montrer dans un premier temps qu'il est possible d'y parvenir en passant par une variable intermédiaire $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$.

(13) Soit $Y = F_X^{-1}(U)$, montrer que Y suit la même loi que X . Pour cela, on pourra montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, F_Y(x) = F_X(x)$.

(14) Écrire la fonction `rloi(n,b)` qui génère aléatoirement un échantillon de taille n suivant la loi $\mathcal{L}(b)$.

(15) Générer un échantillon de taille n suivant la loi $\mathcal{L}(b)$ puis le visualiser sous la forme d'un histogramme. On prendra $b = 3$ et $n = 10, 50, 100, 1000$.

4 Bonus

On peut remarquer que la fonction `puissance` n'est définie pour les réels a et b . En effet, si $a < 0$, alors la fonction `puissance` n'est pas définie pour $b \in]-1; 1[$. De même, si $a = 0$, alors la fonction `puissance` n'est pas définie pour $b < 0$.

```
> puissance(-1, 1/2)
[1] NaN
> puissance(0, -2)
[1] Inf
```

La fonction `stop` permet d'afficher un message d'erreur et d'arrêter l'exécution d'une fonction. On peut compléter la fonction `puissance` ainsi :

```
puissance <- function(a, b) {
  if (any(a < 0) & b > -1 & b < 1) stop('non définie pour a < 0 et -1 < b < 1')
  if (any(a == 0) & b < 0) stop('non définie pour a = 0 et b < 0')
  return (a^b)
}

> puissance(-1, 1/2)
Error in puissance(-1, 1/2): non définie pour a < 0 et -1 < b < 1
> puissance(0:2, -2)
Error in puissance(0:2, -2): non définie pour a = 0 et b < 0
```

(16) Corriger les fonctions `dloi`, `ploi`, `qloi` et `rloi` pour qu'elles affichent un message d'erreur lorsque leurs arguments sont mal définis.