

MA362 — 复分析

Assignment 3

Instructor: 姚卫红

Author: 刘逸灏 (515370910207)

— SJTU (Fall 2019)

习题 三/3

设函数 $f(z)$ 当 $|z - z_0| > r_0$ ($0 < r_0 < r$) 时是连续的. 令 $M(r)$ 表示 $|f(z)|$ 在 $|z - z_0| = r > r_0$ 上的最大值, 并且假定

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} rM(r) = 0.$$

试证明

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} f(z) dz = 0.$$

在这里 K_r 是圆 $|z - z_0| = r$.

$$0 \leq \left| \int_{K_r} f(z) dz \right| \leq \int_{K_r} |f(z)| dz \leq 2\pi r M(r),$$

$$0 \leq \lim_{r \rightarrow +\infty} \left| \int_{K_r} f(z) dz \right| \leq \lim_{r \rightarrow +\infty} 2\pi r M(r) = 0.$$

故

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} f(z) dz = 0.$$

习题 三/4

如果满足上题中条件的函数 $f(z)$ 还在 $|z - z_0| > r_0$ 内解析, 那么对任何 $r_1 > r_0$,

$$\int_{K_{r_1}} f(z) dz = 0.$$

设 $D = \{z \mid r_1 < |z - z_0| < r\}$, 则 $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$, 且 K_{r_1} 和 K_r 是可求长闭曲线并围成了 D , 根据柯西积分定理和推论可知

$$\int_{K_{r_1}} f(z) dz = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} f(z) dz = 0.$$

习题 三/8

如果积分路径不经过点 $\pm i$, 那么

$$\int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right), \quad f'(z) = -\frac{2z}{(1+z^2)^2} \quad (z \neq \pm i).$$

设 $D = \{z \mid z \neq \pm i\}$, 则 $f \in H(D)$. 若积分路径不围绕 $\pm i$, 则积分值可以按照延实轴积分计算:

$$\int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

若积分路径围绕 i 点 k_1 圈 (γ_1), 围绕 $-i$ 点 k_2 圈 (γ_2), 其中 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, 则积分值为:

$$\int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2i} \left(\int_{\gamma_1} \frac{dz}{z-i} - \int_{\gamma_2} \frac{dz}{z+i} \right) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2i} (2k_1\pi i - 2k_2\pi i) = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

习题 三/9

证明:

- (1) $\left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq 2$, C 为联 $-i$ 到 i 的线段;
- (2) $\left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \pi$, C 为右半单位圆 $|z| = 1, \operatorname{Re} z \geq 0$;
- (3) $\left| \int_C \frac{1}{z^2} dz \right| \leq 2$, C 为联 i 到 $i+1$ 的线段;

(1)

$$x = 0, \quad -1 \leq y \leq 1 \implies |x^2 + iy^2| \leq 1.$$

$$L = 2, \quad M = \sup_{z \in C} |f(z)| = \sup_{z \in C} |x^2 + iy^2| = 1.$$

故根据长大不等式得

$$\left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq ML = 2.$$

(2)

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta \implies |x^2 + iy^2| \leq \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

$$L = \pi, \quad M = \sup_{z \in C} |f(z)| = \sup_{z \in C} |x^2 + iy^2| = 1.$$

故根据长大不等式得

$$\left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq ML = \pi.$$

(3)

$$1 \leq |z| \leq \sqrt{2} \implies \left| \frac{1}{z^2} \right| \leq 1.$$

$$L = 1, \quad M = \sup_{z \in C} |f(z)| = \sup_{z \in C} \left| \frac{1}{z^2} \right| = 1.$$

故根据长大不等式得

$$\left| \int_C \frac{1}{z^2} dz \right| \leq ML = 1 \leq 2.$$

习题 三/11

计算积分

$$(1) \int_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz;$$

$$(2) \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 2};$$

$$(3) \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2};$$

$$(4) \int_{|z|=1} \frac{z dz}{(2z + 1)(z - 2)};$$

(1)

设 $f(z) = e^z$, γ 为 $|z| = 1$, D 为 γ 围成的域, 则 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 根据柯西积分公式得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi,$$

$$\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = \int_{|\xi|=1} \frac{f(\xi)}{\xi - 0} d\xi = 2\pi i \cdot f(0) = 2\pi i.$$

(3)

设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2}$, γ 为 $|z| = 2$, 则 γ 内有两个奇点 $\sqrt{2}i$ 和 $-\sqrt{2}i$, 则

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}i} \left(\int_{|z|=2} \frac{dz}{z - \sqrt{2}i} - \int_{|z|=2} \frac{dz}{z + \sqrt{2}i} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}i} (2\pi i - 2\pi i) = 0.$$

(3)

设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2}$, γ 为 $|z| = 1$, D 为 γ 围成的域, 则 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 根据柯西定理得

$$\int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2} = 0.$$

(4)

设 $f(z) = \frac{z}{(2z+1)(z-2)}$, γ 为 $|z| = 2$, 则 γ 内有一个奇点 $-1/2$, 则

$$\int_{|z|=1} \frac{zdz}{(2z+1)(z-2)} = \frac{1}{5} \left(\int_{|z|=1} \frac{dz}{2z+1} + \int_{|z|=1} \frac{2dz}{z-2} \right) = \frac{1}{10} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z+1/2} = \frac{1}{10} \cdot 2\pi i = \frac{1}{5}\pi i.$$

习题 三/13

设

$$f(z) = \int_{|\xi|=3} \frac{3\xi^2 + 7\xi + 1}{\xi - z} d\xi,$$

求 $f'(1+i)$.

设 $g(z) = 3z^2 + 7z + 1$, γ 为 $|z| = 3$, D 为 γ 围成的域, $1+i \in D$, 则 $g \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 根据柯西积分公式得

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=3} \frac{g(\xi)}{\xi - z} d\xi,$$

$$f(z) = 2\pi i \cdot g(z) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1),$$

$$f'(z) = 2\pi i(6z + 7),$$

$$f'(1+i) = 2\pi i(6+6i+7) = -12\pi + 26\pi i.$$

习题 三/16

如果 $f(z)$ 在 $|z - z_0| > r_0$ 内解析, 并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A$, 那么对任何正数 $r > r_0$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz = A,$$

在这里 K_r 是圆 $|z - z_0| = r$, 积分是按反时针方向取的.

设 $R > r > r_0$, D 为 K_r 和 K_R 围成的域, 则 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_R} f(z) dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz.$$

根据柯西积分定理得

$$A = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} \frac{A}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} \frac{A}{z} dz.$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz - A \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} \lim_{r \rightarrow \infty} \left(f(z) - \frac{A}{z} \right) dz \right| = 0.$$

故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz = A.$$

习题 三/17

如果函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 的外区域 D 内及 C 上每一点解析, 并且

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} -f(z) + a & (\text{当 } z \in D \text{ 时}), \\ a & (\text{当 } z \in C \text{ 的内区域时}), \end{cases}$$

这里沿 C 的积分是按反时针方向取的.

根据柯西积分定理得

$$a = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} \frac{a}{\xi - z} d\xi,$$

其中 K_r 是圆 $|\xi - z| = r$.

设 $K_R \in D$, D' 为 D 和 K_R 围成的域, 则 $f \in H(D') \cap C(\overline{D'})$, γ 为 K_R 和 C 组成,

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - a \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{K_R} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{f(\xi) - a}{\xi - z} d\xi \right| = 0.$$

当 $z \in D$ 时, 根据柯西积分定理得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi + \int_{C-} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right),$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - f(z) = -f(z) + a.$$

当 $z \in C$ 的内区域时, 根据柯西积分定理得

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi + \int_{C-} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right),$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = a.$$

故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} -f(z) + a & (\text{当 } z \in D \text{ 时}), \\ a & (\text{当 } z \in C \text{ 的内区域时}). \end{cases}$$