

## MA426 — 微分几何

### Assignment 1

Instructor: 陈优民

Author: 刘逸灏 (515370910207)

— SJTU (Fall 2019)

## 习题 2.1/4

求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & z \geq 0, \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$$

的参数方程

$$x^2 - x + \frac{1}{4} + y^2 = \frac{1}{4},$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

设  $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t$ ,  $y = \frac{1}{2} \sin t$ , 并代入第一个方程

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \sin t\right)^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0,$$

$$z^2 = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{4}(\cos^2 t + \sin^2 t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos t = \sin^2 \frac{t}{2}, \quad z = \sin \frac{t}{2}.$$

故曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, \frac{1}{2} \sin t, \sin \frac{t}{2}\right).$$

## 习题 2.1/6

设空间  $E^3$  中一条正则参数曲线  $\mathbf{r}(t)$  的切向量  $\mathbf{r}'(t)$  与一个固定的方向向量  $\alpha$  垂直. 证明: 该曲线落在一个平面内.

假设该曲线不落在一个法向量为  $\alpha$  的平面上, 即存在点  $t_0$  使得  $\mathbf{r}'(t_0)$  不与该平面平行, 显然这与题设条件矛盾, 故该曲线落在该平面内.

## 习题 2.2/1

求下列曲线在指定范围内的弧长:

- (4) 抛物线  $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \log(\sec t + \tan t) - \sin t)$ ,  $[0, t_0]$ ;  
 (5) 曲线  $y = x^2/2a, z = x^3/6a^2$  在原点  $O(0, 0, 0)$  和点  $p(x_0, y_0, z_0)$  之间.

(4)

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= (\cos t, \log(\sec t + \tan t) - \sin t), \\ \mathbf{r}'(t) &= \left( -\sin t, \frac{\tan t \sec t + \sec^2 t}{\sec t + \tan t} - \cos t \right) = (-\sin t, \sec t - \cos t), \\ |\mathbf{r}'(t)| &= \sqrt{\sin^2 t + (\sec t - \cos t)^2} = \sqrt{\sin^2 t + \sec^2 t - 2 + \cos^2 t} = |\tan t|, \\ \int_0^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt &= \int_0^{t_0} |\tan t| dt = -\ln \cos t_0, \quad t_0 < \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \left( t, \frac{t^2}{2a}, \frac{t^3}{6a^2} \right), \quad t \in [0, x_0]. \\ \mathbf{r}'(t) &= \left( 1, \frac{t}{a}, \frac{t^2}{2a^2} \right), \\ |\mathbf{r}'(t)| &= \sqrt{1 + \frac{t^2}{a^2} + \frac{t^4}{4a^4}} = \frac{t^2}{2a^2} + 1, \\ \int_0^{x_0} |\mathbf{r}'(t)| dt &= \int_0^{x_0} \left( \frac{t^2}{2a^2} + 1 \right) dt = \frac{x_0^3}{6a^2} + x_0.\end{aligned}$$

## 习题 2.2/5

求曲线  $\mathbf{r}(t) = (t^3/3, t^2/2, t)$  上其切线平行于平面  $x + 3y + 2z = 0$  的点.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= (t^3/3, t^2/2, t), \\ \mathbf{r}'(t) &= (t^2, t, 1).\end{aligned}$$

在平面  $x + 3y + 2z = 0$  上取两不平行向量  $(0, 2, -3), (2, 0, -1)$  可得到平面的一个法向量

$$\mathbf{n} = (0, 2, -3) \times (2, 0, -1) = (-2, -6, -4) \propto (1, 3, 2).$$

当  $\mathbf{r}'(t)$  与平面平行时, 与平面法向量垂直

$$\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{n} = t^2 + 3t + 2 = 0,$$

$$t = -1 \quad \text{或} \quad t = -2.$$

故切线平行于平面的点为  $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, -1\right)$  和  $\left(-\frac{8}{3}, 2, -2\right)$ .