

# 仿射概形初步

戚天成 ✉

复旦大学 数学科学学院

2024 年 1 月 6 日

## 1 基本概念

设  $R$  是含幺交换环,  $N(R)$  是其素根, 那么标准满射  $\pi : R \rightarrow R/N(R), a \mapsto a + N(R)$  诱导的连续映射  $\pi^* : \text{Spec}(R/N(R)) \rightarrow \text{Spec} R, Q \mapsto \pi^{-1}(Q)$  是同胚. 由此可构造不同构的含幺交换环  $R_1, R_2$  使得  $\text{Spec} R_1$  与  $\text{Spec} R_2$  同胚. 这说明含幺交换环的素谱不足以重塑出环本身, 本章我们将在含幺交换环的素谱上引入某个很具体的环层使得带上该层的素谱能重塑出原有的环. 首先我们先回顾一些层论的基本概念.

### 1.1 层论回顾

层是微分拓扑、代数拓扑、复几何、范畴表示论以及代数几何等领域的常用工具, 层论被认为最早于 1945 年由 Jean Leray(法国, 1906-1998) 发展, 随后被众多数学家广泛应用到各领域中.

**Definition 1.1.** 设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{C}$  是范畴. 记  $\mathbf{Top}(X)$  是由  $X$  上全体开集关于集合包含关系诱导的偏序范畴, 称  $\mathbf{Top}(X)$  到  $\mathcal{C}$  的逆变函子是  $X$  上取值在  $\mathcal{C}$  中的预层.

**Remark 1.2.** 在这里我们约定一些记号与术语. 设  $\mathcal{F} : \mathbf{Top}(X) \rightarrow \mathcal{C}$  是取值在范畴  $\mathcal{C}$  中的预层. 如果  $V, U$  是  $X$  的开子集满足  $V \subseteq U$ , 那么这对应  $\mathcal{C}$  中从  $\mathcal{F}(U)$  到  $\mathcal{F}(V)$  的态射, 记作  $\text{Res}_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ , 常称为 ( $U$  在  $V$  上的) 限制态射. 如果  $V \subseteq U$  是  $X$  的开子集且  $f \in \mathcal{F}(U)$ , 常把  $\text{Res}_V^U(f)$  记作  $f|_V$ . 对  $X$  的每个开子集  $U$ , 也把  $\mathcal{F}(U)$  记  $\Gamma(U, \mathcal{F})$ , 称其中的元素为  $\mathcal{F}$  在  $U$  上的截面. 将  $\Gamma(X, \mathcal{F})$  中元素称为  $\mathcal{F}$  的整体截面.

为叙述方便, 之后始终将含幺交换环范畴记作  $\mathbf{CRing}$ , 其中的环同态都是保持幺元的.

**Example 1.3.** 设  $X$  是拓扑空间, 记  $\mathcal{C}(U)$  是  $X$  的开子集  $U$  上的实值连续函数全体构成的连续函数环. 如果  $V, U$  是  $X$  的开子集满足  $V \subseteq U$ , 记  $\text{Res}_V^U : \mathcal{C}(U) \rightarrow \mathcal{C}(V), f \mapsto f|_V$ . 则可定义出逆变函子  $\mathcal{C} : \mathbf{Top}(X) \rightarrow \mathbf{CRing}$ . 称  $\mathcal{C}$  为  $X$  上连续函数环预层, 其整体截面全体  $\Gamma(X, \mathcal{C}) = \mathcal{C}(X)$  是  $X$  的连续函数环.

粗糙地说, 层相比于预层所多加的条件即要求几何对象相容的“局部数据”可以唯一地得到“整体数据”.

**Definition 1.4.** 设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{C}$  是范畴,  $\mathcal{F} : \mathbf{Top}(X) \rightarrow \mathcal{C}$  是预层. 如果  $\mathcal{F}$  满足粘接条件, 即对  $X$  的任何开子集  $U$ ,  $U$  的开覆盖  $\{U_i | i \in I\}$  (这里开覆盖指所有  $U_i$  之并恰为  $U$ ) 以及  $s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F}) (i \in I)$ , 只要  $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}, \forall i, j \in I$ , 就存在唯一的  $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$  使得  $s|_{U_i} = s_i, \forall i \in I$ , 则称  $\mathcal{F}$  为  $X$  上的层.

**Remark 1.5.** 如果  $\mathcal{F}$  是拓扑空间  $X$  上层, 那么取  $U = U_i = I = \emptyset$ , 考虑  $U$  的开覆盖  $\{U_i\}_{i \in I}$  并利用层的定义中的粘接条件可证得  $\mathcal{F}(\emptyset)$  是单点集, 因此当范畴  $\mathcal{C}$  是模范畴或含么交换环范畴时,  $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$ .

**Example 1.6.** 设  $\mathcal{F}$  是拓扑空间  $X$  上取值在范畴  $\mathcal{C}$  中的层, 固定  $X$  的开子集  $U$ , 那么  $U$  的开子集均为  $X$  的开子集, 于是可限制  $\mathcal{F}$  定义出层  $\mathcal{F}|_U : \mathbf{Top}(U) \rightarrow \mathcal{C}$ , 称为  $\mathcal{F}$  在开子集  $U$  上的限制.

根据层的定义不难看出 [例1.3] 中定义连续函数环预层是层. 称取值在  $\mathbf{CRing}$  中的层为环层.

**Definition 1.7.** 设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{O}_X$  是其上层. 称  $(X, \mathcal{O}_X)$  是赋环空间,  $\mathcal{O}_X$  被称为其结构层.

**Example 1.8.** 设  $X$  是域  $\mathbb{k}$  上仿射簇, 对每个  $X$  的开子集  $U$ , 记  $\mathcal{O}_X(U)$  为拟仿射簇  $U$  上正则函数环, 如果  $V, U$  是  $X$  的开子集满足  $V \subseteq U$ , 定义  $\text{Res}_V^U : \mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{O}(V), f \mapsto f|_V$  为正则函数的限制映射. 那么我们得到逆变函子  $\mathcal{O}_X : \mathbf{Top}(X) \rightarrow \mathbf{CRing}$ . 由正则函数的定义易知预层  $\mathcal{O}_X$  是  $X$  上层, 称为  $X$  上正则函数环层.  $X$  的正则函数环层的整体截面全体为  $X$  上正则函数环. 若  $\mathbb{k}$  是代数闭域, 则  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  就是  $X$  的坐标环.

对代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇  $X$ , 其正则函数环  $\mathcal{O}_X(X)$  关于每个  $p \in X$  对应的极大理想作局部化即得  $X$  在点  $p$  处的局部环  $\mathcal{O}_{X,p}$ . 我们知道  $X$  在  $p$  点处光滑当且仅当局部环  $\mathcal{O}_p(X)$  是正则局部环. 因此可以考虑对预层引入“局部概念”来观察几何对象在给定点处的局部表现.

**Definition 1.9.** 设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{F}$  是取值在范畴  $\mathcal{C}$  中的预层,  $p \in X$ . 如果正向极限

$$\mathcal{F}_p = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

存在, 则称  $\mathcal{F}_p$  是  $X$  在  $p$  处的茎. 这里的正向系是  $p$  所有的开邻域上二元关系  $\leq : U \leq V \Leftrightarrow V \subseteq U$  诱导的. 具体地, 对  $p$  点的开邻域  $U, V$ , 如果  $V \subseteq U (U \leq V)$ , 则对应  $\mathcal{C}$  中态射  $\text{Res}_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ .

**Remark 1.10.** 当  $\mathcal{C}$  是模范畴或  $\mathbf{CRing}$  时,  $\mathcal{F}_p$  可如下具体地构造: 考虑集合  $T = \{(U, s) | U \text{ 是含 } p \text{ 的开邻域}, s \in \mathcal{F}(U)\}$ , 在  $T$  上定义二元关系  $\sim : (U, s) \sim (V, t)$  当且仅当存在  $x$  的开邻域  $W \subseteq U \cap V$  使得  $\text{Res}_W^U(s) = \text{Res}_W^V(t)$ . 容易验证这是  $T$  上等价关系. 考虑商集  $\mathcal{F}_p = T / \sim$ . 无论  $\mathcal{C}$  是模范畴或是  $\mathbf{CRing}$ , 都易在  $T / \sim$  上定义出相应代数结构. 对每个  $X$  的开子集  $U$ ,  $\mathcal{F}(U)$  到  $\mathcal{F}_p$  都有自然映射  $\alpha_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}_p, f \mapsto [(U, f)]$ . 易验证  $(\mathcal{F}_p, \{\alpha_U | p \in U \text{ 是开邻域}\})$  就是  $\mathcal{F}$  在  $p$  处的茎. 以后将  $\mathcal{F}_p$  与此具体构造视作等同, 由此易见  $X$  每个开子集  $U$  上的截面  $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$  对应茎  $\mathcal{F}_p$  中元素  $[(U, s)]$ , 称为  $s$  在点  $p$  处的芽.

如果赋环空间  $(X, \mathcal{O}_X)$  满足对每个点  $p$  处的茎  $\mathcal{O}_{X,p}$  是局部环, 称  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间.

**Example 1.11.** 在 [例1.6] 中我们看到拓扑空间上的层可限制在给定开子集上, 如果局部赋环空间  $(X, \mathcal{O}_X)$  有开子集  $U$ , 易知  $(U, \mathcal{O}_X|_U)$  也是局部赋环空间.

**Example 1.12.** 考虑域  $\mathbb{k}$  上仿射簇  $X$  的正则函数环层  $\mathcal{O}_X$ . 对每个  $p \in X$ ,  $\mathcal{O}_X$  在该点处的茎就是  $X$  在  $p$  点的局部环  $\mathcal{O}_{X,p}$ . 所以  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间.  $X$  每个开子集  $U$  上正则函数  $s : U \rightarrow \mathbb{k}$  对应正则函数芽  $[(U, s)] \in \mathcal{O}_{X,p}$ . 因此也将局部环  $\mathcal{O}_{X,p}$  称为  $X$  在  $p$  处的正则函数芽环.

设  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  是拓扑空间  $X$  上取值在范畴  $\mathcal{C}$  中的预层, 称逆变函子  $\mathcal{F}$  到  $\mathcal{G}$  的自然变换为  $\mathcal{F}$  到  $\mathcal{G}$  的一个态射. 因此  $\mathcal{F}$  到  $\mathcal{G}$  的态射是满足下述条件的映射

$$\eta : \text{ob} \mathbf{Top}(X) \rightarrow \bigcup_{U \in \text{ob} \mathbf{Top}(X)} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}(U), \mathcal{G}(U)), U \mapsto \eta_U :$$

对所有  $X$  的开子集链  $V \subseteq U$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\eta_U} & \mathcal{G}(U) \\ \text{Res}_V^U(\mathcal{F}) \downarrow & & \downarrow \text{Res}_V^U(\mathcal{G}) \\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & \mathcal{G}(V) \end{array}$$

因为  $\mathbf{Top}(X)$  是小范畴, 所以  $\mathcal{F}$  到  $\mathcal{G}$  的所有态射构成的类是集合. 可用自然变换的合成来定义预层间的合成来得到  $X$  上的预层范畴, 记作  $\mathbf{Psh}(X, \mathcal{C})$  (在  $\mathcal{C}$  明确的场景下, 简写为  $\mathbf{PSh}(X)$ ). 称  $X$  上所有层构成的预层范畴的全子范畴为  $X$  上的层范畴, 记作  $\mathbf{Sh}(X, \mathcal{C})$  (相应地简记为  $\mathbf{Sh}(X)$ ).

设  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{G}$  是拓扑空间  $X$  上层,  $\eta: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  是态射, 那么根据正向极限的定义, 对每个点  $p \in X$ , 层间态射  $\eta$  诱导茎间态射  $\eta_p: \mathcal{F}_p \rightarrow \mathcal{G}_p$ .  $\eta_p$  是使得下图交换的唯一态射:

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}_p & \xrightarrow{\quad \eta_p \quad} & \mathcal{G}_p & & \\ \alpha_U \swarrow & & \searrow \beta_U & & \\ & \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\eta_U} \mathcal{G}(U) & & & \\ \alpha_V \swarrow & \downarrow \text{Res}_V^U(\mathcal{F}) & \downarrow \text{Res}_V^U(\mathcal{G}) & \searrow \beta_V & \\ & \mathcal{F}(V) \xrightarrow{\eta_V} \mathcal{G}(V) & & & \end{array}$$

其中  $V \subseteq U$  是  $X$  的任意含  $p$  的开子集链. 元素层面,  $\eta_p$  将每个  $\mathcal{F}_p$  中形如  $[(U, s)]$  的元素映至  $[(U, \eta_U(s))]$ .

下面我们说明拓扑空间之间的连续映射  $f: X \rightarrow Y$  可诱导层范畴之间的函子. 对  $X$  上层  $\mathcal{F}$ , 我们来定义一个  $Y$  上的层  $f_*(\mathcal{F})$ : 任给  $Y$  的开子集  $V$ , 定义  $f_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$ ; 任给  $Y$  的开子集链  $V \subseteq U$ ,  $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(U)$ , 所以有  $\mathcal{F}$  的限制映射  $\text{Res}_{f^{-1}(V)}^{f^{-1}(U)}: \mathcal{F}(f^{-1}(U)) \rightarrow \mathcal{F}(f^{-1}(V))$ , 把  $\text{Res}_{f^{-1}(V)}^{f^{-1}(U)}$  记作  $\text{Res}_V^U$  再更改记号得到  $\text{Res}_V^U: f_*(\mathcal{F})(U) \rightarrow f_*(\mathcal{F})(V)$ , 于是得到预层  $f_*(\mathcal{F})$ . 因为  $\mathcal{F}$  是层, 因此由  $f_*(\mathcal{F})$  的定义直接保证了  $f_*(\mathcal{F})$  满足粘接条件. 由此得到的层  $f_*(\mathcal{F})$  被称为  $\mathcal{F}$  沿  $f$  的推出层. 根据推出层的定义, 任何  $X$  上层间态射  $\eta: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  也可以自然地对应  $f_*(\mathcal{F})$  到  $f_*(\mathcal{G})$  的态射  $f_*(\eta): f_*(\mathcal{F}) \rightarrow f_*(\mathcal{G})$ , 满足把  $Y$  中每个开子集  $V$  对应到自然变换  $\eta_{f^{-1}(V)}$ . 上述讨论表明对给定连续映射取推出层给出函子  $f_*: \mathbf{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Sh}(Y)$ .

**Definition 1.13.** 设  $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$  是赋环空间. 如果  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射且  $f^\#: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$  是  $Y$  的环层间的态射, 则称  $(f, f^\#)$  是赋环空间  $(X, \mathcal{O}_X)$  到  $(Y, \mathcal{O}_Y)$  的一个态射.

如果  $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y), (Z, \mathcal{O}_Z)$  均为赋环空间, 那么对态射  $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$  和  $(g, g^\#): (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$ , 有连续映射  $gf: X \rightarrow Z$  以及环层间态射  $(g_*f^\#)g^\#: \mathcal{O}_Z \rightarrow g_*f_*(\mathcal{O}_X) = (gf)_*(\mathcal{O}_X)$ . 定义  $(f, f^\#)$  与  $(g, g^\#)$  的合成成为  $(gf, (g_*f^\#)g^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$ . 通过直接计算验证可知赋环空间之间态射的合成具备结合律且每个赋环空间  $(X, \mathcal{O}_X)$  上的单位态是  $(\text{id}_X, 1_{\mathcal{O}_X})$ . 并且不难看出  $(X, \mathcal{O}_X)$  到  $(Y, \mathcal{O}_Y)$  的态射全体构成的类是集合. 因此所有的赋环空间关于上述定义的态射以及合成构成范畴, 称为赋环空间范畴.

**Lemma 1.14.** 如果  $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$  是同构的赋环空间, 则有环同构  $\mathcal{O}_X(X) \cong \mathcal{O}_Y(Y)$ .

下面我们考虑局部赋环空间. 设  $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$  是局部赋环空间, 如果赋环空间之间的态射  $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$  满足对任何  $p \in X$ , 局部环间的环同态  $(f^\#)_p: \mathcal{O}_{Y, f(p)} \rightarrow \mathcal{O}_{X, p}$  是局部同态 (见下面的 [引理1.15]), 则称  $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$  为局部赋环空间之间的态射.

**Lemma 1.15.** 设  $(R, \mathfrak{m}), (S, \mathfrak{n})$  是交换局部环, 则  $f(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$  的充要条件是  $f(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$ . 此时称  $f$  是**局部同态**.

**Remark 1.16.** 这里  $f(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$  等价于  $\mathfrak{m} \subseteq f^{-1}(\mathfrak{n})$ , 也等价于  $\mathfrak{m} = f^{-1}(\mathfrak{n})$ .

根据局部赋环空间之间态射的定义不难看出局部赋环空间之间态射的合成仍为局部赋环空间, 因此所有局部赋环空间构成赋环空间范畴的子范畴, 它不是全子范畴 (存在赋环态射不是局部赋环态射的例子).

**Conclusion.** 本节先介绍了预层的概念 ([定义1.1]) 以及相关基本术语, 例如对给定拓扑空间的所有开子集取连续函数环并考虑限制映射便可产生预层的例子 ([例1.3]). 我们可以把拓扑空间上的预层代入该例子来赋予预层定义的几何直观: 把拓扑空间的每个开子集对应到其上函数环, 具有包含关系的开子集链对应函数环间的限制映射. 满足粘接条件的预层便是层 ([定义1.4]), 粘接条件可以用拓扑空间上连续函数的特有性质予以理解: 如果拓扑空间  $X$  的开子集  $U$  有开覆盖  $\{U_i | i \in I\}$ , 那么如果每个  $U_i$  上都有连续函数  $f_i$  满足连续函数族  $\{f_i\}_{i \in I}$  在定义域的公共部分有相同取值, 那么这族连续函数可唯一粘接成  $U$  上的连续函数. 考察拓扑空间上所有开子集上的连续函数环 (这里没有介绍光滑流形的例子, 可以类似考虑其开子集上的光滑函数环给出光滑函数环层) 或是仿射簇的所有开子集上的正则函数环 ([例1.8]) 都能产生层的例子. 随后对拓扑空间上的层介绍了给定点处茎的概念 ([定义1.9]), 它可用于研究几何对象的局部特性. 例如仿射簇的正则函数环层在给定点处的茎就是簇在给定点处的局部环 ([例1.12]), 这时层在给定点处的茎是正则局部环当且仅当该点是光滑点. 因为预层和层都是函子, 因此用函子间的自然变换可给出 (预) 层间态射的概念, 进而产生给定拓扑空间上的 (预) 层范畴. 最后我们介绍了赋环空间范畴与局部赋环空间范畴.

## 1.2 仿射概形

本节的目标是对任给含么交换环, 引入其素谱上一个具体的结构层使得带有结构层的素谱能够重塑环.

固定含么交换环  $R$ , 考虑  $R$  的素谱  $\text{Spec} R$ , 我们将构造  $\text{Spec} R$  上的一个环层  $\mathcal{O}_{\text{Spec} R}$  使得  $(R, \mathcal{O}_{\text{Spec} R})$  是局部赋环空间且  $\mathcal{O}_{\text{Spec} R}$  的整体截面全体  $\Gamma(\text{Spec} R, \mathcal{O}_{\text{Spec} R}) \cong R$ , 进而该环层已经蕴含  $R$  所有的结构信息 ([定理1.17]). 以下记每个元素  $a \in R$  对应  $X = \text{Spec} R$  中的**主开集**  $\{P \in \text{Spec} R | a \notin P\}$  为  $X_a$ , 易见  $\{X_a | a \in R\}$  是 Zariski 拓扑的一个拓扑基. 之后构造的环层  $\mathcal{O}_X$  会满足  $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) \cong R_a$ , 即  $R$  在元素  $a$  生成的乘法么半群处的局部化. 并且我们会看到含么交换环范畴与仿射概形范畴是范畴对偶的 (见 [定理1.20]).

现在对每个  $X$  的开子集  $U$ , 定义  $\mathcal{O}_X(U)$  为所有满足下述条件的映射  $s : U \rightarrow \coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}}$  构成的集合:

对每个  $\mathfrak{p} \in U$ , 存在  $\mathfrak{p}$  的某个开邻域  $V \subseteq U$  以及  $a \in R, s \in R - \bigcup_{\mathfrak{q} \in V} \mathfrak{q}$  使得  $s(\mathfrak{q}) = a/s \in R_{\mathfrak{q}}, \forall \mathfrak{q} \in V$ .

即映射  $s : U \rightarrow \coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}}$  局部上可表示为统一分式, 其中  $\coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}}$  表示局部环族  $\{R_{\mathfrak{p}} | \mathfrak{p} \in \text{Spec} R\}$  的无交并.

通过  $R_{\mathfrak{p}}$  的环结构可自然地赋予  $\mathcal{O}_X(U)$  上的含么交换环结构. 对  $X$  的每个开子集链  $V \subseteq U$ , 有天然的限制映射  $\text{Res}_V^U : \mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$ . 进而定义出逆变函子  $\mathcal{O}_X : \mathbf{Top}(X) \rightarrow \mathbf{CRing}$ . 因为每个开子集  $U$  对应的  $\mathcal{O}_X(U)$  的定义是局部的, 故容易验证预层  $\mathcal{O}_X$  满足粘接公理, 为  $X$  上环层. 称之为素谱上的**结构层**.

下面我们说明  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间, 并且  $\mathcal{O}_X$  可重塑给定的含么交换环  $R$ .

**Theorem 1.17.** 设  $R$  是含么交换环,  $X = \text{Spec} R$ ,  $\mathcal{O}_X$  是如上定义的结构层. 那么:

- (1) 对每个素理想  $\mathfrak{p}$ , 茎  $\mathcal{O}_{X, \mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$  是局部环, 故  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间.
- (2) 对每个  $a \in R$ , 主开集  $X_a$  对应的含么交换环  $\mathcal{O}_X(X_a) \cong R_a$ . 特别地,  $\mathcal{O}_X(X) \cong R$ .

*Proof.* (1) 固定  $R$  的素理想  $\mathfrak{p}$ , 有标准映射  $\varphi : \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \rightarrow R_{\mathfrak{p}}, [(U, s)] \mapsto s(\mathfrak{p})$ , 这是定义合理的环同态. 注意到  $R - \mathfrak{p}$  中每个元素  $v$  对应  $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}$  中的可逆元  $[(X, v/1)]$ , 因此环同态  $R \rightarrow \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}, a \mapsto [(X, a/1)]$  把  $R - \mathfrak{p}$  中元素映至  $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}$  中的可逆元, 这里把  $a/1$  视作映射  $a/1 : X \rightarrow \coprod_{\mathfrak{q} \in X} R_{\mathfrak{q}}, \mathfrak{q} \mapsto a/1$ . 这诱导出环同态

$$\psi : R_{\mathfrak{p}} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}, a/v \mapsto [(X_v, a/v)],$$

其中  $a/v : X_v \rightarrow \coprod_{\mathfrak{q} \in X_v} R_{\mathfrak{q}}, \mathfrak{q} \mapsto a/v$ . 容易验证  $\varphi$  与  $\psi$  是互逆的映射, 故有环同构  $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$ .

(2) 固定  $a \in R$ , 由环同态  $R \rightarrow \mathcal{O}_X(X_a), b \mapsto b/1$  将  $a$  的自然数幂映至可逆元知该环同态诱导环同态  $\psi : R_a \rightarrow \mathcal{O}_X(X_a), b/a^m \mapsto b/a^m$ , 这里  $b/a^m \in \mathcal{O}_X(X_a)$  表示将  $X_a$  中每个素理想映至  $b/a^m$  的映射. 下面证明  $\psi$  是单射. 如果  $b/a^m \in R_a$  满足  $b/a^m$  是  $X_a$  上零映射, 那么每个  $\mathfrak{p} \in X_a$  满足  $\text{ann}_R(b) \not\subseteq \mathfrak{p}$ , 这里  $\text{ann}_R(b) = \{c \in R | cb = 0\}$ . 因此  $V(\text{ann}_R(b)) \cap X_a = \emptyset$ , 进而  $a \in \sqrt{\text{ann}_R(b)}$ , 这说明在  $R_a$  中  $b/a^m = 0$ .

最后证  $\psi : R_a \rightarrow \mathcal{O}_X(X_a)$  是满射, 任取  $s \in \mathcal{O}_X(X_a)$ .  $s$  关于  $\psi$  原像的构造分为两步.

**Step 1.** 首先说明存在  $u_1, \dots, u_r \in R$  使得  $X_a = X_{u_1} \cup \dots \cup X_{u_m}$  且  $s$  在每个  $X_{u_j} (1 \leq j \leq r)$  上可表示为  $a_j/u_j$  的形式. 根据  $\mathcal{O}_X$  的定义,  $X_a$  可表为一些开子集  $\{U_i | i \in I\}$  的并, 且在每个  $U_i$  上  $s$  形如  $c_i/v_i$ , 其中  $v_i \in R$  满足  $v_i \notin \mathfrak{q}, \forall \mathfrak{q} \in U_i$ . 因为  $\{X_b | b \in R\}$  是素谱的拓扑基, 所以每个  $U_i$  可表为一些  $X_b$  的并, 所以不妨设每个  $U_i$  都为主开集, 设为  $U_i = X_{b_i}$ . 从而  $X_{b_i} \cap V(v_i) = \emptyset, \forall i \in I$  且  $X_a$  为  $\{X_{b_i} | i \in I\}$  之并. 于是  $b_i \in \sqrt{(v_i)}$ , 所以存在  $d_i \in R$  和正整数  $n_i$  使得  $b_i^{n_i} = d_i v_i$ , 这里  $d_i \notin \mathfrak{q}, \forall \mathfrak{q} \in X_{b_i}$ . 所以  $s$  在每个  $X_{b_i}$  上可表示为  $c_i d_i / b_i^{n_i}$ . 注意到  $X_{b_i} = X_{b_i^{n_i}}$ , 所以用  $u_i$  替换  $b_i^{n_i}$ ,  $a_i$  替换  $c_i d_i$ , 再结合  $X_a$  是拟紧空间便知存在有限个  $u_1, \dots, u_r \in R$  使得  $X_a = X_{u_1} \cup \dots \cup X_{u_m}$  且  $s$  在每个  $X_{u_j} (1 \leq j \leq r)$  上可表示为  $a_j/u_j$ .

**Step 2.** 这时在每个  $X_{u_i} \cap X_{u_j} = X_{u_i u_j}$  上,  $s$  有  $a_i/u_i$  与  $a_j/u_j$  两种表示方式, 故由之前证明的  $\psi$  是单射可知在  $R_{u_i u_j}$  中  $a_i/u_i = a_j/u_j$ . 因此对上述固定的  $1 \leq i, j \leq r$ , 存在正整数  $\ell_{ij}$  使得  $(u_i u_j)^{\ell_{ij}} (a_i u_j - a_j u_i) = 0$ . 故可选取充分大的正整数  $n$  使得  $(u_i u_j)^n (a_i u_j - a_j u_i) = 0, \forall 1 \leq i, j \leq r$ . 用  $u_i^{n+1}$  替换  $u_i$ ,  $a_i$  替换  $u_i^n a_i$ , 可设  $X_a = X_{u_1} \cup \dots \cup X_{u_m}$ ,  $s$  在每个  $X_{u_j} (1 \leq j \leq r)$  上可表示为  $a_j/u_j$  且满足  $a_i u_j = a_j u_i, \forall 1 \leq i, j \leq r$ . 再由  $\{X_{u_i}\}_{i=1}^r$  覆盖  $X_a$  得到存在  $z_1, \dots, z_r \in R$  以及正整数  $t$  使得  $a^t = z_1 u_1 + \dots + z_r u_r$ . 命  $b = z_1 a_1 + \dots + z_r a_r$ , 那么对每个  $1 \leq j \leq r, u_j b = a_j z_1 u_1 + \dots + a_j z_r u_r = a_j a^t$ . 这说明  $s$  在每个  $X_{u_i}$  上可表为  $b/a^t$ .

通过前面的讨论, 得到  $\psi(b/a^t) = s$ , 所以  $\psi$  是满射. □

**Definition 1.18.** 如果一个局部赋环空间满足存在含么交换环  $R$  使得该空间作为局部赋环空间与  $(R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  同构, 那么称该局部赋环空间是一个仿射概形. 每个含么交换环  $R$  产生标准的仿射概形  $(R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$ . 称所有仿射概形所构成的局部赋环空间范畴的全子范畴为仿射概形范畴.

[定理1.17] 的一个直接推论便是素谱上的结构层承载了环的所有结构信息.

**Corollary 1.19.** 如果含么交换环  $R, S$  决定的标准仿射概形  $(R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  和  $(S, \mathcal{O}_{\text{Spec}S})$  同构, 那么  $R \cong S$ .

*Proof.* 由 [引理1.14], 这时  $\mathcal{O}_{\text{Spec}R}(\text{Spec}R) \cong \mathcal{O}_{\text{Spec}S}(\text{Spec}S)$ , 再应用 [定理1.17] 即可. □

代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇范畴与  $\mathbb{k}$  上有限生成半素交换代数范畴间通过取仿射簇的坐标环可产生标准的范畴对偶. 下述定理表明仿射概形范畴等价于含么交换环范畴的对偶范畴.

**Theorem 1.20.** 含么交换环范畴与仿射概形范畴是范畴对偶的.

*Proof.* 因为仿射概形范畴和由所有形如  $(\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  的局部赋环空间构成的全子范畴  $\mathcal{C}$  是等价的, 所以要证明结论只需构造  $\mathcal{C}$  与  $\mathbf{CRing}$  之间的范畴对偶. 下面先构造出范畴间对偶函子, 再验证它确实是对偶函子.

**Step 1.** 首先说明存在一自然的逆变函子  $F : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathcal{C}$  满足  $F(R) = (\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$ . 易知交换环间同态  $f : R \rightarrow R'$  可逆变地诱导连续映射  $f^* : \text{Spec}R' \rightarrow \text{Spec}R, Q \mapsto f^{-1}(Q)$ . 对  $\text{Spec}R$  的每个开子集  $V$  以及  $Q \in (f^*)^{-1}(V)$ , 有自然的局部同态  $f_Q : R_{f^*(Q)} \rightarrow R'_Q, a/s \mapsto f(a)/f(s)$ , 那么根据素谱上结构层的定义, 局部同态族  $\{f_Q | Q \in f^{-1}(V)\}$  诱导映射  $(f^*)^\#(V) : \mathcal{O}_{\text{Spec}R}(V) \rightarrow (f^*)_*\mathcal{O}_{\text{Spec}R'}(V) = \mathcal{O}_{\text{Spec}R'}((f^*)^{-1}(V)), s \mapsto (f^*)^\#(V)(s)$ , 这里  $(f^*)^\#(V)(s)$  将  $f^{-1}(V)$  中每个素理想  $Q$  映至  $f_Q(s(q))$ , 其中  $q = f^*(Q)$ . 易验证  $(f^*)^\#(V)$  是定义合理的环同态并且

$$(f^*)^\# : \text{ob}\mathbf{Top}(\text{Spec}R) \rightarrow \bigcup_{V \in \text{ob}\mathbf{Top}(\text{Spec}R)} \text{Hom}_{\mathbf{CRing}}(\mathcal{O}_{\text{Spec}R}(V), (f^*)_*\mathcal{O}_{\text{Spec}R'}(V)), V \mapsto (f^*)^\#(V)$$

是函子  $\mathcal{O}_{\text{Spec}R}$  到  $(f^*)_*\mathcal{O}_{\text{Spec}R'}$  的自然变换, 这说明  $(f^*)^\# : \mathcal{O}_{\text{Spec}R} \rightarrow f^*\mathcal{O}_{\text{Spec}R'}$  是环层间的态射.

根据  $(f^*)^\#$  的定义可知对每个  $Q \in \text{Spec}R', q = f^*(Q)$  以及  $q$  的任何开邻域  $V$  有下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} R_q & \xrightarrow{f_Q} & R'_Q \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ \mathcal{O}_{\text{Spec}R}(V) & \xrightarrow{(f^*)^\#(V)} & \mathcal{O}_{\text{Spec}R'}((f^*)^{-1}(V)) \end{array}$$

这里  $R_q = \mathcal{O}_{\text{Spec}R, f^*(Q)}, R'_Q = \mathcal{O}_{\text{Spec}R', Q}$ , 因此  $(f^*, (f^*)^\#) : (\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R}) \rightarrow (\text{Spec}R', \mathcal{O}_{\text{Spec}R'})$  是局部赋环空间之间的态射. 于是通过定义  $F(R) = (\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  并对任何交换环间的环同态  $f : R \rightarrow R'$  如上定义  $F(f) = (f^*, (f^*)^\#)$  可得逆变函子  $F : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathcal{C}$ .

**Step 2.** 下面来验证前面构造的函子  $F : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathcal{C}$  是范畴对偶. 根据  $\mathcal{C}$  的定义直接得到  $F$  是本质满函子, 故还需验证  $F$  是忠实满函子, 即说明映射  $F : \text{Hom}_{\mathbf{CRing}}(R, R') \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}((\text{Spec}R', \mathcal{O}_{\text{Spec}R'}), (\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R}))$  是双射. 先证  $F$  是单射. 如果环同态  $f, g : R \rightarrow R'$  满足  $F(f) = (f^*, (f^*)^\#) = (g^*, (g^*)^\#) = F(g)$ , 那么由  $(f^*)^\# = (g^*)^\#$  知环同态  $(f^*)^\#(\text{Spec}R), (g^*)^\#(\text{Spec}R) : \mathcal{O}_{\text{Spec}R}(\text{Spec}R) \rightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}R'}(\text{Spec}R')$  相同. 通过 [定理1.17] 我们看到环同构  $R \rightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}R}(\text{Spec}R), a \mapsto a/1$ , 所以  $(f^*)^\#(\text{Spec}R) = (g^*)^\#(\text{Spec}R)$  表明  $f(a) = g(a), \forall a \in R$ , 即  $f = g$ . 最后验证  $F$  是满射, 任取局部赋环同态  $(h, h^\#) : (\text{Spec}R', \mathcal{O}_{\text{Spec}R'}) \rightarrow (\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$ , 那么赋环态射  $h^\# : \mathcal{O}_{\text{Spec}R} \rightarrow h_*\mathcal{O}_{\text{Spec}R'}$ , 它诱导  $\hat{h} = h^\#(\text{Spec}R) : \Gamma(\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R}) \rightarrow \Gamma(\text{Spec}R', \mathcal{O}_{\text{Spec}R'})$ , 借助 [定理1.17] 可得环同态  $\varphi : R \rightarrow S$ , 满足  $\hat{h}$  把每个  $a/1 \in \Gamma(\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  (注意  $\Gamma(\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  中元素均具备这种形式) 映至  $\varphi(a)/1 \in \Gamma(\text{Spec}R', \mathcal{O}_{\text{Spec}R'})$ . 任取  $R'$  的素理想  $Q$ , 那么对任何  $\mathcal{O}_{\text{Spec}R, h(Q)}$  中元素  $[(U, s)]$  存在  $h(Q)$  的开邻域  $V \subseteq U$  使得  $s$  在  $V$  上可表为  $a/v$  的形式, 进而知  $h^\#$  所诱导的茎之间的同态把  $[(V, a/v)] \in \mathcal{O}_{\text{Spec}R, h(Q)}$  映至  $[(h^{-1}(V), \varphi(a)/\varphi(v))] \in \mathcal{O}_{\text{Spec}R', Q}$ . 因为  $(h, h^\#)$  是局部赋环映射, 所以  $R'_Q$  唯一的极大理想  $Q_Q = \{\varphi(a)/\varphi(v) | a \in h(Q), v \in R - h(Q)\}$ , 由此得到  $\varphi^{-1}(Q) = h(Q)$ . 由  $Q$  的任意性知上述环同态  $\varphi$  所诱导的素谱间的连续映射  $\varphi^*$  就是  $h$ . 前面提到  $h^\#$  诱导层面的间同态把形如  $[(V, a/v)]$  映至形如  $[(h^{-1}(V), \varphi(a)/\varphi(v))]$  的元素, 可直接计算验证  $(\varphi^*)^\# = h^\#$ . 所以  $F(\varphi) = (h, h^\#)$ .

由此得到范畴对偶  $F : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathcal{C}$ , 结合  $\mathcal{C}$  是仿射概形的全子范畴以及仿射概形的定义便得结论.  $\square$

**Notation.** 当考虑的仿射概形是某个含么交换环  $R$  决定的标准仿射概形  $(\text{Spec}R, \mathcal{O}_{\text{Spec}R})$  时, 简记为  $\text{Spec}R$ .

**Example 1.21.** 设  $X$  是代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇,  $\mathcal{O}_X$  是其上正则函数环层. 之前已经在 [例1.12] 中指出  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间. 考虑  $X$  的坐标环  $\mathcal{O}_X(X)$  决定的仿射概形  $\text{Spec}\mathcal{O}_X(X)$ , 那么  $\text{Spec}\mathcal{O}_X(X)$  中元素与  $X$  的不可约闭子簇全体一一对应, 仿射概形中的闭点与  $X$  中点一一对应. 易验证拓扑同胚  $X \cong \max\text{Spec}\mathcal{O}_X(X)$ . 一般地,  $(X, \mathcal{O}_X)$  未必是仿射概形, 例如考虑仿射直线  $X = \mathbb{C}$ , 它是不可约空间. 假设存在仿射概形  $\text{Spec}R$  使得  $(\mathbb{C}, \mathcal{O}_{\mathbb{C}})$  与之同构, 则有同胚  $\mathbb{C} \cong \text{Spec}R$ , 因此  $R$  的素根  $N(R)$  是素理想. 进而得到  $\mathbb{C}$  中存在某个点的 Zariski 闭包是整个空间, 这与  $\mathbb{C}$  中单点集是闭子集矛盾.

**Remark 1.22.** 如果拓扑空间  $X$  中点  $p$  满足  $\{p\}$  是稠密集, 则称  $p$  是  $X$  的一般点.

**Example 1.23.** 设  $R$  是含幺交换环, 称仿射概形  $\text{Spec}R[x_1, \dots, x_n]$  是  $R$  上  $n$  维仿射空间. 当  $n = 1$  时称  $\text{Spec}R[x]$  是仿射直线; 当  $n = 2$  时称  $\text{Spec}R[x, y]$  是仿射平面. 如果  $R = \mathbb{k}$  是代数闭域, 和经典仿射空间  $\mathbb{k}^n$  相比,  $\text{Spec}R[x_1, \dots, x_n]$  “增添”了  $\mathbb{k}^n$  中非单点的不可约闭子簇全体.

如果说流形是粘合欧式空间产生的几何对象, 那么概形就是粘合仿射概形产生的几何对象.

**Definition 1.24.** 设  $(X, \mathcal{O}_X)$  是局部赋环空间, 如果  $X$  存在开覆盖  $X = \bigcup_{i \in I} U_i$  使得每个  $(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$  是仿射概形, 则称  $(X, \mathcal{O}_X)$  是概形. 将所有概形构成的局部赋环空间范畴的全子范畴定义为概形范畴.

**Notation.** 在不引起混淆时将概形  $(X, \mathcal{O}_X)$  简记为  $X$ .

在本节最后我们介绍给定概形上的概形以及给定交换环上的概形.

**Definition 1.25.** 设  $X, S$  是概形, 设  $f : X \rightarrow S$  是概形间的态射. 称  $(X, f)$  是  $S$  上概形或  $S$ -概形, 这里的态射  $f$  被称为结构态射. 如果  $S = \text{Spec}R$  是含幺交换环  $R$  决定的仿射概形, 称  $(X, f)$  是交换环  $R$  上概形或  $R$ -概形. 设  $(X, f)$  与  $(Y, g)$  均为  $S$ -概形, 如果概形间的态射  $h : X \rightarrow Y$  满足  $gh = f$ , 则称  $h$  是  $S$ -概形态射. 所有的  $S$ -概形以及  $S$ -概形构成的范畴称为  $S$ -概形范畴.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

固定含幺交换环  $K$ , 则对任何含幺交换环  $A$ , 保幺环同态  $\alpha : K \rightarrow A$  给出  $A$  上  $K$ -代数结构. 反之, 任给  $K$ -交换代数  $A$  诱导环同态  $\alpha : K \rightarrow A, k \mapsto k1_A$ . 所以  $K$ -交换代数本质上就是环同态  $\alpha : K \rightarrow A$ . 如果  $f : A \rightarrow B$  是含幺交换环间的环同态, 对标准映射  $\alpha_1 : K \rightarrow A, \alpha_2 : K \rightarrow B$ ,  $f$  是  $K$ -代数同态当且仅当  $f\alpha_1 = \alpha_2$ . 下面我们说明  $K$ -仿射概形范畴与  $K$ -交换代数范畴间有自然的范畴对偶.

**Theorem 1.26.** 设  $K$  是含幺交换环, 记  $K\text{-CAlg}$  是  $K$  上交换代数范畴,  $K\text{-AffSch}$  是  $K$ -概形范畴. 如下定义逆变函子  $H : K\text{-CAlg} \rightarrow K\text{-AffSch}$ : 对每个  $K$ -交换代数  $A$ , 记  $f_A : \text{Spec}A \rightarrow \text{Spec}K$  是环同态  $\alpha_A : K \rightarrow A$  在 [定理1.20] 中范畴对偶  $F$  作用下得到的仿射概形态射  $F(\alpha_A)$ , 定义  $H(A) = (\text{Spec}A, f_A)$ . 对任何  $K$ -交换代数同态  $\varphi : A \rightarrow B$ , 则  $\alpha_B = \varphi\alpha_A$ , 这诱导  $f_B = f_A F(\varphi)$ . 定义  $H(\varphi) = F(\varphi)$ , 那么

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}A & \xleftarrow{F(\varphi)} & \text{Spec}B \\ & \searrow f_A & \swarrow f_B \\ & \text{Spec}K & \end{array}$$

的交换性保证了  $F(\varphi) : H(B) \rightarrow H(A)$  是仿射概形间的  $K$ -概形态射. 所以  $H$  是定义合理的逆变函子. 那么  $H : K\text{-}\mathbf{CAlg} \rightarrow K\text{-}\mathbf{AffSch}$  是范畴对偶.

*Proof.* 先说明  $H$  是本质满函子, 任取  $K$ -仿射概形  $(X, f)$ , 可不妨设  $X = \mathrm{Spec} A, f : \mathrm{Spec} A \rightarrow \mathrm{Spec} K$ . 因为 [定理1.20] 保证了函子  $F$  是满函子, 所以存在环同态  $\alpha_A : K \rightarrow A$  使得  $F(\alpha_A) = f$ , 由  $\alpha_A$  可将  $A$  视作  $K$ -代数. 进而  $(X, f) \cong H(A)$ , 故  $H$  是本质满函子. 故只需要说明对任何  $K$ -交换代数  $A, B$ ,  $H : \mathrm{Hom}_{K\text{-}\mathbf{CAlg}}(A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_{K\text{-}\mathbf{AffSch}}(HB, HA), \varphi \mapsto H(\varphi) = F(\varphi)$  是双射, 而这由  $F$  是忠实满函子保证.  $\square$

**Remark 1.27.** 因为代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇范畴与  $\mathbb{k}$ -仿射半素交换代数范畴间有范畴对偶, 故该定理表明  $\mathbb{k}$  上仿射簇范畴可忠实满地嵌入  $\mathbb{k}$ -仿射概形范畴.

所以研究交换环  $K$  上的仿射概形本质上就是研究  $K$ -交换代数.

**Conclusion.** 本节首先对任何含么交换环  $R$  的素谱  $\mathrm{Spec} R$  定义了其上结构层使得  $(\mathrm{Spec} R, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} R})$  成为局部赋环空间 ([定理1.17]). 因为  $\Gamma(\mathrm{Spec} R, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} R}) \cong R$ , 所以素谱上的结构层蕴含了环的所有结构信息. 一般地, 不同构的含么交换环可能有同胚的素谱, 但带有结构层的素谱在同构意义下可重塑环 ([推论1.19]). 代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇范畴与  $\mathbb{k}$ -仿射半素交换代数范畴间有自然的对偶, [定理1.20] 表明当把  $\mathbb{k}$ -仿射半素交换代数范畴替换成更一般的交换环范畴时, 仿射概形范畴是与之对偶的几何范畴. 由于代数闭域上仿射簇和其坐标环的极大谱间有标准同胚, 所以用素谱作为定义仿射概形的底空间并不自然. 选取素谱替代极大谱来作为仿射概形的底空间的一个根本原因是它能保证极大谱无法具有的某种函子性质——极大理想关于环同态的原像未必是极大理想. [例1.21] 指出代数闭域上带有正则函数环层的仿射簇虽然是局部赋环空间但一般不是仿射概形. 类似流形是局部欧式的, 概形是局部仿射概形的 ([定义1.24]). 结尾介绍了给定概形上的概形以及交换环上的概形, [定理1.26] 表明给定交换环上概形范畴与该交换环上交换代数范畴间有自然的对偶, 进而知代数闭域  $\mathbb{k}$  上仿射簇范畴可忠实满地嵌入  $\mathbb{k}$ -仿射概形范畴, 由此可在概形框架下研究仿射簇.

## 参考文献

- [GW20] U. Görtz and T. Wedhorn. *Algebraic Geometry I: Schemes*. Springer Spektrum Wiesbaden, 2020.
- [Har77] R. Hartshorne. *Algebraic geometry*, volume 52. Springer Science & Business Media, 1977.